NEU 5230.6

X2

WHITNEY LIBRARY,

HARVARD UNIVERSITY.

THE GIFT OF

J. D. WHITNEY,

Sturgis Hooper Professor

IN THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

6185

March 25, 1910

Allgemeines

REPERTORIUM

für das

Decennium 1850—1859.

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

I. Autoren-Register.

A.

A. bedeutet Aufsatz, — B. briefliche Mittheilung, — R. Referat, Recension, Anzeige selbstständiger Schriften. Die Autor-Namen in blossen Bücher- und Aufsatz-Titeln sind nicht beachtet.

	Jahrg.	Seite
Abel, J.: die Erz-Lagerstätten Serbiens. R.	1852	736
Abel, F. A.: krystallisirtes Zinnoxyd. R.	59	815
Abegg, H.: Pseudomorphosen im Münster-Thale, Arfredsonit u. s. w. B.	59	803
Abich, H.: Soda der Araxes-Ebene in Armenien. R.	51	90
— — Höhen in Dagestan und Transkaukasien R.	51	205
— — Sammlung von Kreide-Versteinerungen aus Dagestan. R. . .	51	744
— — Krater-förmige Erdstürze im Gouvt. Tula. R.	55	581
— — Eocän-Gebilde im Süden des Urals und am Aral-See. R. . .	56	576
— — chemische Untersuchungen über das Kaspische Meer, den Urmia- und den Van-See und ihre Umgebungen. R.	56	694
— — Schwefel-reiches Tuff-Gestein um Dyadin. R.	57	459
— — das Steinsalz in Russisch-Armenien, Paläontologischer Theil. R.	57	500
— — über Dumont's Geologische Karte von Europa, soweit sie den Kaukasus betrifft A.	57	769
— — Geologische Karte und Paläontologie des Kaukasus. B. . . .	57	808
— — die Mangan-Erze in Transkaukasien. R.	58	596
— — Prodromus einer Geologie der Kaukasus-Länder. R.	58	736
— — Beiträge zur Paläontologie des Asiatischen Russlands, 4. R. .	58	739
Abriuzkji: Ausbruch eines Schlamm-Vulkans auf Taman. R. . . .	55	460
— — Ausbruch eines Schlamm-Vulkans auf Taman, 1853. R. . .	56	715
Achenbach, Ad.: Höhlen in den Hohenzollern'schen Landen. R. . .	57	724
— — geognostische Beschreibung von Hohenzollern. R.	58	719
Acosta: zur Kenntniss der Sierra Nevada in Mexiko. R.	50	229
— — über den Vulkan von Zamba (bei Carthagena). R.	51	208
— — Wirkung schwefelsaurer Dämpfe auf Hornblende-haltige Trachyte. R.	52	962
— — Geologie von Neu-Granada. R.	54	362
— — Wirkung schwefelsaurer Wasser auf Trachyt. R.	55	363
Agassiz: progressive, prophetische und embryonische Typen. R. . .	50	374
— — „Lake superior, its physikal Charakter" etc. Boston 8° R. .	50	471
— — geographische Verbreitung der Thiere. R.	50	509
— — Zusammenhang zwischen Organisations-Stufe und Wohn-Element der Thiere. R.	51	115
— — verschiedener Ursprung der Menschen-Rassen. R.	51	369
— — die Korallen-Riffe von Florida. R.	54	223
— — ursprüngliche Verschiedenheiten und Zahlen der Thiere. R. .	55	218
— — Provinzen der Thier-Welt und Menschen-Typen. R.	55	608

	Jahrg.	Seite
Agassiz: Verhältniss zwischen fossilen und lebenden Thier-Formen. R.	1855	762
— — die Milleporae und andere bisherige Polyparien sind Hydroiden aus der Klasse der Acalephen. B.	59	67
— — an Essay on classification, London 1859. R.	59	362
Aichhorn: Aceratherium-Knochen in Steyermark. R.	57	375
Airy, G. B.: Berechnung der Anziehung von Gebirgs-Massen R.	57	98
Albers, J. Chr.: Malacographia Maderensis, Berolini 1855, 4°. R.	55	507
Allain und Bartenbach: Gold in Kiesen von Chessy und St.-Bel. R	50	444
d'Alton, E und H. Burmeister: „der fossile Gavial von Boll" 1854. R.	55	104
Andeer, P. J.: der Albula, historisch-geognostisch beschrieben. R.	58	724
Anderson, Th.: Gurolith, ein neues Mineral, Beschreibung und Zerlegung. R.	52	210
Anderson, C.: muthmasslicher Ursprung des Goldes. R.	56	67
Anderson, J.: Fisch-Reste im Old-red von Dura-Den. R.	59	490
Andler: die Angulaten-Schichten der Württembergischen Jura-Formation. A.	58	641
Andrä, C. A.: geognostische Karte von Halle, Text dazu. R.	51	102
— — Kohlen-Pflanzen von Wettin und Löbejün. R	51	475
— — geologische Verhältnisse um Magdeburg. R.	52	362
Andrä, K. J.: zur fossilen Flora Siebenbürgens und des Banates. R.	56	251
Andrews: neue Magneteisen-Mischung aus dem Mourne-Gebirge. R.	53	464
— — Mineral-Zusammensetzung basalt. und metamorph. Gesteine R.	55	829
Andrian, v., F.: die Gegend von Brixlegg und Kitzbüchel in Tyrol. R.	59	306
— — Erz-Lagerstätten im Zipser und Gömörer Komitat. R.	59	318
— — das Schiefer-Gebirge in der Zips und anstossenden Komitaten R.	59	479
— — geognostische Verhältnisse der Umgegend von Dobschau. R.	59	738
Angelin „Palaeontologia Suecica", Lundae, 1851, I. 8°. R.	52	242
— — „Palaeontologia Suecica", Fasc. II. 1854. R.	54	492
Anisomow: die Naphtha von Taman. R.	51	718
Ansted, D. T.: „Elementary Course of Geology, Mineralogy etc. London 8°. R.	50	622
— — Endosiphonites n. g. aus den Schiefern von Cornwall. R.	54	849
Antos, J.: Vorkommen des Schwefels in Siebenbürgen. R.	54	836
d'Archiac: Fossilien der Nummuliten-Gruppe um Bayonne. R.	51	750
— — Geologischer Durchschnitt von Bains-de-Rennes, Aude. R.	55	591
— — Geologie der Corbières-Kette im Aude-Dpt. R.	56	355
d'Archiac und J. Haime: geologisch-geograph. Verbreitung der Nummuliten. R.	54	457
Argéliez: der Lias von Milhau, Aveyron-Dpt, und seine Versteinerungen. R.	56	732
Argyll, v.: Fossilien-Schicht unter Trapp auf Mull. R.	51	487
Armbrust, Fr.: Bemerkungen über Belemnitella mucronata und B. quadrata. A.	59	421
Arnd's in Sympheropol gesammelte Versteinerungen. R.	53	759
Arnoux: Mineralien aus Cochinchina. R.	56	566
— — Mineralien von Quang-ngai in Cochinchina. R.	58	77
Arriens, T: Ersteigung des Vulkans Kloed auf Java. R.	58	80
Ashley, J. A.: Zusammensetzung des Themse-Wassers. R.	51	353
Ashley und Clark: Zerlegung des Themse-Wassers. R.	52	215
Atkinson: Malachit bei Jekaterinburg. R.	59	289
Aucapitaine, H.: Durchlöcherung von Felsen durch Pholaden. R.	54	733
— — Ausbruch des Vesuvs im Jahre 1850. R.	51	209
Austin, Th.: „Monograph of recent and fossil Crinoidea, 1—9, London 4°. R.	56	761
Aveline und Salter: der Caradoc-Sandstein in Shropshire. R.	54	487
Aymard, A.: Petrefakten-reiche Schichten im oberen Loire-Becken. R.	54	831

B.

	Jahrg.	Seite
Babinet: Theorie der See-Strömungen. R.	1852	224
Bach, H.: „Theorie der Bergzeichnung“ Stuttgart 1853. R.	54	362
— — geologische Karte von Zentral-Europa. R.	59	625
Baer, W.: Analyse von Pimelit. R.	54	182
Baer, v.: das Kaspische Meer und seine Mollusken-Fauna. R. . .	56	591
Bahr: gediegen Eisen in sogen. versteinertem Baum gefunden. R. .	54	175
— — Analysen Schwedischer Mineralien. R.	54	179
— — über Sideroferrit in versteintem Holze. R.	54	446
Bailey: Ausdehnung der miocänen Infusorien-Schicht Marylands. R. .	50	720
— — mikroskopische Untersuchung von Schlamm-Proben aus verschiedenen Tiefen des Atlantischen Ozeans. R.	53	374
— — Diatomaceen-Erden in Californien und Oregon. R.	56	354
— — Entstehung des Grünsandes in unsren Meeren. R.	57	91
— — vulkanische Asche im Grunde des Atlantischen Ozeans. R. .	58	104
— — mikroskopische Untersuchung der von Berryman zwischen Irland und dem arktischen Meere herauf-gebrachten Grund-Proben. R.	59	225
Baily, H.: Beschreibung fossiler Reste aus Kreide-Gesteinen von Port-Natal. R.	57	369
Baily, W. H.: Beschreibung von Evertebraten-Resten aus der Krim. R.	58	873
Baird: Knochen-Höhlen in Pennsylvanien. R.	51	481
Balleul: Erscheinungen bei'm Ausbruche des Vesuvs im J. 1850. R.	51	465
Balling, Fr.: Silber-Bergbau bei Tabor in Böhmen. R.	55	81
Banks, R. W.: die Tilestones bei Kington und ihre Einschlüsse. R. .	58	715
Bäntsch: analysirt Arsenik-Kies der Kohlen-Formation von Wettin. R.	57	835
Barbot de St-Marny: Olivin, Chrysoberyll und Disthen in Ural'schen Goldseifen. R.	58	569
— — Korund in Ural'schen Goldseifen. R.	58	695
Barrande, J.: Versuch einer Klassification der Trilobiten. A. . . .	50	769
— — „Graptolithes de Bohème, Prague 1850, 8°“. R.	51	123
— — Werk über die silurischen Versteinerungen Böhmens, I. B. .	52	204
— — Unterscheidung verschiedener Trilobiten-Schöpfungen. A. . .	52	257
— — anachronische Thier-Kolonie'n in Silur-Schichten. B. . . .	52	306
— — über Suess's Böhmische Graptolithen (mit Holzschn.). A. . .	52	399
— — Plaesiocoma Corda's ist ein Homalonotus. R.	53	128
— — Wiederholung der Silur-Fauna Böhmens in Wisconsin und New-York nach D. D. Owen und J. Hall; über Dithyrocaris. B. .	53	335
— — Silur-Gebilde in Texas und am oberen See. B.	53	446
— — „Système Silurien du centre de la Bohème, I. Paléontologie (Trilobites)“ 1853, 4°. R.	53	482
— — Beobachtungen über die Kruster, Flossenfüsser und Kopffüsser des Böhmen'schen Silur-Gebirges, Tf. 1. A.	54	1
— — Werk über Böhmens Silur-Versteinerungen; Repertoire des Trilobites. B.	54	44
— — die Devonische Flora in Thüringen. B.	54	496
— — Beziehungen zwischen Stratigraphie und Paläontologie. R. .	54	616
— — Ascoceras der Prototyp von Nautilus, Tf. 3. A.	55	257
— — Abhandlung über Ascoceras; Arbeiten über Cephalopoden. B.	55	320
— — organische Ausfüllung des Siphons in paläozoischen Cephalopoden-Schaalen Tf. 6. A.	55	385
— — „le dépôts siluriens de Bohème et de Scandinavie, Prague“. R.	56	219
— — die Unterscheidungs-Merkmale der Nautiliden, Goniatiliden und Ammonitiden und die neue Sippe Nothoceras 1. Tfl. A. . .	56	308
— — sein Werk über die Böhmen'schen Versteinerungen. B. . .	57	553
— — Silur-Versteinerungen von Rokitzan in Böhmen. R.	57	638

	Jahrg.	Seite
Barrande, J.: über die innre Struktur der Nautiliden-Schaale. A.	1857	679
— — über die Primordial-Fauna. R.	58	361
— — unsere jetzige Kenntniss von der Primordial-Fauna. R.	59	503
— — Werk über die Böhmischen Silur-Versteinerungen. R.	59	608
— — die Primordial-Fauna in Spanien und in Franken (Hof). B.	59	721
— — über die organischen Ablagerungen in den Luft-Kammern der Orthoceraten, Tf. 6. A.	59	780
Barrande, J. und de Verneuil: silurische und devonische Reste von Almaden. R.	56	499
Barrett, L.: über Atlas und Axis des Plesiosaurus. R.	59	383
Bartenbach und Allain: Gold in Kiesen von Chessy und St.-Bel. R.	50	444
Barth, A.: Analyse Jod-haltigen Mineral-Wassers aus Oberbayern. R.	51	349
Barth, L.: Keramohalit (Haarsalz) von Nikolsdorf im Pusterthale. R.	59	305
Bartlett, A. D.: über einige Didus-Knochen. R.	55	489
Bauer: devonische Grauwacke und Kalke des Niederrheins und ihre Versteinerungen. B.	52	192
— — zerlegt Kaolin von Zettlitz bei Karlsbad. R.	58	569
— — Vorkommen von Eisen-Erzen in Schweden. R.	59	184
Bauer und Weselsky: zerlegen ein Mineral-Wasser aus Österreich. R.	58	825
Baumert: Doppelverbindung von Chlor-Calcium und Chlor-Magnesium. R.	57	715
— — Magnetkies von Berncastel an der Mosel. R.	58	695
Bate, C. Sp. über Kirkby's Prosoponiscus problematicus im Magnesia-Kalk. R.	59	489
Bayle, E.: Bau von Hippurites und Radiolites. R.	56	383
— — über Sphaerulites foliaceus. R.	56	384
— — über Radiolites Jouanneti. R.	56	384
— — Zahn-System von Anthracotherium. R.	56	606
— — über Radiolites (Biradiolites) cornu-pastoris. R.	56	753
— — Listriodon splendens u. a. Säugthiere aus der Mollasse von Neuchâtel. R.	57	248
— — Rudisten der Mastrichter Kreide. R.	58	744
Bayle und Coquand: über Domeyko's Sekundär-Versteinerungen von Coquimbo. R.	50	480
Bayle und Ville: Geologie der Provinz Oran in Algerien. R.	56	450
— — — die Provinz Algerien. R.	55	710
Bealey und Forbes: Zinnober von Neu-Almaden in Californien. R.	56	686
Beaudoin: Geologie von Châtillon-sur-Seine, Côte d'or. R.	57	206
Becker, L.: Römische, auf galvanischem Wege vergoldete Münzen B.	50	50
— — Metall-Veränderung an einem ausgegrabenen Dolch. B.	50	51
— — Gewinnung edler Metalle und Steine in Australien. B.	57	312
— — Mineralien der Gold-Gruben Australiens; Knochen-Höhlen in Basalt daselbst; Alter der jetzigen Fauna und Flora Australiens. B.	57	698
— — Gold-Gräbereien in Australien; Knochen des Dingo-Hundes im Gemenge mit denen ausgestorbener Beutelthiere. B.	58	196
— — das allmähliche Aufsteigen der Süd-Küste Neuhollands. A.	58	294
— — Alter der jetzigen Thier- und Pflanzen-Welt in Australien. A.	58	535
Beckles, S. H.: Fährten-Abgüsse in den Wealden-Schichten. R.	52	383
— — Ornithoidichniten der Wealden-Formation in England. R.	55	478
Becquerel: natürliche Mineral-Bildung durch flüssige langsam auf feste wirkende Stoffe. R.	53	470
— — langsame geologische Wirkungen von Wärme und Druck. R.	58	851
Behncke, G. A.: zerlegt Arsenik-Kiese und Arsenik-Eisen. R.	57	713
Beinert: Entstehung Kohlensäure-haltiger Mineral-Wasser. R.	50	464
— — Polyptychodon-Zahn im unteren Quader Schlesiens. R.	54	863
Belcher, E.: Ichthyosaurus im arktischen Nord-Amerika. R.	56	95
— — senkrechter Baumstamm im Schlamm-Boden der Polar-Gegend R.	57	100

	Jahrg.	Seite
Bellardi, L.: „Monografia delle Colombelle fossili", Torino 1848, 8°". R.	1850	751
— — nummulitische Versteinerungen aus Ägypten. R.	51	764
— — „Monografia delle Mitre fossili del Piemonte". R.	52	1002
— — die Fossil-Reste der Nummuliten-Formation Nizza's. R.	53	603
— — Versteinerungen aus dem Nummuliten-Gebirge Ägyptens. R.	57	229
Benett: Untersuchung des Themse-Wassers von Greenwich. R.	51	591
Bennigsen-Förder, v.: über eine selbstständige Diluvialmergel-Schicht. R.	58	94
— — verschwemmte Kreide-Polythalamien im Löss. R.	57	609
Benoît, E.: Kreide-Gebirge im Ain-Dpt. R.	59	313
Bensch, A.: Verhalten von Basalt in Wasser und Luft. R.	55	597
Berendt, G. C. und Koch: „Kruster, Myriapoden, Arachniden und Apteren in Bernstein", Berlin 1854, fol. R.	55	119
Berendt, G. C.: organische Reste im Bernstein; II, 1. Hemiptera und Orthoptera; II, 11. Neuroptera, 1856. R.	56	619
Bergemann, C.: das Meteoreisen von Zacatecas. R.	50	446
— — Gelbbleierz von Azulaques in Zacatecas. R.	51	348
— — Zerlegung von Arseniksaurem Blei aus Zacatecas. R.	51	591
— — Dechenit ein Vanadin-saures Bleioxyd in Rhein-Bayern. R.	52	211
— — Allanit in Gneiss von Westpoint, Neu-York. R.	53	58
— — Granat-ähnliches Mineral von Brevig in Nerwegen. R.	53	60
— — Eisen-Natrolith von Brevig in Norwegen. R.	54	73
— — ein dem Sodalith ähnliches Mineral. R.	54	174
— — Ytter-Granat aus Norwegen. R.	55	833
— — Mineral-Analysen, Mangan-Blende, Gramenit, Aräoxen. A.	57	393
— — eigenthümliches Mineral vom Menzenberg im Siebengebirge. R.	57	721
— — über Ehlit, ein Phosphor- und Vanadin-saures Kupfer-Oxyd. A.	58	190
— — feldspathiger Bestandtheil des Zirkon-Syenits. R.	58	577
— — der Feldspath-artige Gemengtheil des Zirkon-Syenits. R.	59	447
— — Krantzit ein neues fossiles Harz. R.	59	448
— — Nickel-Erze auf einem Uranerz-führenden Gange. R.	59	450
— — Zusammensetzung des Meteoreisens im Allgemeinen. R.	59	737
Berger: geognostische Karte von Coburg; Semionotus Bergeri. B.	54	321
— — die Keuper-Formation mit ihren Konchylien in der Gegend von Coburg, Tf. 6. A.	54	408
— — die Versteinerungen im Röth von Hildburghausen. A.	59	168
Berlin, N. J.: zerlegt rothen Zeolith von Upsala. R.	50	348
— — analysirt Stilbit aus Schweden und Norwegen. R.	50	455
— — Thulit von Arendal. R.	51	92
— — Analyse des Sodalith's von Lamö bei Brevig. R.	51	198
— — Zerlegung des Pyrophyllits von Westanä in Schoonen. R.	52	703
— — Tachyaphaltit; ein neues Norwegisches Mineral. R.	53	595
— — Zusammensetzung des Mosandrits. R.	53	600
— — Erdmannit, ein neues Norwegisches Mineral. R.	56	35
Berlin, N. J., v. Borck und Weibye: über den Eudnophit von Brevig. R.	50	703
Berville de, P.: Pseudocarcinus Chauvini im unteren Grobkalke. R.	57	764
Besnard, A. F.: die Mineralien Bayerns nach ihren Fundstätten. R.	55	348
Beust v., F. C.: Erz-Gänge und ihre Beziehungen zu den Porphyr-Zügen im Erzgebirge. R.	56	569
Beyrich: zur geognostischen Karte der Gegend von Regensburg. R.	50	624
— — tertiäre Thone von Osnabrück. R.	52	358
— — Richters Nereiten und Myrianiten bei Saalfeld sind mit den Englischen und Nordamerikanischen übereinstimmend. R.	53	123
— — organische Reste der Lettenkohle in Thüringen. R.	53	220
— — „die Konchylien des Norddeutschen Tertiär-Gebirges" (8°, I. 1853). R.	53	624
— — „die Konchylien des Norddeutschen Tertiär-Gebirges" II. III. R.	54	626

	Jahrg.	Seite
Beyrich: Graptolithen im Schlesischen Gebirge. R.	1855	717
— — über Oligocän-Gebirge; Chelocrinus; Encrinus. B.	56	27
— — Alter der Schossnitzer Pflanzen und des Bernsteins. R.	56	227
— — Konchylien des Norddeutschen Tertiär-Gebirges III. IV. R.	56	477
— — Palaechinus Rhenanus in der Rheinischen Grauwacke. R.	58	110
— — Konchylien des Norddeutschen Tertiär-Gebirges VI. R.	58	635
— — Abgrenzung der oligocänen Tertiär-Zeit. R.	58	713
— — die Krinoiden des Muschelkalkes, Berlin 1858, 4°. R.	58	761
— — die Ammoniten des unteren Muschelkalkes. R.	59	497
Bibra, v.: Vorkommen des Atakamits in Bolivia. R.	53	452
Bickel, C.: zerlegt Quellen-Erzeugnisse Islands. R.	50	344
Billings, E.: die unter-silurischen Cystideen Canadas. R.	59	635
— — die unter-silurischen Asteriaden Canadas. R.	59	636
Billings, E.: neue Brachiopoden-Sippe Centronella u. a. Arten. R.	59	758
Billings, E. und J. W. Salter: Cyclocystoides eine silurische Echinodermen-Sippe. R.	59	636
Binfield, W. R. und H.: Wealden-Schichten mit Insekten in Sussex. R.	57	99
Binkhorst, J. T.: neue Krebse aus Mastrichter Kreide. R.	58	231
— — das Kreide-Gebirge bei Ciply, Jauche etc. R.	59	106
— — „Esquisse etc. des couches crétacées du Limbourg". R.	59	466
— — Rudisten der Mastrichter Kreide. B.	59	177
Binney, E. W.: Fuss-Spuren im Millstone-grit Cheshire's. R.	57	124
— — permischer Charakter der rothen Sandsteine Schottlands. R.	57	732
— — Vierfüsser-Fährten im Millstone-grit Cheshire's. R.	57	754
— — über Stigmaria ficoides	59	367
Bischof, G: Pseudomorphosen von Feldspath und Zeolithen: Analyse des Flussspathes, Verwandlungs-Prozess; wasserfreie Silikate (Feldspath) auf Erz-Gängen in Norwegen und Ungarn; krystallisirter Feldspath in Sedimentär-Bildungen an der Lenne u. a.; Granit- und Quarz-Gänge darin und zumal in Serpentin. B.	50	43
— — über die Absätze des Rheines. A.	52	385
— — über die Elbe-Anschwemmungen bei Hamburg. B.	52	588
— — Bewegung der Weltkörper etc. physikalisch erklärt. R.	52	739
— — Steinsalz-Analysen; Soolen-Schichtung; Schlamm-Führung der Donau und des Rheins. R.	53	721
— — Speckstein-Pseudomorphose nach Grammatit von Neu-York. R.	54	346
— — Breithaupt's Weisszinnerz ist kieselsaures Zinn-Oxyd. R.	54	346
— — zerlegt Thonsteine und Feldstein-Porphyre. R.	54	347
— — Bildungs-Weise der Erze in Gängen. R.	54	365
— — Kaolin-Pseudomorphose aus Feldspath. R.	54	448
— — zerlegt Steinsalz verschiedener Gegenden. R.	55	74
— — analysirt Trüb-Wasser des Boven-river in Surinam. R.	55	702
— — Wirkung schwacher Lösungs-Mittel auf Kalkstein. R.	55	838
— — zerlegt Breithaupt's weisses Zinnerz aus Cornwall. R.	55	841
— — „Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie" R.	56	211
Bischoff's Petrefakten-Sammlung käuflich. R.	57	128
Blackwell, S. H.: Feuer-Gesteine im Kohlen-Gebirge Staffordshires. R.	51	477
Blake, W. P.: krystallisirtes kohlensaures Lanthan-Oxyd. R.	54	444
— — Fossils and Shells collected in California 1853–54. R.	57	241
— — Calchihuitl von Santa-Fé ist Türkis. R.	58	580
Blanchard, E.: fossile Gallinaceen-Knochen im Pariser Gypse. R.	57	765
Bleeker: Umgegend (geologische) von Batavia. R.	50	82
Blofeld, J. H.: das Eiland St.-Helena. R.	54	834
Blomstrand, C. W.: Prehnitoid von Wexiö. R.	57	69
— — Orthit von Wexiö in Schweden. R.	57	442
— — Labrador aus Schweden. R.	57	717

	Jahrg.	Seite
Blomstrand, C. W.: Labrador von Ulatutan bei Lund. R. . . .	1858	470
— — Prehnitoid von Wexiö in Schweden. R.	59	294
— — Analyse des Orthits von Wexiö in Schweden. R.	59	819
Blondeau: Vulkanische Umwandlung von schwefeliger in Schwefel-Säure. R.	50	492
— — Verschlechterung des Brunnen-Wassers. R.	50	623
— — natürliche Quellen von Schwefelsäure. R.	51	199
— — Untersuchung des Mineral-Wassers von Cransac. R.	52	66
Blum, J. R.: mineralogische Beobachtungen. A.	51	658
— — Lehrbuch der Oryktognosie, 3. Aufl. 1854. R.	54	701
— — Mineralogische Mittheilungen. A.	58	287
Blyth, J. und R. Harkness: Lignite von Giants-Causeway. R. . . .	56	732
Bobierre, A.: Bank fossilen Tanges zu Kérouen, Finistère. R. . .	52	338
Böcking, M.: Meteoreisen von Ruffs-Mountain, S.-Carolina. R. . . .	56	51
— — das Anlaufen des Buntkupfererzes. R.	56	191
— — Meteoreisen vom Vorgebirge der guten Hoffnung. R. . . .	56	843
— — Buntkupfererz von Coquimbo in Chili. R.	57	169
Bojarschinow: ein dritter Erz-Gang in der Silber-Grube Siränowosk. R.	54	832
Boll, E.: die Brachiopoden der Kreide-Formation in Meklenburg. R.	57	116
— — Beyrichia-Arten im Silur-Gerölle Nord-Deutschlands. R. . .	57	362
— — silurische Cephalopoden in Norddeutschen Geschieben. R. . .	58	234
Bollaert: Natron-Salpeter in Tarapaca, Süd-Peru. R.	53	835
— — Mastodon-Knochen aus Chile. R.	58	622
Bolley, P: Bildungs-Weise der natürlichen Borax-Säure. R. . . .	50	341
— — Überrindung thönerner Wasserleitungs-Röhren. R.	55	711
Bonaparte, Ch.: Lebender Notornis aus Neuseeland. R.	51	256
— — fossile Ornithologie R.	57	633
Bork, v., Berlin und Weibye: über den Eudnophit von Brevig. R. .	50	703
Borne, von dem: Orthoceratites undulatus ist das Ende von Lituites lituus. R.	53	123
— — Krystalle von schwefelsaurem Strontian. R.	57	329
Bornemann, J. G.: Geologie des Ohm-Gebirges. B.	51	815
— — geognostische Verhältnisse des Ohm-Gebirges bei Worbis, Tfl. 1. A.	52	1
— — Daucina eine Foraminiferen-Sippe Brasiliens. R.	55	859
— — die Grenze zwischen Keuper und Letten-Kohle in Thüringen R.	56	59
— — organische Reste der Letten-Kohle Thüringens. R.	56	615
— — Foraminiferen und Entomostraceen von Hermsdorf. R. . . .	56	755
Bosquet, J.: „Entomostracés tertiaires de la Belgique", Bruxelles 4°. R.	53	98
— — „les Crustacés du terrain crétacé de Limbourg 1854, 4. R. .	55	125
— — neue Brachiopoden des Mastrichter Systems (Maestrichtien). R.	55	239
— — Cirripèdes crétacés de Limbourg, 1857. 4°. R.	58	620
Boucard: Geologie der Provinzen Panama und Veraguas in Neu-Granada. R.	52	740
Bouchard-Chantereaux: Davidsonia, eine neue Brachiopoden-Sippe. R.	50	756
Boudon: Beschreibung fossiler Konchylien. R.	57	623
Boué, A.: Erklärung der ehemaligen Temperatur-Verhältnisse der Erde. R.	55	104
— — das Erz-Revier Maïdan-Pek in Serbien. R.	56	710
— — Erdbeben von 1857, Dez., 1858, Jan. und Febr. R. . . .	59	857
Bouis, J: Borsäure in Schwefel-Wasser von Olette, Ost-Pyrenäen. R.	53	474
— — Borsäure in den Schwefel-Quellen der Pyrenäen. R.	54	72
Bourgeois: Knochen Breccie zu Vallières-les-grandes, Cher-et-Loire. R.	54	473
Bouriot, A.: Gegend von Forges-les-Eaux, Seine infér. R. . . .	51	363
Borntträger: Analyse des Berylls von Zwiesel und der Zinkblende von Joachimsthal. B.	51	674
— — Zerlegung eines Clausthaler Fahlerzes. B.	56	335
Boussingault und Lewy: Zerlegung der Boden-Gase. R.	55	352

	Jahrg.	Seite
Boutron-Charlard und O. Henry: Analyse des Wassers vom Todten Meere. R.	1853	63
— — zerlegen Jordan-Wasser. R.	53	187
Bowerbank: Alcyonites parasiticus in Achat. R.	51	761
— — Riesen-Vogel im London-Thone auf Sheppey. R.	52	992
— — Grösse des Carcharias megalodon aus Red Crag. R.	52	1001
— — Pterodactylus-Arten der Englischen Kreide. R.	53	105
— — Riesen-Vogel Lithornis emuinus im London-Thon. R.	55	220
— — Feuerstein-Gebilde der Kreide durch Schwämme. R.	57	89
— — Sphaeronites tessellatus Phill. ist ein Schwamm. R.	57	766
Boye: magnetisches Schwefeleisen in Gap-mine, Pa. R.	53	838
Brandt, J. F.: Schneidezähne bei Rhinoceros tichorhinus. R.	50	880
Braun, Alex.: fossile Goniopteris-Arten. R.	53	760
— — Beitrag zur Flora der Tertiär-Zeit, Tf. 3. A.	54	138
Braun, M.: Blende am Wetternsee in Schweden. R.	58	690
Bravais, A.: Theorie der Zusammenfügungen auf Krystallographie angewendet. R.	50	217
Breidenstein: Mesolith aus Island. R.	56	346
Breithaupt, A.: Glaukodot, ein neues Mineral von Huasko in Chile. R.	50	71
— — Pyrolusit nach Polianit und Manganit; Werners-Fest. B.	50	193
— — Embolit oder Bromchlorsilber von Copiapo. R.	50	444
— — über Lepolith, Lindsayit und Hyposklerit. R.	50	618
— — über den Lonchidit aus Sachsen und England. R.	50	701
— — zerbrochene Krystalle im Gestein; Alter des Gypses. B.	50	835
— — mineralogische Beschreibung des Arkansits. R.	50	846
— — über den Konichalzit aus Andalusien. R.	51	91
— — Kalkspath auf Lagern im Gneisse Norwegens. R.	51	588
— — Rhipidolith vom Schwarzenstein in Tyrol. R.	51	595
— — Enargit, ein neues Mineral aus der Ordnung der Glanze. R.	52	67
— — Aigirin ein neues Mineral aus Norwegen. R.	52	70
— — über den Leuchtenbergit. R.	52	704
— — Glaukodot von Orawitza im Banate. R.	52	711
— — Antimon im Reussischen Voigtlande. R.	53	193
— — Achtarandit-Pseudomorphosen nach Helvin. R.	53	596
— — Rosenspath-Pseudomorphose nach Kalkspath. R.	53	600
— — Barit-Pseudomorphose nach Kalkspath. R.	53	601
— — Kalkspath nach Pyromorphit. R.	53	695
— — Quarz-Pseudomorphose nach Rosenspath. R.	53	695
— — Chalcedon pseudomorph nach Pyromorphit. R.	53	700
— — Chlorit pseudomorph nach Oligonit. R.	53	700
— — Gediegen-Kupfer pseudomorph nach Aragonit. R.	53	701
— — Perlspath-Pseudomorphose nach Kalkspath. R.	53	708
— — Pseudomorphosen von Eisenkies, Rotheisenerz und Nadeleisenerz nach Baryt. R.	53	837
— — Pikrophyllit- und Grünerde-Pseudomorphosen nach Augit. R.	53	837
— — Prehnit und Quarz pseudomorph nach Natrolith. R.	53	843
— — Silber und Silberglanz pseudomorph nach Rothgiltigerz. R.	53	843
— — Chlorit pseudomorph nach Quarz und Turmalin. R.	53	844
— — Magneteisen pseudomorph nach Glanzeisenerz. R.	54	68
— — Kupferkies pseudomorph nach Nadelerz. R.	54	76
— — Beraunit-Pseudomorphose nach Vivianit. R.	54	174
— — Pseudomorphose von Serpentin nach Augit. R.	54	181
— — Eisenkies und Kalkspath nach Anhydrit. R.	54	187
— — Erz-Gänge zu Mornhausen in Hessen-Darmstadt. R.	54	192
— — über den Schneckenstein im Sächsischen Voigtlande. A.	54	787
— — über 25 Abänderungen Gold-haltiger Alluvionen Sibiriens. R.	54	822

	Jahrg.	Seite
Breithaupt, A.: Erbsen-förmiger Kalksinter in Stollen bei Freiberg. R.	1855	71
— — Weissbleierz nach Bleiglanz. R.	55	72
— — Pseudomorphose von Eisenspath in Roth- und Glanz-Eisen. R	55	76
— — Gang-Vorkommnisse bei Quadalajara in Spanien. R.	55	705
— — Pseudomorphose von? Rothzinkerz nach Blende. R.	55	841
— — Tautoklin nach Kalkspath-Form. R.	55	842
— — Pinguit-Pseudomorphose nach Flussspath. R.	56	35
— — Glanzeisenerz-Pseudomorphose nach Flussspath R.	56	36
— — eigenthümliche Pseudomorphosen. R.	56	38
— — Gediegenkupfer-Pseudomorphosen nach Rothkupfererz. R.	56	182
— — Brauneisenerz-Pseudomorphosen nach Eisenkies. R.	56	182
— — Quarz-Pseudomorphosen nach Rothkupfererz. R.	56	182
— — sogen. Kälber im Thonschiefer Thüringens. R.	56	186
— — Gediegen-Gold aus Australien und Californien. R.	56	188
— — Antimon-Glanz von Hof. R.	56	196
— — neue Zeolithe vom Monte Catini in Toscana. R.	57	176
— — Gediegen-Blei von Perote in Veracruz. R.	57	717
— — Quarz-Krystalle von der Himmelfahrtsgrube bei Freiberg. R.	57	832
— — Vorkommen von Steinsalz in Serbien. R.	58	87
— — Gediegen-Silber der Grube Himmelsfürst bei Freiberg. R.	58	566
— — Röttisit und Konarit, neue Mineralien Sachsens. R.	59	184
— — Gediegen-Gold aus Antioquia in Neu-Granada. R.	59	190
— — Homichlin ein neues Mineral von Plauen. R.	59	196
— — Modifikation des Kohlenstoffs. R.	59	816
Breslau: Ozokerit im Wettiner Steinkohlen-Reviere. R.	51	350
Brewster, D.: Flüssigkeiten in Mineral-Höhlungen. R.	54	819
— — Höhlungen mit Flüssigkeit in Bernstein. R.	55	842
— — Höhlungen in Topas mit Flüssigkeit gefüllt. R.	56	43
Brodie: neue Libellula- und Lepidolepis-Arten im Lias R.	50	118
— — gewisse Schichten im Unteroolith von Cheltenham. B.	51	484
— — die ältesten Pollicipes-Arten aus dem Unterlias. R.	57	491
— — der obere Keupersandstein in Warwickshire. R.	58	227
Bromeis, Th.: Schwefelwasserstoff-haltige Soolquelle bei Hannover. R.	50	453
Bromeis, C.: Osteolith-Vorkommen im Dolomit der Wetterau. R.	53	705
Brongniart, Ad.: über die fossilen Pflanzen. R.	50	105
Bronn, H. G.: „Geschichte der Natur", Lieff. 28—30. R.	50	233
— — Gampsonyx fimbriatus Jord., aus der Steinkohlen-Formation von Saarbrücken und dem Murg-Thale. A.	50	575
— — verglichene Vollkommenheits-Stufen der gamopetalen und dialypetalen Dikotyledonen. A.:	52	420
— — „Lethaea geognostica" 3. Aufl., III Bände in 6 Theilen. R.	56	634
— — über das geologische Entwickelungs-Gesetz der Muschelthiere. A.	56	640
— — zur Geschichte des Meteoreisens von Atacama. A.	57	257
— — über die fossilen Eindrücke der Regentropfen. A.	57	407
— — Beiträge zur triasischen Fauna und Flora der bituminösen Schiefer von Raibl (mit 9 Tfln.). 8. A.	58, 1, 129;	59, 39
— — über die Farnen-Sippe Chiropteris Kurr in Lettenkohlen-Sandstein (mit 1 Tfl.) A.	58	143
— — die Entwickelungs-Gesetze der organischen Welt, Stuttg. 8°. R.	58	635
— — Petrefakten-Sammlungen in Heidelberg. R.	59	878
Bronn, H. G. und J. Roemer: Lethaea geognostica, 3. Aufl., neue Lieff. R.	54	855
Brooke, H. J.: muthmassliche Trona-Krystalle. R.	54	448
Brown, R.: aufrechte Sigillaria-Stämme in Kohle von Cape Breton. R.	51	754
Brown, G. W.: analysirt angespülten Kelp. R.	54	820
Brown, J.: Bos priscus in Essex. R.	58	128

	Jahrg.	Seite
Bruchhausen, v., W.: Berücksichtigung der Hochwasser in der Erd-Geschichte. B.	1850	824
— — Erd-Gestalt; Schwierigkeit bei Höhen-Bestimmungen aus dem Barometer-Stande; Wirkung der Anziehungs-Kraft nahe-stehender Gebirgs-Massen und grosser veränderlicher Gletscher-Anhäufungen auf benachbarte Meere; Eis-Zeit; wechselnde Meeres-Hebungen am Nord- und Süd-Pol in 21000jährigen Perioden. B.	52	435
— — Schichten-Wechsel n 21000jährigen Erd-Perioden B.	52	595
Bruckmann, A. E.: die Öningener Steinbrüche und ihre Pflanzen-Reste. R.	50	499
— — Flysch und Nummuliten-Gestein der Alpen. B.	50	602
— — „der artesische Brunnen zu Isny", Stuttg. 1851. R.	51	470
— — Flora Oeningensis fossilis, Nachtrag. R.	52	760
Brush und Dana: Untersuchung von Triphan aus Amerika. R.	52	852
Brush, G. J. u. L. Smith: Unionit ist Oligoklas. R.	54	189
— — — — Bowenit gehört zum Serpentin. R.	54	189
— — — — Chesterlith-Kalk ist ein Glimmer. R.	54	442
— — — — zerlegen Nickel-Smaragd. R.	54	815
— — — — zerlegen Margarodit aus der Monroe-Co. R.	54	816
— — — — Emerylith identisch mit Margarit. R.	54	819
— — — — zerlegen sogen. Dysyntribit. R.	54	821
— — — — über den Euphyllit. R.	55	75
— — — — Wasser-haltiger Anthophyllit-Asbest. R.	55	194
— — — — Albit von Haddam in Connektikut ist Oligoklas. R.	55	198
— — — — Rhodophyllit ist Rhodochrom. R.	55	198
— — — — zerlegen Biotit aus Neu-York. R.	55	348
— — — — zerlegen Lazulith aus Nord-Carolina. R.	55	348
— — — — zerlegen Danbury-Feldspathe. R.	55	449
— — — — Carrolit ein neuer Kupfer-Linnäit aus Maryland. R.	55	560
— — — — Shepard's Ozarkit ist Thomsonit. R.	56	36
— — — — Cummingtonit gehört zur Hornblende. R.	56	183
— — — — Saponit und Thalit sind einerlei. R.	56	184
— — — — Monrolith gehört zum Disthen R.	56	188
— — — — Loxoklas ist mit Orthoklas einerlei. R.	56	194
— — — — Hudsonit und Augit sind einerlei. R.	56	687
— — — — über Gibbsit	57	71
— — — — über Danburit aus Connecticut. R.	57	174
Bryce, J.: Lignite in verändertem Dolomit auf Bute, Schottland. R.	51	473
Bryson, A.: Wurm-Fährten in Silur-Schiefern R.	57	754
— — Diatomaceen im Silur-Schiefer Schottlands. R.	56	82
Buch, L., v.: Goniatiten, Aptychus, Kreide in Dagestan. R.	51	357
— — wesentliche Unterscheidung der Goniatiten von den Nautileen. A.	51	568
— — „eine Muschel-Ablagerung der Nordsee", Berlin 8°. R.	51	621
— — über Aptychus. R.	50	244
— — über Nautilus lingulatus. B.	50,	434, 603
— — die Anden in Venezuela. R	50	479
— — Besuch des Monte nuovo bei Neapel. R.	50	720
— — Verbreitung der Jura-Formation auf der Erde. R.	54	78
Buchner, L. A.: Zerlegung der Edelsoole von Reichenhall. R.	51	203
Buckman, J.: Libellula Brodiei in Oberlias von Dumbleton. R.	54	122
— — über den Cornbrash bei Cirencester. R.	54	620
— — fossile Pflanzen im unteren Lias. R.	54	854
Bukeisen, Fr.: zerlegt schwarzen Glimmer von Pfitsch in Tyrol. R.	58	825
— — zerlegt Diopsid aus dem Zillerthale. R.	58	826
— — Zerlegung des Desmins von der Seisser-Alpe. R.	59	77
— — Zerlegung von Braunit aus dem Engadin. R.	59	77
Bunbury, Ch. J. F.: die Pflanzen des Anthrazits der Savoyer Alpen. R.	50	119

	Jahrg.	Seite
Bunbury, Ch. J. F.: fossile Pflanzen von Madera. R.	1858	757
— — fossile Pflanzen-Reste von Madera. R.	59	253
Bunsen, R.: Einfluss des Drucks auf die chemische Natur plutonischer Gesteine. R.	51	220, 739
— — Prozesse der vulkanischen Gestein-Bildung in Island. R.	51	837
— — genetische Beziehungen nicht metamorphischer Gebirge Islands. R.	51	837
— — genetische Beziehungen der metamorphischen Gebirgsarten Islands. R.	51	837
— — über vulkanische Exhalationen R.	52	~~499~~ 501
— — chemische Zusammensetzung des Meteoreisens von Atacama. A.	57	257
Burat, A.: verschiedene Beschaffenheit gewisser Erz-Lagerstätten in der Tiefe. R.	51	611
— — Fortsetzung der Erz-Gänge nach der Teufe. R.	52	868
Burkart, J.: Brauneisenstein in pseudomorphen Krystallen. R.	54	191
— — über die Fundorte der bis jetzt bekannten Mexikanischen Meteoreisen-Massen, nebst Bemerkungen über Ursprung und Zusammensetzung der Aerolithe (mit 1 Tfl.) A.	56	257
— — Mangan-Blende und Fahlerz aus Mexiko. R.	56	557
— — über Mexikanische Meteoreisen-Massen. B.	57	53
— — Braunkohlen-Gebirge und Sphärosideritam Sieg-Ufer. R.	57	77
— — Quecksilber-Vorkommen in Californien. R.	57	330
— — Californiens Boden und Gold-Vorkommen. R.	57	461
— — die Fundorte der Mexikanischen Meteoreisen-Massen, als Nachtrag zu den früheren Angaben über diesen Gegenstand, unter Anschluss von Fr. G. Weidner's Bericht über das Magneteisen-Vorkommen bei Durango in Mexiko. A	58	769
— — das Erdbeben in Mexiko, 1858 am 19. Juni. R.	58	726
— — Basalt-Gang im Johannis-Seegen am Siebengebirge. R.	58	857
— — Feuer-Ausbruch zu Real del Monte in Mexiko. R.	59	213
— — der Ausbruch des Jorullo im Jahre 1759. R.	59	323
— — Meteoreisen von Zacatecas in Mexiko. R.	59	736
Burmeister: Labyrinthodonten von Bernburg; I. Trematosaurus. R.	50	752
Burtt, J. L.: See-Fische durch Schwefelwasserstoffgas sterbend. R.	53	105
Buvignier: über Ceromya. R.	53	111
— — Isodonta, eine neue fossile Acephalen-Sippe	53	114
Byron, R.: devonische Versteinerungen in Irland. B.	57	57

C.

Caillaud: Fels-bohrende Pholaden. R.	53	98
Canaval: Mineralien-Vorkommen auf Eisenspath-Lagern am Hüttenberge. R.	55	447
— — neues Vorkommen von Vanadinblei-Erz. R.	57	173
Canaval u. v. Rosthorn: Geognosie Kärnthens. R.	55	583
— — — — Mineral-Vorkommnisse in Kärnthen. R.	55	821
Candolle de, A.: Verbreitungs-Weise der Pflanzen auf der Erde. R.	58	877
Carius, L.: Thonschiefer-Metamorphose bei Eichgrün im Voigtlande. R.	56	595
Carnall, v.: Eisenstein-Lagerstätten des Muschelkalks in Oberschlesien. R.	52	337
— — Bleierze im Bleiberg bei Commern. R.	54	605
— — zerquetschte Kiesel im Kohlen-Gebirge von Waldenburg. R.	56	576
— — gesammte Eisen-Ausbeute im Jahre 1854. R.	57	353
Caron, H. u. H. Ste.-Cl. Deville: neue Erzeugungs-Arten krystallisirter Mineralien. R.	58	578
— — — — Abhandlung über Apatit, Wagnerit u. a. Phosphor-Metalle. R.	59	191
Carpenter, W. B.: Struktur von Nummulina, Orbitulites, Orbitoides. R.	50	238
— — Blutgefäss-System bei Terebratula. R.	55	382
— — Untersuchungen über Foraminiferen, I. Orbitulites. R.	57	225

	Jahrg.	Seite
Carpenter, W. B.: Schaalen-Struktur von Rhynchonella Geinitzana. R.	1857	375
— — über Foraminiferen; II—V: Orbiculina, Alveolina, Cycloclypeus und Heterostegina. R.	58	241
Carrière: Scheelit in der Erz-Lagerstätte zu Framont. R.	53	838
Carruthers, W.: die Graptolithen der silurischen Schiefer in Dumfriesshire und Beschreibung einiger neuen Arten. R.	59	875
Carter: H. J.: Struktur der Schaale von Operculina Arabica. R.	53	383
— — röhrige Struktur der Alveolina-Schaale. R.	55	640
Casiano de Prado: Geologie der Provinz Segovia in Spanien. R.	56	205
— — Geologie von Almaden, Sierra Morena und Toledo. R.	56	469
Caspary, R.: die fossilen Nymphaeaceae. R.	57	756
Castel: Ausbruch von Kohlenwasserstoff-Gas in der Eisen-Grube la Voulte R.	55	731
Castelnau, de: neuer grosser Diamant in Minas-geraes. R.	53	697
Castendyck, W.: geognostische Skizze aus dem N.-W.-Deutschland. A.	53	31
— — Eisenstein-Vorkommen im Westphälischen Jura-Gebilde. B.	53	324, 327
— — Erz-Führung des Kupferschiefer-Flötzes zu Osnabrück. B.	53	444
— — geognostische Übersicht vom Westphälischen Sauerlande. B.	54	314
— — die Gegend um Wildungen im Fürstenthum Waldeck. A.	56	140
— — Kessel-artige Gebirgs-Form im Flötzgebirge zwischen Weser und Leine. B.	56	673
Catullo: Gletscher nicht die alleinige Ursache von Glättung und Streifung. R.	52	350
— — Alter der Pflanzen-führenden Tertiär-Bildungen von Chiavona, Salcedo und Novale im Vicentinischen. B.	53	46
— — Miocänes Alter der Fisch-Schiefer von Chiavona. B.	53	683
— — Kruster-Arten am Monte Bolca. B.	54	572
— — die tertiären Kruster und Palmen des Monte Bolca. B.	57	154
— — Bryozoari, Antozoari e Spongiari dei terreni di sedimento superiore delle Venezie, Padova 1856, 4° R.	57	230
Chalin, A. und A. Rotureau: die Nauheimer Thermen. R.	58	859
Chambers: über Lyell's Beweise für die Hebung Skandinaviens. R.	52	87
— — grosse Erosions-Terrasse in Schottland. R.	55	462
Chapman, E. J.: Scheelit von Coquimbo R.	54	347
— — Cryptoceras in Silur-Gesteinen; Klassifikation der polythalamen Cephalopoden. R.	58	617
— — neue unter-silurische Trilobiten aus Ober-Canada. R.	59	489
Chapuis et Dewalque: „les Fossiles secondaires de Luxemburg", 1854. R.	54	849
Charlesworth: über Trigonien. R.	51	512
Chatin: Jod in Süsswasser-Pflanzen. R.	51	197
— — Jod in Luft, Wasser, Thau und Schnee. R.	52	494
Chodzkos: Besteigung des grossen Ararats im August 1850. R.	52	970
Chop: C.: Reptilien und Fische aus Schlotheimer Keuper. R.	58	615
Christol, de: tertiäre Affen- und Katzen-Arten. R.	51	380
— — Klassifikation der Pachydermen nach dem Zahn-Zäment. R.	51	497
— — Hipparion, Metaxytherium und Hipparitherium. R.	53	107
Clark, W. S.: Analysen von Meteor-Massen R	53	186
Clark und Ashley: Zerlegung des Themse-Wassers. R.	52	215
Clarke, W. B.: Geologie von Neusüdwales. R.	56	69
Claus, L.: merkwürdige Stein-Art aus Mittel-Russland. R.	53	454
Cleghorn: über den Till bei Wick in Caithness. R.	51	483
Cobbold, R. H.: Steinkohle zu E-u in China. R.	56	729
Cocchi, J.: Feuer- und Sediment-Gesteine Toskana's. R.	57	592
Coles, H.: die Haut des Ichthyosaurus. R.	53	630
Collomb, E.: Quartär-Gebirge des Rhein-Beckens. R.	51	728
— — gefurchte und geritzte Wander-Blöcke um Lyon. R.	52	965

	Jahrg.	Seite
Conrad, F. A.: neue eocäne Schaalen u. Korallen von Jackson, Mis. R.	1856	229
— — neue Kreide- und Eocän-Fossilien in Nord-Amerika. R. . .	56	480
— — Neue Kreide- und Tertiär-Fossilien in Texas. R.	56	480
— — Berichtigung früherer Sippen-Namen tertiärer Konchylien. R. .	56	752
— — neue tertiäre Wirbel-lose Thier-Arten aus Californien. R. . .	57	853
— — einige tertiäre u. a. Konchylien Nord-Amerika's R	59	234
— — Kreide-Konchylien von Rippley in Tippah-Co, Missouri. R. .	59	497
Conte, le, J. L.: fünf neue Säugthier-Arten von Illinois R. . . .	50	872
Cook, H.: Senkung der Küsten von Neu-Jersey und Long Island. R.	59	469
Copland, J.: Karniol-Gruben bei Barotch zwischen Bombay und Blouda. R.	58	821
Coquand: Eisenerze des Aveyron- u. a. Departements. R.	50	97
— — Alaun-Werke von Campiglia, Montioni und la Tolfa. R. . .	50	356
Coquand und Bayle: über Domeyko's Sekundär-Versteinerungen von Coquimbo. R.	50	480
Coquand, H.: Die Lagoni in Toskana. R.	50	492
— — Antimon-Blende in der Solfatara von Pereta. R.	50	616
— — Gänge im Gebirge Toskana's R.	51	722
— — primitive und Feuer-Gesteine im Var-Departement. R. . . .	52	366
— — geologische Beschreibung der Provinz Constantine. R. . . .	55	363
— — das permische Gebirge im Aveyron-Dept. R.	56	64
— — Perm-Gebirge und Vogesen-Sandstein in den Saône- und Loire-Depts und dem Serre-Gebirge. R.	59	103
— — die Kreide-Formation im Charente-Dpt. R.	59	632
Cornalia: die fossilen Säugthiere der Lombardei. R.	59	500
Cornuel, J.: Knochen aus dem Neocomien von Wassy, Haute-Marne R.	52	510
— — Süsswasser-Konchylien im Neocomien. R.	56	66
Costa: Palaeontologia; Jura-Fische im Neapolitanischen. B. . . .	51	182
Cotta, B.: über die Umgebungen des Fassa-Thales A. 50	129,	592
— — über Quadersandstein- und Kreide-Gebirge. B.	50	190
— — „geologische Briefe aus den Alpen". B.	50	302
— — über „Bischof's Geologie". B. 50	310,	592
— — Entstehung der Erz-Gänge. gegen Bischof. B.	50	428
— — Erz-Gänge auf trockenem Wege, in einer Flammofen-Mauer. B.	50	432
— — über den inneren Bau der Gebirge. B	51	181
— — gegen einige Ansichten in Bischof's Geologie. B.	51	322
— — körnige Kalksteine im Glimmerschiefer der Striegis-Thäler; Granulit bei Hainichen, Tf. 8. B.	51	573
— — Falten-Erhebung am Harze; Muschelkalk und Lias bei Braunschweig; in Muschel-Schaalen eingedrückte Eisenkörner. B. .	51	819
— — Muschelkalk am Elm; Kalktuff von Königslutter; Stylolithen. B.	52	48
— — über die bei der Geologen-Versammlung zu Gotha gehaltenen Vorträge. B.	52	49
— — Schichten-Folge im Quader-Sandstein des Tharander Waldes. B.	52	450
— — Porphyr mit Gesteinstrümmer-Einschlüssen bei Zschoppau. B.	52	602
— — Gneiss-Blöcke im Granit-Gange des Granulits von Mitweida; Braunkohlen-Flötze aus Koniferen-Stämmen zu Grimma. B. .	53	442
— — Ursprung des körnigen Kalkes. R.	53	490
— — Glimmertrapp-Gang in Gneiss im Weisseritz-Thale. B. . . .	53	561
— — geologische Reise in Schwaben. B.	53	682
— — Phonolith-Tuff mit neptunischen Gesteins-Stücken; Phonolith-Fels am Hohentwiel. B.	53	684
— — „geologische Bilder", Leipzig 1852. R.	53	740
— — rother und grauer Gneiss in Sachsen B.	54	39
— — „Innerer Bau der Gebirge" Freiberg 1854, 8° R.	54	214
— — der innere Bau der Alpen. R.	54	467

	Jahrg.	Seite
Cotta, B.: Lagerungs-Verhältnisse in der Steinkohlen-Formation zu Hainichen; Kohlen-Pflanzen von Olbernau im Erzgebirge; Pechstein-Gang im Porphyr zu Debritz bei Meissen; Quadersandstein zu Coschütz bei Dresden. B.	54	564
— — Sandstein-Kugeln bei Klausenburg in Siebenbürgen. B.	54	674
— — Lagerungs-Verhältnisse des Glimmerschiefers in der Bukowina. B.	54	789
— — Steinkohlen mit Pflanzen im Plauen'schen Grunde. R.	54	834
— — Geologische Mittheilungen aus der Bukowina. A.	55	25
— — Glimmerschiefer in Basalt. B.	55	179
— — die Steinkohlen- und? Perm-Formation in Sachsen. B.	56	542
— — die Gegend von Borsa-Banya in der obern Marmarosch R.	56	200
— — Erz-Vorkommen im Alpenkalke von Partenkirchen in Bayern. R.	56	568
— — Thoneisenstein-Lager im Karpathen-Sandstein der Bukowina. R.	56	579
— — Mollasse-Kohle in den Bayern'schen Voralpen. R.	56	707
— — die Gosau-Formation am Wolfgang-See in Salzburg. R.	56	724
— — Einlagerungen im Glimmerschiefer der südlichen Bukowina.	57	450
— — über den Granit und Jurakalk auf dem Quader-Sandstein bei Schandau; Rothliegendes zwischen Granit und Mandelstein bei Dresden. B.	57	552
— — Kohlen-Formation im Sily-Thale Siebenbürgens. R.	57	610
— — Lias und Hils-Sandstein und deren Verwerfungen in Lippe-Detmold; Gliederung des Lias zu Falkenhagen bei Schwalenberg und dessen bezeichnende Versteinerungen. B.	57	696
— — Kohlen-Formation von Ruszkberg im Banate. R.	58	86
— — „Deutschlands Boden", Leipzig 8°, 2. Aufl. I. R.	58	478
— — die Herkules-Bäder bei Mehadia. R.	58	708
— — Deutschlands Boden, sein geologischer Bau etc. 2. Aufl., II. Thl. 1858. R.	59	107
— — Kohlen-Formation von Häring in Tyrol. R.	59	199
— — Geschiebe aus der Nagelflue von St. Gallen. R.	59	740
— — bituminöse Lias-Schiefer von Falkenhagen in Lippe-Detmold. R.	59	825
Cotta, B. und Reich: Einwirkung schwacher Säuren auf übereinander gehäufte Kalkstein-Geschiebe und Hervorbringung gegenseitiger Eindrücke zwischen denselben. R.	59	813
Cotteau, G.: Echinoideen in der Kimmeridge-Formation des Aube-Dpts. R.	56	94
— — Desorella, eine neue Echinoideen-Sippe. R.	56	228
— — Seeigel im Jura- und Kreide-Gebirge des Sarthe-Depts. R.	57	851
— — über die Sippe Galeropygus. R.	59	364
Cotteau und Leymerie: fossile Echiniden der Pyrenäen. R.	57	858
Cottle, T: fossile Pachydermen in Canada. R.	54	122
Craw, W. J.: Analyse des Klinochlor's R.	54	69
Credner, H: über „Murchison's Gebirgs-Bau in den Alpen". B.	50	434
— — geognostische Bemerkungen über die Zentral-Kette der Alpen in Ober-Kärnthen und Salzburg. A.	50	513
— — Gervillien der Trias in Thüringen, Tf. 6. A.	51	641
— — Allanit bei Schmiedefeld im Thüringer Walde R.	54	185
— — Geognostische Bildungs-Geschichte des Thüringer Waldes. R.	56	60
— — über die Pseudomorphosen von Quarz nach Flussspath zu Bischofsrode bei Schleusingen. A.	59	799
Croker, J. G.: die Lignit-Ablagerung von Bovey-Tracey in Devonshire. R.	58	224
Crosnier, L.: Geologie von Chili. R.	55	202
Cumenge, E.: Antimon-Erz aus der Provinz Constantine. R.	54	77
Cuming: neueste Änderung im Niveau des Isländischen Meeres. R.	55	709
Curioni, G.: Glieder-Folge im Trias-Gebirge der Lombardei. R.	56	736
Czjzek, J.: über die Congeria Partschi bei Wien. R.	51	128
— — zwei neue Foraminiferen-Sippen um Rhein. R.	51	379

	Jahrg.	Seite
Czjzek, J.: das Thal von Buchberg am Schneeberg. R. . . .	1852	866
— — Kohle in einer Kreide-Ablagerung bei Grünbach. R. . .	55	86

D.

Dahll, T. und D. Forbes: Analysen des Yttrotitanits von Askerö. R.	57	709
— — Analyse des Tyrits. R.	58	74
— — der Alveit Skandinaviens ist Zirkon. R.	58	309
— — Analyse des Euxenits. R.	58	321
— — zerlegen Orthit von Arendal. R.	58	566
Damour, A.: Zerlegung des Saphirins von Grönland. R.	50	343
— — zerlegt Faujasit. R.	50	345
— — zerlegt Labrador aus Basalt Islands. R.	50	347
— — zerlegt Alluaudit in Schrift-Granit von Limoges. R.	50	348
— — zerlegt Albit aus Phonolith Islands. R.	50	349
— — zerlegt Anorthit aus Lava vom Thjorsa-Ufer. R.	50	446
— — die Baierine (Bayernit) von Limoges. R.	50	618
— — Zerlegung des Trapp's von Island. R.	51	199
— — zerlegt Lava vom Hekla von 1845. R.	52	704
— — Zusammensetzung der Madreporen. R.	52	860
— — Untersuchung Diamanten-führenden Sandes von Bahia. R. . .	53	597
— — zerlegt Orangit. R.	54	447
— — Zusammensetzung des Andalusits. R.	55	349
— — Krystall-Form des Brongniartits. R.	55	446
— — Dufrenoyit im Binnenthale in Wallis. R.	55	703
— — Perowskit aus dem Zermatt-Thale. R.	55	839
— — zerlegt Roméin. R.	56	688
— — Titan-haltiger Chrysolith von Pfunders in Tyrol. R.	57	325
— — Eudialit und Eukolit. R.	57	833
— — Talkerde-haltiger Sand von Compiegne im Oise-Dept. R. . .	57	836
— — Analyse des Euklases. R.	58	215
— — Hydroapatit in den Pyrenäen. R.	58	321
— — Untersuchung Diamanten-führender Sande aus Bahia. R. . .	58	818
Dana, J. D.: Geology (the United States Expedition, Part X, 1849, 4°) R.	51	356
— — über Korallen-Riffe und -Inseln. I. Theil. R.	52	88
— — Fossile Reste von der United States Expedition. R.	51	381
— — Danburit, ein neues Mineral aus Connecticut. R.	53	700
— — neues Triphyllin-ähnliches Mineral. R.	53	700
— — die vertikale Verbreitung der Meeres-Bewohner. R.	53	755
— — Isomorphismus und Atom-Volumen einiger Mineralien. R. . .	54	77
— — Korallen-Riffe und -Inseln, II. Theil. R.	54	199
— — Höhen-Wechsel im Stillen Meere. R.	54	460
— — Temperatur- durch Höhen-Wechsel Amerika's und Afrika's bedingt. R.	54	618
— — Dikotyledonen-Blätter in Kreide Nebraska's; Newberry's Reise in die Rocky mountains. B.	59	602
Dana und Brush: Untersuchung von Triphan aus Amerika. R. . . .	52	852
Danielo: Versteinerungs-reicher Schiefer in Morbihan. R.	50	465
Darlington: eigenthümliches Meteoreisen von Tarapaca in Chili. R. .	56	553
Darwin, Ch.: „Monograph of the fossil Lepadidae“ London 1851, 4°. R.	52	632
— — Fossil Balanidae and Verrucidae, Lond. 4°. R.	57	117
Dareste, C.: Systematische Stellung des Blochius longirostris. R. .	52	982
Daub: Feldstein-Porphyre u. Erz-Gänge im Münster-Thal bei Staufen. A.	51	1
— — der Bunte Sandstein bei Staufen im Baden'schen Oberlande. A.	52	536
Daubeny: Wirkung der Kohlensäure auf's Wachsthum der Pflanzen. R.	50	252
— — gegen die Einwürfe auf seine Vulkanen-Theorie. R. . . .	50	358

	Jahrg.	Seite
Daubeny: Ermittelung von Phosphorsäure in Felsarten. R. . . .	1858	214
Dauber, H.: Pajsbergit aus Finland. R.	56	39
— — Anatas aus Wales. R.	56	49
— — Beudantit von Montabaur in Nassau und aus Irland. R. . .	57	711
Daubrée: unterirdische Wasser-Ströme in geringer Tiefe. R. . . .	50	91
— — Knochen-Höhle bei Lauw im Oberrhein-Dept. R.	51	599
— — Apatit und Topas auf künstlichem Wege. R.	51	710
— — Tertiäres Bitumen, Lignit und Salz von Lobsann B. . . .	51	734
— — Gold-Blättchen im Sande der Mosel bei Metz. R.	52	76
— — Zirkon in Graniten und Syeniten der Vogesen. R.	52	863
— — Verbreitung von Arsenik und Antimon in der Erd-Rinde. R. .	53	175
— — „Description géologique et minéralogique du Bas-Rhin", 1852. R.	53	736
— — Berthierit in den Vogesen. R.	54	442
— — künstliche Silikate und Aluminate durch Einwirkung von Mineral-Dämpfen auf Fels-Arten. R.	55	214
— — Zirkon in Graniten und Syeniten der Vogesen. R.	56	344
— — Streifung der Gesteine durch erratische Vorgänge und Zersetzung des Reibsandes. R.	58	82
— — Eindrücke in den Geschieben der Pudding-Steine. R. . . .	58	106
— — Vierfüsser-Fährten im Buntsandstein von Luxeuil. R. . . .	58	363
— — Metamorphismus der Gesteine und dessen Agentien. R. . .	58	727
— — Beziehungen der Thermen von Plombières zu den Erz-Gängen. R.	58	734
— — Arsenik mit bituminösen Mineralien verbunden. R.	59	822
Davidson, Th.: einige neue oder wenig bekannte Brachiopoden. R. .	50	244
— — über Lamarcks fossile Terebratula-Arten. R	50	377
— — „Monograph of British oolitic and liasic Brachiopoda", III. R.	53	209
— — Klassifikation lebender Brachiopoden nach ihrer Organisation. R.	53	252
— — zwei ober-silurische Obolus-Arten. R.	54	502
— — „British fossil Brachiopoda", I. Allgemeiner Theil. R. . . .	54	503
— — „British fossil Brachiopoda" II. Tertiary and Cretaceous. R. .	54	507
— — Arbeit über die Brachiopoden in deutscher Ausgabe B. . . .	55	54
— — devonische Versteinerungen aus China. R.	55	384
— — „Klassifikation der Brachiopoden" übs. von Suess, 1856, 4°. R.	56	379
— — British Cretaceous Brachiopoda. R.	57	482
Davis, Ch. H.: geologische Wirkungen der Meeres-Strömungen. R. .	50	78
Davis u. Squire: Verarbeitung von Obsidian. R.	50	702
— — — — Verwendung des Silbers in ältester Zeit. R.	51	199
— — — — das Kupfer bei den alten Amerikanern. R.	52	79
Davy, J.: kohlensaurer Kalk in See-Wasser. R.	50	492
Dawson, J. W.: Neuschottland u. a. Theile von Britisch-Nordamerika. R.	59	333
— — fossile Zustände von Sternbergia s Artisia. R.	58	871
— — devonische Pflanzen der Insel Gaspe in Canada. R.	59	755
— — die untere Steinkohlen-Formation in Britisch-Amerika. R. . .	59	834
Dawson und Lyell: Reptilien-Reste in einem Baume der Kohlen-Formation in Nova Scotia. R.	53	511
Deane, J.: neue fossile Fährten von Turner's-Fall. R.	51	497
— — Thier-Fährten im Sandsteine des Connecticut-Thales. R. . .	57	877
Debey, M. H.: geognostisch-geogenetische Darstellung von Aachen. R.	50	92
— — Übersicht der Kreide-Pflanzen bei Aachen. R.	50	116
— — Cycadopsis, neue Coniferen-Sippe aus Aachener Kreide. R .	50	117
Debey und C. v. Ettingshausen: die Kreide-Flora von Aachen R. .	58	619
Dechen, v., H.: Jurakalkstein-Stücke um Kloster Laach. B.	51	60
— — die Bildung der Gänge R.	51	210
— — über Eis-Bildung in Strömen. R	51	455
— — Aufsatz und Karte über das Siebengebirge. B.	51	816
— — Schichten unter der Steinkohle an der Ruhr. R.	52	98

	Jahrg.	Seite
Dechen, H. v.: über v. Klipstein's geognostische Beschreibung und Karte des Grossherzogthums Hessen und des Kreises Wetzlar. B.	1852	828
— — Versteinerungen in der Kies-Grube von Friesdorf am Rheine. R.	52	971
— — über Dumont's geognostische Karte von Belgien. R.	52	724
— — geognostische Beschreibung des Siebengebirges. R.	53	193
— — über Daubrée's Schilderung des Unterrhein-Departements. B. .	53	320
— — Steinkohlen-Reichthum in Saarbrück, Steinsalz in Hohenzollern B.	53	324
— — Grauwacken-Gebirge zwischen Rhein und Maas. R.	53	494
— — Eintheilungen der paläozoischen Gebilde. R.	53	727
— — Steinsalz in Hohenzollern R.	54	364
— — geognostische Untersuchung des Kreises Berleburg. R. . . .	54	366
— — Kalkstein-Pseudomorphose nach Kochsalz im Muschelkalk. R.	54	449
— — Eisen-haltige Thon-Konkrezionen in Schlämm-Sümpfen zu Comern. R.	54	475
— — das Rheinisch-Westphälische Grauwacken-Gebirge; Lenne- und Agger-Schiefer; Wissenbacher-Schiefer; Kramenzel; Pön-Sandstein; Posidonomyen-Schiefer. B.	55	48
— — Wurzeln in einer Steinkohlen-Grube Saarbrücks R.	55	80
— — über das Westphälische Schiefer-Gebirge an der Edder u. Lahn. R.	55	81
— — die Karte des Siebengebirges. R.	55	87
— — geognostisches Verhalten der Steinkohlen-Lager in Sachsen. R.	55	477
— — geognostische Übersicht des Regierungs-Bezirkes Arensberg. R.	56	78
— — Erscheinungen ähnlich dem krystallisirten Sandstein. R. . .	56	344
— — Lagerungs-Verhältnisse im südlichen Teutoburger Walde. R. .	56	721
— — über v. Strombeck's geognostische Karte von Braunschweig. B.	56	816
— — Zusammenhang der Kohlen-Reviere von Aachen und der Ruhr. R.	57	96
— — der Teutoburger Wald. R.	57	192
— — Granit im Gebiete des Culm-Sandsteins bei Marburg. R. . .	57	345
— — Palaeomeryx aus Blätterkohle im Siebengebirge. R.	57	491
— — Fortdauernde Auflösung und Absetzung von Weissbleierz. R.	58	216
— — Pseudomorphose von Weissbleierz nach Barytspath. R. . . .	58	319
— — Syenit und Syenit-Granit auf den Seychellen. R.	58	339
— — Konkrezionen in Steinkohlen-Gruben Schonen's. R.	58	859
— — über Thal-Bildung. R.	59	91
— — über Dumont's geologische Karte von Belgien. R.	59	100
— — Coaks-artige Masse aus einem Coaks-Ofen bei Neunkirchen. R.	59	183
— — künstlicher Olivin. R.	59	288
— — über die geologische Karte der Rhein-Provinz u. Westphalens. R.	59	855
Dechen, v. und F. Roemer: Geschiebe mit Eindrücken. R.	55	82
Deffner, C.: Konservirung von Petrefakten. R.	56	876
Deffner, C. und O. Fraas: die Jura-Versenkung bei Langenbrücken in Baden. A.	59	1
— — — — — die Jura-Versenkung bei Langenbrücken in Baden. A.	59	513
Deichmann: Privat-Goldwerke im Uderei-Gebiete Russlands. R. . .	50	228
Deicke, J. C.: Beiträge über die Mollasse der Schweitz, Tf. 2. A. .	52	35
— — Mollasse in St.-Gallen und den Nachbar-Kantonen. B. . . .	52	301
— — über die Eindrücke in den Geschieben der Mollasse-Formation der östlichen Schweitz. A.	53	796
— — Petrifikation der Konchylien-Schaalen in der Mollasse der Schweitz. A.	54	657
— — über ein eigenthümliches Vorkommen von Petrefakten in der Meeres-Mollasse. A.	55	540
— — Nummuliten und Flysch-Gebilde der Alpen. B.	55	681
— — geognostische Skizze des unteren Thurgau's und der Umgebung von Öningen. A.	56	129

	Jahrg.	Seite
Deicke, J. C.: Säulen-förmige Absonderungen in den Gesteinen der Mollasse und polirte Flächen der Nagelflue-Geschiebe, mit Holzschn. A.	1857	401
— — Mollasse der Schweitz; Anthrazit in Wallis. B.	57	701
— — Übersicht der Mollasse-Formation zwischen den Alpen der Ost-Schweitz und dem Ost-Rande des Schwarzwaldes. A.	57	779
— — die Diluvial-Kohle bei Mörschwyl in St. Gallen. A.	58	659
— — Brände im Diluvialkohlen-Bergwerke zu Mörschwyl in St. Gallen. A.	59	272
De Koninck, L.: Zechstein-Formation in Spitzbergen R.	50	85
— — neue paläolithische Krinoideen Englands und Schottlands. R.	59	758
De Koninck, L. und H. Le Hon: les Crinoides du terrain carbonifère. R.	56	601
Delafosse: Beziehung zwischen Atom-Zusammensetzung und Krystall-Form. R.	51	599
— — Plesiomorphismus. R.	53	844
Delaharpe, Ph: die Chelonier in der Waadter Mollasse. R.	58	747
— — und Gaudin: eocäne Knochen im Waadt-Lande. R.	54	83
Delahaye und L. Krafft Natronhydrosilikat in einer Sand-Breccie. R.	53	64
Delanoüe: das untre Devon-System im Boulogner Becken. R.	51	103
— — natürliche Entstehung der Zink-Erze. R.	52	85
— — Bildung von Zink-, Blei-, Eisen- und Mangan-Erzen auf regelloser Lagerstätte. R.	54	92
— — über Metamorphismus der Felsarten. R.	54	731
— — Entstehung von Zink-, Blei-, Eisen- und Mangan-Erzen. R.	55	359
— — Bedenken über die Dolomitisation des Kalkes. R.	55	471
— — Aufgabe des Wassers an der Oberfläche und in der Tiefe. R.	55	724
— — über den Metamorphismus der Gesteine R.	55	728
Delaporte: Schwefel-Gruben in Ober-Ägypten. R.	55	359
Delbos, J.: die Knochen der Höhlen von Sentheim und Laun im Oberrhein-Dept. R.	59	93
Delesse, A.: Untersuchungen über den Quarz-führenden Porphyr. B.	50	186
— — über Schafhäutl's Analyse des sogen. Trasses im Riesgau. B.	50	314
— — mineralogische und chemische Zusammensetzung der Vogesen-Gesteine. A.	50	422
— — Aluminosilikat von Eisenper- und Eisenprotoxyd von Quintin. R.	50	444
— — über den Euphotid des Mont-Genèvre. A.	50	675
— — zerlegt den Damourit. R.	50	693
— — zerlegt die „Machefer" genannte Eisen-Schlacke. R.	50	702
— — Analyse eines Schiefers mit Talkerde-Basis vom Po. R.	51	91
— — über den Porphyr von Lessines in Belgien. A.	51	168
— — Alters-Folge der Mineralien auf Gängen in Arkose. R.	51	368
— — über den alterthümlichen rothen Porphyr. A.	51	422
— — über Kersantit der Vogesen und über Kersanton. B.	51	428
— — Verbundensein von Mineralien in Felsarten von starker magnetischer Kraft. A.	51	555
— — mineralogische Beziehungen des körnigen Kalkes der Vogesen. R.	52	77
— — über Quarz-führende Porphyre, Pyromerid-ähnliche Gesteine und über körnigen Kalk im Gneiss. B.	52	199
— — chemisch gebundenes Wasser in Feldspath-Gesteinen. R.	52	323
— — Ergebnisse seiner Arbeit über die Roches globuleuses. B.	52	691
— — Sismondin von St.-Marcel in Piemont. R.	52	702
— — Pyromerid der Vogesen. R.	52	881
— — über die Felsarten mit Kugel-Gefüge. R.	53	619
— — über die Granite der Vogesen. R.	54	193
— — über die metamorphische Grauwacke. R.	54	728

	Jahrg.	Seite
Delesse: Manchfaltigkeit granitischer Gesteine. R.	1854	837
— — über den Granit. R.	55	82
— — zerlegt Grünerde von Framont. R.	55	448
— — Ursprung warmer Quellen in den Pyrenäen. R.	55	723
— — über den Irischen Pegmatit. R.	55	739
— — Beryll im Schrift-Granit der Mourne-Berge. R.	56	184
— — Perlstein und Sphärulit. R.	56	195
— — Schrift-Granit der Mourne-Mountains in N.-Irland. R.	56	358
— — mineralogische und chemische Zusammensetzung der Vogesen-Gesteine. R.	56	360
— — Untersuchungen über die sogen. Roches globuleuses. R.	56	466
— — zerlegt Sardinische Pechsteine. R.	56	555
— — Topas in Schrift-Granit der Mourne-Mountains in Irland R.	56	688
— — Fayalit im Schrift Granit der Mourne-Mountains. R.	57	174
— — Kupfererz-Lagersätten auf dem Cap der guten Hoffnung. R.	57	350
— — Zerlegung der Topfsteine. R.	58	73
— — Metamorphismus der fossilen Brennstoffe. R.	58	95
— — Forschungen über den durch Trapp-Gesteine bedingten Metamorphismus. A.	58	385
— — Metamorphische Wirkung des Granites auf Kalkstein. R.	58	707
— — Untersuchungen über die Minette. R.	58	848
— — Metamorphismus der Felsarten durch Granite. R.	59	222
— — Metamorphismus der Felsarten durch Eruptiv-Gesteine. R.	59	223
— — Untersuchungen über die Entstehung eruptiver Gesteine. R.	59	459
— — Metamorphismus der Felsarten. R.	59	840
Denham: die grösste Tiefe des Meeres. R.	53	489
Dennis: Säugthier-Knochen im Bone bed von Lyme regis. R.	56	499
— — Vögel-Knochen in Stonesfielder Schiefer. R.	57	365
Depretz: Meteorstein-Fall in Ost-Flandern. R.	59	743
— — der grösste Diamant. R.	50	847
— — der grösste Gold-Klumpen aus Australien (mit Holzschn.) R.	53	72
Desclabissac: Analyse eines Albits. R.	59	622
Descloizeaux: Krystall-Form des Gehlenits. R.	50	68
— — Christianit eine neue Mineral-Gattung. R.	50	216
— — Krystall-Form des Malakons. R.	51	696
— — Vanadinbleierz aus Peru ist Descloizit. R.	54	346
— — Krystall-Form des Jod-Silbers aus Chile. R.	54	451
— — Krystall-Form des Wöhlerits. R.	54	451
— — schwarzer Diamant von Bahia in Brasilien. R.	57	328
— — neuer Fundort von Columbit oder Niobit. R.	57	581
— — Krystall-Formen des Lievrits. R.	57	719
Deshayes: über Sphaerulites calceoloides Dsmoul. R.	51	757
— — über die in Granit eingebohrten Seeigel. R.	56	499
— — Vertheilung der Eocän-Versteinerungen im Pariser Becken. R.	56	499
— — Traité élémentaire de Conchyliologie I, 2, II, 1. R.	56	855
— — Animaux sans vertèbres de Paris, 4°, I—VIII. R.	57	631
— — Animaux sans vertèbres de Paris, Livr. IX—XIV. R.	58	616
— — Animaux sans vertèbres du bassin de Paris, XV—XVIII. R.	59	125
Deslongchamps, E.: Suessia eine neue Brachiopoden-Sippe in Oolith. R.	55	508
Desmarest: Entstehung des Salpeters. R.	58	688
Desnoyers, J.: Thier-Fährten im Gypse des Pariser Beckens. R.	59	756
Desor und Whitney: über fossile Regen-Tropfen. R.	52	110
Desor, E.: Meeres-, Süsswasser- und erratisches Alluvium in Nord-Amerika. R.	52	623
— — Stärke des Schalles auf Bergen und in Tiefen. R.	55	359
— — erratische Erscheinungen in Europa und Amerika. R.	53	495

	Jahrg.	Seite
Desor, E.: die Echinoideen des Nummuliten-Gebirges der Alpen. R.	1854	120
— — die infra-neocomischen Bildungen, das Terrain Valenginien und deren charakteristischen Echiniten. A.	54	310
— — die Echinoideen des Nummuliten-Gebirgs der Alpen. R.	54	499
— — Étage Valanginien im Neocomien. R.	55	845
— — obere Grenze der Gletscher-Schliffe in den Alpen. R.	56	452
— — Klassifikation der Cidariden. R.	57	120
— — Synopsis des Echinides fossiles, Paris 1858, 8°. R.	59	254
Despretz: Wirkung der Volta'schen Säule auf Kohlenstoff. R.	51	481
Desvaux: Bohrbrunnen zu Tamerna in Algerien. R.	56	585
Deville, Ch. Ste.-Cl.: Kalk-haltiges Feldspath-Gestein von Chemnitz. R.	51	358
— — zur Kenntniss vulkanischer Gesteine der Antillen. R.	52	486
— — Veränderungen kieselsaurer Gesteine durch Schwefelwasserstoff-Säure und Wasser-Dampf. R.	52	864
— — Vulkanische Gesteine der Antillen. R.	52	970
— — zerlegt Labrador von Guadeloupe. R.	55	448
— — Dichte-Wechsel der Mineralien beim Schmelzen. R.	55	454
— — Ausbruch des Vesuvs im Mai 1855. R	57	590
— — Vesuvische Laven vom Mai 1855. R.	59	299
Deville, H. Ste.-Cl. u. H. Caron: neue Erzeugungs-Arten krystallisirter Mineralien. R.	58	578
— — — — Abhandlung über Apatit, Wagnerit und andere Phosphor-Metalle. R.	59	191
Dewael, N.: Alter der Tertiär-Schichten von Antwerpen. R.	54	88
Dewalque, G.: „le lias de le province de Luxembourg". Liège 1857. R.	59	344
— — et Chapuis: les Fossiles secondaires de Luxembourg 1854. R.	54	849
Dick und Heddle: zerlegen sogen. Blei-Niere aus Cornwall. R.	57	709
Dickert, Th.: Geologische Reliefs. R.	54	227
Dickinson, G.: Quellen im Kreide Gebirge um London. R.	52	626
Dickson, W.: das Aschenthal in Palästina. R.	58	608
Diday: Vorkommen von Gold in der Gegend von Genua. R.	52	365
— — Analyse von Melaphyren. R.	53	456
— — Analyse von Trachyt. R.	53	841
— — zerlegt rothen Quarz-führenden Porphyr von Estérel R.	55	199
— — zerlegt blauen Porphyr von Fréjus. R.	55	704
Dieffenbach: Verdrängungs-Pseudomorphosen von Quarz und Baryt. R.	53	461
— — unter-miocäne Wirbelthier-Fauna, Säugthiere, Fische, Vögel u. s. w. zu Climbach u. a. a. O. Hessens. B.	53	685
— — Gold-Bergbau an der Edder; Geognosie des Fürstenthums Waldeck. B.	54	324
Dieffenbach, O.: die Erz-Gänge und das Gang-Gebirge von Nord-Carolina in den angrenzenden Staaten. A.	54	663
— — über den Mineral-Reichthum der Vereinten Staaten von Nord-Amerika. A.	55	527
— — Vorkommen von Chrom-Erzen und ihre Verbreitung in den Vereinten Staaten. A.	55	533
— — Bemerkungen über den Mineral-Reichthum der Vereinten Staaten, Forts. A.	56	385
Dietrich, Th.: Wirkung von Wasser, Kohlensäure und Ammon-Salzen auf Gesteine. R.	58	832
Ditten, H. S.: analysirt den 1843 bei Ackershuss gefallenen Meteorstein. R.	56	435
— — in Norwegen gefundener Meteorstein. R.	57	831
Dittmar, v., C.: zur geognostischen Karte von Kamtschatka. R.	57	89
Dixon, Fr.: „Geology and Fossils of Sussex", London 1850, 4°. R.	53	108
Dollfus, A. und C. Neubauer: Zerlegung Nassauischer Schaalsteine R.	57	163

	Jahrg.	Seite
Domeyko, J.: der Vulkan von Antuco. A	1850	804
— — Zerlegung von Prehnit und Porphyr aus Chili. R.	51	354
— — Skolezit des Cachapual-Thales in Chili. R.	51	354
— — über die Solfatara, welche 1847 am Cerro Azul in der Cordillere von Talka entstanden ist, übers. von R. A. Philippi. A . .	52	662
Döning, A.: fossile Knochen bei Kischenew in Bessarabien. R. . .	56	65
Dormitzer u. Suess: Brachiopoden im Böhmischen Übergangs-Gebirge. R.	53	223
Dove: Wärme-Abnahme gegen die Pole, ungleich unter verschiedenen Meridianen. R.	53	197
Dowler: geolog. Alter von Cypressen und Menschen um Neu-Orleans. R.	55	221
Drian, A.: Augit-Gestein im Rhône-Dept. R.	56	83
Drouot: Hornblende-Gestein im östlichen Theile des Beaujolais. R. .	57	345
Dubois: grösster Gold-Klumpen in Kalifornien. R.	53	696
Duchanoy: Lagerung der Kupfer-Erze im mitteln Norwegen. R. . .	56	75
Dufrénoy: Diamant-Krystall aus Brogagem in Brasilien. R.	56	841
Dumont, A.: geologische Karte und Eintheilung Belgiens. R. . . .	51	617
— — Hilfe der Geologie bei Forschung nach unterirdischen Wassern. R.	52	729
— — geometrische Charaktere der Gleichzeitigkeit der Formationen. R.	53	611
— — über Geyser-Gesteine. R.	54	473
Dumont-d'Urville: vulkanisches Eiland Bridgeman. R.	50	465
Dunker, W.: Mollusken im Oberschlesischen Muschelkalke. R. . .	50	99
— — Süsswasser-Mollusken in Almeroder Braunkohlen-Formation. R.	53	751
— — Pflanzen-Reste aus Quadersandstein von Blankenburg. R. . .	56	640
— — „de Septiferis genere et de Dreisseniis“ Marburg 1855. R.	56	238
Dupaty, A.: Erdbeben zu Mascara in Oran. R.	52	738
Durocher, J.: Mineralien der Erz-Lagerstätten auf trockenem Wege erzeugt. R.	51	706
— — Magnetische Kraft der Fels-Arten. R.	51	723
— — Dolomit-Bildung durch Talkerde-haltige Dämpfe. R.	52	328
— — Zinnerz-Vorkommen in Bretagne. R.	52	498
— — Zinnerz-führende Alluvionen in Bretagne. R.	52	971
— — Absorption atmosphärischen Wassers durch Mineralien. R. .	53	696
— — Dolomit-Bildung durch Bittererde-Dämpfe? R.	53	701
— — Ursprung warmer Quellen in den Pyrenäen. R.	55	721
— — künstliche Mineral-Bildungen, wichtig für die Geologie. R. .	56	472
— — unterseeische Wälder und Höhen-Wechsel in West-Frankreich. R.	57	216
— — Feuer-Gesteine, ihre Ausbruch-Erscheinungen und Klassifikation I—III. R.	57	353
IV—V. R.	57	734
Durocher u. Malaguti: Pyrit-Bildung in jungen Alluvionen. R. . .	52	619
Durocher, Malaguti und Sarzeaud: Blei, Kupfer und Silber in Seewasser und Organismen. R.	50	352
Dürre: Osteolith aus den Kratzer-Bergen Böhmens. R.	59	195
Durval, H.: Borax-See und -Boden am Monte rotondo. R.	58	704
Duvernoy, G.: durchlöcherter Jura-Kalkstein und dessen Bewohner. R.	50	726
— — Grabungen nach miocänen Knochen zu Sansan. R.	51	763
— — über die ausdehnende Wirkung der Krystallisations-Kraft und Versuch die Gestalt der Erd-Rinde und Erhebung der Gebirge daraus zu erklären. A.	52	781
— — Osteologie lebender und fossiler Zetaceen in Strasburger Sammlungen. R.	53	93
— — fossile Säugthiere von Sansan. R.	53	105
— — Bubalus (Arni) antiquus ist fossil in Algerien. R.	53	124
— — Studien über fossile Rhinocerosse. R.	54	243
— — tertiäre Säugthiere von Pickermi bei Athen. R.	54	637
— — neue Studien über die fossilen Nashorne. R.	54	755

E.

	Jahrg.	Seite
Ebelmen: zerlegt Arsenik-Nickel von Ayer im Wallis. R. . . .	1850	70
— — zerlegt Fahlerz aus Algerien. R.	50	71
— — künstliche Darstellung krystallinischer Mineralien. R. . . .	50	457
— — Mineral-Bildung durch Krystallisation auf trockenem Wege. R.	51	692
— — künstliche Chrysoberyll-Krystalle. R.	51	710
— — und Salvétat: Analyse von Kaolin aus China. R.	52	333
Ebray, Th.: Vergleichung von Ammonites anceps und A. pustulatus. R.	57	382
— — die Sippe Cottaldia im Bathonien. R.	58	510
— — Ergänzungs-Täfelchen am Scheitel von Collyrites. R . . .	59	378
— — Conoclypus, eine neue Echinoideen-Sippe. R.	59	378
— — einige Organismen-Arten des Albien bei Sancerre. R. . . .	59	762
Edmonds, R.: Landschnecken lebender Arten im Sande Cornwall's. R.	50	868
Edwards, Fr. E.: „Monograph of the eocene Mollusca", I. Cephalopoda. R.	54	852
— — „Monograph of the eocene Mollusca", II. Pulmonata. R. . .	54	864
— — „Monograph of the eocene Mollusca", III.	57	635
Edwards, J. D.: Titaneisen von der Küste von Mersey. R.	57	835
Egerton, Ph. Gr.: vgl. Grey Egerton.		
— — Fisch-Reste aus der Gegend von Ludlow. R.	58	624
— — über die Synonymie der Fische im Old red sandstone. R. .	59	491
— — die erloschene Sturioniden-Sippe Chondrosteus. R.	59	506
— — über Palaeoniscus superstes aus Keuper. R.	59	510
Egger, J. G.: die Foraminiferen der Miocän-Schichten bei Ortenburg in Niederbayern, mit 15 Tfln. A.	57	266
— — „der Jurakalk bei Ortenburg", Passau 1858, 8°. R.	58	349
— — die Ostrakoden der Miocän-Schichten bei Ortenburg in Bayern (mit 6 Tfln.) A.	58	403
Ehrenberg: das mächtigste Infusorien-Lager in Oregon. R.	50	95
— — das Formen-reiche Leben in der Atmosphäre. R.	50	248
— — mikroskopische Untersuchung des Jordan-Wassers und des Bodens des todten Meeres. R.	50	488
— — Infusorien-haltiges Gyps-Lager in Kleinasien. R.	50	491
— — Werk über Geologie des unsichtbaren Lebens. R.	51	495
— — mikroskopische Bestandtheile der Schwarzerde. R. . . . 52	344,	345
— — das organische Leben in 12000′ Meeres-Tiefe. R.	54	610
— — biolithischer Süsswasser-Mergel am Garag-See in Fajum. R. .	54	612
— — zur Kenntniss der Natur und Entstehung des Grünsandes. R. .	54	735
— — Grünsand aus Polythalamien-Kernen im Zeuglodon-Kalke. R. .	55	469
— — die Bildung des Meeres-Grundes in 12900′ Tiefe R. . . .	55	470
— — Erkenntniss grössrer Organisation bei den Polythalamien. R. .	55	615
— — „Mikrogeologie", Leipzig 1854, fol. R.	55	758
— — marines Polygastern-Lager mit verlarvten Polythalamien. R. .	56	101
— — ganze Nummuliten-Kerne mit reicher organischer Struktur. R.	56	497
— — Fortsetzung seiner Mikrogeologie. R.	56	605
— — farbig injicirte Polythalamien-Schaalen aus Java. R.	56	607
— — Meeres-Organismen aus 16200′ Tiefe. R.	57	111
— — Grünsand und dessen Erläuterung des organischen Lebens. R.	57	749
— — Südamerikanische Gebirgs-Massen aus mikroskopischen Organismen. R.	57	843
— — mikroskopische Lebens-Formen im untersilurischen Gebirge von St. Petersburg. R.	58	630
— — ein vulkanischer Tuff bei Hermersdorf in Sachsen. R. . . .	59	846
— — organischer Quarzsand der Aachener Kreide-Schichten. R. . .	59	464
— — Thier-Leben in Fels-bildenden heissen Quellen auf Ischia. R.	59	510
Ehrlich, C.: „über die Nordöstlichen Alpen", Linz 1850, 8°. R. . .	50	728

	Jahrg.	Seite
Ehrlich, C.: „Geognostische Wanderungen in den N.W.-Alpen", Linz 8°. R.	1852	620
— — Zahn von Elephas primigenius im Traun-Flusse. B.	53	158
— — Wiener Sandstein, Nummuliten-Sandstein und Gosau-Schichten in den Ost-Alpen. B.	55	42
— — tertiäre Cetaceen-Reste zu Linz. R.	55	632
Eichwald, v., E.: die Jura-Formation in Russland. R.	50	225
— — Saurier im Kupfer-führenden Zechstein Russlands. R.	50	874
— — die Bergkalk-Formation Russlands. R.	51	607
— — „naturhistorische Bemerkungen zur vergleichend. Geognosie". R.	52	108
— — „Lethaea Rossica", ou le monde primitif de la Russie décrit et figuré. Stuttgart. I. 1852. R.	52	757
— — „Lethaea Rossica", II. livr. R.	53	123
— — „Lethaea Rossica" III. vol. Période moderne, III, 8°. R.	54	110
— — Meteorstein, bei Dünaberg 1820 gefallen. R.	54	184
— — über einen Schädel von Zygosaurus lucius. R.	54	497
— — Paläontologische Bemerkungen über den Kursk'schen Eisensandstein. R.	55	622
— — Grauwacke-Gebirge in Lief- und Esth-Land. R.	55	852
— — fossile Reste im Grauwacke-Gebirge Lief- und Esth-Lands. R.	55	865
— — über Cryptonymus und Zethus. R.	56	510
— — geographische Verbreitung der fossilen Thiere Russlands R.	57	633
— — zur geographischen Verbreitung der fossilen Thiere Russlands. R.	58	238
— — Erd-Löcher und Erdfälle auf Ösel und in Lievland. R.	58	600
Elie de Beaumont: Wechselbeziehungen in den Richtungen der Gebirgs-Systeme. R.	51	94, 100
— — Aufgaben in den W. Cordilleren Süd-Amerikas. R.	51	610
— — Lage des Pentagonal-Netzes auf der Erd-Oberfläche. R.	52	82
— — „Notice sur les systèmes des montagnes", III. Paris 1852. R.	53	204
— — neues Hebungs-System in Algerien. R.	57	92
— — die Lias-Sandsteine von Luxemburg, Vic und Romery. R.	57	213
Emmons, E: älteste Korallen der Montgomery-Co., U. St. (Konkrezionen). R.	57	123
— — Perm- und Trias-System in Nord-Carolina. R.	57	342
— — Geological-Report of the Midland of North-Carolina, 1856. R	58	358
— — Dromatherium sylvestre aus N.-Amerik. Kohlen-Schichten. R.	59	511
Emmrich, H.: Alpenkalk und seine Gliederung in Bayern. R.	50	620
— — Jura- und Kreide-Gebirge im Traun-Gebiete Bayerns. R.	52	92
— — Studien in den Deutschen Nord-Alpen; Mittle Kreide; Neocomien; Aptychus-Schiefer; zwei rothe Marmore; Alpen-Kohle; Gervillien-Bildung; Lithodendron- und Isocardien-Kalke. B.	52	353
— — Versteinerungen am Kramer bei Garnisch; Gervillia tortuosa; oolithische, Alpen-, Lias- und Jura-Kalke im Traun-Gebiete. B.	52	593
— — geognostische Beobachtungen in den Bayern'schen und Österreichischen Alpen. R.	53	78
— — geologische Untersuchungen im Österreichischen Gebirge. R.	53	191
— — zur Kenntniss der Süd-Bayern'schen Molasse. R.	56	359
— — die Kalk-Alpen um Lienz in Tyrol. R.	57	221
Engelhardt: tabellarische Übersicht der Lias-Glieder verschiedener Gegenden. R.	59	94
Engelmann: unterirdischer Wald in Curland. R.	50	466
Erdbeben in Armenien. R.	51	464
Erdmann: zerlegt Soole von Wittekind bei Halle. R.	50	63
Erdmann, Ax.: Beobachtungen über die Schwedischen sogen. Morlekor. A.	50	34
— — Geologie von Tunaberg; Niveau-Wechsel in den Scheeren. B.	51	174
— — Geognosie des Kirchspiels Tunaberg, Stuttgart 8°. R.	51	359
— — Geologie der Eisenerz-Lagerstätten von Dannemora. R.	53	67

	Jahrg.	Seite
Erdmann, Ax.: mineralogische Beschreibung von Tunaberg. R. . .	1853	704
— — Eisenstein-Lagerstätten auf Utö. R.	58	327
— — geologische Forschungen in Schweden. A.	59	257
Erman, A.: geographische Verbreitung des Goldes. R	50	359
— — geologische Verhältnisse Californiens. R.	50	494
Erz-Anbruch im Geistergange zu Joachimsthal, Böhmen. R. . . .	54	72
Escher von der Linth: Umgegend des Calanda in Graubündten. R. .	50	743
— — „die Gegend von Zürich in der letzten Periode der Vorwelt". R.	52	726
— — Lagerung und Alter des Schratten-Kalkes; Reihenfolge der Formationen im Vorarlberg und Bergamaskischen B. . . .	53	167
— — Vorkommen von Orbitulina lenticularis und Pterocera Pelagi im Urgonien. B.	53	329
— — Geologisches aus Nord-Vorarlberg. R.	54	203
— — neue Karte des Kantons St.-Gallen. R.	55	578
— — Gebirge des Appenzeller Landes bis zum Wallensee. R. . .	58	850
Eser: neue Petrefakte aus Württemberg. R.	56	604
Escosura: zerlegt Freieslebenit von Hiendelencina in Spanien. R. .	58	818
Etallon: der hohe Jura um Saint-Claude. R.	58	725
Ettingshausen, C. v.: „Österreichische Tertiär-Floren" I. von Wien. R.	52	627
— — Fundorte tertiärer Pflanzen-Reste in Österreich. R.	52	748
— — die Proteaceen der Vorwelt. R.	52	749
— — Nachtrag zur fossilen Flora von Wien. R.	52	749
— — Beitrag zur Flora der Wealden-Periode. R.	52	885
— — Palaeobromelia, ein neues fossiles Pflanzen-Geschlecht. R. .	52	992
— — Aufzählung der fossilen Umsprosser oder Monokotyledonen. R.	52	992
— — die fossilen Pandaneen. R.	52	1003
— — Pflanzen-Schiefer von Laak in Krain. R.	53	72
— — Beitrag zur Kenntniss der fossilen Flora von Wildhut an der Salzach in Österreich. R.	53	120
— — die Steinkohlen-Flora von Stradonitz in Böhmen. R.	53	120
— — die tertiären Palmen in Österreich. R.	53	212
— — neue oder wenig bekannte Pflanzen aus Lias und Oolith. R. .	53	241
— — Pflanzen aus trachytischem Sandstein von Kremnitz. R. . . .	53	383
— — über fossile Proteaceen. R.	53	508
— — zur näheren Kenntniss der Kalamiten. R.	53	508
— — fossile Flora des Monte Promina. R.	53	509
— — die Tertiär-Flora von Häring in Tyrol. R.	54	376
— — die fossile Flora von Tockay. R.	54	490
— — Nervation der Blätter bei Euphorbiaceen. R.	54	621
— — Nachtrag zur Eocän-Flora des Monte Promina. R.	54	877
— — „die eocäne Flora des Monte Promina", Wien 1855. R. . .	55	369
— — die Steinkohlen-Flora von Radnitz. R.	56	96
— — die fossile Flora von Köflach in Steyermark. R.	58	499
— — die fossile Flora von Sotzka in Steyermark. R.	59	372
— — die Blatt-Skelette der Apetalen. R.	59	376
— — „über die Geschichte der Pflanzen-Welt", Wien 1858. R. . .	59	377
— — die Blatt-Skelette der Celastrineae und Bombaceae. R. . . .	59	377
Ettingshausen, C. v. u. Pokorny: Naturselbstdruck zur Darstellung von Pflanzen. R.	56	478
Ettingshausen, C. v. u. Debey: die Kreide-Flora von Aachen, I. II. R.	58	619
Ettling: Zwillings-Bildung des Glimmers. R.	53	54
Ewald: die Kreide und ihre Versteinerungen in Istrien. R.	51	602
— — Grenze zwischen Neocomien und Gault. B.	51	737
— — über Biradiolites. R.	53	381
— — die Rudisten am nördlichen Harz-Rande. R.	57	755
— — das Hackelgebirge in der Provinz Sachsen. R.	59	90

	Jahrg.	Seite
Ezquerra del Bayo, J.: Akademie der Wissenschaften in Madrid; Wörterbuch der Wissenschaften; vollständiger Elephas primigenius; geologische Karte von Spanien. B.	1850	835
— — Geologisches von Trillo und Ablanque in Guadalajara. R.	52	342
— — geognostische Karte von Spanien, Tf. 1. A.	51	24
— — „Elementos de Laboreo de minas"; neueste Aufschlüsse im Quecksilber-Bau von Almaden. B.	51	675
— — Gebirgs-Bau der Spanischen Halbinsel. R.	54	460

F.

Faber, W. L.: Carrolit ein neues Kobalt-Mineral. R.	53	181
— — Carrolit von Flinksburg in Carrol, Maryland. R.	54	68
Fahnestock, G. W.: Einfluss von Brenngas auf lebende Pflanzen. R.	59	256
Fahrenkohl u. Rouillier: über Ichthyoterus Fischeri n. g. sp. R.	54	856
Falconer, H.: Säugthier-(Plagiaulax-) Arten in den Purbeck-Schichten. R.	58	113
— — die in England vorkommenden Elephanten-Arten. R.	58	378
— — die Knochenhöhle Grotta di Maccagnone bei Palermo. R.	59	640
— — Beobachtungen über Knochen-Höhlen bei Palermo. R.	59	861
Fallon, F. A.: das Granulit-Gebirge bei Schemnitz. R.	56	724
Favre, A.: Ammoniten-Gesteine über Nummuliten im Reposoir-Thale. R.	50	474
— — Untersuchungen über die künstlichen Mineralien. R.	56	431
— — Geologie einiger Theile Savoyens. R.	58	481
— — „le terrain liasique et keupérien de la Savoie", Genève 1859. R.	59	349
Fehling, H.: Gehalt der Kalksteine an Alkalien und Phosphorsäure. R.	50	445
— — zerlegt Württembergisches Steinsalz und Soolen. R.	50	614
Fellenberg: Zerlegung d. Mineralwassers von Weissenburg bei Bern. B.	50	62
Felsen-Sturz zu Feldberg in der Schweitz. R.	50	624
Felsen-Sturz bei Felsberg. R.	51	107
Fenzl's u. Heckel's Art versteinerte Skelette zu reinigen. R.	51	380
Fergus, T. H.: Glimmer aus Hornblende entstehend. R.	50	61
Ferguson, W.: Feuersteine und Grünsand in Aberdeenshire. R.	59	227
Fiedler, H.: die fossilen Früchte der Steinkohlen-Formation. R.	58	625
Field, F.: Atakamit von Copiapo in Chile. R.	55	839
— — Analyse des Bodens von Caldeca in Chili. R.	56	841
— — zerlegt Meteoreisen aus der Wüste Atakama. R.	57	166
— — Analyse eines Meteorsteins von Atacama. R.	58	216
— — Algodonit von Coquimbo in Chile. R.	58	691
— — Guayacanit aus den Cordilleren Chili's. R.	59	302
— — Guayacanit ein neues Mineral der Cordilleren Chili's. R.	59	621
Filhol, E.: Borsäure in Schwefelwassern u. a. Natur-Erzeugnissen. R.	53	475
Filhol u. Leymerie: Aerolith zu Montrejean im Haute-Garonne-Dept. R.	59	622
Fischer: Sclerosaurus armatus Myr., eine neue Saurier-Gattung aus dem Bunten Sandsteine bei Warmbach, gegenüber Rheinfelden, Tf. 3. A.	57	136
Fischer u. Nessler: Eusynchit, neues Vanadin-Mineral von Freiberg. R.	55	570
Fischer-Ooster, C. v.: „die fossilen Fukoiden der Schweitzer Alpen". R.	58	636
Fischer von Waldheim: einige fossile Arten des Gouvernement's Orel. R.	50	243
— — Cephalopoden aus Russischem Bergkalke. R.	51	491
— — über Crioceras Woronzowi. R.	51	491
— — Notitz über einige fossile Fische Russlands. R.	53	125
— — Platacanthus, fossiler Fisch aus Griechenland. R.	53	759
Fitsche: Uranpech-Erz der Himmelfahrts-Grube bei Freiberg. R.	55	445
Fitzingee, L.: systematische Stellung der fossilen Reptilien. R.	56	758
Flajolot: Krystall-Form des Fahlerzes von Mouzaïa. R.	56	185
Fletcher, Th. W.: Trilobiten von Dudley. R.	51	255
Fleming: Ursprung und Verbreitung der Pflanzen-Arten. R.	50	755

	Jahrg.	Seite
Foith, K.: kugelige Gesteins-Struktur. R.	1855	580
Fontan: Menschen-Knochen in Höhlen des Ariège-Dept's. R.	58	598
Forbes, C.: Krabben in der Payta-Bay ans Land geworfen. R.	59	233
Forbes, D.: zerlegt Buntkupfererz und Kupferkies von Jemteland. R.	55	197
— — Wechselwirkung von Schwefel-Metallen und Kiesel-Erzen. R.	56	197
— — Analyse des Tritomits von Brevig. R.	58	566
Forbes, D. u. T. Dahll: Analysen des Yttrotitanits von Askerö. R.	57	709
— — — — Analyse des Tyrits. R.	58	74
— — — — der Skandinavische Alveit ist Zirkon. R.	58	309
— — — — Analyse des Euxenits. R.	58	321
— — — — zerlegen Orthit von Arendal. R.	58	566
Forbes, D. u. Bealey: Zinnober von Neu-Almaden in Californien. R.	56	686
Forbes, E.: Schichten und Organismen-Folge im Purbeck-Gebilde. R.	51	354
— — Gestade-Schichten unter Oxford-Thon auf Skye. R.	52	350
— — Zoologische Regionen unter dem Meere. R.	52	996
— — Maclurea hat einen Deckel. R.	52	1003
— — Echinodermen des Crag's. R.	53	104
— — Cardiaster, ein neues Seeigel-Geschlecht aus Kreide. R.	53	379
— — Analogie zwischen Individuums- und Art-Leben. R.	53	381
— — neue Punkte für die Britische Geologie. R.	54	82
— — das Gesetzliche in der Aufeinanderfolge der Organismen. R.	54	606
— — Jahrtags-Rede. R.	54	606
— — „the Echinodermata of the British Tertiaries", 1852, 4 °. R.	54	760
— — die Tiefe der Urmeere nach der Farbe der Konchylien geschätzt. R.	56	125
— — Britische Trilobiten. R.	57	380
— — Britische Asteriaden und Echiniden. R.	57	746
Forbes, J. D.: Vulkanische Entstehung des Mont-Albano. R.	51	466
— — Gletscher und Eis-Felder in Norwegen. R.	55	708
— — Grenze des ewigen Schnee's in Norwegen. R.	55	730
Forchhammer: über Dolomit-Bildung. R.	50	717
— — Beiträge zur Bildungs-Geschichte des Dolomits. R.	52	852
— — künstliche Bildung krystallisirten Apatits. R.	55	100
— — Meteoreisen aus Grönland. R.	55	350
— — Einfluss des Kochsalzes auf Mineral-Bildung I. R.	55	587
— — Einfluss des Kochsalzes auf Mineral-Bildung II. R.	55	589
— — Einfluss des Kochsalzes auf Mineral-Bildungen. R.	56	436
Foster u. Whitney: Azoisches Gebirge am Oberen See. R.	54	829
— — — — Pechstein aus Trapp von Isle Royale. R.	55	449
Fötterle, Fr.: Braunkohlen-Lager im Arvaer Comitate Ungarns. R.	53	190
— — Anatas von Schemnitz. R.	54	78
— — geologische Übersichts-Karte von Süd-Amerika. R.	55	90
— — Magnesit in Steyermark. R.	56	44
— — Massen-Gesteine von S.-W. Mähren. R.	56	854
— — geologische Forschungen im S.-W. Mähren. R.	57	350
— — Steinkohlen-Lager zu Jaworzno bei Krakau. R.	57	590
— — Lagerung der Steinkohlen- und Trias-Gebilde in S.-W. Kärnthen. R.	57	615
— — Gang-Verwerfung im Schlackenwalder Zinn-Bergbau. R.	58	219
— — Steinkohlen- und Trias-Gebilde im S.-W. Kärnthen. R.	58	344
— — Eisenstein-Lagerstätten der Karpathen. R.	58	858
— — geologische Forschungen im Neutraer Komitat. R.	59	203
Fouqué: Geologie der Gegend von Mortain im Manche-Dpt. R.	58	841
Four, M.: körniger Thoneisenstein u. Bohnerz zu Autrey. Haute-Saône. R.	57	346
— — Bohnerz-Ablagerungen im Haute-Saône-Dept. R.	58	344
Fournet: Eruptiv-Gesteine um Lyon. R.	50	72
— — geologische Wanderung durch Süd-Tyrol. R.	52	354
— — Ergebnisse einer Wanderung in den Alpen. R.	52	967

	Jahrg.	Seite
Fournet: Ursache oolithischer Gesteins-Struktur. R.	1854	841
— — Kalk-Tropfstein und -Sinter in Höhlen des Drôme-Dept's. R.	55	465
— — Überblick einer Theorie der Erz-Lagerstätten I. R.	56	586
II. R.	56	725
— — Gänge in der Sierra de Cartagena. R.	58	348
Fournet u. Graff: altes Gebirge von Neffiez im Languedoc. R.	54	846
Fraas, O.: Versuch einer Vergleichung des Deutschen Jura's mit dem Französischen und Englischen. A.	50	139
— — Tertiär-Ablagerungen auf der Württembergischen Alb. R.	52	345
— — Paläotherien-Formation zu Fronstetten in Württemberg. R.	52	758
— — zu seinem Aufsatze: über die Paläotherien von Fronstetten. R.	53	250
— — der Bergschlipf von Rathshausen. R.	54	205
— — zum obersten weissen Jura in Schwaben. R.	55	612
— — Squatina acanthoderma von Nusplingen. R.	56	486
— — Ablagerungs-Weise der Petrefakten im Jura. R.	56	604
— — die Oolithe im weissen Jura des Brenz-Thales. R.	57	86
— — die Jura-Versenkung zu Langenbrücken bei Bruchsal. B.	58	664
— — über basaltiforme Pentakrinen. R.	58	876
Fraas, O. und C. Deffner: die Jura-Versenkung bei Langenbrücken in Baden (m. Karte). A.	59	1
— — — — die Jura-Versenkung bei Langenbrücken in Baden. A.	59	513
Frantzius, v.: um Meran vorkommende Grauwacke. A.	51	667
— — Capra Rozeti in Braunkohle Dalmatiens; tertiäres Blätter-Lager zu Kauth bei Breslau. B.	52	453
Fremy: Zersetzung von Schwefel-Verbindungen durch Wasser und Entstehung Schwefel- und Kiesel-haltiger Mineral-Wasser. R.	54	86
— — Metalle im Platin-Erz. R.	55	836
Fresenius: Borsäure im Kochbrunnen zu Wiesbaden. R.	54	183
Fresenius u. H. v. Meyer: Sphaeria areolata in Braunkohle. R.	56	757
Freyer: Schichten-Folge des Tertiär-Gebirgs von Radoboj in Croatien. R.	50	852
— — Foraminiferen des Wiener Beckens. R.	51	380
Frezin: Kohlenwasserstoffgas-Quellen in Savoyen. R.	56	724
Fridau, F.: Alaunfels vom Gleichenberg in Steyermark. R.	51	592
Frischmann, L.: „Thier- u. Pflanzen-Reste im lithogr. Kalke Bayerns". R.	53	749
Fritsch, K.: sekulärer periodischer Wechsel der Luft-Temperatur. R.	55	455
Fritzsche, J.: über Ozokerit, Neft-Gil und Kir. R.	58	468
Fromentel, E. de: die Korallen im Portland-Kalk des Haute-Saone-Dept's. R.	58	590
Fromherz, C.: alpinische Diluvial-Bildungen im Bodensee-Becken. A.	50	641
— — der körnige Kalk am Kaiserstuhl im Breisgau. B.	52	446

G.

Gaillardot, Ch.: der Djebel Khaisoun bei Damaskus in Syrien. R.	57	450
Galbraith: zerlegt Granit-Feldspathe aus Irland. R.	55	703
— — Analyse des Killinits. R.	59	622
Gale: Menschen-Reste in der Bluff-Formation von Natchez. R.	51	636
— — zerlegt Wasser vom grossen Salzsee und dortigen Thermen. R.	55	195
Garden, R. J.: einige Kreide-Gesteine bei Port-Natal. R.	57	369
Garrett: die Begleiter des Eisenchroms. R.	54	345
Gastaldi, B.: Zahn-Bildung und Alter von Anthracotherium magnum. R.	58	738
Gätschmann, M. F.: „Auf- und Untersuchung der Lagerstätten nutzbarer Mineralien". R.	58	330
Gaudin, A.: künstliche wasserhelle Saphir-Krystalle. R.	57	444
Gaudin, Ch. Th.: die Tertiär-Flora von Lausanne. R.	56	450
— — Diluvial-Torf zu Biarritz bei Bayonne. R.	57	84
— — die jüngere Tertiär-Flora Oberitaliens. R.	58	501

	Jahrg.	Seite
Gaudin, Ch. Th. et C. Strozzi: Contributions à la Flore fossile Italienne; II, Val d'Arno. R.	1859	870
— — — — Mémoire sur les feuilles fossiles de la Toscane. R.	59	115
Gaudry, A.: Formation des Silex et des Meulières, Thèse; Paris 1852, 4°. R.	54	207
— — die vulkanischen Ausbrüche auf Hawaii, Sandwichs. R.	56	199
— — die Knochen-Lagerstätte von Pickermi in Attica. R.	56	594
Gaudry, A. u. Lartet: paläontologische Forschungen zu Pickermi in Attica. R.	57	370
Gay u. Gervais: Beschreibung von Plesiosaurus? Andium. R.	53	123
Geinitz, H. Br.: Zusammensetzung und Lagerung der Kreide-Formation in der Gegend von Halberstadt, Blankenburg und Quedlinburg. A.	50	133
— — Bemerkungen zu Debey's geognostisch-geologischer Darstellung der Gegend von Aachen. A.	50	289
— — das Quader-Gebirge von Regensburg. R.	50	727
— — Grünsand-Formation und Flammen-Mergel im Teutoburger Wald. B.	51	62
— — „Versteinerungen der Grauwacke in Sachsen", I. Graptolithen. R.	52	373
— — Klassifikation der Sächsischen Quader-Formation; Sack's Petrefakten-Sammlung angekauft; neue Aufstellungs-Weise der geognostisch-paläontologischen Sammlungen in Dresden. B.	52	459
— — „Versteinerungen der Grauwacke Sachsens" II., 4° 1853. R.	53	621
— — Conularia Hollebeni n. sp. R.	54	865
— — „die Flora des Hainichen-Ebersdorfer und Flöhaer Kohlen-Bassins im Vergleich zum Zwickauer", Leipzig 1854, fol. R.	55	241
— — „die Versteinerungen der Kohlen-Formation Sachsens". R.	55	625
— — die Anthrazit-Kohle im oberen Erzgebirge. R.	55	712
— — Unternehmungen auf Steinkohlen im Erzgebirgischen Becken.	56	446
— — „Geognostische Darstellung der Steinkohlen-Formation Sachsens" 1856. R.	56	474
— — über Amygdalophyr oder Mandelstein-Porphyr. B.	56	665
— — 2 neue Versteinerungen und Stropholosien des Zechsteins. R.	58	373
— — „Leit-Pflanzen der permischen Formation, Leipz. 1858, 4°."	58	502
— — Vorkommen von Gold in Australien. R.	59	81
— — Melaphyr und Sanidinquarzporphyr zu Zwickau. R.	59	214
Gemmellaro, G. G.: allmähliche Hebung der Ost-Küste Siciliens. R.	59	464
Genth, F. A.: Nordamerikanische Mineralien. R.	54	176
— — Tetradymit in Davidson, V. St.	54	445
— — neuer Elementar-Stoff im Golde Californiens. R.	55	68
— — ein neues? Fahlerz aus der Grafschaft Cabarras. R.	55	198
— — analysirt Apophyllit aus Nova Scotia. R.	55	347
— — Fahlerz von Eldridge's Gold-Grube in Nord-Carolina. R.	56	36
— — Wavellit aus der Grafsch. Davidson, Vereinte Staaten. R.	56	49
— — Geokronit aus der Grafschaft Louisa, Vereinte Staaten. R.	56	49
— — Scheelsaures Blei in Nord-Carolina. R.	56	350
— — Skorodit aus Nord-Carolina. R.	56	351
— — Bismuthit aus Rowan, Nord-Carolina.	56	445
— — Allanit aus Orange-Co. in Neu-York. R.	56	445
— — Allanit in Granit von Bethlehem, Grafsch. Northampton. R.	56	552
— — Scheelit in Nord-Carolina. R.	56	552
— — zerlegt Owenit. R.	56	555
— — zerlegt Meteoreisen von Tuczon in Sonora, Mexico. R.	57	166
— — Barnhardit aus Nord-Carolina. R.	57	432
— — Allanit aus der Eckhardshütte in Berks.	57	434
— — Wolfram in Nord-Carolina. R.	57	435
— — Wolframsaures Kupferoxyd ein neues Mineral aus N.-Carolina. R.	57	439
— — Tetradymit oder Tellurwismuth aus Nord-Amerika. R.	57	439
— — Zerlegung des Barnhardit's aus N.-Carolina. R.	58	565

	Jahrg.	Seite
Genth, F. A.: Siegenit aus Chloritschiefer von Carroll und Missouri. R.	1858	682
— — Coracit vom Lake superior ist Uranpecherz. R.	58	683
— — Carrollit aus der Patapsco-Grube in der Grafschaft Carroll. R.	58	685
— — Wavellit aus der Grafschaft Chester. R.	58	685
— — Harrisit aus der Canton-Grube. R.	59	83
— — Dufrenoyit aus Greensand. R.	59	83
— — Wismuthglanz von Riddarhyttan in Schweden. R.	59	189
— — Lanthanit aus Pennsylvanien. R.	59	190
— — Cantonit aus der Canton-Grube. R.	59	196
Genth, F. A. und Keiser: Analysen verschiedener Allanite. R.	58	575
Geoffroy St.-Hilaire, J.: alluviale Knochen und Eier eines Riesen-Vogels in Madagaskar. R.	51	374
— — Knochen und Eier von Aepyornis. R.	55	480
Geologische Aufnahme des Königreichs der Niederlande. R.	53	371
Gergens: Sandstein-Knollen und Zölestin im Sandstein bei Oppenheim. B.	55	172
— — in Chalcedon von Oberstein eingewachsene Mineral-Krystalle. A.	56	22
— — einige Pseudomorphosen aus der Blei-Grube von Kautenbach bei Berncastel an der Mosel. A.	56	135
— — über Konferven-artige Bildungen in manchen Chalzedon-Kugeln. A.	58	801
Gerhard, W.: über Diego de Ordaz den ersten Ersteiger des Popokatepetl. B.	57	54
Gerhard, N.: Dolomit-Bildung in der Fränkischen Schweitz. B.	58	58
Germar: Chrismatin, ein neues Erdharz. R.	51	353
— — tertiäre Insekten am Rheine und zu Aix.	51	759
— — Insekten in Braunkohle und im Gypse von Aix. R.	53	105
Gervais, P.: Säugethier-Arten mit Pariser Paläotherien bei Apt R.	50	498
— — Palaeotherium, Lophiodon u. a. Pachydermen. R.	50	878
— — drei Hipparion-Arten zu Cucuron, Vaucluse. R.	51	490
— — Zoologie et Paléontologie françaises, Paris, fol R.	51	492
— — über die fossilen Hufethiere in Frankreich. R.	52	979
— — ein fossiles Nashorn und die übrigen Säugthiere des Hérault-Dept's. R.	52	997
— — über Pterodon- u. a. erloschene Raubthier-Arten Frankreichs. R.	53	115
— — Bestimmung miocäner Knochen aus Spanien. R.	53	616
— — Hyaenarctos insignis, eine neue Art. R.	54	495
— — Note über die Sippe Hyaenarctos. R.	54	752
— — die Cetaceen-Sippe Ziphius und insbesondere Z. cavirostris. R.	54	848
— — Zoologie et Paléontologie françaises, II voll. 4°.	55	222
— — fossile Phoken und Wale in Frankreich. R.	55	620
— — über die fossilen Reptilien Frankreichs. R.	55	742
— — die fossilen Säugthiere Süd-Amerikas. R.	56	231
— — Histialosa Thiollierei, ein neuer Fisch aus der Kreide des Drôme-Dept's. R.	56	509
— — Vorkommen von Anthracotherium magnum. R.	56	615
— — Aphelosaurus aus den permischen Schiefern von Lodève. R.	59	235
— — pliocäner Rorqual von Montpellier. R.	56	751
— — die fossilen Säugthiere Süd-Amerika's. R.	57	224
— — fossile Säugthiere im Gard-Dept. R.	57	250
— — Säugthier-Fährten im Keuper von Lodève. R.	58	361
Gervais u. Gay: Beschreibung von Plesiosaurus? Andium. R.	53	123
Gibbes, R. W.: Wirbelthiere im Kreide- und Tertiär-Gebirge Nord-Amerika's. R.	50	746
— — fossile Squaliden in den Vereinten Staaten. R.	50	868
— — Mosasaurus und drei verwandte Sippen in Nord-Amerika. R.	52	762
— — über Basilosaurus oder Zeuglodon. R.	53	94
Gibson, T. F.: grosser Iguanodon-Femur aus der Wealden-Formation. R.	59	509

	Jahrg.	Seite
Giebel, C. G.: Steinkohlen-Formation bei Meisdorf im Selke-Thal. R.	1850	91
— — Gaea excursoria Germanica, Lips. 8°. R.	52	81
— — Buch über Cephalopoden: Labyrinthodonten und Sigillaria im Buntsandsteine von Bernburg; Kreide-Versteinerungen aus Texas. B.	52	601
— — „Allgemeine Paläontologie", Leipzig 1852, 8°. R.	52	629
— — einige Versteinerungen aus Pläner-Kalk von Quedlinburg. R.	52	766
— — zur Osteologie des Rhinocerosses. R.	52	767
— — neuer Palaeophrynus aus Braunkohle des Siebengebirges. R.	52	892
— — Philippi's Handbuch der Konchyliologie; Knochen aus Torf bei Erfurt; tertiäre Trigonien; unter-miocäne Schichten bei Schraplau gegen Quenstedt. B.	53	44
— — Kreide-Versteinerungen aus Texas; Deutsches Petrefakten-Verzeichniss: Koprolithen von Bernburg; Cidarichthys statt Pachygaster. B.	53	165
— — Pflanzen-Reste im Braunkohlen-Sandstein bei Merseburg. R.	53	631
— — Sigillaria im Sandstein von Bernburg ist Pleuromeya. R.	54	109
— — Kritisches über die Myophorien des Muschelkalks. R.	55	245
— — Krinoiden in Kreide-Mergel Quedlinburgs. R.	55	368
— — paläontologische Notitzen. R.	55	625
— — Ammonites dux n. sp. aus Muschelkalk. R.	55	871
— — Gottländischer Orthoceratit mit Weichtheilen. B.	56	332
— — „die Versteinerungen im Muschelkalke von Lieskau" 1856, 4°. R	56	362
— — Weichtheile von Orthoceras. R.	56	599
— — räthselhafter Fisch im Mansfelder Kupferschiefer. R.	56	600
— — Fauna der Vorwelt, II. Gliederthiere. R.	56	764
— — das Kreide-Gebirge in Thüringen. R.	57	471
— — Dichelodus ein neuer Fisch aus Mansfelder Schiefer. R.	57	483
— — die paläolithischen Capulus-Arten. R.	57	762
— — Erdbeben in Sachsen und Thüringen im Juni 1857. R.	57	842
— — paläontologische Untersuchungen. R.	58	373
— — zur Fauna der lithographischen Schiefer Solenhofens. R.	58	622
— — die silurische Fauna das Unterharzes. R.	58	717
— — „die silurische Fauna des Unterharzes", Berlin 1858, 4°. R.	58	751
— — oligocäne Konchylien von Bernburg. R.	59	125
Giesecke, B. Th.: analysirt Bohnerz von Mardorf in Kurhessen. R.	59	295
Girard, H.: Varietäten der Terebratula vicinalis aus dem Brocatello d'Arzo. A.	51	316
— — Verbreitung des Goniatiten- und Clymenien-Gebirges; geologische Reise nach der Schweitz, Süd-Frankreich und Pyrenäen; Bex, Baveno, Lugano, Mendrisio, Tremona. B.	51	331
— — Harz in Bräunkohle von Perleberg ist Bernstein? R.	53	128
— — geognostische Reise von Genua nach Barcelona durch Süd-Frankreich (Tf. 8). B.	53	564
— — Klassifikation der Säugthiere. R.	55	876
— — über die Melaphyre in der Gegend von Ilefeld am Harz (m. 1 Tfl.) A.	58	145
— — Geologie der Norddeutschen Ebene zwischen Elbe u. Weichsel. R.	58	608
Girschner, N.: der tönende Sand bei Kolberg. R.	59	626
Giwartowski: Analyse des Glaukolith's. R.	50	700
Glim, H. v.: schaaliger Serpentin (Antigorit?) von Windisch-Madrei in Tyrol. R.	59	445
— — Asbest-artiger Serpentin (Metaxit) von Pregatten in Tyrol. R.	59	445
Glocker, E. F.: neues Nickel-Silikat aus Schlesien. R.	50	59
— — neue Thier-Formen aus Karpathen-Sandstein. R.	51	753
— — Kalkspath von Zannowitz in Mähren. R.	53	63
— — Kalkspath von Nieder-Einsiedel in Österreichisch-Schlesien. R.	53	173
— — Kalkspath von Reichenstein in Schlesien. R.	53	187

	Jahrg.	Seite
Glocker, E. F.: Allophan im blauen Stollen bei Zuckmantel. R. .	1853	708
— — nordische Geschiebe in der Oder-Ebene. R.	55	77
— — Zellen-ähnliche Einschlüsse in Diamanten. R.	55	571
— — Erdpech und Pflanzen-Reste im Rothliegenden Mährens. R. .	56	56
— — über die Lauka-Steine. R.	56	213
— — Pinguit von Barnberg in Mähren. R.	56	351
— — Bitterspath in Mähren. R.	56	553
— — die Kalk-Brüche bei Luckau in Mähren. R.	56	583
— — Pikrolith von Schönau in Mähren. R.	56	703
— — über Umwandelungen von Eisen-Erzen. R.	57	64
— — Brauneisenstein und Psilomelan in Mähren. R.	57	433
— — Haar-förmiger Glas-Quarz von Walchow in Mähren. R. . . .	57	436
— — Bergtheer, Erdpech, Ozokerit in Sandstein. R.	57	440
— — Quarz-Gänge als Wasser-Erzeugniss. R.	58	610
— — sulphatischer Eisen-Sinter in Schlesien. R.	58	693
Gmelin, C. G: Feldspath des Zirkon-Syenits in Norwegen. R. . . .	51	592
Gobanz, J.: Tertiäre Binnenmollusken in Steiermark. R.	55	767
Göbel, A.: Untersuchung eines Meteorsteins von Ösel. R.	56	690
— — Meteoreisen auf Ösel an Lievlands Küste gefallen. R. . . .	58	320
Göppert, H. R.: fossile Hölzer aus Sibirien. R.	50	126
— — über die Erhaltung fossiler Pflanzen im Übergangs-Gebirge und in der Kohlen-Formation, so wie über die Sippen Knorria und Aspidiaria. A.	50	257
— — über Junghuhn's geologische Forschungen in Java. B. . . .	51	68
— — Tertiär-Flora der Umgegend von Breslau. R.	52	634
— — „Flora fossilis formationis transitionis“ 1852, 4°. R. . . .	52	888
— — Beiträge zur Tertiär-Flora Schlesiens. R.	52	892
— — die Braunkohlen-Flora der Rhein-Lande. R.	52	985
— — fossile Koniferen. R.	53	128
— — die Braunkohlen-Flora im N.-W. Deutschland. R.	53	225
— — Pflanzen-Reste aus dem Salz-Stock von Wieliczka. R. . . .	53	382
— — über die Tertiär-Flora Java's. A.	53	433
— — Monographie der fossilen Koniferen, Leiden 1850. R. . . .	53	623
— — Vorkommen des Bernsteins in Schlesien. R.	53	701
— — über die Bernstein-Flora. R.	53	745
— — Stigmaria ficoides, die Hauptpflanze der Steinkohlen. R. . .	54	243
— — Pflanzenzellen-ähnliche Bildungen in Diamanten. R.	54	342
— — Untersuchungen über die tertiäre Flora. R.	54	494
— — „die Tertiär-Flora Java's nach Junghuhn“, 1854, 4°. R. . . .	54	628
— — Erscheinen seiner Floren der Kupferschiefer-Formation und von Schossnitz. B.	54	795
— — „Tertiär-Flora von Schossnitz in Schlesien“, Leipzig 4°. R. .	55	368
— — Übergangs- und permische Flora. B.	55	547
— — künstliches Profil der Steinkohlen-Formation zu Breslau. R. .	56	765
— — versteinerter Wald zu Radowenz bei Adersbach. R.	58	90
— — über Bogheat Parrot Cannel-coal. R.	58	217
— — Braunkohlen-Formation in Schlesien. R.	58	332
— — die versteinerten Wälder im nördlichen Böhmen. R	58	755
— — die permische Flora. R.	58	758
— — Reise in Schweden; Ceramites (Dictyonema) Hisingeri und Chondrites antiquus daselbst; paläolithische Flora; Stigmaria ist die Wurzel von Sigillaria; — Knorria gehört zu Sagenaria s. Lepidodendron. B.	59	804
Gold-Gewinnung vom J. 1848 in Ural und Sibirien. R.	51	467
Gold-Gewinnung vom J. 1851 in Ural und Sibirien. R.	53	72
Gold-Reichthum Australiens. R.	54	94

	Jahrg.	Seite
Goldenberg, Fr.: Verwandtschaft der Sippe Noeggerathia. R. . .	1850	873
— — Insekten im Saarbrücker Steinkohlen-Gebirge. R.	52	996
— — „Flora saraepontana, I. 1855, fol.	55	867
— — Insekten der Saarbrücker Steinkohlen-Formation. R. . . .	56	108
Goldfuss, A: „zur Fauna des Steinkohlen-Gebirges“: Archegosaurus. R.	50	103
— — Aspidosoma Arnoldii, ein Seestern in Grauwacke. R. . . .	51	380
Golfier-Besseyre: eigenthümliches Gold-Klümpchen aus Australien. R.	54	343
Gorini: Versuche die Entstehung der Gebirge und Vulkane zu erläutern. R.	53	610
Gorup-Besanez, v.: Analyse des Mineral-Wassers von Steben. R . .	53	702
— — Phosphorit von Amberg. R.	55	569
— — Soda aus Ostindien. R.	56	42
— — Magnesit von Madras. R.	56	182
— — Moorerde von Steben in Bayern. R.	57	434
Gottlieb: Analyse des Marienbrunnens von Gabernegg in Süd-Steyermark. R.	59	821
Gould: Unvollkommenheit Australischer Vögel und Säugethiere. R.	50	639
Gould, Ch.: Tropifer, ein Kruster aus dem Bone-bed. R.	58	115
Graff u. Fournet: altes Gebirge von Neffiez im Languedoc. R. . .	54	846
Grailich, J.: Roemerit ein neues Mineral vom Rammelsberg. R. . .	58	829
Grandjean: über Gebirgs-Erhebungen. A.	52	176
— — zur Kenntniss des Rheinischen Gebirgs-Systems in Nassau. A.	52	267
— — tertiäre Trachyte, Trachyt-Dolerite, Phonolithe, Basalte, Tuffe, Augit- und Hornblende-Gesteine des Westerwaldes; Eisensteine; Verwachsungen von Hornblende und Augit, von Kalkspath und Aragonit; Quarz-Bildungen auf nassem Wege. B.	52	294
Gras, Sc.: die alpinische Anthrazit-Formation. R.	58	326
— — Steinkohlen-Pflanzen bei Lias-Konchylien in den Alpen. R. .	58	375
— — Kohlen-Pflanzen mit Lias-Konchylien in den Alpen. R. . . .	59	220
Gratiolet, F.: über den Encephalus von Caenotherium commune. R.	59	108
— — Odobaenotherium ein Walross von Montrouge bei Paris. R. .	59	239
— — über den Encephalus von Oreodon gracilis. R.	59	861
Gray, A.: Nutzen der Pflanzen im Haushalte der Natur. R. . . .	57	254
Gray, J. E. u. Jeffreys: über die Schnecken-Sippe Scissurella. R. .	57	254
Greenough, G. B.: Geologie von Vorder-Indien. R.	55	733, 855
Greg, P. B.: Gediegen-Blei im Meteoreisen von Chili. R.	57	68
Greg, R. Ph.: zerlegt Matlockit von Cromford in Derbyshire. R. . .	52	210
— — Conistonit, ein neues Mineral aus Cumberland. R.	55	837
— — u. M. F. Heddle: Analyse und Synonyme des Pecklolith's. R.	58	471
— — u. W. G. Lettsom: Mineral-Topographie Grossbritanniens. R. .	59	186
Greifenhagen, C.: Mineralien der Bergwerkswohlfahrt zu Zellerfeld. R.	56	47
— — Rothgiltigerz auf Bergwerkswohlfahrt bei Zellerfeld. R. . .	56	443
Greppin, J. R.: Tertiär und Quartär-Bildungen im Berner Jura. R. .	57	844
Gressly: über die Tertiär-Bildungen im Laufen-Thale. R.	51	745
— — Geologischer Durchschnitt des Hauenstein-Tunnels. R. . . .	56	84
Grewingk, C.: Reise nach der Halbinsel Kanin am Eismeere. R. . .	50	740
— — Smaragd-Gruben des Urals. R.	57	710
— — Zechstein in Lithauen und Kurland. R.	57	722
— — Silur-Formation in Livland und Gottland. B.	59	62
Grey-Egerton, Ph.: Verwandtschaft von Platysomus. R.	51	761
— — Palichthyologisches. III. Ganoidei Heterocerci. R.	53	744
— — zwei neue Ctenacanthus-Arten aus Steinkohle. R.	55	255
— — Palichthyologische Notitzen. R.	55	861
— — Britische fossile Fische aus Jura und Kreide. R.	55	870
— — über Tetragonolepis und Dapedius. R.	56	754
— — mesolithische Fische in England. R.	58	237

	Jahrg.	Seite
Grey-Egerton, Ph.: Pleuracanthus, Diplodus und Xenacanthus sind einerlei. R.	1858	743
— — u. Miller: über Pterichthys und die Cephalaspiden. R.	51	493
Groningen, van, u. Oppel: Kiesel-Aluminit bei Stuttgart. R.	54	193
Gruner: Entstehung der Mangan-Erze in den Pyrenäen. R.	44	466
— — das Erz-führende Gebirge von Nontron und Thiviers. R.	54	718
— — die Hauptgänge im Zentral-Plateau Frankreichs. R.	58	705
Grünewaldt, v.: Versteinerungen des Schlesischen Zechstein-Gebirges. R.	53	125
— — die Versteinerungen-führenden Formationen des Urals. R.	59	231
Guarini, G., C. Palmieri u. A. Scacchi: l'Incendio Vesuviano del 1850 e 1855. R.	59	229
Gümbel, C. W.: geologische Untersuchungen in Bayern. B.	53	446
— — Gebirgs-Durchschnitt der linken Rheinthal-Seite bei Landau (Tf. 7). A.	53	524
— — geognostische Untersuchung Bayerns. B.	54	164
— — geognostische Untersuchungen im Bayern'schen Walde; krystallinische Schiefer; Kiesel-Mineralien; im Algäu: Flysch; in Vorarlberg und Tyrol alte Sediment-Gesteine, Verrucano, Pflanzen-Schiefer; Vils-Schichten; Wetzstein-Schichten im Ammergau; Hallstätter Schichten; Parallele mit Mitteldeutschland. B.	55	173
— — die in der Oberpfalz vorkommenden Mineralien. R.	55	704
— — der Grünten, eine geognostische Skizze, München 8°.	57	481
— — Vorkommen von Torf-Pechkohle (Dopplerit) im Dachelmoos bei Berchtesgaden. A.	58	278
— — Lagerstätte der Keuperlias-Pflanzen in Oberfranken; das Bonebed daselbst mit seinen fossilen Resten; die Thalassiten-Bank und ihre Schichten-Folge. B.	58	550
— — geognostische Verhältnisse der Bayern'schen Alpen und Donau-Ebene. R.	59	218
Gümbel, C. W. u. Fr. Sandberger: Tertiär-Gebirge am Nord-Rande der Ost-Alpen. R.	58	717
Gümbel, Th.: Einiges über den inneren Bau der Achat-Kugeln. A.	53	153
Guéranger: Schichten-Folge im Terrain Cénomanien bei Mans. R.	51	742
Gneymard, E.: Lagerstätte von Nickel im Isere-Dept. R.	56	554
— — Arten des Vorkommens von Platin in den Alpen. R.	56	441
Guiscardi: zerlegt Guarinit, eine neue Mineral-Art von Monte Somma. R.	58	826
Gutberlet, W. K. J.: Einschlüsse im Basalte des Kalvarienbergs bei Fulda. A.	53	658
— — Sphen im Trachyt der Rhön; Mesotyp und Hauyn daselbst; Pseudomorphosen nach Steinsalz. B.	53	680
— — über Psilomelan im Bunten Sandstein. A.	53	802
— — Vorkommen und Aufarbeitung des Edder-Goldes. A.	54	15
— — Wanderblock im Kalkstein des Waadtlandes. B.	54	36
— — Verbreitung und Ursprung der Phonolith-Trümmer im Ulster-Thale der Rhön; Hebung dieses Gebirges. B.	54	161
— — Geologisches aus Waldeck; Malachit, Kupfer-Lasur, Gold-Vorkommen daselbst. B.	54	672
— — Sphärosiderit und Bohnerz in basaltischen Gesteinen. A.	55	168
— — Permische Formation in Waldeck. B.	55	314
— — Braunstein-Grube zu Eimelrode. B.	55	317
— — die Zeitfolge der höheren Oxydation des Mangan- und Eisen-Oxydules und ihre geologische Bedeutung. A.	55	430
— — Phonolithe, Trachyte und Basalte der Rhön. B.	56	24
— — über die Abkunft des Goldes. A.	57	513
— — über den Unterschied zwischen scheinbaren und wirklichen Geschieben. A.	59	769

	Jahrg.	Seite
Gutberlet, W. K. J.: Phonolithe, Basalte und Trachyte im Kreise Hünfeld, Chur-Hessen. B.	1859	803
Guyot, A.: das erratische Becken des Rheines in der Schweitz. R.	50	863
Guyon: Erdbeben in der Provinz Algier i. J. 1851. R.	55	87

H.

Habel, Fr.: „Baden bei Wien, eine Skizze", Wien 1852, 8°.	52	728
Hänle, Chr. Fr. „Ursache der innern Erd-Wärme", Lahr 1851, 8°. R.	52	343
Hagen, H. A.: über Goldenberg's Insekten aus der Saarbrückener Steinkohle. R.	58	374
— — Ascalaphus proavus aus Braunkohle von Linz am Rhein. R.	59	115
— — zwei Libellen aus der Braunkohle von Sieblos in der Rhön.	59	115
Hagenow, Fr. v.: „Bryozoen der Mastrichter Kreide" Cassel 1851, 4°.	52	124
— — anstehendes Jura-Gebirge in Hinter-Pommern; Septarien-Thon bei Stettin. B.	53	347
Haidinger, W.: Braunkohle aus dem Urgen-Thale in Steyermark. B.	50	63
— — neues Vorkommen von Kupferkies. R.	50	214
— — Stauden-förmige Struktur und Form von Kalk-Massen. R.	50	224
— — Gediegen-Kupfer zu Recsk bei Erlau in Ungarn. R.	50	850
— — Bericht über den Dopplerit. R.	51	194
— — Linarit und Caledonit aus Rezbanya. R.	52	852
— — künstliche und gestrickte Krystallisationen von Silber. R.	53	703
— — Strontianit von Radoboj. R.	54	178
— — gestricktes Kupfer und Eisen durch Schmelzung erhalten. R.	54	187
— — Baryt-Krystalle aus der Militärbad-Quelle in Karlsbad. R.	54	683
— — Schau-Stuffen von Brauneisenstein mit Spatheisenstein-Kernen. R.	54	809
— — neue Fundorte von Pseudomorphosen nach Steinsalz. R.	56	845
— — merkwürdiges Vorkommen von Quarz. R.	57	73
— — Magneteisen, pseudomorph nach Glimmer. R.	57	172
— — die hohlen Geschiebe aus dem Leitha-Gebirge. R.	57	187
— — Kenngottit ein neues Mineral von Felsöbanya. R.	57	834
— — Opale von Vörösvagas in Ungarn. R.	58	213
— — Skorodit aus Eisenerz-Gruben Kärnthens. R.	59	196
— — Meteoreisen zu Orawitza 1858 am 15. Mai gefallen. R.	59	292
— — Basalt-Schlacken im Braunkohlen-Flötz im Kainach-Thale. R.	59	308
Haime, J.: Milnia ein neues Cidariden-Genus. R.	51	490
— — Bildung der Antipathes-Korallenstöcke. R.	51	512
— — über Bryozoen. R.	53	512
— — die fossilen Bryozoen der Jura-Formation Frankreichs. R.	55	632
— — Geologie des Eilandes Majorca, Balearen. R.	56	460
Haime, J. u. d'Archiac: geolog.-geograph. Verbreitung der Nummuliten. R.	54	457
Haime, J. u. Milne-Edwards: Übersicht des Korallen-Systems. R.	52	114
— — — — Untersuchungen über V: die Oculinidae. R.	52	248
— — — — Untersuchungen über VI: die Pseudoculinidae. R.	52	251
— — — — Untersuchungen über VII: die Turbinoliidae. R.	52	375
— — — — Polyparien: VII. Poritidae. R.	53	875
— — — — Polyparien VIII: Lithostrotion. R.	53	877
— — — — „the British fossil Corals", IV. Devonian-Formation. R.	54	497
— — — — British fossil Corals: V. Silurian. R.	57	104
Haines: Thier-Fährten im Millstone-grit der Grafschaft Clare. R.	52	989
Haldeman: über Atops und Triarthrus. R.	50	100
Hale, C. S.: Geologie Süd-Alabama's. R.	50	724
Hall, J.: Atops = Triarthrus = Calymene. R.	50	105
— — Fährten im Sandstein der Clinton-Gruppe New-Yorks. R.	50	512
— — Graptolithen, ihre geologische Dauer und Wichtigkeit. R.	50	640
— — Paläontologische Ergebnisse in Neu-York. R.	51	498

	Jahrg.	Seite
Hall, J.: neue fossile Korallen-Sippen in Neu-York. R.	1851	765
— — silurische Brachiopoden, insbesondre Leptäniden. R.	53	212
— — geologische Forschungen in Wisconsin. R.	53	609
— — Geologie und Paläontologie der Rocky Mountains.	53	613
— — Palaeontology of New-York, II. (Middle Silurian) 1852, 4°. R.	55	247
— — Fossil-Reste aus Emmons' Taconic System. R.	55	593
— — neue Versteinerungen aus der Steinkohlen-Formation. R. . .	57	862
— — über den Kohlen-Kalkstein im Mississippi-Thale. R.	58	97
— — über die Kreide-Schichten in den Vereinten Staaten. R . .	58	359
— — über die Sippe Archimedipora d'Orbigny's. R.	58	616
— — über die Sippe Graptolithus. R.	58	764
— — silurische und devonische Krinoideen und Cystideen von New-York. R.	59	235
— — „Contributions to the Palaeontology of New-York." R. . . .	59	755
Hall, J. u. Meek: neue Evertebraten der Kreide Nebraska's. R. . .	57	864
Hall, J. u. J. D. Whitney: „Geological Survey of Iowa", 1858. R. .	59	340
Hallmann: Temperatur der Quellen im Rheinischen Gebirge. R. . .	55	80
Hamilton, W. J.: Hopkins gegen Élie de Beaumont's Hebungs-Systeme. B.	53	323
Hancock, A.: Bemerkungen über gewisse Wurm-förmige Eindrücke in den Bergkalk-Bezirken Nord-Englands. R.	59	873
Harkness, R.: dreizehige Fährten im Buntsandsteine Cheshire's . R. .	51	512
— — Graptolithen in schwarzen Schiefern von Dumfrieshire. R. . .	53	636
— — neue Fährten im Buntsandsteine von Dumfrieshire. R. . . .	54	858
— — untersilurische Anthrazite, Graptolithen etc. in Schottland. R.	55	362
— — untersilurische Anthrazit-Schiefer Schottlands. R.	56	67
— — Treppen-förmiges Pflanzen-Zellgewebe in den devonischen Schichten. R.	56	605
— — Reste in den untersten Sediment-Gesteinen Süd-Schottlands. R.	57	239
— — Annulaten-Fährten in Millstone-grit Irlands. R.	57	753
Harkness, R. u. J. Blyth: Lignite von Giants-Causeway. R. . . .	56	732
Harper, L.: Ceratites Americanus n. sp. aus Kreide Alabamas. R. .	57	765
— — „Report on the Geology of Mississippi", Jackson 1857, 8°. R.	58	480
Harting, P.: „de Magt van het Kleine in onzen Ardbol", Utrecht 8°. R.	50	472
— — „de Bodem onder Amsterdam", Amsterdam 1852, 4°. R. . . .	53	376
— — der Boden unter Gorinchem. R.	54	195
— — de voorwereldlijke Scheppingen, Tiel 8°. R.	57	107
— — ein Diamant mit eingeschlossenen Krystallen. R.	59	192
Hartleben: das Vorkommen von Quecksilber in der Lüneburger Haide. A.	54	560
Hartmann: die Braunkohle von Brennberg bei Ödenburg. R. . . .	50	85
Hartung, G.: geologische Verhältnisse von Lanzarote u. Fuerta ventura. R.	58	836
Hasse, C.: über Bergnaphtha in Galizien. R.	59	624
Hassencamp, E.: die Muschelkalk-Formation im Rhön-Gebirge und ihre Versteinerungen. B.	52	942
— — Beiträge zur geognostischen Kenntniss der jüngeren Gebirgs-Glieder des Rhön-Gebirgs. A.	53	437
— — Braunkohlen-Bildung in der Rhön mit Folliculites Kaltennordheimensis, Binnen-Konchylien, Säugthieren, Fischen u. A.; Zerlegung eines Minerales von da; Apatit. B.	56	420
— — Beschreibung der Braunkohlen-Formation in der Röhn. R. .	58	711
— — Zusammenvorkommen von Augit und Hornblende in der Rhön.	59	297
— — relatives Alter der vulkanischen Gesteine im Rhön-Gebirge. R.	59	831
Hauch, A.: Lagerung des Steinsalzes in Galizien. R.	55	207
Hauer, Fr. v.: geologische Reichs-Anstalt in Wien. B.	50	194
— — über Russegger's Versteinerungen aus Ägypten und Syrien. R.	50	222
— — neue Cephalopoden von Hallstatt und Aussee. R.	50	250
— — Orbituliten-Kalk in den Ost-Alpen. R.	50	363

	Jahrg.	Seite
Hauer, Fr. v.: Gliederung des Alpenkalks in den Ost-Alpen. A. .	1850	584
— — Schichten-Gliederung in den Ostalpen und Karpathen. R. . .	50	731
— — Geologie des Nord-Abhanges der Ostalpen. R.	50	737
— — Eocän-Bildungen im Cillyer Kreise, nach Konchylien. R. . .	51	740
— — Elephanten-Schädel von Rzeszow in Galizien. R.	53	211
— — Alter der Österreichischen Tertiär-Bildungen. B.	53	330
— — Gliederung von Trias, Lias und Jura in den NO.-Alpen. R. .	54	455
— — heterophylle Ammoniten der Österreichischen Alpen. R. . .	54	759
— — Fossilien im Dolomite des M. Salvatore bei Lugano. R. . . .	55	479
— — unsymmetrische Ammoniten der Hierlatz-Schichten. R. . . .	55	487
— — Cephalopoden der Hallstätter Schichten. R.	55	502
— — Capricornier der Österreichischen Alpen. R.	55	625
— — Bemerkungen über die Schichten-Folge des Trias-Gebirges der Lombardei. R.	56	738
— — Cephalopoden aus dem Lias der NO.-Alpen. R.	56	747
— — geologische Verhältnisse in Österreich unter der Enns. R. . .	57	344
— — über Melling's Raibler-Versteinerungen. R.	57	618
— — zur Kenntniss der Versteinerungen der Raibler-Schichten. . R.	58	124
— — paläontologische Notitzen über triasische etc. Arten. R. . .	58	383
— — „Beiträge zur Paläontographie Österreichs", Wien I, 1. R. . .	58	504
— — die Eocän-Gebilde im Erzherzogthum Österreich und Salzburg. R.	59	843
— — Lias-Gebilde im nördlichen Ungarn. R	59	851
Hauer, K. v.: Analyse der Fahlerze von Poratsch in Ungarn. R. . .	53	478
— — über den veränderlichen Wasser-Gehalt einiger Mineralien. R.	54	686
— — Schwefelarsen in Braunkohle Steyermarks. R.	54	818
— — Bouteillenstein (Obsidian) von Moldawa in Böhmen. R. . . .	55	577
— — Analyse zweier Grünen Schiefer. R.	56	190
— — Bindemittel der Wiener Sandsteine. R.	56	201
— — Magnesit von Bruck in Steyermark. R.	56	436
— — zerlegt Uran-Pecherz von Przibram in Böhmen. R.	55	76
— — Eisenspath von Ruskberg im Banate. R.	57	719
— — sogenanntes Steinmark von Saska im Banate. R.	57	719
— — Steinkohlen von Gospié im Liccaner Bezirke. R.	58	78
— — Wasser vom See Palic im Banate. R.	58	79
— — zerlegt Dammerde von Gomba in Ungarn. R.	58	215
— — die heisse Schwefelquelle von Warasdin-Tepliz in Kroatien. R.	59	102
— — Analyse des Arsenikkieses. R.	59	293
Haughton, L.: zur arktischen Geologie. R.	59	221
— — zerlegt Saponit oder Seifenstein. R.	59	295
Haupt, Th.: geognostische Skizze der Erz-Formation in Toskana. R.	56	460
Haushalter, C. L.: fossile Thier-Reste in Algäuer Mollasse. R. . .	56	601
Hausmann: Arsenige Säure, Realgar und Auripigment. R.	50	694
— — Krystallisations-System des Karstenits; Homöomorphismus der Mineralien. R.	51	450
— — Triphan, wie Pyroxen krystallisirt, aus Massachusetts. B. . .	51	574
— — Krystallisations-System des Karstenits; Homöomorphismus. R.	52	217
— — Diopsid und Bleigelb als krystallinisches Hütten-Produkt. R. .	52	333
— — Tellur-Wismuth aus Brasilien. R.	52	698
— — Krystallisation und Struktur des Zinkoxyds. R.	52	703
— — über den Zirkon-Syenit. R.	52	712
— — der Granit des Harzes. R.	52	972
— — künstliche Krystalle von Magneteisen, Eisenchrysolith und Antimonnickel. R.	53	177
— — pseudomorpher Brauneisenstein von Bodenmais. R.	53	467
— — der Dolomit am Hainberg bei Göttingen. R.	54	478
— — Xanthosiderit ist dessen Gelbeisenstein. B.	54	568

	Jahrg.	Seite
Hausmann: Altdeutsche Axt unter Kalktuff gefunden. R.	1854	842
— — Form-Änderung starrer Körper durch Molekular-Bewegung. R.	55	688
— — über den faserigen Baryt um Göttingen. B.	57	414
— — Kalkschiefer in Basalt bei Göttingen. R.	57	834
— — Chloropal vom Meenser Steinberg bei Göttingen. R.	58	569
— — Erz-Lagerstätten von Rio-tinto in Spanien. R.	59	88
Hausmann u. Wöhler: Meteorstein-Fall bei Bremervörde im J. 1855. .	57	332
Hautefeuille: Quecksilber in Gediegen-Kupfer am Ober-See. R. . .	58	314
Haw, H.: analysirt Hydroborocalcit von Windsor in Neuschottland. R.	58	827
Hayden, T. V.: zur 2. Ausgabe der geologischen Karte von Nebraska und Kansas. R.	59	823
Hayden u. Meek: Gastropoden u. Cephalopoden in Kreide Nebraska's. R.	57	491
— — — — Acephalen und Gastropode in Kreide Nebraska's. R. .	57	492
— — — — tertiäre Gebirge und Fossil-Reste in Kreide Nebraska's. R.	57	493
— — — — permische Reste aus Kansas. R.	58	349
— — — — neue Schaaler-Sippen und Arten aus Nebraska. R. . .	58	376
— — — — Geologie des Nebraska-Territoriums. R.	58	493
— — — — Geologie und Fossil-Reste eines Theiles desselben. R.	58	495
— — — — neue Organismen-Arten aus der Steinkohle im Kansas-Thale. R.	59	869
Hayes, A.: chemische Verschiedenheit und Wirkung des Wassers von der Oberfläche und aus der Tiefe des Meeres. R	55	88
— — gediegen Eisen aus Liberia in Afrika. R.	58	69
Hébert, E.: Cyathula-Schicht des Pariser Beckens in Limburg gefunden. R.	50	860
— — über Leymerie's neuen Kreide-Typus. R.	51	731
— — Crag-Fossilien im Bosc d'Aubigny, Manche. B.	51	741
— — die unteren Tertiär-Schichten Frankreichs und Englands verglichen. R.	53	188
— — obre Kreide in Frankreich. R.	54	108
— — über Dumont's Système Heersien in Belgien. R.	54	368
— — Geologie des Pariser Beckens. R.	55	360
— — Plastischer Thon u. a. Tertiär-Schichten des Pariser Beckens. R.	55	580
— — ein Femur von Gastornis Parisiensis. R.	55	763
— — das Jura-Gebirge am West-Rande des Pariser Beckens. R. .	56	210
— — der Unterlias der Ardennen und die Gryphaea-Arten. R. . .	57	211
— — über den geologischen Bau der Französischen Ardennen. R. .	57	218
— — les mers anciennes dans les bassin de Paris, I, 1. R. . . .	57	465
— — pachyderme Säugthiere von Paris, I. Coryphodon. R. . . .	57	488
— — die Fossil-Reste in der Kreide von Meudon. R.	59	360
Hébert, E. u. E. Renevier: Versteinerungen des oberen Nummuliten-Gebirges. R.	55	474
Heckel, J.: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. R.	52	980
— — über das Wirbelsäulen-Ende der Ganoiden und Teleostier. R.	53	115
— — über Knorpelfische, Amia, Cyclurus und Notaeus. R. . . .	53	223
— — fossile Fische vom Libanon. R.	53	632
— — Sammlung eocäner Fische aus Italien. R.	55	379
— — Eintheilung der Pyknodonten und Beschreibung neuer. R. . .	55	482
— — neue Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. .	56	481
Heckel's u. Tenzl's Art versteinerte Skelette zu reinigen. R. . . .	51	380
Heddle, F.: Edingtonit-Analyse. R.	56	38
— — Galaktit ist Natrolith R.	57	324
— — Natrolith in Schottland. R.	57	328
— — sogenannter Davidsonit aus Aberdeen. R.	58	74
— — Uigit, ein neues Mineral aus Mandelstein von Skye.	58	823
— — der sogen. Galaktit ist Mesotyp. R.	59	623
Heddle, F. u. Dick: zerlegen sogen. Blei-Niere aus Cornwall. R. .	57	709

	Jahrg.	Seite
Heddle, F. u. R. P. Greg: Analyse und Synonyme des Pektoliths. R.	1858	471
Heer, Osw.: zur Geschichte der Insekten. A.	50	16
— — über die Anthrazit-Pflanzen der Alpen. A.	50	657
— — Fossile Reste und Alter des Tertiär-Gebirges in Croatien. R.	50	853, 854
— — die Lias-Insel des Aargau's. R.	52	983
— — Tertiär-Flora der Schweitz. R.	53	497
— — über die Rhynchoten der Tertiär-Zeit. R.	53	862
— — Insekten-Fauna von Öningen und Radoboj. R.	53	874
— — Arbeiten über Keuper-Insekten und die Tertiär-Flora der Schweitz. B.	54	320
— — Arbeit über Öningener Pflanzen und Insekten. B.	55	546
— — „Flora tertiaria Helvetiae, Winterthur in fol., I." 1855. R.	55	636
— — fossile Pflanzen von St. Jorge auf Madeira. R.	56	241
— — die fossilen Insekten der Provence. R.	56	502
— — „über die Wallnuss-Bäume" Trogen 1858, 8°.	58	749
— — Podogonium eine Cäsalpiniaceen-Sippe der Mollasse. R.	59	243
— — die Schieferkohle von Utznach und Dürnten. R.	59	346
— — „Flora tertiaria Helvetiae"; II. Apetala. R.	59	500
— — Tertiär-Flora von Vancouvers-Insel, Bellingham-Bay u. Island. R.	59	754
Heidepriem: Nephelin-Fels des Löbauer Berges. R.	51	591
— — Nephelin-Fels des Löbauer Berges. R.	52	485
Heintz: Perlglimmer (Margarit) vom Pfitsch-Thale in Tyrol. R.	57	331
— — ein dunkelgrünes Mineral, dessen Begleiter. R.	57	331
Heller, L.: neue fossile Stelleriden. R.	59	365
Helmersen, G. v.: Kreide-Gebirge am Aral-See. R.	50	737
— — die Halbinsel Mangyschlack. R.	51	468
— — Wärmeleitungs-Fähigkeit einiger Felsarten. R.	52	623
— — über Aulosteges und Strophalosia. R.	53	636
— — die devonische Zone von Smolensk bis Woronesch. R.	54	465
— — Emporsteigen der Ufer des Baltischen Meeres etc. R.	56	730
— — Zerstörung silurischer Kalke durch Brandung. R.	57	607
— — geologische Bemerkungen in Schweden und Norwegen. R.	58	703
— — geognostische Untersuchung der devonischen Schichten Mittel-Russlands zwischen Düna und Don, ausgeführt 1850. R.	59	845
Helmholtz: der Schmelzpunkt des Eises durch Druck veränderlich. R.	58	492
Hennessy, H.: Untersuchungen über physikalische Geologie, Thl. II. R.	50	858
— — Stetigkeit der Drehungs-Achse der Erde. R.	52	726
— — die Erd-Gestalt. R.	54	363
— — Beziehung zwischen Erdbildungs-Theorie und -Gestalt. R.	54	475
— — Physikalischer Bau der Erde. R.	57	84
— — Kräfte, die den Seespiegel in geologischen Zeiten verändern konnten. R.	59	627
Henry, O: Untersuchung des Frankoliths aus Devon. R.	51	590
— — zerlegt Mineral-Wasser von Cransac. R.	52	71
— — Zerlegung der weissen Blende von Neu-Jersey. R.	52	76
— — der sogenannte Franklinit ist Apatit. R.	52	703
— — Kobalt und Nickel in Eisen-haltigen Wassern. R.	55	467
Henry, O. u. Boutron-Charlard: Analyse des Todtenmeer-Wassers. R.	53	63
— — — — zerlegen Jordan-Wasser. R.	53	187
Henry u. Mazade: Titan-, Zirkon-, Kobalt- und Nickel-Oxyd in Mineral-Wasser. R.	56	345
Hensel, R.: Arctomys primigenius, Myoxus-, Cricetus-, Putorius-Reste in der Breslauer Sammlung. B.	52	463
— — diluviale Insektenfresser und Nagethiere. R.	56	489
— — Beiträge zur Kenntniss fossiler Säugthiere, II. R.	56	875
— — Beiträge zur Kenntniss fossiler Säugthiere, III. Nager. R.	57	870

	Jahrg.	Seite
Herapath, Th.: zerlegt die Mineral-Quelle bei Bristol. R.	1852	704
Herapath, W. u. Th.: schwefelsaurer Strontian in Brunnen Bristols. R.	53	175
Herbst, G.: Mammont und Chara-Reste beisammen, bei Weimar. B.	53	322
— — „Gold-Bergbau bei Weida in Sachsen“ 1854, 8°. R. . . .	54	368
— — Folliculites Kaltennordheimensis im Rheingau; Aragonit bei Ilmenau. B	56	167
— — Braunkohlen-Gebirge mit Folliculites Kaltennordheimensis und Aceratherium. B.	57	58
Herland, J. F.: Geologie von Nossi-Bé bei Madagaskar. R.	57	348
Hermann, R.: Chrysolith im Talkschiefer des Urals. R.	50	59
— — Vorkommen von Gillingit in Finnland. R.	50	64
— — zerlegt Talk von Slatoust. R.	50	69
— — Stilbit in Schrift-Granit des Ilmen-Gebirges. R.	50	336
— — Identität von Troostit und Willemit. R.	50	342
— — Nordamerikanische Manganoxydul-Hydrate. R.	50	447
— — gleiche Krystall-Formen bei Villarsit und Chrysolith. R. . .	50	452
— — krystallinischer Serpentin in Form des Chrysoliths. R. . . .	50	458
— — Identität von Hydrotalkit und Völcknerit. R.	50	613
— — Vorkommen von Brookeit in Goldseifen am Ural. R. . . .	50	703
— — Zusammensetzung der natürlichen Eisen-Silikate. R.	50	705
— — Zusammensetzung des Specksteines. R.	50	707
— — die natürlichen Talkerde-Silikate. R.	51	203
— — Feldspath-Mineralien: Lepolith, Linseit, Hyposklerit; Heteromerie der Feldspathe. R.	51	441
— — Jeffersonit und Augit sind identisch. R.	51	447
— — Pennit, ein neues Mineral. R.	51	448
— — neue Zerlegung des Äschynits. R.	52	75
— — Zerlegung von Yttro-Ilmenit und Samarskit R.	52	75
— — Zusammensetzung der Pyrochlore. R.	52	209
— — Untersuchung von Tantal und Columbit. R.	52	215
— — über Glimmer und Cordierit. R.	52	848
— — Zusammensetzung der Turmaline. R.	52	852
— — Zusammensetzung der Tantal-Erze. R.	52	861
— — Identität von Williamsit und Serpentin R.	53	699
— — Malakon bei Miask im Ilmen-Gebirge. R.	54	178
— — Halbkalkdiallag von Achmatowsk. R.	55	575
— — zerlegt Skapolithe. R.	54	440
— — zerlegt das Wasser der Marsan-Quelle. R.	58	311
— — Euklas vom Ural. R.	58	685
— — Zerlegung des Thermophyllit's aus Finnland. R.	59	82
— — Auerbachit ein neues Russisches Mineral R.	59	189
— — zerlegt Trichalzit aus Russland. R.	59	194
— — Wachsen der Steine und künstliche Mineral-Bildung. R. . .	59	446
— — Untersuchungen über Wismuth-Erze u. Wismuth-Oxysulphuret. R.	59	733
— — Graphit aus der Kirgisen-Steppe. R.	59	815
Herrmannsen, A. N.: Indicis generum malacozoorum Supplementa“. R.	53	218
Herter, P.: Geologie der Gegend von Cartagena in Spanien. R. . .	56	203
— — Erz-Vorkommen in den krystallinischen Schiefern des Riesengebirgs. R.	58	831
Hessenberg, F.: über das Zwillings-Gesetz der von G. Rose bekannt gemachten Quarz-Vierlinge von Reichenstein in Schlesien. A. .	54	306
Heusser, Ch.: Adular im Dolomit des Binnenthals. R.	57	712
Heyden, v.: tödtliches Gas aus Erd-Löchern bei Hungen. R. . . .	53	743
— — Insekten in Braunkohle von Salzhausen und Westerburg. R. .	56	757
— — Insekten aus der Braunkohle von Sieblos in der Rhön. R. .	59	114
Hingenau, v.: „geologische Verhältnisse von Mähren und Schlesien“. R.	52	624

	Jahrg.	Seite
Hingenau, v.: Geologie von Mähren und Österreichisch-Schlesien. R.	1854	477
— — geologische Verhältnisse von Nagyag in Siebenbürgen. R. . .	57	187
— — Gesteins-Bildungen um Luhatschowitz in Mähren. R. . . .	57	448
Hislop, S.: Tertiär-Schichten mit Trapp-Gesteinen verbunden in Ostindien. R.	59	749
Hitchcock, E.: Braunkohlen-Lager von Blandon in Vermont; Alter der Hämatit-Lager in den Vereinten Staaten. R.	54	196
— — Fährten in Alluvial-Thon. R.	55	863
— — Fährten und Knochen im Connecticut-Sandstein. R.	56	125
— — neue fossile Fische und Fährten. R.	56	237
— — neue Muschel-Art im Connecticut-river-Sandstein. R. . . .	57	237
— — „Illustrations of surface Geology", New-York. 1857. R. . .	58	81
— — „Ichnology of New-England", 1859? R.	59	508
— — „Ichnology of New-England", Boston 1858, 4°. R.	59	866
Hochstetter, F.: geognostische Studien im Böhmer Walde. R. . .	56	72
— — das Falkenau-Ellbogner Braunkohlen-Becken in Böhmen. R. .	56	584
— — das Duppauer Basalt-Gebirge in Böhmen. R.	56	705
— — die Karlsbader Thermen liegen auf zwei Gebirgs-Spalten. R.	56	731
— — Aragonit in Basalt-Tuff zu Maschau in Böhmen. R.	57	176
— — Verhältnisse des Duppauer Basalt-Gebirges in Böhmen. R. .	57	185
— — geologische Verhältnisse von Karlsbad. R.	58	325
— — geologische Verhältnisse um Marienbad in Böhmen. R. . . .	58	341
— — geologische Untersuchungen in Böhmen. R.	58	473
Höfer, F.: Ursachen der Erdbeben R.	56	573
Hoffmann, Herm.: Pflanzen-Verbreitung und Pflanzen-Wanderung. R.	53	218
Hofmann, E.: Californisches Gold. R.	50	336
— — Verhältnisse im nördlichen Verlaufe des Urals. R.	51	610
Hofmann, F.: Kupfer in bituminösen Schiefern in der Militär-Grenze. R.	58	842
Hohenegger, L.: geologische Karte des Kreises Teschen. R. . . .	57	351
— — Versteinerungen des Adnether-Schichten in den Karpathen. R.	58	105
Hollard, H.: die Ganoiden und die Verwandtschaft der Lophobranchier. R.	53	240
Holmberg, H. J.: geognostische Bemerkungen aus Ost-Finnland. R. .	59	310
Holmes, Fr. S.: Reste von Haus- und von ausgestorbenen Säugthier-Arten beisammen in postpliocänen Schichten Carolina's. R. .	59	496
Holzmann: Mittheilungen über die geognostischen Verhältnisse der Galmei-Lagerstätte bei Wiesloch. A.	52	907
d'Hombres-Firmas: Knochen-Höhle bei Alais. R.	50	90
Hoog, J.: Geologie des Berges Sinai und seiner Umgegend. R. . .	54	724
Hooker, J. D.: Volkmannia Morrisi H. ist eine neue Art. R. . . .	54	768
— — Struktur und Verwandtschaft von Trigonocarpum. R. . . .	55	860
— — eocäner Carpolithes ovulum von Lewisham. R.	56	235
— — Folliculites minutulus aus Kohle von Bovey-Tracey. R. . . .	56	235
Hopkins, W.: über Diluvial-Erscheinungen. R.	52	717
— — die äussre Temperatur der Erde u. andrer Planeten. R. . .	57	188
Horner: Alter des Menschen-Geschlechtes in Ägypten. R.	58	510
Hörnes, M.: Schichten-Folge des Tegel-Gebirges im Wiener Becken. R.	51	360
— — „fossile Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien". I. R. .	52	112
— — „fossile Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien". II. R. .	52	630
— — „fossile Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien". III. R. .	52	978
— — „tertiäre Mollusken von Wien". IV. 1852. R.	53	96
— — Mollusken des Wiener Tertiär-Beckens. V. R.	53	507
— — „die Mollusken des Wiener Tertiär-Beckens". VI. R. . . .	53	753
— — kein Eocän in Polen; Grenze zwischen Eocän, Miocän und Pliocän. B.	53	806
— — die Eocän-Formation in Österreich. B.	54	572
— — die fossilen Mollusken im Wiener Tertiär-Becken, VII, VIII. R.	54	760

	Jahrg.	Seite
Hörnes, M.: Gastropoden und Acephalen der Hallstätter Schichten. R.	1855	500
— — Mollusken des Wiener Tertiär-Beckens, IX. R.	55	768
— — einige Gastropoden aus den Ost-Alpen. R.	56	384
— — die tertiären Mollusken von Wien, X. R.	56	750
— — Gastropoden aus der Trias der Alpen. R.	56	757
— — subfossile Seethier-Reste am Isthmus von Korinth. R.	57	183
— — Meteoreisen-Fall bei Ohaba in Siebenbürgen. R.	59	79
— — Meteorstein-Fall zu Kaba bei Debreczin, 1857. R.	59	192
Horsford, E. N.: Erhärtung der Kalksteine in den Korallen-Riffen von Florida. R.	54	226
Howard, T. S.: plötzlicher und anhaltender Gas-Ausbruch in Stafford. R.	51	464
Howse, R.: permische Versteinerungen in Durham u. Northumberland. R.	57	636
Hruschauer, Fr.: zerlegt die Mineral-Quelle von Kostreinitz in Untersteier. R.	50	345
Hubbard: kolossale Beryll-Krystalle. R.	54	68
Huene, v.: Psilomelan im Trachyt des Siebengebirges. R.	54	593
— — Galmei, Blende, Bleierz, Eisenkies, Braunkohle bei Gladbach. R.	54	827
Hugard: krystallographische Studien an schwefelsaurem Strontian. R.	51	708
— — der Dolomit des Binnenthales. R.	58	591
Humboldt, A. v.: Kälte-Grade, worin Löwen und Tiger gedeihen. R.	55	624
Hunt, T. St.: Untersuchung verschiedener Serpentine. R.	54	344
— — Zusammensetzung u. Metamorphose einiger Sediment-Gesteine. R.	54	707
— — über Algerit. R.	55	444
— — Zirkon in Canada. R.	56	192
— — Ergänzungen über Wilsonit. R.	57	67
— — Analyse verschiedener Feldspathe. R.	57	437
— — Analysen von Andesin. R.	58	565
— — die Serpentine Canadas und ihre Begleiter. R.	58	846
— — Fragen der chemischen Gebirgskunde über Feldspathe etc. R.	58	855
— — ein dem Nickel-haltigen Gymnit nahe-stehendes Mineral. R.	59	818
— — Hypersthen aus einem Feldspath-Gesteine bei Quebek R.	59	819
Hunter: Lazulith in der Grafschaft Lincoln. R.	54	345
— — Diamanten in Nord-Carolina. R.	54	345
— — analysirt Arsenikkies von Andreasberg. R.	54	345
— — Korund in Nord-Carolina. R.	54	450
Huxley, Th. H.: über die geologische Entwickelung der Thier-Organisation. R.	55	762
— — über die Verwandtschaft von Himantopterus Salt. R.	56	612
— — Pygocephalus, ein Kruster aus der Steinkohlen-Formation. R.	58	115
— — Plesiosaurus Etheridgei n. sp. von Street. R.	58	232
— — über Cephalaspis und Pteraspis. R.	58	763
— — Rhamphorhynchus Bucklandi aus Stonesfield-Schiefern. R.	59	494
— — tertiäre Vogel- und Wal-Art aus Neuseeland. R.	59	495
— — Dicynodon Murrayi n. sp. aus Süd-Afrika. R.	59	495
— — Reptilien-Reste aus Süd-Afrika und Australien. R.	59	496
— — Haut-Panzer des Crocodilus Hastingsiae. R.	59	757
— — Stagonolepis Robertsoni Ag. aus dem Elgin-Sandsteine und neuentdeckte Fährten im Sandsteine von Cummingstone. R.	59	875
Huyot, E.: geologische Verhältnisse von Idria in Kärnthen. R.	56	465
Huyssen: Ursache schlagender Wetter im Wälderthon-Gebirge Mindens. R.	55	598
— — Sool-Quellen im Münster'schen Gebirgs-Becken. R.	55	733
— — die Sool-Quellen im Westphälischen Kreide-Gebirge. R.	56	711
Huzeau, J. C.: Richtung und Höhe der Gebirgs-Hebungen in Belgien. R.	57	470

I, J.

	Jahrg.	Seite
Jäckel, F. W.: um Liegnitz vorkommende Mineralien. R. . . .	1856	561
— — die Basalte Nieder-Schlesiens. R.	59	830
Jackson, Ch. T.: Zerlegung von Vermikulit von Milbury, Mass. R. .	52	852
— — Eupyrchroit ein neues Mineral. R.	53	698
— — Geologisches aus Nord-Carolina, Georgia, Tennessee. R. . . .	55	843
— — Erz-Vorkommnisse in den Vereinten Staaten. R.	55	846
— — zerlegt Allophan von Polk in Tennessee. R.	57	176
— — Analyse des Allophan's aus Tennessee. R.	58	471
Jäger, G.: Pygopterus lucius = Archegosaurus Decheni. R. . . .	50	380
— — fossile Säugthiere in Württemberg. R.	51	501
— — fossile Säugthiere des Donau-Thales u. der Schwäbischen Alp. R.	53	377
— — Ichthyosaurus longirostris, n. sp. aus Württemberg. R. . . .	57	106
Jardine, W.: Thier-Fährten im Bunten Sandsteine von Corncockle. R.	53	753
Jean-Jean u. M. de Serres: Knochen-Breccien und -Höhlen bei Montpellier. R.	51	759
Jeffreys u. J. E. Gray: über die Schnecken-Sippe Scissurella. R. .	57	254
Jeitteles, L. H.: die letzten Erdbeben in den Karpathen und Sudeten. B.	58	546
— — nordische Geschiebe um Troppau; Erdbeben in den Karpathen und Sudeten; der vulkanische Köhlerberg bei Freudenthal. B.	58	809
— — Vorkommen vulkanischer Gesteine bei Troppau. R.	59	201
— — nordische Geschiebe um Troppau. R.	59	307
Jenzsch, G.: Amygdalophyr, ein Felsit-Gestein mit Weissigit, einem neuen Minerale in den Blasenräumen. A.	53	385
— — Vorkommen des Talkspaths, Carbonites hystaticus, als Ausfüllung eines Blasen-Raumes in Melaphyr-Mandelstein bei Zwickau. A.	53	535
— — Nachträge zur Abhandlung über den Amygdalophyr. A. . . .	54	401
— — Polyhalit von Vic im Meurthe-Dpt. R.	55	702
— — dritter Nachtrag zur Abhandlung über den Amygdalophyr. A.	55	798
— — Fluor in Flussspath und Aragonit. R.	56	44
— — Lithion-haltiger Feldspath. R.	56	440
— — Herz-förmige Quarz-Zwillingskrystalle. R.	56	555
— — Zusammensetzung Thon-haltiger Kalk-Silikate. R.	56	842
— — über Pechstein-Bildung R.	57	183
— — Zirkon-Tantalit von Limoges, Haute-Vienne. R.	57	332
— — mikroskopisch-chemische Untersuchung des „Melaphyrs von Neurode". R.	57	435
— — zur Kenntniss der Phonolithe im Böhmischen Mittelgebirge. R.	57	445
— — Blasenräume und deren Bildung in den Trachyten Böhmens. R.	58	220
— — Lithologie die Basis der rationellen Geologie. A.	58	539
— — über den Sanidinquarz-Porphyr von Zwickau in Sachsen, den sogen. Pechstein, Hornstein-Porphyr, Thonstein-Porphyr, Felsit-Porphyr der Bergleute. A.	58	651
— — krystallisirte Kieselsäure ist dimorph; eine Form derselben, Vestan, charakterisirt die Melaphyre. R.	59	816
Igelström, J.: Stratopeit, ein neues Mineral im Dolomit Schwedens. R.	53	61
— — Paysbergit, ein neues Mineral Schwedens. R.	53	183
— — Svanbergit ein neues Schwedisches Mineral. R.	55	564
— — Lazulith aus Schweden. R.	55	825
— — seltene Schwedische Mineralien. R.	55	840
Ihle: Gediegen-Blei; künstliche Krystalle auf einer Hütte bei Freiberg. R.	59	191
Ilimoff: Zerlegung des Wolkonskoits von Okhansk. R.	50	450
Illing, B.: Magnesia-Glimmer von Haindorf in Schlesien. R. . . .	56	348
— — Arsenikal-Kies von Andreasberg im Harz. R.	56	446
Jochheim, Ph.: „die Mineralquellen d. Grossherzogth. Hessen", Erlang. 8°. R.	58	696

	Jahrg.	Seite
Johnston: Ursprung der sogen. Faulerde in Derbyshire. R. . . .	1854	343
— — Entstehung von Magnesia-Kalk. R.	54	710
Jokely, J.: geologische Untersuchungen im Egerer Kreise in Böhmen. R.	56	708
— — Erz-Lagerstätten im südlichen Böhmen. R.	56	717
— — das Egerer und Falkenauer Tertiär-Becken Böhmens. R. . .	57	723
— — geologische Übersicht des Leitmeritzer Erzgebirges. R. . . .	58	844
— — die Erz-Lagerstätten im Böhmischen Erz- und Fichtel-Gebirge. A.	59	96
— — Nordwestliche Ausläufer des Riesengebirgs in Böhmen. R. .	59	457
— — Quader-Sandstein und -Mergel um Dauba und Niemes. R. .	59	743
Joly, N. u. A. Lavocat: fünfzehiger Typus der Säugthiere. R. . .	55	761
Jones, T. R.: Pleistocäne Entomostraca in England. R.	53	768
— — Entomostraca of the Cretaceons Formation, 1849. R. . . .	55	108
— — ober-silurische Beyrichia-Arten. R.	55	876
— — über Estheria minuta in der Trias Englands. R.	57	117
— — Monograph of the tertiary Entomostraca of England. R. . .	57	503
— — paläolithische zweiklappige Entomostraca, III. Leperditia. R. .	57	745
— — paläolithische zweiklappige Entomostraca Nordamerikas. R. .	58	756
— — paläolithische zweiklappige Entomostraca aus Canada. R. . .	59	636
Jordan, L. A.: zerlegt Smektit von Cilly in Untersteyermark. R. . .	50	691
Jordan, H. u. H. v. Meyer: die Kruster der Steinkohlen-Formation von Saarbrück. R.	54	500
Joy, C. A.: zerlegt Meteoreisen von Cosbyscreek, Tenn. R.	55	563
Isbister, A. K.: Geologie des arktischen Amerikas. R	56	353
Juckes, J. B.: Lagerung des neuen rothen Sandsteins in Staffordshire. R.	51	475
Jugler: die sogen. Thier-Fährten am Isterberge (Tf. 2—4). A. . .	53	150
— — „die geognostischen Verhältnisse des Königreichs Hannover". 1835. R	56	449
Junghuhn, Fr.: Java's Gestalt, Pflanzen-Decke und innerer Bau. R. .	54	95
— — das neptunische Gebirge auf Java. R.	55	601
— — Boden-Hebung und Hügel-Bildung auf Java. R.	56	68

K.

Kade, G.: Übersicht der ober-tertiären Versteinerungen im Sande des Schanzenbergs bei Meseritz. B.	52	460
— — „die losen Versteinerungen im Schanzenberg bei Meseritz". R.	53	607
— — über Geschiebe der Norddeutschen Ebene. B	58	451
— — Fisch-Reste in einem devonischen Diluvial-Block. R. . . .	58	508
— — Bildung von Lituus perfectus. R.	59	861
Kane: versteinerter Moschus-Ochse im hohen Norden Amerika's. R. .	58	109
Käppel, Ph. M.: Zerlegung eines Marmors von Carrara. R.	53	694
Karstedt: zerlegt Speiskobalt von Schneeberg. R.	55	70
Karsten, C.: Zerlegung des Asphaltes aus Dalmatien. R.	50	60
— — Feuer-Meteore; Meteor-Fall bei Thorn in früherer Zeit. R. .	53	844
Karsten, H.: Geologie der Umgebung von Maracaybo und der N.-Küste Granadas. R.	54	716
— — die Nord-Küste Neu-Granada's; die Vulkane von Turbaco und Zamba. R.	55	93
— — Pläner in Mecklenburg. R.	55	727
— — geognostische Verhältnisse der nördlichen Cordilleren Südamerika's, der Orinoko- und Amazonas-Ebenen. R.	58	859
Kastendyck, W.: Wiesenerze im Kreise Tecklenburg in Hannover. B.	52	590
Kaup, J. J.: „zur näheren Kenntniss fossiler Säugthiere; I. Nashorne". R.	54	757
— — Urweltliche Säugthiere; II. Halitherium, Darmst. 1855. R. .	55	492
— — ein vollständiger Halitherium-Gaumen mit Zähnen, 1. Tfl. A.	56	19
— — Arbeit über die Sippe Mastodon. B.	57	57

	Jahrg.	Seite
Kaup, J. J.: „über Mastodon“, Darmst. 1857, 4°. R.	1857	485
— — Halitherium besitzt einen rudimentären Femur (m. 1 Tfl.). A.	58	532
— — der vierte Finger des Aceratherium incisivum (Tfl.). A.	59	163
— — über Machaerodus cultridens. A.	59	270
Kayser, W.: Braunkohlen-Vorkommen bei Osterode. R.	54	210
Keferstein, W.: Zahn-Bildung bei Rhinoceros Schleiermacheri. B.	57	315
— — devonische Trigoniaceen und Carditaceen. R.	57	627
Kehlberg, P. A.: Erdbeben in Sselenginsk R.	59	198
Keibel, P : Hypersthen-Fels von Mägdesprung am Harze. R.	58	690
— — zerlegt Gabbro vom Radau-Thale im Harze. R.	58	827
— — Diorit von der östlichen Granit-Grenze des Brockens. R.	59	445
Keiser u. F. A. Genth: Analyse verschiedener Allanite. R.	58	575
Kenngott, G. A.: „mineralogische Untersuchungen“, II. Heft, 1850. R.	50	338
— — Gemengtheile eines Granites von Pressburg. R.	52	495
— — Karpholith von Schlackenwald. R.	53	62
— — Abrazit, Berzelit, Gismondit, Zeagonit. R.	53	183
— — Krystallisation des Danaits. R.	53	459
— — Krystallisation des Zinkenits. R.	53	459
— — Zusammenvorkommen zweier Goldkrystall-Typen. R.	53	460
— — Kryptolith-ähnliches Vorkommen in Apatit-Krystallen. R.	53	465
— — merkwürdige Krystallisation des Pyrargyrits. R.	53	466
— — Zusammenvorkommen von Pyrrhotin und Pyrargyrit zu Joachimsthal. R.	53	595
— — Oligoklas; Sonnenstein; interponirte Krystalle. R.	53	600
— — Liebenerit. R.	53	602
— — Arseniksilber von Andreasberg am Harze. R.	53	694
— — Diamant-Einschluss in Diamant. R.	53	710
— — über Chalilith aus Irland. R.	53	711
— — gekrümmte Flächen an Honigstein-Krystallen. R.	53	837
— — Eigenschwere des Flussspathes. R.	54	72
— — Poonalith von Poonah in Ostindien. R.	54	78
— — Harringtonit aus Antrim in Irland. R.	54	176
— — Antrimolith aus Antrim in Irland. R.	54	182
— — Gewichts-Bestimmung an Aragon-Krystallen. R	54	189
— — Mineralien in krystallisirtem Quarz eingeschlossen. R.	54	189
— — Zerstörung der Flussspath-Farben durch Glühung. R.	54	192
— — Barytschwefel-Karbonat ist keine Pseudomorphose. R.	54	347
— — eigenthümliches Quarz-Vorkommen in Ägypten. R.	54	445
— — Brevigit und sein Verhältniss zum Natrolith. R.	54	445
— — Anatas in krystallisirtem Quarz. R.	54	447
— — Bicalcareocarbonate of Barytes. R.	54	448
— — Chalkotrichit von Cuprit verschieden. R.	54	448
— — Jeffersonit aus Neu-Jersey. R.	54	604
— — Beckit ist keine selbstständige Mineral-Species. R.	54	815
— — Krystall-Formen des Bromits von Blasteros in Mexiko. R.	54	816
— — Quarz mit Einschlüssen von krystallisirtem Gold. R.	54	818
— — zur Charakteristik des Gypses. R.	54	818
— — untersucht den Baralit von Baralon, Côte d'or. R.	54	822
— — Felsöbanyit identisch mit Hydrargillit. R.	54	823
— — Krystall-Form des Kieselwismuths von Schneeberg. R.	54	826
— — Ursache der rothen Färbung des Cancrinits. R.	55	73
— — Vorkommen von Karstenit mit Steinsalz. R.	55	75
— — Krystall-Gestalten des Matlockit's. R.	55	198
— — Gestörte Krystall-Bildung des Quarzes. R.	55	201
— — Mischungs-Formel für den Sylvanit. R.	55	347
— — die Eigenschaften des Covellins. R.	55	349

	Jahrg.	Seite
Kenngott, A.: Berthierit ein mechanisches Gemenge. R. . . .	1855	450
— — Eisen-Kobaltkies von Modum in Norwegen. R.	55	561
— — neues Mineral? aus Baveno. R.	55	561
— — Analyse von Karpholith. R.	55	563
— — über Breithaupt's Ostranit. R.	55	563
— — Krystall-Form des Scheererits von Uznach. R.	55	564
— — Funkit ist eine Augit-Abänderung. R.	55	569
— — Boltonit eine selbstständige Spezies. R.	55	571
— — besondre Varietät des Flussspathes. R.	55	574
— — über Sassolin. R.	55	700
— — Zusammenvorkommen von Aragon und Kalkspath. R. . . .	55	706
— — Krystall-Gestalten des Graphits. R.	55	825
— — Hudsonit ist keine Abänderung des Augits. R.	55	828
— — Nordenskiöldit eine Abänderung des Grammatits. R.	55	831
— — Unghwarit eine selbstständige Spezies. R.	55	832
— — Krystall-Gestalt des Beudantits von Horhausen, Nassau. R. .	55	839
— — über Childrenit. R.	56	35
— — Farben-Vertheilung an einem Flussspathe. R.	56	39
— — besondre Krystall-Bildung des Quarzes. R.	56	39
— — Couzeranit der Pyrenäen begreift zwei Arten. R.	56	46
— — Diopsid aus Tyrol. R.	56	48
— — Junkerit eine Abänderung aus Siderit. R.	56	49
— — Heteromerit nur eine Abänderung von Idokras. R.	56	180
— — Krystallisation des Bamlit's R.	56	183
— — Analyse des Funkit's. R.	56	186
— — Idokras in Opal. R.	56	187
— — gleichzeitig gebildete Pyrit- und Markasit-Krystalle. R. . .	56	188
— — Bleiglanz in Opal von Bleistadt in Böhmen R.	56	189
— — Mispickel pseudomorph nach Pyrrhotin. R.	56	189
— — Biotit aus Nord-Amerika. R.	56	192
— — Feuolith aus Island ist Pechstein. R.	56	193
— — Ehlit von Linz am Rhein. R.	56	195
— — Harringtonit von Antrim. R.	56	197
— — Phlogopit aus Neu-York. R.	56	346
— — Baltimorit aus Texas und Pennsylvanien. R.	56	347
— — Krystall-Form des Chlorophyllits. R.	56	348
— — Akanthit eine neue Art der Silberglanze. R.	56	434
— — Idokras im Thonschiefer von Fahlun in Schweden. R. . . .	56	435
— — Krystall-Gestalten des Millerit's. R.	56	438
— — Galaktit eine selbstständige Spezies. R.	56	443
— — Plumbokalzit aus Schottland. R.	56	443
— — Leuchtenbergit von Slatoust im Ural. R.	56	560
— — Thonerde-Gehalt des Augits. R.	56	563
— — ein neues Mineral von Felsöbanya in Ungarn. R.	56	566
— — Ficinit von Bodenmays wohl eine eigene Spezies. R. . . .	56	686
— — Krystallisation des Tellursilbers. R.	56	689
— — das Crucilith genannte Mineral von Dublin. R.	56	693
— — eigenthümliche Krystall-Gestalt des Flussspathes. R.	56	841
— — Nachträgliches über den Plagionit. R.	57	69
— — Kalzit als Einschluss in Pleonast. R.	57	69
— — Piauzit von Chum bei Tüffer in Steyermark. R.	57	163
— — weitre Bemerkungen über den Chalilith. R.	57	167
— — Krystall-Bildung von Pyromorphit vor dem Löthrohre. R. . .	57	171
— — Beschaffenheit des Tombazit's aus dem Voigtlande. R. . . .	57	175
— — Krystall-Form des Millerits von Saarbrück. R.	57	331
— — Eustatit, eine neue Art Augitspath. R.	57	441

	Jahrg.	Seite
Kenngott, A.: Pseudophit eine neue Art Serpentin-Steatit. R. . .	1857	437
— — Hartit von Rosenthal in Steyermark. R.	57	578
— — ein mit Felsöbanyit verwechseltes Mineral. R.	57	711
— — Serpentin-ähnliche Pseudomorphose von Diopsid. R.	57	716
— — Krystall-Verbindung bei Brasilischem Turmalin. R.	57	832
— — Pyrit-Krystalle in Quarz. R.	57	838
— — das Tyrit genannte Mineral. R.	59	305
Keyserling, v. u. v. Krusenstern: Geologie der Petschora-Gegenden. R.	50	728
Keyserling, v.: Beobachtungen an Nummuliten. R.	51	379
— — über die Aufeinanderfolge der Organismen. R.	54	768
— — geologische und paläontologische Bemerkungen zu Schrenk's Reisen. R.	57	373
Khreschnatitzki: Analyse des Cimolits von Alexandrowsk im Ekatherinoslaw'schen Gouvern. R.	50	59
Kjerulf, Th.: chemisch-geognostische Untersuchungen über das Christiania-Territorium. A.	54	299
— — Zinnerz-Pseudomorphosen nach Feldspath in Cornwall. R. . .	54	344
— — „das Christiania-Silurbecken chemisch-geognostisch". R. . .	55	467
— — zerlegt Cerit von Riddarhyttan in Schweden. R.	55	705
— — Kali-Glimmer nach Feldspath in Hirschberger Granit. R. . .	56	38
— — Quarz-führender Trachyt aus Island. R.	56	350
— — vulkanische Bomben aus der Eifel. R.	56	351
— — analysirt Löss von Heisterbach im Siebengebirge. R. . . .	56	552
— — Glimmer vom Vesuv. R.	57	435
— — Umwandlung des Glimmers in Augit. R.	57	440
— — zerlegt Granat aus Glimmerschiefer im Banate. R.	58	470
Kimball, J.: Pflanzen aus der Kohlen-Formation von Pennsylvanien und Ohio. A.	58	400
King, B.: Gold-Mengen in Californien gefunden. R.	51	720
King, Wm.: einige Korallen-Familien und -Genera. R.	51	488
— — „a Monograph of Permian Fossils of England", London 1848. R.	54	742
— — Anthracosia ist eine Unioniden-Sippe. R.	56	227
— — über Pleurodictyum problematicum. II. R.	56	504
— — permische Palliobranchiaten. R.	57	381
Kiprijanoff, V.: Fische im Kursk'schen Eisen-Sandsteine. R. . . .	55	622
— — zweiter Beitrag über Hybodus Eichwaldi. R.	57	383
— — Fisch-Reste im Kursker Eisensandstein. R.	56	758
— — diluviale Wirbelthiere von Dniepr und Wolga. R.	56	111
— — Fisch-Reste im Kursk'schen Eisen-Sandstein. R.	59	364
Kireewsky, E.: Knollen kohlensauren Kalkes in den Sandsteppen Asiens. R.	58	212
Kirkby, J. W.: permische Reste von Durham. R.	58	745
— — permische Chitoniden aus Durham. R.	59	510
— — permische Entomostraca aus Durham. R.	59	761
Klauer: krystallisirter Speiskobalt von Riechelsdorf in Chur-Hessen. R.	55	71
Klein: Konchylien der Süsswasser-Formationen Württembergs. R. .	52	637
— — Konchylien der Süsswasser-Formation Württembergs. R. . .	54	248
Klement, J.: Kohlensäure-Quelle zu Sz. Ivan in der Liptau. R. . .	59	621
Kleszezynski, E.: die geologische Umgebung von Przibram in Böhmen. R.	57	848
Klipstein, A. v.: Abgüsse seltener Knochen (Dinotherium); über Cotta's Reise in den Alpen; Karte von Darmstadt. B.	51	680
— — Monographie'n-weise Herausgabe seiner geologischen Untersuchungen in Chur-Hessen und angrenzenden Provinzen. B. .	52	201
— — „geognostische Darstellung des Grossherzogthums Hessen", I. .	52	976
Kner, R.: Versteinerungen im Kreide-Mergel von Lemberg. R. . . .	51	478
Knoblauch: krystallisirte Körper zwischen elektrischen Polen. R. . .	51	698

	Jahrg.	Seite
Knop, A.: historisch-merkwürdige Erscheinungen an Gang-Gesteinen aus dem Hochstätter Thale bei Auerbach an der Bergstrasse; insbesondre die sogen. Perimorphosen von Kalkstein und Epidot in Granat (m. 1 Tfl.). A.	1858	33
— — Beiträge zur Kenntniss der Steinkohlen-Formation und des Rothliegenden im Erzgebirgischen Bassin. A.	59	532
— — zur Kenntniss der Steinkohlen-Formation und des Rothliegenden im Erzgebirgischen Bassin, II. Thl. A.	59	671
Kobell, Fr. v.: Skolopsit ein neues Sulphat-Silikat. R.	51	445
— — Aräoxen, ein neues Bleizink-Vanadat. R.	51	594
— — Kreitonit, ein neuer Spinell von Bodenmais; Mineral-Arten mit vikarirenden Mischungstheilen. R.	51	694
— — Hydrargillit aus Brasilien. R.	52	705
— — galvanische Leitungs-Fähigkeit der Mineralien. R.	53	697
— — Pyromelin ein Zersetzungs-Produkt. R.	53	836
— — Thoneisengranat-Zwilling vom Zillerthal. R.	54	183
— — Beziehungen zwischen Mischung und Polymerie von Sismondin, Chloritoid und Masonit; — Disterrit, Xanthophyllit, Clintonit, Chlorit und Rhipidolith R.	57	170
Koch: neues vollständiges Zeuglodon-Skelett. R.	56	237
Koch, F. E.: geognostische Beobachtungen in Mecklenburg: Braunkohlen, Septarien-Thone. B.	55	435
— — anstehende Tertiär-Formationen zu Dömitz in Mecklenburg. R.	58	102
Koch, K.: im Nassauischen vorkommende Mineralien. R.	59	84
Köchlin-Schlumberger: Quarzit-Gerölle mit Eindrücken in den Vogesen. R.	56	63
— — Kreide- und Nummuliten-Gebirge bei Biarritz- R.	57	844
— — Tertiär- und Diluvial-Versteinerungen im Haut-Rhin-Dpt. R.	58	589
— — die Gegend um Belfort. R.	59	633
Kokscharow, N. v.: Magneteisen-Achtundvierzigflächer des Urals. R.	50	343
— — Bagrationit, ein neues Mineral aus dem Ural. R.	50	449
— — Brookit-Krystalle vom Ural. R.	50	619
— — Achmatow'scher Chlorit verglichen mit anderen. R.	53	62
— — Krystall-Form des Chilolith's. R.	54	188
— — über den Klinochlor von Achmatowsk, Tf. 1. A.	55	9
— — krystallisirter Skorodit aus Russland. R.	55	72
— — Cancrinit aus dem Tunkinskischen Gebirge. R.	55	447
— — neuer Fundort des Cancrinits. R.	58	319
— — Analyse Russischer Mineralien. R.	54	453
— — Honigstein in Russland vorkommend. R.	59	821
Koninck, L. de: fossile Chiton-Arten; zwei neue silurische. R.	58	750
Koristka, A.: Einfluss von Höhe und Gestein auf Erd-Magnetismus. R.	51	110
Kossmann: Zerlegung des Mineralwassers von Niederbronn, Oberrhein-Dept. R.	52	68
Köttig, O.: krystallisirtes Platin. R.	57	831
Kowalewskji: Gold in Afrika. R.	51	363
Krantz, A.: über den Orangit. R.	52	80
— — Mexikanisches Meteoreisen. R.	55	446
— — Meteoreisen vom Toluca-Thale in Mexiko. R.	57	830
— — ungewöhnliche Krystall-Formen von Eisenkies und Granat. R.	58	77
— — metallisches Eisen in Magneteisen umgewandelt. R.	59	193
Krafft, L. u. Delahaye: Natron-Hydrosilikat in einer Sand-Breccie. R.	53	64
Krauss, F.: „Petrefakte der untern Kreide vom Kap-Land". 4°. R.	51	384
— — Mollusken der Tertiär-Formation von Kirchberg. R.	52	765
— — zur Kenntniss des Schädel-Bau's von Halitherium (m. 1 Tfl.). A.	58	519
Krug von Nidda: Erz-Lager erbohrt am Gritzberg in Oberschlesien. R.	50	710
— — Horn- und Weiss-Bleierz in Krystall-Form des ersten. R.	51	200

	Jahrg.	Seite
Krug von Nidda: Erz-Lagerstätten im Muschelkalke Oberschlesiens. R.	1852	93
— — das Oberschlesische Steinkohlen-Becken. R.	56	458
— — Graptolithen-Schiefer und Grauwacke Schlesiens. R.	57	839
Krusenstern, v. u v. Keyserling: Geologie der Petschora-Gegenden. R.	50	728
Kubinyi, Fr. v.: Abrutschung am Berge Havraneck. R.	50	76
Kudernatsch, J. die Ammoniten von Swinitza. R.	53	379
— — zur Kenntniss des Banater Gebirgs-Zuges. R.	56	357
— — mittler Banater Gebirgs-Zug um Steierdorf. R.	57	444
— — Geologie des Banater Gebirgs-Zuges. R.	58	347
Kuhlemann, C.: Analyse des derben Bournonits. R.	58	214
Kurr, v.: tertiäre Land- und Süsswasser-Konchylien Schwabens. R. .	56	604
Kutorga, St.: Siphonotreteae und silurische Trilobiten, Petersb. 8°. R.	50	369

L.

Labecki, v.: miocäne Braunkohlen und Salz-Lager in Polen. R. . .	55	463
Lachmann, W.: „Physiographie von Braunschweig und dem Harz-Gebirge". I. R.	52	726
Lagorie: Gold-Gruben in Antioquia, Neu-Granada. R.	51	600
Laletin: Kupfer-Erze zu Bogoslawsk im nördlichen Ural. R. . . .	51	463
Lamare-Picquot: Felsarten in Nord-Amerika gesammelt. R.	51	462
Lan: Erz-Lagerstätten an der Lozère und in den Cevennen. R. . .	56	582
— — Silber-haltiger Bleiglanz zu Carnoulés im Gard-Dpt. R . .	57	352
— — der Fraydronit eine eigne Felsart. R.	58	609
Landerer, A.: Kupfer in krystallinischer Form. R.	59	623
Landerer, X.: sphäroid. Granit auf Tinos; Meerschaum von Theben. B.	50	313
— — Smirgel von Naxos; Chrom-Eisenstein und Serpentin. B. . .	50	681
— — Thermen von Hierapolis in Phrygien. R.	58	575
Landolt: Schmelzbarkeit des Arseniks unter hohem Drucke. R. . .	59	733
Langlois u. Jacquot: Studien über die Eisen-Erze des Mosel-Dept's. R.	52	706
Lanza, F.: das Kreide-Gebirge in Dalmatien. R.	56	58
Lardy: Schweitzer Naturforscher-Versammlung in Sion; Saussure's Poudingues de la Valorsine et du Trient sind Kohlen-Sandsteine; die Anthrazite an der Rhone gehören zur gleichen Formation; Kreide im Jura Vaudois; eocäne Säugthiere im Waad; Flabellaria in Mollasse bei Lausanne. B.	52	822
— — Verhandlungen der Schweitzer Naturforscher-Gesellschaft zu Aarau. B.	51	320
— — Kohlensandstein der Schweitz; Studer's Geologie der Schweitz. B.	51	815
— — über Leopold von Buch. A.	53	264
— — Campèche's Sammlungen fossiler Reste in Oolith- und Kreide-Bildungen des Jura's; Jod in der Quelle von Saxon in Wallis. B.	53	323
— — Nekrolog Charpentier's. B.	55	677
Lartet, E.: Grabungen nach tertiären Knochen zu Sansan. R. . . .	51	763
— — Pelagornis miocaenus, nach einem Humerus aufgestellt. R. .	57	505
— — die fossilen Elephanten-Arten in Rom und Toskana. R. . . .	59	234
Lartet u. A. Gaudry: paläontologische Forschungen zu Pikermi in Attika. R.	57	370
Lasaulx, E. v.: „die Geologie der Griechen und Römer", München 4°.	52	862
Laurent, P.: Erdbeben zu Remiremont, 1851, Juli 12. R.	52	85
Laurentz, Th.: fossiles Harz von Brandeisl bei Schlan in Böhmen. R.	57	326
Laurillard: Grabungen nach miocänen Knochen zu Sansan. R. . .	51	763
Lavalle: Erscheinungen bei langsamer Krystall-Bildung. R. . . .	53	472
Lavocat, A. u. N. Joly: fünfzehiger Typus der Säugthiere. R. . . .	55	761
Lawrow, N.: zwei neue Asaphus-Arten im Petersburger Silur-Kalke. R.	59	379
Lea, J.: Vierfüsser-Fährten im Old-red-sandstone von Pottsville. R. .	50	251

	Jahrg.	Seite
Lea, J.: „Fossil Footmarks in the Red Sandstone of Pottsville". R.	1855	875
— — „Fossil Footmarks" in fol. R.	56	488
— — Reptilien im New red sandstone Pennsylvaniens. R.	57	253
LeConte, J.: die Bildung Floridas durch den Golfstrom. R.	58	106
LeCoq: radiale Wanderung von Fels-Blöcken in Auvergne. R. . .	55	356
LeHon: u. L. De Koninck: les Crinoides du terrain carbonifère. R. .	56	601
Lehmann, Fr. X.: „v. Seyfried's Öningener Versteinerungen", 1855, 8°. R.	55	621
Leichhardt, L.: Kohlen-Lager zu Newcastle in Australien. R. . . .	51	726
Leidy, J.: Poebrotherium Wilsoni ein tertiärer Wiederkäuer. R. . .	51	755
— — fossile Säugthiere und Chelonier in Nebrasca. R.	53	878
— — erloschene Löwen-Art, Felis atrox, in N.-Amerika. R. . . .	54	120
— — erloschene Arten Amerikanischer Ochsen. R.	54	127
— — the Ancient Fauna of Nebraska, Philadelphia 1853, 4°. R. .	55	111
— — „Memoir of the extinct species of American Ox", Washingt. 4°. R.	55	243
— — Bathygnathus borealis, ein Saurier aus New red sandstone. R.	55	499
— — Bootherium cavifrons und Ovibos moschatus. R.	56	109
— — tertiäre Knochen vom Ohio-Ufer. R.	56	109
— — „on the extinct Slooth tribe of North-America", Washingt. 1855. R.	56	239
— — Kameel-Reste in N.-Amerika. R.	56	381
— — Ichthyodorulithen: Stenacanthus und Cylindracanthus. R. . .	56	609
— — Hayden's Reptilien und Fische vom Nebraska-Territorium. R. .	57	113
— — neue Säugthier-Arten aus dem Nebraska-Territorium R. . .	57	115
— — zwölf Arten fossiler Fische. R.	57	115
— — tertiäre Säugthiere von Hayden in Nebraska entdeckt. R. . .	57	244
— — post-pliocäner Seehund von Ottawa-river in Canada. R. . .	57	248
— — Fisch-Reste aus der devonischen Kohlen-Formation der Vereinten Staaten. R.	57	367
— — Beschreibung einiger Reste ausgestorbener Säugthiere. R. . .	57	375
— — die fossilen Dicotyles-Arten Nordamerikas. R.	57	483
— — Reste erloschener Wirbelthier-Arten aus Nebraska u. a. R. .	57	854
— — Wirbelthier-Reste in New-Jersey von Cook gesammelt. R. .	57	856
— — Wirbelthier-Reste von Emmons entdeckt. R.	57	856
— — Fisch-Reste in Missouri von Evans gefunden. R.	57	858
— — das ausgestorbene Pekari Nord-Amerikas. R.	58	122
— — Fische aus dem Kohlen-Kalke in Illinois und Missouri. R. . .	58	122
— — Zusammensetzung des Fusses von Megalonyx. R.	58	123
— — Reste zweier tertiärer Seehund-Arten. R.	58	252
— — über gewisse Fische der Kohlen- und der Kreide-Formation. R.	58	252
— — Reste ausgestorbener Schildkröten-Arten Nord-Amerikas. R. .	58	253
— — erloschene Wirbelthier-Arten aus dem Sioux-Lande. R. . .	58	254
— — pliocäne Säugthiere aus Nebraska. R.	58	509
— — fossile Wallross-Reste in den Vereinten Staaten. R.	58	628
— — Berichtigung seiner Namen fossiler Säugthiere. R.	58	876
— — die bis jetzt am Missouri gefundenen Wirbelthiere. R. . . .	58	375
— — über die Zähne von Mosasaurus. R.	58	877
— — pliocäne Wirbelthier-Reste von Riobrara in Nebraska. R. . .	59	246
— — Reste ausgestorbener Fisch-Sippen. R.	59	378
Leitao, J. M.: der Erz-führende Landstrich Moncayo in Aragonien. R.	52	964
— — Fahlerz von Moncayo in Aragonien. R.	54	176
Leonhard, G.: Beryll im Granit von Heidelberg. B.	51	185
— — „die Quarz-führenden Porphyre" Stuttgart 1851. R.	52	83
— — Orthit bei Weinheim in Baden. A.	53	554
— — „Beiträge zur mineralogisch-geognost. Kenntniss Badens", I. R.	53	742
— — Fortbildungen im Mineral-Reiche. A.	54	415
— — Realgar und Auripigment im Muschelkalke zu Wiesloch bei Heidelberg. A.	57	549

	Jahrg.	Seite
Leonhard, C. C. v.: zur Kenntniss der Gesteine, welche die Azoren zusammensetzen. A.	1850	1
— — krystallinische Hütten-Produkte. R.	52	256
— — über den Schwefel, Naturgeschichtliches, Technisches und Merkantilisches. A.	53	273
— — künstlicher Augit. A.	53	641
— — künstlicher Glimmer. A.	54	129
— — Krystallisirung der Schlacken. A.	55	129
— — über das „Buch der Geologie oder Wunder der Erd-Rinde". R.	55	256
— — künstlicher Graphit (ein Bruchstück aus dessen „Hütten-Erzeugnisse als Stützpunkte geologischer Hypothesen"). A.	56	398
Leprieur: Geologie des Comté-Beckens in Cayenne R.	50	227
Leras: Boden-Erschütterungen zu Brest, 1849, Okt. 17. R.	50	236
Lesquereux: die Bildung der Prairien in Nord-Amerika. R.	58	845
— — Pflanzen der Kohlen-Formation der Vereinten Staaten. R.	59	379
— — neue Pflanzen-Arten aus Anthrazit und Steinkohle Nord-Amerikas. R.	59	379
— — Pflanzen aus jüngeren Tertiär-Formationen Nord-Amerikas. R.	59	505
— — Kohlenschichten-Folge in der Kohlen-Formation von Kentucky und Illinois im Vergleich mit jener im Apalachischen Kohlen-Felde. R.	59	848
Leunis, J.: „Oryktognosie und Geognosie". R.	56	704
Levallois, J.: geologische Verhältnisse des Meurthe-Dept's. R.	52	736
— — Steinsalz im Mosel-Dept.; Muschelkalk-Gebirge in Lothringen. R.	52	972
— — Geologie des Meurthe-Dept's. R.	54	212
— — Ostrea costata und O. acuminata als Leitmuscheln; der Unteroolith in Lorraine. R.	54	710
— — Eisen-Grube zu Florange; Oberlias-Sandstein daselbst. R.	55	213
— — Eisen-Erze im Mosel-Dept. und deren Beziehung zum Lias. R.	55	463
— — Geologie des Meurthe-Dept's. R.	56	202
— — das untre Oolith-Gebirge in Lothringen. R.	56	207
— — die Lias-Sandsteine von Luxemburg, Vic und Romery. R.	57	214
Levy: Analyse der Luft im Meer-Wasser von Caen. R.	50	708
Lewinstein, G.: Zusammensetzung des glasigen Feldspaths. R.	56	563
— — Feldspath-reicher Trachyt der Eifel. R.	57	713
Lewy u. Boussingault: Zerlegung der Boden-Gase. R.	55	352
Lewy, B.: die Mastodonten in Neu-Granada. R.	55	381
— — Bildung und Zusammensetzung der Smaragde Neu-Granada's. R.	58	309
Leydolt: Krystalle in Glas. R.	53	180
— — Krystall-Gestalt des Eises. R.	53	844
— — der Meteorstein von Borkut, Marmaros. R.	57	177
Leymerie: Wanderung auf den Marboré und Mont-perdu. R.	50	469
Leymerie u. Cotteau: fossile Echiniden der Pyrenäen. R.	57	858
Leymerie u. Filhol: Aerolith von Montrejean im Haute-Garonne-Dpt. R.	59	622
Lidl, F. v.: Steinkohlen-Formation im Pilsener Kreise Böhmens. R.	58	92
— — Geognosie von Lubenz bei Saaz in Böhmen. R.	58	718
Liebe, Th.: Zechstein-Gebirge bei Homburg. B.	53	562
— — chemische und geognostische Untersuchungen über den Zechstein des Orla-Thales, Tf. 10. A.	53	769
— — Beziehungen der Beimengungen des Zechsteins zu seiner Farbe. R.	56	580
— — über den Konglomerat-artigen Zechstein Sachsens. R	58	843
Liebener u. Vorhauser: „die Mineralien Tyrols", Innsbruck 1852. R.	53	839
Lieber, O.: Ungleichheit der Gang-Bildung nach Verschiedenheit der Teufe. R.	58	861
— — Itakolumit und seine Begleiter in Carolina. R.	59	747
Liebig, G. v.: das vulkanische Barren-Eiland. R.	59	313

	Jahrg.	Seite
Lill v. Lilienbach, A.: Verhalten des Erz-Adels gegen die Teufe im Silber- und Blei-Bergwerk von Przibram in Böhmen. R. .	1859	841
Limprecht: zerlegt Epistilbit von Island. R.	55	448
Limprecht u. Sartorius v. Waltershausen: Andesin von Island. R. .	56	345
Limur, de: Granit in Strömen ergossen unfern Huelgoat in Finistère. R.	58	332
Lipold, M. V.: Geognosie der Herrschaft Nadworna in Galizien. R. .	51	721
— — geologische Stellung der Alpen-Kalksteine. R.	54	88
— — Braunkohle zu Wildsfluth in Ober-Österreich. R.	55	206
— — Kreide- und Eocän-Formation im N.O.-Kärnthen. R.	55	586
— — das Leogang-Thal im Kronlande Salzburg. R.	56	570
— — die alpine Lias- und Jura-Formation im S.O.-Kärnthen. R. . .	56	849
— — Übergangs-Schiefer im N.O.-Kärnthen. R.	57	81
— — Verbreitung von Diluvium und Tertiär-Formation in Kärnthen. R.	57	214
— — das Sulzbach-Thal im S.W.-Theile Untersteyermarks. R. . .	57	337
— — geologische Durchschnitte im östlichen Kärnthen. R. . . .	57	614
— — krystallinische Schiefer-Gesteine im N.O.-Kärnthen. R. . . .	58	221
— — Kaolin vom Bacher-Gebirge in Steyermark. R.	58	829
— — Beiträge zur geologischen Kenntniss Ost-Kärnthens. R . . .	59	476
— — krystallinische Schiefer- und Massen-Gesteine in Kärnthen. R.	59	740
— — Untersuchungen im Wippach-Thale, westwärts von Heiligkreutz im Isonzo-Thale von Salcano abwärts, ferner der Hügel des Scoglio im Westen von Görz, des Karst-Gebirges zwischen dem Wippach-Thale und dem Adriatischen Meere, endlich der Umgebungen von Triest und Capo d'Istria. R.	59	737
Lipold u. Prinzinger: Geologisches vom Salzberge bei Hall. R. . .	56	360
List, K.: Analyse des Misy, vom Rammelsberg bei Goslar. R. . . .	52	71
— — chemische Zusammensetzung des Taunus-Schiefers. R. . . .	51	345
— — Analyse des Pikroliths von Reichelstein in Schlesien. R. . .	51	588
Littrow, v.: das allgemeine Niveau der Meere. R.	55	219
Lloyd, G.: Labyrinthodon Bucklandi im Buntsandsteine von Warwickshire. R.	52	895
Lockhart: Mastodon-Kiefer mit 2 Backenzähnen übereinander. R. .	55	369
— — diluviale Knochen-Lagerstätte bei Orleans. R.	55	869
Logan, W. E: Gold und Phosphor-saurer Kalk in Canada. R. . . .	53	476
— — geologische Untersuchung Canadas. R.	58	854
— — Geological Survey of Canada. Decades of Organic Remains. R.	59	634
Lombardeau: Braunkohlen von Nossi-Bé und Madagascar. R. . . .	58	610
Lorenz, J. R.: Entstehung der Hausrucker Kohlen-Lager. R. . . .	58	79
Lorière, de u. de Verneuil: Geologie Spaniens. R.	55	356
Lortet: Knochentrümmer-Gestein von Cette. B.	51	674
Lory, Ch.: Süsswasser-Bildung zwischen Portland und Neocomien im Jura. R.	50	490
— — Neocomien-Bildung im Jura-Gebirge. R.	50	865
— — das Jura-Plateau und die Wander-Blöcke im Isère-Dept. R. .	54	216
— — Schichten des Crussol-Berges bei Valence. R.	56	57
— — Kreide-Gebilde im Thale Dieu-le-fit, Drôme-Dept. R. . . .	57	613
Losiewskji: Grotten und unterirdische See'n im Gouvt. Orenburg. R.	52	350
Lottner, T. H.: „Skizze des Westphälischen Steinkohlen-Gebirges", Iserlohn 1859. R.	59	346
Luca, S. de: Aragon von Gerfalco in Toskana. R.	59	197
Ludwig, J. F.: Geologisches um Jauer in Schlesien. R	51	467
Ludwig, R.: Kupferschiefer u. Zechstein im Vogelsberg u. Spessart. R.	54	614
— — geologische Karte von Friedberg in der Wetterau. R. . . .	56	578
— — Mineralquellen und Salzbrunnen um Friedberg, Wetterau. R. .	57	452
— — Pflanzen der jüngsten Wetterauer Braunkohle. R.	58	498
— — Geognosie und Geogenie der Wetterau. R.	58	703

	Jahrg.	Seite
Ludwig, R.: mittel-tertiäre Pflanzen aus dem Rheinisch-Wetterauer Becken. R.	1859	121
— — tertiäre Pflanzen von Homberg in Kurhessen. R.	59	122
Lwoff, Th.: Kupfer-Erz von Werschne-Oudinsk. R.	59	305
Lycett, J.: Konchylien im Oolith von Gloucestershire. R.	50	869
— — Konchylien im mitteln Unteroolith in Gloucestershire. R.	52	226
— — Schloss und eine neue Art der Sippe Platymya. R.	53	95
— — die fossile Muschel-Sippe Trichites. R.	53	219
— — über Trigonia und einige neue Arten aus Oolith. R.	53	877
— — die Sippe Tancredia L. ist Hettangia Terq. R.	54	112
— — über Perna quadrata. R.	55	748
— — Gryphaea Buckmani von Cheltenham. R.	55	878
— — über die Sippe Limea. R.	56	223
— — Isodonta in Englischen Jura-Schichten. R.	58	128
Lycett, J. u. J. Morris: Pachyrisma, eine neue Muschel-Sippe aus Oolith. R.	53	114
— — — — „Mollusca from the Great Oolite, I. Univalves". R.	53	232
— — — — Mollusca from the Great Oolite, of Minchinhampton, II. R.	54	764
— — — — the Mollusca from the Great Oolite III. R.	57	742
Lyell, Ch.: über die stufenweise Entwickelung organischer Formen. R.	51	628
— — Tertiär-Schichten in Belgien und Französisch-Flandern. R.	52	881
— — Höhen-Wechsel des Serapis-Tempels zu Pozzuoli. R.	58	223
— — Geologie der Vereinten Staaten. R.	58	601
— — auf Steilabhängen des Ätna gebildete Laven und Theorie der Erhebungs-Kratere. R.	59	460
Lyell u. Dawson: Reptilien-Reste in einem Baume der Kohlen-Formation in Nova Scotia. R.	53	511

M.

Mac-Adam, J.: Loricula Mac-Adami, ein neuer Cirripede. R.	58	508
Mac-Andrew: Bifrontia (B. zanclaea) eine lebende Sippe. R.	53	382
McBain, J.: Wombat-Schädel aus einer Australischen Knochen-Höhle. R.	58	510
McCoy, Fr.: Britische fossile Kruster. R.	50	121
— — neue silurische Mollusken. R.	51	253
— — Klassification fossiler Kruster. R.	51	505
— — neue Arten paläozoischer Echinodermen. R.	51	748
— — neue silurische Radiaten. R.	52	128
— — drei neue devonische Zoophyten. R.	52	989
— — Description of British Palaeozoic Fossils, I, II R.	53	97
— — neue devonische Fossil-Reste. R.	53	110
— — neue Brachiopoden aus Kohlen-Kalkstein. R.	53	211
— — neue kambro-silurische Fossil-Reste. R.	53	216
— — Beschreibung neuer unter-silurischer Schaalen. R.	53	232
— — Beschreibung neuer Bergkalk-Versteinerungen. R.	53	238
— — protozoische Ringelwürmer vom Tweed. R.	53	380
— — die angeblichen Fisch-Reste in „Murchison's Silur-System", Tf. 4. R.	53	629
— — neue Versteinerungen aus der Englischen Kohlen-Formation. R.	53	760
— — neue Kruster aus der Kreide. R.	55	859
— — a Systematic Description of British Palaeozoic Fossils, 4°. R.	56	111
Magnus: die rothe Farbe des Schwefels von Radoboj. R.	54	701
Maier, P. J. (vgl. Mayer): Analyse der Asche des Vulkans Gunung Guntur auf Java. R.	53	463
Maillard, L.: das Eiland Bourbon. R.	54	605
Malaguti u. J. Durocher: Pyrit-Bildung in jungen Alluvionen. R.	52	619

	Jahrg.	Seite
Malaguti, Durocher u. Sarzeaud: Blei, Kupfer und Silber in See-Wasser und in Organismen. R.	1850	352
Mallet, J. W.: Analyse des Euklases. R.	54	447
— — Analyse des Idokrases von Polk-County in Tenn. R.	59	819
Manger, R.: Erz-Anbrüche zu Michelsberg bei Plan in Böhmen. R.	53	601
Mantell, G. A.: Nachtrag über Belemnites und Belemnoteuthis. R.	50	644
— — Pelorosaurus Conybearei von Tilgate Forest. R.	50	745
— — Dinornis- u. a. Vogel-Reste, Konchylien, Korallen, Felsarten aus Mittel- und Nord-Neuseeland. R.	51	226
— — neue Sendung von Moa-Knochen aus Neuseeland. R.	51	249
— — Lebender Notornis aus Neuseeland. R.	51	256
— — Menschen-Reste und -Werke in Gebirgs-Schichten R.	52	92
— — Reptilien-Reste in altem rothem Sandstein und Schiefer. R.	53	106
— — zur Osteologie von Iguanodon und Hylaeosaurus. R.	53	214
Mantell, R. N.: Schichtenfolge und Organismen der Oolithe bei Chippenham. R.	50	721
Marbach: über Möbius' Methode Krystall-Formen darzustellen. R.	58	75
— — thermo-elektrische Untersuchung tesseraler Krystalle. R.	59	293
Marchand: Zerlegung einer Mineral-Quelle bei Halle. R.	50	337
— — untersucht Wasser vom Todten Meere. R.	50	454
Mark, W. von der: Wirbelthiere, Kruster und Cephalopoden der Westphälischen Kreide. R.	59	491
Marcou, J.: geologische Forschungen im westlichen Jura. R.	50	709
— — Gebirgs-Systeme in Nord-Amerika. R.	55	354
— — Lagerstätten des Goldes in Californien. R.	55	716
— — geologischer Durchschnitt der Rocky Mountains bei San Pedro. R.	55	726
— — Geologie der Vereinten Staaten u. a. Theile von Nord-Amerika. R.	56	91
— — Gebirge zwischen Red-River und Rio grande. R.	57	458
— — „Geology of North-Amerika", Zürich 1858. R.	58	477
— — zur Geologie der Rocky-mountains. R.	58	708
— — Dyas und Trias in Europa, Amerika und Indien. R.	59	750
— — über Nebraska und Kansas. R.	59	815
Marès, P.: Beschaffenheit der Sahara im Süden der Provinz Oran. R.	59	474
Marignac de, C.: über den Liebenerit. R.	52	492
— — Beziehungen zwischen Formen-Gruppen verschiedener Krystall-Systeme. R.	58	217
Marigny, F. v.: Analyse eines Zink-Erzes aus Oran. R.	58	566
— — Zerlegung von Kupfer-Erz aus Oran. R.	58	576
— — Braunkohle von d'Hadjar-Roum, Prov. Oran in Algerien R.	59	820
Marquart: krystallisirter Kesselstein. R.	59	819
Marschall, v.: über die Graf Münster'sche Sammlung in München. R.	51	510
Marschau, J.: Waschgold-Vorkommen in den Diluvial-Gebilden Ungarns. R.	59	295
Martens, E. v.: über Pecten glaber und Pecten sulcatus. R	59	360
Märtens, K.: Versuch die Entstehungs-Weise der Übergangs-Gebirge zu erklären. A.	51	779
— — Kalktuff-Bildung und Einfluss der Gyps-Quellen im Thale zwischen Elm und Asse. A.	55	33
— — die Tropfstein-Bildungen in der Baumanns- und Biels-Höhle. A.	56	537
Martins, Ch.: vulkanische Gesteine im Kohlen-Becken von Commentry verwandeln die Kohle in Koaks. R.	52	85
— — das Vernet-Thal; die Moränen der Pyrenäen. R.	55	83
— — Ausnagung kalkiger Gesteine durch Atmosphärilien. R.	57	82
Massalongo, A.: „Plantae fossiles novae", Veronae 1853, 8°. R.	54	251
— — „Enumerazione delle piante miocene in Italia", 1853, 8°. R.	54	626
— — neuere paläontologische Entdeckungen am Monte Bolca. A.	57	775

	Jahrg.	Seite
Maschke, O.: Kieselsäure-Hydrat; Bildungsweise von Opal und Quarz. R.	1856	556
Mayer: Bildungs-Stätte kieselpanzeriger Infusorien. R.	57	125
— — dendritische Krystallisationen auf fossilen Knochen. R.	58	309
— — fossile und humatile Menschen-Knochen. R.	58	862
Mayer, K.: das Nummuliten-Gebirge der Rallig-Stöcke bei Thun. R.	54	613
— — das Tertiär-Gebirge. B.	58	62
Mayer, P. J. (vgl. Maier): Analyse salzigen Wassers aus Java. R.	53	602
Mayer, M. C.: tertiäre Konchylien Süd-Russlands. R.	57	623
Mazade u. Henry: Titan-, Zirkon , Kobalt- und Nickel-Oxyd in Mineral-Wasser. R.	56	345
Meek u. J. Hall: neue Evertebraten der Kreide Nebraska's. R.	57	864
Meek u. Hayden: Acephalen und ein Gastropode in Kreide Nebraska's. R.	57	492
— — — — tertiäre Gebirge und Fossil-Reste in Kreide Nebraska's. R.	57	493
— — — — permische Reste aus Kansas. R.	58	349
— — — — neue Schaaler-Sippen und -Arten aus Nebraska. R.	58	376
— — — — Gastropoden und Cephalopoden in Kreide Nebraska's. R.	57	491
— — — — Geologie des Nebraska-Territoriums. R.	58	493
— — — — Geologie und Fossil-Reste eines Theiles desselben. R.	58	495
— — — — neue Organismen-Arten aus der Steinkohle im Kansas-Thale. R.	59	869
Meglitzkji: das Werchojaner-Gebirge; Silber-haltige Blei-Erze am Endybal. R.	55	212
Meigs, J. A.: Beziehungen zwischen Atom-Wärme und Krystall-Form R.	57	176
Melloni: magnetische Polarität vulkanischer Gesteine. R.	54	614
Mendelejew: Analyse des Orthits aus Finnland. R.	58	567
Meneghini e Savi: Geologia della Toscana, Firenze 1851. R.	54	195
Menke, K. Th.: Pinites Menkeanus Göp. im Lippe'schen Keuper. B.	52	468
Mercklin, C. E. v.: Holz und Bernstein in Braunkohle von Gishiginsk. R.	53	710
— — Palaeodendrologicum Rossicum, 1855, eine Preisschrift. R.	57	362
Merian, P.: Ananchytes in der Jura-Formation. R.	50	622
— — marine Tertiär-Formation am Randes bei Schaffhausen. R.	50	856
— — Schaalthiere im Süsswasser-Kalk von Mühlhausen. R.	51	122
— — St.-Cassianer Formation an mehren Orten. B.	51	328
— — Geologie von Paraguay. R.	52	361
— — Vorkommen des Bohnerzes. R	52	493
— — geologische Verhältnisse von Öningen. R.	52	959
— — Bohr-Versuche auf Salz in Solothurn und Bern. R.	53	65
— — Geologie des Aargauischen Jura's. R.	54	826
— — Geologie der Vorarlbergischen Alpen. R.	54	829
— — St.-Cassian-Formation in Bergamo's Alpen und in Rhätikon. R.	54	835
— — Vorkommen von Dinotherium im Berner Jura. R.	54	838
— — die St.-Cassian-Formation am Comer-See. R.	55	83
— — über die Eocän-Formation im Jura. R.	55	104
— — kein Ananchytes im Korallen-Kalke des Jura's. R.	55	237
— — Muschelkalk-Versteinerungen im Dolomit bei Lugano. R.	55	479
— — Equisetum-Blüthen im Keuper bei Basel. R.	55	220
— — die Flötz-Formation um Mendrisio am Luganer-See. R.	56	207
Meugy: Kreide-Gebirge in den Nord-, Aisne- und Ardennen-Dept's. R.	56	358
— — poröse Quarz-Gesteine im Pariser Becken. R.	58	834
Meyer, H. v.: über den Archegosaurus des Steinkohlen-Gebirgs. R.	50	104
— — Sapheosaurus und Atoposaurus im lithograph. Jura-Kalke des Ain-Dept's; letzter mit Pterodactylus longirostris auch zu Solenhofen; Cancer hispidiformis im Nummuliten-Sandstein zu Gmünden; tertiärer Säugthier-Knochenpanzer; Zeuglodon-Reste bei Linz; Dorcatherium, Anthracotherium, Palaeomeryx, Rhinoceros,		

		Jahrg.	Seite
	Sus, Phoca, Dinotherium, Listriodon, Cervus, Halianassa und Nager im Wiener Becken; fossiler Vogel von Radoboj; Anthracotherium, Rhinoceros, Microtherium in Nassauer Braunkohle; Capra und Bos im Torfe bei Frankfurt. B.	50	195
Meyer, H. v.:	Fische im Muschelkalke Thüringens. R.	50	246
— —	Polyptychodon interruptus in Flammen-Mergel bei Goslar; Säugthier-Knochen in Mollassen-Kohle der Schweitz; mittel-tertiäre Säugthiere und Reptilien-Reste zu Haslach bei Ulm; fossile Emys- und Platemys-Arten; Fische aus Tertiär-Thon von Unterkirchberg bei Ulm; Dadocrinus, Nothosaurus und Fische im Muschelkalke Oberschlesiens. B.	51	75
— —	mittel-tertiäre Säugthiere, Reptilien, Fische, Kruster zu Reisensburg bei Günsburg; Fische und Insekten in der Braunkohle bei Westerburg in Nassau; Wirbelthier-Reste in der Blätterkohle von Rott am Siebengebirge; Rhinoceros und Anoplotherium in Hickengrund am Westerwalde; Zahn-Bildung am jungen Elephas primigenius; Säugthierknochen-Breccie bei Beremend im Baranyaer Komitate; Saurichthys tenuirostris des Muschelkalks; Säugthier-Knochen in einer Lehm-Grube zu Lorch in Nassau. B.	51	677
— —	Coccosteus Hercynicus n. sp. in Harzer Grauwacke; Batrachier in der Wetterauer Braunkohle; Rana, Palaeophrynus und Palaeobatrachus; tertiäre Fische. B.	52	57
— —	Nothosaurus im Cryptina-Kalke der Alpen; Cancer und Crocodilus-Reste im Nummuliten-Kalke der Ost-Alpen; Arionius servatus in Mollasse von Passau; Stephanodon Mombachensis, Percoidei und Lebias in Mollasse von Günzburg; Wirbelthier-Reste in Meeres-Mollasse von Niederstotzingen; Krokodile, Schildkröten, Geweihe, Amphitherium und Hyotherium in der Mollasse von Reisensburg; Emys- und Clemmys-Arten in der von Haslach; Palaeotherium, Plagiolophus, Dichobune, Dichodon, Hyaenodon u. a. Fleischfresser, Vögel, Krokodile, Emydiden in den Bohnerzen von Frohnstetten; Anthracotherium in Braunkohle des Westerwaldes; Cervus spelaeus aus dem Rheine.	52	301
— —	Schlangen-Haut mit Haut-Knöchelchen in Papier-Kohle des Siebengebirges; Palaeobatrachus gigas n. sp. und Rana Troscheli von da; Palaeobatrachus Goldfussi und Triton Noachicus aus derselben am Stösschen; Rana Salzhausensis und Dicerca Taschei; Insekten-Gänge und Koprolithen im Holze der Braunkohle der Wetterau; Xylophagus antiquus in Braunkohle der Westerburg ist Bibio antiquus; Porcellio carbonum von da; Hippopotamus major im Diluvial-Kies von Wiesbaden. B.	52	467
— —	„die Muschelkalk-Saurier“, dritte Lieferung. B.	52	601
— —	eocäne Säugthiere von Frohnstetten: Plagiolophus Fraasi, Plagiolophus minor, Dichodon Frohnstettensis; Molasse-Sand von Uffhofen mit Anthracotherium magnum; Batrachier in Braunkohle von Gusternhain; Pterodactylus, Sapheosaurus Thiollierei und Schildkröten im lithographischen Jura-Schiefer von Cirin. B. .	52	831
— —	„Fauna der Vorwelt; II. Saurier des Muschelkalks“. R. . .	52	883
— —	Neue Kruster aus der Steinkohlen-Formation Saarbrück's; Adelophthalmus, Chorionotus und Arthropleura; neue Reptilien-Reste im Muschelkalke von Crailsheim, von Simosaurus und Nothosaurus; Protorosaurus im Kupferschiefer; Palaeobatrachus gigas in Braunkohle; Delphinus-Reste in Schwäbischer Mollasse; Mastodon Turicensis in Mollasse von Kirchberg; Rana Meriani und Astacus? papyraceus in Braunkohle des Siebengebirges; Wirbelthier-Reste in Mollasse des Berner Jura's; Saurier-Reste		

		Jahrg.	Seite
	von Polyptychodon interruptus und Leiodon anceps aus Grünsand von Regensburg. B.	1853	161
Meyer,	H. v.: „die Saurier des Muschelkalks", IV. R.	53	507
— —	Werk über die Muschelkalk-Saurier; der Nager von Waltsch in Böhmen. B.	53	578
— —	Anthracotherium Dalmatinum von Monte Promina u. a. O.; Chelydra Decheni aus Braunkohle des Siebengebirges; Wirbelthier-Reste aus Basalttuff-Konglomerat zu Glimbach an der Rabenau; angebliches Vorkommen von Agnotherium antiquum und Hyaena spelaea; fossile Reste im lithographischen Schiefer von Nusplingen bei Spaichingen; Eryon Schuberti; Litogaster; Pemphyx; Pterodactylus longicollum n. sp. aus Solenhofener Schiefern; Acrosaurus Frischmanni von da; Reptilien und Cancer-Arten in Kressenberger Nummuliten-Gestein. B.	54	47
— —	Monographie der Reptilien aus der Steinkohlen-Formation Deutschlands; Archegosaurus; Sclerocephalus Haeuseri. B.	54	422
— —	Helochelys Danubiana n. g. sp. im Unter-Grünsandstein zu Kelheim; Idiochelys Fitzingeri und J. Wagneri im lithographischen Schiefer von da; Platychelys Oberndorferi Wgnr. und Acichelys Redenbacheri n. g. sp. von da; Crocodilus Büticonensis in Mollasse vom Büticon Aargau's; Wirbelthier-Reste in Braunkohle von Kaltennordheim und von Römerikenberg bei Rott; Cyprinus in Molasse-Thon von Unterkirchberg; Asterolepis Hoeninghausi im Devon-Kalke der Eifel. B.	54	575
— —	ausführliche Beschreibung von Archegosaurus der Steinkohlen-Formation und von Pterodactylus (Rhamphorhynchus) Gemmingi; Pt. longirostris; Pt. secundarius; Homoeosaurus breviceps der lithographischen Schiefer; Tropidonotus atavus in Rheinischer Braunkohle; Palaeoniscus Brongniarti und Smerdis zu Sieblos an der Rhön. B.	55	326
— —	zur Fauna der Vorwelt; II. Muschelkalk-Saurier, 2. R.	55	366
	II. „ „ 3. R.	55	755
— —	tertiäre Fische von Ulm; Pterodactyle in Württemberg. B.	55	808
— —	Crocodilus Büticonensis in Süsswasser-Molasse. R.	56	109
— —	Jugend-Form von Chelydra Decheni im Siebengebirge. R.	56	230
— —	über Anthracotherium Dalmatinum. R.	56	230
— —	zur Fauna der Vorwelt, III. Abtheilung; Palaeontographica, VI. Bnd.; Säugthier-Reste von Klagenfurt; Wirbelthier-Reste aus der Mollasse von Baltringen und aus der Braunkohle im Siebengebirge; Sphaeria aus der Wetterau. B	56	329
— —	Schildkröte und Vogel aus den Fisch-Schiefern in Glarus. R.	56	362
— —	der Nager von Waltsch in Böhmen. R.	56	362
— —	jurassische und triasische Krustazeen. R.	56	366
— —	über das Plagiostomen-Genus Thaumas, Asterodermus, Acrosaurus aus den lithographischen Schiefern. B.	56	418
— —	Jugend-Zustand von Chelydra Decheni im Siebengebirge. R.	56	487
— —	Anthracotherium Dalmatinum von Monte Promina. R.	56	487
— —	Physichthys aus dem Übergangs-Kalksteine der Eifel. R.	56	610
— —	Fische, Kruster, Echinodermen im Muschelkalke Oberschlesiens. R.	56	745
— —	Osteophorus Roemeri ein Labyrinthodonte aus dem Rothliegenden des Böhmischen Riesengebirges; Ichthyosaurus-Wirbel aus den Kössener-Schichten im Achen-Thale; über Asterodermus und Squatina; Pterodactylus Kochi, Pt. micronyx n. sp. und Pt. crassirostris; Homoeosaurus Neptunius: Smerdis und Perca aus den Braunkohlen der Röhn; Palaeomeryx und Lacerta Rottensis in denen bei Bonn. B.	56	824

	Jahrg.	Seite
Meyer, H. v.: zur Fauna der Vorwelt; III. Kupferschiefer-Saurier. R.	57	102
— — Paläeontographische Studien (über Säugthiere und Reptilien). R.	57	109
— — Beiträge zur näheren Kenntniss fossiler Reptilien. A. . . .	57	532
— — Paläontologische Arbeiten; Smerdis von Sieblos in der Rhön; Leuciscus, Cobitis u. a. Fische in der Braunkohle von Eisgraben bei Fladungen; Palaeotherium medium von Mühlhausen; Wirbelthier-Reste aus dem Charen-Kalke des Ilm-Thales; die Prosoponiden. B.	57	554
— — Lophocrinus speciosus und Poteriocrinus regularis in den Posidonomyen-Schiefern; neue Prosopon-Arten; Palaeomeryx Kaupi und Dorcatherium Vindobonense in der Mollasse von Mösskirch; Arionius servatus von da; Elephas primigenius, Bos priscus und Cervus im Diluvial-Letten bei Frankfurt; Pterodactylus-Reste. B.	58	59
— — Pterodachylus und Rhacheosaurus der lithographischen Schiefer; Palaeobatrachus Goldfussi und Salamandra laticeps aus Braunkohle von Markersdorf in Böhmen; Rana Danubiana aus der Mollasse von Günzburg; Abänderungen tertiärer Fisch-Arten; Palaeomeryx Scheuchzeri, P. Bojani, Chalicomys Jaegeri u. a. aus Mollasse; Dicroceros, Dorcatherium und Micromeryx von Sansan; Archaeonectes pertusus ein plakoider Fisch aus dem Devon-Kalke der Eifel; Eryon Raiblanus n. sp.; Ischyodus rostratus aus Hannöver'schem Portland; Goniosaurus Binkhorsti u. a. Reptilien aus Kreide-Tuff von Mastricht und Münster. B.	58	202
— — „Steinkohlen-Reptilien Deutschlands: Archegosaurus." R. . .	58	239
— — Macrochelys (Colossochelys) mira, Testudo sp. und Pycnodus faba aus Mollasse von Oberkirchberg: Verbreitung des Anthracotherium magnum; Untersuchung des Zygosaurus lucius aus der Russischen Perm-Formation; Melosaurus Uralensis von da; Protorosaurus Speneri aus Kupferschiefer von Riegelsdorf. B.	58	296
— — vier Labyrinthodonten-Arten aus dem Bunten Sandsteine von Bernburg; Nager aus der Braunkohle des Siebengebirges. B.	58	555
— — Psephoderma alpinum aus dem Dachstein-Kalke der Alpen. A.	58	646
— — Palaeoniscus obtusus aus der Braunkohle von Sieblos i. d. Röhn. R.	59	114
— — miocäne Säugthier-Knochen zu Haslach bei Ulm, Stockach und Weissenau. B.	59	172
— — zur Fauna der Vorwelt, IV. Reptilien der lithographischen Schiefer des Jura's, 1859. R.	59	354
— — Bestimmung fossiler Knochen aus Diluvial, Braunkohle, Basalt-Tuff und Oxford. B.	59	427
— — Werk über die Reptilien der lithographischen Schiefer; Fossil-Reste aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge: Andrias Tschudii; Coluber (Tropidonotus) atavus; Lacerta pulla, L. Rottensis; Rana Meriani; Palaeobatrachus Goldfussi; Chelydra Decheni; Palaeomeryx medius (Moschus Meyeri); Vogel-Federn; Micropsalis papyracea; Parallele zwischen Rott und Öningen. B.	59	723
— — Eryon Raiblanus, aus den Raibler-Schichten Kärnthens. R. .	59	860
Meyer, H. v. u. H. Jordan: die Kruster der Steinkohlen-Formation von Saarbrück. R.	54	500
Meyer, H. v. u. Fresenius: Sphaeria areolata in Braunkohle. R. . .	56	757
Meyer, J. H. C. A.: neues Vorkommen von Struveit in Hamburg. R.	57	175
Meyer-Dörr: Einfluss des Bodens auf die Färbung der Schmetterlinge. R.	53	489
Meyn, L.: Chronologie der Paroxismen des Hekla's. R.	55	578
— — Riffstein-Bildung im Kleinen an der Nordsee-Küste. R. . . .	57	179
Michaud, G.: „Coquilles de Hauterive, Drôme", Lyon 1855. R. . .	55	745
— — bietet seine Konchylien-Sammlungen zum Kauf an. B. . . .	55	768
Michel: die Landschaft Dobrudscha in Bulgarien. R.	58	83

	Jahrg.	Seite
Michelin: Synonyme des Conoclypeus conoideus. R.	1857	861
— — suprakretaceische Echinoideen aus Jamaika. R.	58	612
Middendorff, v.: fossile Hölzer in Sibirien gefunden. R.	50	126
Middleton: zerlegt Magnetkies von Rajpootanah in Indien. R. . . .	50	694
— — Analyse des Kobaltes aus Westindien. R.	52	702
Milch: Bohrloch zu Warmbrunn. R.	55	213
Miller, H.: Asterolepis und Glyptolepis zu Caithness. R.	52	383
— — Asterolepis und Glyptolepis von Caithness und Russland. R. .	53	228
— — neuer Fundort von Antimon-Erzen im Voigtlande. R. . . .	55	574
Miller u. Grey-Egerton; über Pterichthys und die Cephalaspiden. R.	51	493
Milne-Edwards: Krönung von Bronn's Arbeit über die geologische Reihenfolge der Organismen durch die Pariser Akademie. B.	57	153
Milne-Edwards u. J. Haime: Monographie der Asträiden, Schluss. R.	50	756
— — — — „a Monograph of British fossil Corals", I, 1850. R. .	51	625
— — — — „Monographie des Polypiers paléozoiques", Paris 4°. R.	51	625
— — — — „Structure et Classification des Polypiers", I, Paris 1848—1849. R.	51	625
— — — — Übersicht des Korallen-Systems. R.	52	114
— — — — Untersuchungen über V: die Oculinidae. R.	52	248
— — — — Untersuchungen über VI: die Pseudoculinidae. R. . .	52	251
— — — — Untersuchungen über VI: die Turbinoliidae. R. . . .	52	375
— — — — „Monograph of fossil British Corals, London, II. R. .	52	757
— — — — „Monograph of British fossil Corals", III. R.	52	989
— — — — Polyparien, VII: Poritidae. R.	53	875
— — — — Polyparien, VIII: Lithostrotion. R.	53	877
— — — — the British fossil Corals, IV: Devonian-Formation. R. .	54	497
— — — — British fossil Corals, V: Silurian. R.	57	104
Milowanow: statistische Notitz über den Jelton-See. R.	54	844
Mineral-Reichthum Süd-Australiens R.	51	202
Miquel, F. A. W.: Pflanzen aus der Kreide in Limburg. R. . . .	54	228
Mitchel, J.: zerlegt Londoner Trinkwasser. R.	50	847
Möbius, A. F.: Symmetrie-Gesetze der Krystalle; Eintheilung darnach. R.	54	177
Möller, N. B.: Eudnophit gehört zum Analzim. R.	59	623
Mollet: Skleretinit ein neues fossiles Harz. R.	56	349
Monheim, K.: Willemit vom Busbacher Berg bei Aachen. R. . . .	51	89
— — Kieselzinkerz von Aachen und aus Ungarn. R.	51	705
— — Zinkeisenspath oder Kapnit von Aachen. R.	51	705
— — zerlegt grünen Eisenspath vom Altenberge. R.	51	709
— — zerlegt Dolomit vom Altenberge bei Aachen. R.	51	709
— — Zinkspath vom Busbacher Berge bei Aachen. R.	52	66
— — Pyromorphit vom Busbacher Berge bei Aachen. R.	52	66
— — Manganzinkspath von Herrenberg bei Riom.	52	69
Monheim, V.: Zink-Mineralien am Altenberge bei Aachen. R. . . .	51	448
— — Halloisit am Altenberge bei Aachen. R.	51	587
— — Quarz-Überzüge auf Zinkspath; Verhüllungs-Pseudomorphosen von Quarz nach Zinkspath und Kieselzinkerz bei Aachen. R. .	50	704
Montagna, A.: Giaciatura e condizioni del terreno carbonifero di Agnano. R.	59	230
Moore, J. C.: Konchylien im Till von Caithness R.	51	484
— — tertiäre Konchylien auf St.-Domingo gesammelt. R.	52	508
— — Haut und Nahrung von Ichthyosaurus und Teleosaurus. R. .	57	122
Morlot, A. v.: Gegend von Grossau und Pechgraben in Steiermark. R.	50	89
— — Dolomit am Kapfenberg in Obersteiermark. R.	50	96
— — geologische Verhältnisse Steyermarks im S. der Drau. R. . .	50	712
— — Niveau der Miocän-Formation in den Ost-Alpen. R.	50	739
— — Alter und Bildungs-Weise des Tertiär-Gebirges in Croatien. R.	50	854, 855

	Jahrg.	Seite
Morlot, A. v.: über Diluvial-Terrassen. R.	50	856
— — Geologie des S. Theiles von Untersteyer.	51	231
— — Baumstamm in Mollasse-Mergel bei Lausanne. R.	55	711
— — quartäre Gebilde des Rhone-Gebietes. R.	55	719
— — Durchschnitt des Mollasse-Beckens von den Alpen bis zum Jura. R.	56	458
— — quartäre Geschiebe im Rhone-Gebiete. R.	59	315
Morris, J.: Neritoma eine neue Gastropoden-Sippe im oberen Jura. R.	50	248
— — über die Sippe Siphonotreta und eine neue Art. R.	50	373
— — Säugthier-Reste zu Brentford. R.	51	760
— — Notitzen über Thecidea, Talpina, Cliona. R.	53	758
— — Woodwardites Robertsi in der Steinkohle von Worcestershire. R.	59	354
Morris J. u. J. Lycett: Pachyrisma, eine neue Muschel-Sippe aus Oolith. R.	53	114
— — — — „Mollusca from the Great Oolite, I. Univalves". R.	53	232
— — — — Mollusca from the Great Oolite, of Minchinhampton, II. R.	54	764
— — — — the Mollusca from the Great Oolite, III. R.	57	742
Mortillet, G.: Veränderungen der Mollusken-Fauna um Genf. R.	52	512
— — die Kohlen-Pflanzen mit Lias-Thieren zu Petit-Coeur. R.	54	109
— — „Géologie de la Savoye", 4°. R.	56	66
— — „Histoire de la Savoye avant l'homme", Annecy 8°. R.	56	213
Moser, J.: Salpeter-Distrikte in Ungarn. R.	54	216
— — zerlegt einen Thon von Wiesloch unweit Heidelberg. R.	54	709
— — zerlegt Oligoklas von Wolfach im Kinzig-Thale. R. R.	54	823
— — Oligoklas von Wolfach in Baden. R.	55	833
— — Zusammensetzung des Nil-Schlamms. R.	57	168
Moulet: zwei fossile Helix-Arten. R.	57	623
Mousson, A.: „die Gletscher der Jetztwelt" Zürich 1854. R.	55	79
Mulder: über das Banka-Zinn. R.	50	446
Müller: Porphyr-Vorkommen bei Lössnitz. R.	54	210
— — Pseudomorphosen von Braun- nach Kalk-Spath und von Kupfer- nach Mangan-Kies zu Freiberg. R.	55	69
— — fortdauernde Schwefelsilber-Bildung in Drusenräumen. R.	56	440
— — Nickel-haltiger Magnetkies von Snarum in Norwegen. R.	58	825
— — Erz-Gänge bei Gablau in Niederschlesien. R.	59	210
— — Porphyr-Gänge im Öderan und Augustusburg. R.	59	744
Müller, Aler.: über das tesserale Krystall-System. R.	52	618
— — Vanad-Gehalt Württembergischer Bohnerze. R.	53	64
— — Eisenkies-Druse von Bretzwyl in Basel. R.	52	489
— — Krystalle schwefelsauren Strontians. R.	54	75
— — Einige Pseudomorphosen aus dem Teufelsgrunde im Münsterthale im Breisgau. A.	55	411
— — Vorkommen von Chlor-Kalium am Vesuve. R.	55	698
— — Entstehung der Eisen- und Mangan-Erze im Jura. R.	55	856
— — Kupfer-Grube am Oberen See in Michigan. R.	57	79, 589
— — Vorkommen von Mangan-Erzen im Jura. R.	57	168
— — Pseudomorphose von Brauneisenstein nach Granat. R.	58	213
— — Brandisit pseudomorph nach Fassait in Tyrol. R.	58	692
— — pseudomorpher Brookit nach Titanit aus den Vogesen. R.	58	820
Müller, Fr.: neues Steinsalz-Lager bei Bayonne. R.	55	365
Müller, H.: merkwürdige Drusen auf einem Schneeberger Kobalt-Gang. R.	50	847
— — das Gneiss-Gebirge um Annaberg. B.	50	592
— — mineralogische Verhältnisse von Tischenreuth, Oberpfalz. R.	53	363
— — Nontronit von Tischenreuth in der Oberpfalz. R.	54	819
Müller, Joh.: Lycoptera Middendorffi, ein Knochen-Fisch aus Sibirien. R.	51	768
— — fossile Fisch-Sippen mit lebenden übereinstimmend. R.	53	123
— — neue Beiträge zur Kenntniss der Zeuglodonten. R.	53	242

	Jahrg.	Seite
Müller, Joh.: Delphinopsis ein neues Cetaceum von Radoboj. R. .	1853	627
— — über die Krinoideen. R.	54	229
— — zu Delphinopsis Freyeri. R.	55	500
— — über die Polycystinen. R.	56	127
— — neue Krinoideen aus Eifeler Kalk. R.	56	631
— — Lepidocentrus, ein Echinoidee mit Schuppen-Nähten, aus der Eifel. R.	56	636
— — neue Echinodermen des Eifeler Kalkes. R.	57	860
— — Echinodermen der Rheinischen Grauwacke u. Eifeler Kalke. R.	58	370
Müller, Jos.: „Petrefakte der Aachener Kreide-Formation", I, II. R.	52	111
Müller, L.: Vorkommen von Hyalit auf Quarz und Serpentin bei Jordansmühl in Schlesien. A.	50	418
Münichsdorfer, Fr.: der Hüttenberger Erzberg in Kärnthen. R. . .	55	713
Murbach: Wirkung des Magnetes auf Krystalle. R.	51	450
Murchison, R. I.: plutonische und vulkanische Gebirge im Kirchenstaate. R.	50	231
— — Wirbelthiere in älteren Formationen; Gold in Kalifornien und Australien. B.	52	199
— — über das silurische System. R.	52	344
— — paläolithische Bildungen in Schottland. R.	56	354
— — das Treibholz im arktischen Archipel. R.	56	464
— — Alter der Fisch-Reste von Ludlow. R.	58	624
— — Gebirgsarten-Folge im N. Hochlande bis zum Old red. R. . .	59	337
— — Silur-Gesteine und -Versteinerungen in Norwegen und den Russisch-Baltischen Provinzen. R.	59	339
Murray, A.: Fossil-Reste von der Vancouver's Insel. R.	58	384
Muspratt, Sh.: Löthrohr-Reaktionen von Baryt, Strontian etc. R. . .	51	198

N.

Naumann, C. F.: über Sächsische Kreide, gegen Beyrich. B. . . .	50	306
— — Krystall-Form des Zink-Arseniates. R.	50	445
— — neuere Formationen von Gneiss und krystallinischem Schiefer. A.	51	513
— — über Bruchhausen's Hochwasser-Theorie. B.	51	570
— — neue Interpretation der Turmalin-Analysen. R.	53	843
— — das Leipziger Braunkohlen-Becken ist von meerischer Bildung R.	54	227
— — geognostische Instruktions-Reise in Italien; Elba, Florenz; Jaspisse, Serpentine u. s. w. B.	55	45
— — über die Krystall-Reihe des Quarzes nach Descloizeaux. A. . .	56	140
— — Bildung der Sächsischen Granulit-Formation. R.	57	722
— — Ergebnisse über den Ilfelder Melaphyr (S. 145). B.	58	808
— — über die Melaphyre von Ilfeld am Harze. B.	59	56
Nauck: Basalt-Durchbruch und Phosphorit in der Oberpfalz. R. . .	54	722
— — über Quarz-Zwillinge. R.	56	190
Nendtvich, C. M.: chemische Untersuchung der Kohlen Ungarns. R. .	50	339
Nessler u. Fischer: Eusynchit, neues Vanadin-Mineral von Freiberg. R.	55	570
Netwald, J.: zerlegt Jod- und Brom-haltiges Wasser von Hall. R. .	55	834
Neubauer, C. u. A. Dollfus: Zerlegung Nassauischer Schaalsteine. R.	57	163
Neugeboren, J. L.: Foraminiferen im Tegel von Ober-Lapugy. R. . .	52	630
— — Elephanten-Stosszahn im Rothenburger Passe. R.	52	631
— — tertiäre Squaliden-Zähne von Talmatsch in Siebenbürgen. R. .	53	110
— — Tegel-Mollusken von Ober-Lapugy in Siebenbürgen. R. . . .	56	479
— — die Stichostegier von Ober-Lapugy, Wien 1857, 4°. R. . . .	57	376
— — tertiäre Petrefakten im Wiener Becken und zu Lapugy. B. .	57	419
Newberry, J. S.: Fische aus der Steinkohlen-Formation des Ohio-Staates. R.	57	341

	Jahrg.	Seite
Newberry, J. S.: neue Fisch-Sippen und -Arten im Kohlen-Gebirge. R.	1857	626
— — Geologie von Nord-Californien und Oregon. R.	58	103
— — neue devonische Fische aus dem Ohio-Staate. R.	58	117
— — Entstehungs-Art der Cannel-Kohle. R.	58	852
Nicholson u. Price: zerlegen die „Brass"-Eisenerze aus Süd-Wales. R.	57	586
Nicklès, J.: Ursache der Veränderlichkeit der Krystall-Winkel. R.	50	620
— — über die dimorphen Körper. R.	51	693
— — Fluor in Mineral-Wassern von Plombières, Vichy und Contréxeville. R.	57	578
— — Vivianit in Menschen-Knochen. R.	57	581
Niederrist: die Mumien von Venzone. A.	52	687
— — geognostisch-bergmännische Beschreibung des Blei- und Galmei-Bergbau's zu Raibl in Ober-Kärnthen, Tf. 6. A.	52	769
Nieszkowski: silurische Trilobiten der Ostsee-Provinzen. R.	59	120
— — Eurypterus remipes auf Ösel. R.	59	759
— — zur Monographie der Trilobiten der Ostsee-Provinzen. R.	59	864
Nilsson: über die Hebung Skandinaviens. R.	50	477
— — die fossilen Ochsen-Reste R.	51	256
— — Saurier und Fische in Schoonens Kreide-Formation. R.	57	625
Nodot, L.: trennt Schistopleuron von Glyptodon. R.	56	107
Nöggerath: Imprägnation der Nebengesteine durch Erz-Gänge. R.	50	100
— — Meteoreisen aus Mexiko mit Widmanstädt'schen Figuren. R.	53	174
— — Erdbeben, ihre Bewegung und Propagations Form. R.	53	371
— — Sammlung von Diamanten im Wiener Mineralien-Kabinet. R.	54	72
— — eigene Gestalt des Olivins im Basalte von Unkel. R.	54	91
— — Holz aus einer Rheinischen Braunkohlen-Grube. R.	54	364
— — pseudomorphe Krystalle in der jungen Sinter-Zeche bei Siegen. R.	54	710
— — eine durch die Versteinerungs-Masse interessante Koralle. R.	54	719
— — Geschiebe mit Eindrücken in Konglomeraten. R.	54	836
— — Vorkommen neuer und schöner Mineralien. R.	55	351
— — Gemenge von Blei, Bleiglätte, Bleiglanz und Bleiweiss. R.	55	449
— — natürliche Mennige. R.	55	466
— — verschieden-farbiger Granat in Blöcken am Laacher See. R.	55	570
— — poröses Quarz-Gestein bei Namur. R.	55	733
— — Beobachtungen über die Erdbeben i. J. 1853. B.	55	808
— — Gediegen-Blei und natürliche Bleiglätte von Vera Cruz. R.	56	40
— — „die Erdbeben im Visp-Thale i. J. 1855". R.	56	51
— — Mittheilungen verschiedenen Inhaltes. R.	56	185
— — über J. C. Warren's „Mastodon giganteus of N.-America" R.	56	498
— — Holz-Bauwerk unter der Oberfläche einer Braunkohlen-Grube bei Cöln. R.	56	567
— — Knochen-Höhlen im Reg.-Bezirke Arnsberg. R.	56	574
— — Diorit zu Kürenz bei Trier. R.	56	711
— — amorpher schwarzer Diamant aus Brasilien. R.	57	64
— — Pholerit oder Nakrit. R.	57	70
— — zu Volger's Untersuchungen über das Erdbeben von 1855. R.	57	95
— — eigenthümliches kohlensaures Zink-Oxyd (Zinkblüthe). R.	57	325
— — Vorkommen der Trachyte in Ungarn. R.	57	347
— — eiserne Bomben im Rhein bei Bonn gefunden. R.	57	453
— — Hypudaeus-Knochen, Scheffel-weise im Boden der Eifel. R.	57	495
— — Harmotom im Basalt des Siebengebirges. R.	57	582
— — krystallisirter Arsenik-Nickel von Sangershausen R.	58	311
— — das Erdbeben im Siebengebirge am 6. Dez. 1856. R.	58	321
— — neuer Fundort des Wavellit's bei Dillenburg. R.	58	688
— — Erscheinungen an Chalcedonen aus Melaphyr-Mandeln. R.	58	819
— — über Senarmontit von Aïn Beïda in Algerien. R.	58	822

	Jahrg.	Seite
Nöggerath: Opal in Gallert-artigem Zustande. R.	1858	828
— — über Wüstemann's geologisches Relief der Rosstrappe. R.	58	843
— — faseriger Aragon, sogen. Eisenblüthe aus Steyermark. R.	59	204
— — Veränderung eines im Meersande bei Ostende eingerammten Pfahls. R.	59	311
— — Römische Marmor- u. a. Bau-Steine in Trier. R.	59	741
Nordenskiöld: Krystall-Form des Graphits. R.	56	351
— — Krystall-Form des Chondrodits. R.	56	704
— — Demidovit ein neues Mineral vom Ural. R.	57	443
— — Lazurstein und seine Begleiter in der Bucharey. R.	58	688
— — zerlegt Demidowit aus dem Ural. R.	58	818
Nordenskjöld, A. E.: in Finnland vorkommende Mineralien. R.	58	312
— — Kassiterit (Zinnerz) von Pitkäranta. R.	58	466
— — Orthit von Laurinkari bei Abo. R.	58	573
— — Tantalit-Arten von Kimito und Tammela. R.	58	830
Nordmann, A. de: Paléontologie du sud de la Russie, Livr. I, II, 1858. R.	59	861
North, E. D.: die „Blut-Quelle" in einer Höhle von Honduras. R.	55	363
Norwood, J. G.: permisches Gebirge in Illinois. R.	58	716
Norwood, J. G. u. Owen: protozoische Kohlen-Formation in Kentucky. R.	50	224
Norwood u. Pratten: Productus-Arten der W.-Staaten Nord-Amerikas. R.	56	381
— — — — Chonetes-Arten der W.-Staaten N.-Amerikas. R.	56	383
— — — — neue Mollusken der Steinkohlen-Formation. R.	57	116
Noulet, J. B.: Obereocän-Gebirge als ein Theil des Pyrenäen-Baues. R.	59	748
Novicki, K. v.: Kochsalz-Vorkommen in Böhmen. R.	55	858

O.

Oldham: Geologie der Grafschaft Wicklow. R.	50	494
Omboni, J.: die Sediment-Gesteine der Lombardei. R.	56	215
— — neue Übersicht der Gebirgs-Bildung Italiens. R.	58	87
Oppe, H. V.: Zinn- und Eisen-Gänge im Eibenstocker Granit. R.	53	721
Oppel, A.: Ammonites planorbis Sow. (A. psilonotus Qu.) mit seinem Aptychus. R.	56	378
— — Acanthoteuthis antiquus zu Gammelshausen bei Boll. R.	56	378
— — „Jura-Formation Englands, Frankreichs und S.-W.-Deutschlands", I. R.	56	452
II. R.	56	850
— — Pterodactylus im Lias Württembergs. R.	58	116
— — Kössener-Schichten in Schwaben und Luxemburg. R.	58	352
— — die Jura-Formation etc. III et IV, 1858, 8°. R.	58	482
— — Zone der Avicula contorta in Schwaben und nach Martin in Burgund. R.	59	452
Oppel u. van Groningen: Kiesel-Aluminit bei Stuttgart. R.	54	193
Oppel, A. u. E. Suess: Äquivalente der Kössener Schichten in Schwaben. R.	57	91
Oppermann. Ch. T.: analysirt Mineral-Wasser von Sulzbach. R.	54	184
d'Orbigny, A.: über lebende und fossile Mollusken. R.	50	748
— — Fossil-Reste im Terrain danien oder pisolithique. R.	51	100
— — „Prodrome de Paléontologie" Paris 12°, I, II. R.	51	239
— — geologische Entwickelungs-Folge des Thier-Reichs. R.	51	631
— — geologische Medien der Existenz der Thiere. R.	51	633
— — Zeit des Erscheinens der Thier-Ordnungen. R.	51	633
— — Klassifikation der Brachiopoden, II. Cirrhidae. R.	53	239
— — Klassifikation der Bryozoen-Mollusken. R.	54	113
d'Orbigny, Ch.: Schichten zwischen Kreide und plastischem Thon bei Paris. R.	57	732

	Jahrg.	Seite
Orsini u. Spada Lavini: Geologie der Apenninen Zentral-Italiens. R.	1857	203
Osann, B.: Kupferkies-Überzug über Fahlerz-Krystallen auf Gängen. R.	53	180
Osann, G.: einfaches Verfahren das spezifische Gewicht fester Körper zu bestimmen. R.	59	820
Oschatz: mikroskopische Struktur des körnigen Kalkes. R.	56	50
— — mikroskopische Struktur des Carnallits. R.	57	720
Oswald: silurische Seeschwämme (Spongien). R.	51	757
— — Disthen in einem Gneis-Geschiebe bei Öls. R.	56	194
Otto, E. v.: „Additamente zur Flora des Quader-Gebirges von Dresden". R.	52	895
Ouchakow: zerlegt Pelicanit aus dem Gouvt. Kiew. R.	58	828
— — Zerlegung des Pelicanits von Kiew. R.	59	450
Owen, D. D. u. Norwood: protozoische Kohlen-Formation in Kentucky. R.	50	224
Owen, D. D.: geologische Forschungen im Gebiete von Wisconsin. R.	50	227
— — Thalit vom N. Ufer des Lake superior. R.	53	466
— — „Geological Survey of Wisconsin; Iowa, Minnesota and the Nebrasca Territory", Philadelphia 1853, 8°. R.	53	480
— — neues Mineral vom Kettle-Fluss in Minnesota. R.	54	445
— — Geologie im N.-W. und oberen Becken des Mississippi's. R.	54	829
— — „Geological Survey of Wisconsin, Iowa" etc. 1853, 8°. R.	55	488
— — „the Geological Survey of Kentucki, 1854—1855". R.	57	729
Owen, R.: fossile Riesen-Vögel Neu-Seelands. R.	50	125
— — über Roger's Reptilien-Reste im Grünsande New-Jersey's. R.	50	255
— — die ungeflügelten Riesen-Vögel Neu-Seelands. R.	51	373
— — „History of British fossil Reptiles", London 4°, I—III. R.	52	379
— — über Reptilien-Fährten im Potsdam-Sandsteine Canada's. R.	52	981
— — eocäne Säugthier-Reste von Hordwell. R.	52	1000
— — Pterodactylus-Arten der Englischen Kreide. R.	53	106
— — Vergleichungen des Skelett-Baues von Megatherium. R.	53	215
— — fossiler Batrachier im Britischen Kohlen-Schiefer. R.	53	623
— — Beschreibung neuer Nesodon-Arten.	53	757
— — Geologie des Schaafes R.	54	112
— — Eier und Junge von Apteryx. R.	54	496
— — Spalacotherium, eine Nagethier-Sippe der Purbeck-Formation. R.	54	620
— — ein Reptil (Baphetes) in der Pictou-Kohle Neuschottlands. R.	54	633
— — „the Chelonian Reptiles of the Wealden Clays and Purbeck Limestones" London 1853, 4°. R.	54	753
— — Reptilien- und Säugthier-Reste in Purbeck-Schichten. R.	55	237
— — ein Labyrinthodonten-Schädel aus Zentral-Indien. R.	55	254
— — Coccoteuthis latipinnis in Oberoolith-Schiefern von Kimmeridge. R.	55	607
— — Reptilien aus Purbeck-Schichten von Swanage. R.	56	110
— — Schädel von Dicynodon tigriceps aus Süd-Afrika. R.	56	105
— — Schädel von Prorastomus sirenoides in Jamaica's Tertiär-Schichten. R.	56	106
— — über einige Säugthiere im Red Crag Suffolks. R.	56	491
— — die Verwandtschaft des Gastornis Parisiensis. R.	56	501
— — Dichodon cuspidatus von Wight und Hordwell. R.	56	760
— — Fossil Reptilia of the Wealden; II. Dinosauria. R.	57	105
— — Dinornis elephantopus n. sp. aus Neuseeland. R.	57	108
— — Stereognatus oolithicus, ein Säugthier von Stonesfield. R.	57	109
— — Bubalus moschatus in Kies-Schichten von Berks. R.	57	222
— — Scelidotherium leptocephalum von Buenos Ayres. R.	57	379
— — die Verwandtschaft von Stereognathus oolithicus. R.	57	383
— — über den Schädel von Megatherium Americanum. R.	57	761
— — Monograph of the Wealden Reptilia, III. Megalosaurus. R.	57	850
— — Wiederkäuer und eingeborne Rinder-Art Grossbritanniens. R.	57	867

	Jahrg.	Seite
Owen, R.: Placodus Andriani ist ein Reptil. R.	1858	128
— — Dichobune ovina aus ober-eocänen Schichten von Wight. R. .	58	236
— — Laophis crotaloides: ein fossiler Ophidier von Salonichi. R. .	58	383
— — Beine von Dinornis struthionides und D. gracilis. R.	58	618
— — die Krokodilier der Oolithe. R.	58	759
— — die Mittelformen zwischen Reptilien und Fischen. R . . .	58	760
— — über die Enaliosauri. R.	58	867
— — Schädel und Zähne von Placodus deuten einen Saurier an. R.	59	128
— — vordre Extremitäten der Megatherium Americanum. R. . . .	59	239
— — Megalania, eine tertiäre Riesen-Echse Australiens. R. . . .	59	239
— — Pliolophus, ein Lophiodonte aus Londonthon von Harwich. R.	59	240
— — Schädel des Zygomaturus trilobus M'C. aus Australien. R. .	59	243
— — Nothotherium- u. a. fossile Knochen aus Australien. R. . .	59	244
— — von Beckles aufgefundene Hinterfuss-Knochen des Iguanodon. R.	59	509
— — über Dimorphodon, eine neue Pterodactylus-Sippe des Lias und die geologische Verbreitung der Flieg-Reptilien überhaupt. R.	59	636
— — Thylacoleo carnifex in Tertiär-Konglomerat Australiens. R. .	59	756

P.

Pacht, R.: geognostische Untersuchungen zwischen Orel, Woronesch und Simbirsk im Jahr 1853. R.	59	846
Page: Kruster vom Fusse des Old red in Schottland. R.	56	598
— — pleistocäne Phoca in Fife, Schottland. R.	57	877
— — Paläontologie der silur-devonischen Tilestones Schottlands. R.	59	507
Paillette, A.: Fluss-Geschiebe und Kohlen-Formation in Asturien. R.	51	471
Paillette, A. u. Schulz: Zinnerz-Lagerstätten in Spanien. R. . . .	50	710
— — — — Ballesterosit ein Zinn-haltiger Kies. R.	51	350
Palacky, J.: Einsenkung von Zentral-Australien. R.	58	81
Pander, Chr. H.: silurische Fische in den Russisch-Baltischen Gouvernements. R.	58	110
— — „die Plakodermen des devonischen Systems in Russland". R. .	58	248
Papon, J.: Val Tuoi in Graubündten. R.	59	97
Paravay, de: Aepyornis in Afrika. R.	57	125
Pareto, L.: Nummuliten-Gebirge am Fusse der Apenninen. R. . .	56	91
Parolini, A.: Erscheinungen an Quellen im Brenta-Thale. R. . . .	59	200
Parran: Sekundär-Formationen um St-Affrique, Aveyron-Dept. R. .	57	612
Partsch u. Wöhler: Meteoreisen von Rasgatà in Neu-Granada. R. .	53	54
Pasteur, L.: Wachsen der Krystalle und Ursachen ihrer Sekundär-Formen. R.	57	74
Patterson: Gold, Platin und Diamanten in den Vereinten Staaten. R.	51	351
Payerne: Auflöslichkeit der Luft im Meer-Wasser R.	57	472
Pearce, J.: Kalkspath-Krystalle von der Küste Afrikas. R.	54	343
Pechi: Analysen Toskanischer Kupferglanze. R.	54	188
— — Analyse des Marmatits. R.	54	190
— — Analyse von Antimon-Blüthe. R.	54	192
— — zerlegt Pikranalzim aus Toskana. R.	54	818
— — zerlegt krystallisirtes Fahlerz aus Tokana. R.	54	824
— — zerlegt Pikrothomsonit aus Toskana. R.	55	76
— — zerlegt Bleiglanze aus Toskana. R	55	450
— — Analyse Toskanischer Kupferkiese. R.	55	699
— — Bor-Verbindungen der Soffionen Toskana's. R.	55	834
— — Humboldtit oder Datolith aus Toskana. R.	56	349
— — zerlegt Schneiderit aus Toskana. R.	56	349
— — Savit aus dem Toskanischen. R.	56	689
— — Sloaneit von Monte Catini in Toskana. R.	56	689

	Jahrg.	Seite
Pechi: Portit aus dem Toskanischen. R.	1856	693
— — Zerlegung des Caporcianits. R.	56	844
Peligot, E.: Studien über die Zusammensetzung des Wassers. R.	57	338
Pellico, R.: Silbererz-Lagerstätte bei Hiendelaenzia in Spanien. R.	50	84
Pentland: Charte des Titikaka-See's. R.	50	472
— — Beutelthier-Reste im Bone-bed Englands. R.	59	120
Percy, J.: Zerlegung des Percylith's von la Sonora in Mexiko. R.	52	75
Perrey, A.: Erdbeben sind häufiger während der Syzygien des Mondes. R.	55	732
— — der Vulkan Bibiluto auf Timor. R.	59	197
— — mittle Richtung der Erdbeben in Skandinavien. R.	59	471
Peters, K. F.: tertiäre Schildkröten-Reste aus Österreich. R.	56	484
— — Nerineen im oberen Jura Österreichs. R.	56	763
Peters, K.: Lagerung der oberen Kreide-Schichten in den Ost-Alpen. R.	53	719
— — die Salzburgischen Kalk-Alpen im Saale-Gebiete. R.	55	219
— — krystallinisches Gebirge um Villach, Radenthein u. Kremsalpe. R.	57	449
— — Gyps-Lager zu Längenfeld in Krain. R.	58	219
Petit: Bewegung einer Feuerkugel. R.	54	485
Pettko, J. v.: Tubicaulis von Ilia bei Schemnitz. R.	51	115
Petzholdt, A.: neues brennbares Mineral aus Esthland R.	52	68
— — angebliche Löslichkeit des Quarzes in Zuckerwasser. R.	55	197
Pfaff, Fr.: „Beurtheilung der Weiss'schen Grundgesetze der mechanischen Geologie". A.	56	513
— — Beiträge zur Kenntniss des Fränkischen Jura's, Tf. 1. A.	57	1
— — Erwiderung in Betreff der mechanischen Geologie von Weiss. B.	57	415
Philippi, R. A.: Reise nach Valparaiso; Mineralien und Vulkane Chili's. B.	52	468
— — Besteigung des Pi-sé, auch Vulkan von Osorno oder von Llanquihue genannt, Tf. 5. A.	52	551
— — Ankunft in Valdivia. B.	52	600
— — Zusätze zu Domeyko's Aufsatz über die Solfatara am Cerro Azul und über Lasursteine in Chili. A	52	682
— — Höhe-Bestimmungen am Vulkan von Osorno; Reise-Plane für Amerika. B.	52	941
— — „Handbuch der Konchyliologie und Malakozoologie". R.	53	510
— — ist zu Santiago angestellt für Natur-Geschichte. B.	54	44
— — Anstellung in Santiago; Reise in die Atacama-Wüste; die Cordilleren. B.	54	791
— — Vorkommen des Meteoreisens in der Wüste Atacama. A.	55	1
— — Werk über die Reise in der Atacama-Wüste. B.	56	822
— — geognostische Beschaffenheit der Insel Masafuera, Chile. A.	57	22
— — zur Geographie lebender Mollusken-Arten. R.	57	222
— — Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Formation in Chile. A.	57	404
Phillips, J.: Vergleichung der paläolithischen Malvern-Berge mit andern. R.	52	727
Phillips: neue Plesiosaurus-Art aus Yorkshire. R.	54	381
Phillips, J A.: Analysen alter Münzen und Waffen. R.	54	177
Phipson: marine Tuff-Bildung an der Küste West-Flanderns. R.	57	611
Pichler, A.: zur Geognosie der Tyroler-Alpen. A.	56	661
— — Geologie der NO. Kalk-Alpen Tyrol's. R.	57	616
— — zur Geognosie der Tyroler Alpen. A.	57	689
— — zur Geologie des Kaisergebirges in Tyrol. B.	58	444
— — Gebirgsarten-Suiten aus den Kalkalpen Tyrols verkäuflich. B.	59	276
— — aus dem Inn- und Wipp-Thale R.	59	753
Pictet, F. J.: „Poissons fossiles du Mont Liban, Genève 4°. R.	53	108
— — Matériaux pour la Paléontologie Suisse, Genève I, 1854. R.	54	374
— — Matériaux pour la Paléontologie Suisse, II, 1854. R.	54	639
— — Matériaux pour la Paléontologie Suisse, III. 1855. R.	55	615
— — Matériaux pour la Paléontologie Suisse, IV, 1856. R.	56	599

	Jahrg.	Seite
Pictet, F. J.: Matériaux pour la Paléontologie Suisse, V—VIII. R.	1857	623
— — Kreide-Fische in der Schweitz und Savoyen. R.	58	380
— — Matériaux pour la Paléontologie Suisse [1] IX. R.	58	118
[1] X. R.	58	384
[2] I—II. R.	58	828
— — Matériaux pour la Paléontologie Suisse [1] XI, [2] III, IV. R.	59	123
— — Matériaux pour la Paléontologie Suisse [2] III, IV. R. . . .	59	372
Pictet et Roux: „Mollusques des grès verts de Genève“, I. livr. R.	52	977
— — — — Mollusques des grès verts de Genève, II, III, 4°. R. .	54	249
Pieschel, C.: die Vulkane der Republik Mexiko, Berlin 8°. R. . .	57	610
Piette, E.: die Lias-Sandsteine von Aiglemont und Rimogne. . . .	57	207
— — die Strombiden im Grossoolith NW.-Frankreichs. R.	57	371
— — die untern Jura-Stöcke in den Ardennen- und Aisne-Dept's. R.	57	846
— — Cerithium-Arten im Bathonien der Aisne- und Ardennen-Dpt's. R.	58	379
Pisani, P.: über Löthrohr-Proben. R.	58	829
— — Brennmaterial zu Löthrohr-Versuchen. R.	59	303
Pissis: der Berg Aconcagua in Chili. R.	56	199
— — die Anden in Chili. R	56	571
— — die Hebungs-Systeme in Süd-Amerika. R.	57	731
— — topographisch-geologische Beschreibung von Aconcagua in Chili. R.	59	467
Planer, J.: Vorkommen des Vollbortit's in der Perm-Formation. R. .	50	220
— — Steinkohlen-Lager am West-Abhange des Urals R.	56	572
Plant, J.: der obre Keuper und seine Fossil-Reste in Leicestershire. R.	58	228
Planta, A. v.: Analyse zweier Kalksteine der Flysch-Formation. R.	59	443
Plattner, C. F.: Analyse des Enargits. R.	52	67
— — die Braunkohlen-Formation in Brandenburg. R	54	89
— — Verhalten Quecksilber-haltigen Eisenkieses von Idria. R. . .	54	823
— — eigenthümliches Korallenerz von Idria. R.	56	196
Plieninger, Th.: über Geosaurus maximus bei Ulm. R.	50	128
— — über Amphicyon in Württemberg. R.	51	512
— — „Belodon Plieningeri aus der Keuper-Formation. R.	57	751
Pohl, J. J.: zerlegt Mutterlauge der See-Saline von Pirano. R. . .	57	829
Pohl u. Schrötter: Analyse von Seesalz. R.	53	184
Pokorny u. v. Ettingshausen: Naturselbstdruck zur Darstellung von Pflanzen. R.	56	478
Pomel, A.: kritische Note über Palaeotherium. R.	50	747
— — Elotherium magnum, eine neue Pachydermen-Sippe. R. . .	50	756
— — Klassifikation lebender und fossiler Hufethier-Sippen. R. . .	50	866
— — Fuss-Bildung von Anoplotherium und Hyaemoschus. R. . . .	53	754
— — die Berge der Beni-bou-Said an der Grenze Marokko's. R. .	55	583
— — Eintheilung des Tertiär-Gebirges in Frankreich. R.	54	608
— — „Catalogue des vertèbrés fossiles etc. de la Loire“, Paris 1854, 8°. R.	55	370
Ponzi: über die Emporhebung der Apenninen. R.	53	618
Poey, A.: die Erdbeben auf Cuba von 1851—1856. R.	58	598
Porth, E: Kupfer-Erz im Rothliegenden des NW. Böhmens. R. . .	57	347
— — Melaphyre im Rothliegenden auftretend. R.	57	347
— — Melaphyr, Porphyr und Basalt im Rothliegenden Böhmens. R.	59	485
Posselt, L.: Gebirge und Bergbau von Zacatecas. B	50	317
— — die Kupfer-Distrikte am Lake superior. A.	56	1
Potyka, J.: ein neues Niob-haltiges Mineral. R.	59	732
— — Arsenik-Kies von Sahla in Schweden. R.	59	815
Prado, C. de: Geologie der Provinz Madrid. R.	54	845
Pratten u. Norwood: Productus-Arten der W. Staaten N.-Amerikas. R.	56	381
— — — — Chonetes-Arten der W. Staaten N.-Amerikas. R. . .	56	383
— — — — neue Mollusken der Steinkohlen-Formation. R. . . .	57	116
Prediger, C.: geognostische Beobachtungen am südlichen Harze. R. .	56	203

	Jahrg.	Seite
Prestel: Krystall-Struktur des Meteoreisens als Kriterium. R. . .	1856	439
Prestwich: das Englisch-Französisch-Belgische Eocän-Becken. R. . .	59	228
Prettner, F.: Höhen-Bestimmungen in Kärnthen. R.	53	609
Prevost, C.: Wechselbeziehungen zwischen den Richtungen der Gebirgs-Systeme. R.	51	99
— — Grabungen nach miocänen Knochen zu Sansan. R.	51	763
— — Palaeornis, ein Riesen-Vogel in Tertiär-Kalk. R.	55	376
Price u. Nicholson: zerlegen die „Brass"-Eisenerze aus Süd-Wales. R.	57	586
Prinzinger u. Lipold: Geologisches vom Salzberge bei Hall. R. . .	56	360
Prokesch-Osten, v.: versteinerte Holz-Stämme auf Lesbos. R. . .	54	862
Puggaard, Ch.: Übersicht der Geologie der Insel Möen. A.	51	791
Pumpelly, R.: Gletscher-Überreste auf der Jnsel Corsica (m. 1 Tfl.). A.	58	273

Q.

Quadrat: Zerlegung der Heilquelle von Sternberg. R.	52	74
Qualen, W. v.: grosser Salz-Stock in der Kirkisen-Steppe. R. . . .	50	76
Quarz in Schwefel-Gruben Siciliens. R.	53	695
Quatrefages de: Scolicia prisca, ein Annelide aus Kreide. R. . . .	51	753
Queckett, J: mikroskopische Struktur der Boghead-Cannelkohle. R.	54	636
Quenstedt, Fr. A.: über die Gaviale im Lias von Württemberg. B. .	50	319
— — die Mastodonsaurier im Keuper Württembergs, 4°. R. . . .	51	251
— — über Mecochirus u. a. Krebse im braunen Jura. R.	51	511
— — Hippotherium in den Bohnerzen Württembergs. R.	52	359
— — zu den Belemniten. A.	52	641
— — Menschen-Zähne in Württemberger Bohnerzen. R.	53	250
— — Bemerkungen über die Knochen von Fronstetten. B.	53	251
— — Pterodactylus Württembergicus n. sp. aus lithographischem Kalksteine von Nusplingen. B.	54	570
— — die Gaviale und Ichthyosauren des Schwäbischen Jura's. A. .	55	421
— — Pterodactylus Suevicus in lithographischen Schiefern Württembergs. R.	55	614
— — Pentacrinus colligatus aus Nummismalen-Mergel. R.	56	605
— — „der Jura", I. Lief., Tübingen 1856. R.	56	741
— — über Gaviale und Pterodactylus Württembergensis. R. . . .	57	112
— — „Sonst und Jetzt, populäre Vorträge über Geologie". R. . .	57	180
— — die Rücken-Höhle in der Schaale gewisser Ammoniten (der Dorsocavati). A.	57	544
— — Scheidewand-Loben gewisser Ammoniten; über einige Glieder des Württembergischen Jura's. B.	58	448
— — über Pterodactylus liasicus R.	58	507
Quiquerez, A.: Bohnerz-Gebilde im Jura. R.	56	572

R.

Ragsky, Fr.: die Herkules-Bäder im Banate. R.	53	591
Rammelsberg, C.: Untersuchung von Breithaupt's Thuringit. R. . .	50	58
— — Zerlegung der Chabasie. R.	50	60
— — Zerlegung des Meteorsteins von Juvenas. B.	50	63
— — Zusammensetzung des Hisingerits. R.	50	339
— — zerlegt die Quell-Absätze des Alexisbades am Harz. R. . . .	50	346
— — Wismuth-Spath aus Süd-Carolina. R.	50	450
— — Identität von Arkansit und Brookit. R.	50	453
— — Mineral-Theile in Laven mit Meteoreisen verglichen. R. . .	50	456
— — Zusammensetzung des Schorlamit's aus Arkansas. R. . . .	50	618
— — wahre Zusammensetzung des Chlorits. R.	50	691
— — über den Hyposklerit von Arendal. R.	50	849

	Jahrg.	Seite
Rammelsberg, C.: Zusammensetzung des Turmalins etc. R. . . .	1851	595
— — zerlegt Meteoreisen von Seeläsgen bei Schwiebus. R. . . .	51	696
— — zerlegt Kupferglimmer von Andreasberg R.	51	708
— — Untersuchung des Nemalith's von Hoboken, N.-Jersey. R. . .	52	66
— — Orthit von East-Bradford in Pennsylvanien. R.	52	70
— — zerlegt Epidot und Orthit. R.	52	78
— — Analyse des Meteoreisens von Seeläsgen. R.	52	211
— — Mineral-Gemengtheile insbesondre Isländischer Laven, verglichen mit denen ältrer Gebirgsarten und Meteorsteine. R.	52	315
— — über das chemisch gebundene Wasser in Feldspath-Gesteinen. R.	52	326
— — Zerlegung von Augit und Hornblende aus Basalt-Tuff. R. . .	52	851
— — Analyse des Meteorsteins von Schwetz R.	52	863
— — über Petalit und Spodumen. R.	53	53
— — Bleihornerz und Matlockit aus Derbyshire. R.	53	173
— — Rhodonit oder Fowlerit aus N.-Amerika. R.	53	176
— — krystallogr.-chemisches Verhalten des Humits und Olivins. R. .	53	176
— — Zusammensetzung des Epidots. R.	53	182
— — der Pseudo-Apatit Breithaupt's ist Apatit. R.	53	184
— — Schorlamit aus Arkansas. R.	53	452
— — Selenquecksilber vom Harze. R.	53	601
— — Mesolith von Hauenstein und Thomsonit; krystallographische Untersuchungen. B.	53	680
— — Analyse des Meteorsteins von Stannern. R.	53	699
— — zerlegt Kieselkupfer von Chile R.	53	839
— — Triphyllin von Bodenmays. R.	54	177
— — Verhältnisse, worin isomorphe Körper zusammen-krystallisiren und dessen Einfluss auf die Krystall-Form. R.	54	702
— — zerlegt Mimetisit oder Kampylit aus Cumberland. R.	54	817
— — Zerlegung des Polyadelphits. R.	55	70
— — zerlegt Zinnkies. R.	55	72
— — zerlegt Eisensinter von Schwarzenberg. R.	55	74
— — Dolerit vom Meissner. R.	55	198
— — zerlegt Andesin von Marmato. R.	55	447
— — chemische Untersuchung des Vesuvians. R.	55	451
— — Granat von Haddam in Connecticut. R.	55	701
— — Thomsonit, Comptonit und Mesolith von Hauenstein. R. . .	55	707
— — eingliederiger Feldspath. R.	55	832
— — Chiviatit aus Peru. R.	55	835
— — Helvin aus Zirkon-Syenit Norwegens. R.	55	837
— — Speiskobalt von Riechelsdorf in Chur-Hessen. R.	56	43
— — Boronatrokalzit aus Süd-Amerika. R.	56	563
— — Krystall-Form des Mejonits vom Vesuv. R.	57	175
— — Identität von Leukophan und Melinophan. R.	57	583
— — Zusammensetzung des Beudantits von Cork. R.	57	711
— — Form und Zusammensetzung von Vanadin-Blei. R.	57	716
— — über Völknerit und Hydrotalkit. R.	57	833
— — zerlegt Steatit von Snarum. R.	57	835
— — Leuzit und seine Zersetzungs-Produkte. R.	58	69
— — die Silikate als Bestandtheile krystallinischer Gesteine. R. .	58	697
— — krystallographisch-chemische Beziehungen zwischen Augit, Hornblende und verwandten Mineralien. R.	58	683
— — Analzime von den Cyclopen-Inseln und Aussig. R.	59	303
— — oktaedrischer Eisenglanz vom Vesuv; Magneteisen durch Sublimation. R.	59	731
Rammelsberg, C. u. Zinken: zerlegen Apophyllit vom Harz. R. . .	50	68
— — — — zerlegen Epichlorit vom Harz. R.	50	215

	Jahrg.	Seite
Rammelsberg, C. u. Zinken: über Scheeleit vom Harz. R. . . .	1850	346
— — — — das Gänseköthig-Erz vom Harze. R.	50	349
— — — — über die Fahlerze vom Harz. R.	50	692
— — — — zerlegen Wollastonit vom Harze. R.	50	846
— — — — das Arseniksilber vom Harze. R.	51	197
— — — — zwei Nickel-Erze der Antimon-Grube zu Wolfsberg. R.	51	348
— — — — Strontian und Schwerspath von Köthen. R.	51	353
— — — — über den Bournonit vom Harze. R.	52	701
Ramann, G.: die Erd-Bildung. R.	54	108
Ramsay: paläolithische Gletscher in Gross-Britannien. R.	55	216
Rath, G. vom: analysirt Wernerit und dessen Zersetzungs-Produkte. R.	55	196
— — chemische Untersuchung einiger Grünsteine Schlesiens. R. .	56	699
— — Quecksilber-reiches Fahlerz aus Ober-Ungarn. R.	57	67
— — pseudomorpher Glimmer von Lomnitz. R.	57	71
— — gelber Apatit von Miask im Ural. R.	57	330
— — chemische Zusammensetzung zweier Phonolithe. R.	57	583
— — ein Profil der Bündtner Alpen. R.	57	726
— — Zusammensetzung der Phonolithe von Zittau. R.	57	836
— — interessante Quarz-Krystalle von Zinnwald im Erzgebirge. R.	58	72
— — das Gebirge um Santa Caterina in Sondrio. R.	58	83
— — Beobachtungen am Bernina und in Oberhalbstein in Graubündten. R.	58	337
— — über syenitische u. a. Gebirgsarten Bündtens. R.	58	339
— — die Basalt-Kuppe Scheidsburg bei Remagen. R.	58	835
— — Tennantit aus Cornwall. R.	59	294
— — nachträgliche Bemerkungen über das Bernina-Gebirge. R. . .	59	481
— — Apatit-Krystalle aus dem Pfitsch-Thal in Tyrol. R.	59	625
— — zur Kenntniss der fossilen Fische des Plattenbergs in Glarus. R.	59	862
Ratzeburg: Arten-Reichthum unsrer heutigen Wälder in gemässigtem Klima. R.	59	384
Raulin, V.: geologische Verhältnisse der Insel Creta. R.	50	475
— — das pyrenäische Nummuliten-Gebirge. R.	50	486
— — Tertiärgebirgs-Durchschnitte an der Gironde, Garonne u. s. w. R.	53	71
— — das Tertiär-Gebirge Aquitaniens. R.	53	73
— — mittles Kreide-Gebirge im Yonne-Dept. R.	55	207
Raulin, V. u. Delbos: tertiäre Ostrea-Arten Aquitaniens. R. . . .	57	383
Realey: Zinnober-Erz aus Neu-Almaden, Californien. R.	54	183
Redfield, W. C.: der Sandstein mit fossilen Fischen in Connecticut. R.	57	87
Reeve: eine Voluta-Familie des London-Thones lebend entdeckt. R.	50	512
Regnault: Zusammensetzung der atmosphärischen Luft. R.	54	817
Reich: neue Versuche über die mittle Dichte der Erde. R.	53	617
— — Kupfererz-Gang der Mürtschen-Alp in Glarus. R.	58	476
— — Zinn-Gruben auf Banka. R.	59	743
Reich u. Cotta: Einwirkung schwacher Säuren auf übereinandergehäufte Kalkstein-Geschiebe und Hervorbringung gegenseitiger Eindrücke zwischen denselben. R.	59	813
Reichardt, C.: „die chemischen Verbindungen der unorganischen Chemie". R	58	682
Reichenbach, R. v.: zerlegt Braunkohle von Rietzing bei Ödenburg R.	58	468
— — analysirt verwitterten Sphärosiderit aus Mähren. R.	58	468
— — zerlegt schwarz-blauen Eisenspath von Ternitz. R.	58	472
— — analysirt Brauneisensteine von Ternitz. R.	58	472
— — Analyse verschiedner Brauneisensteine. R.	58	574
— — zerlegt Ankerit von Rohrbach bei Ternitz. R.	58	832
— — Brauneisenstein von Ternitz in Österreich. R.	59	190
Reimer, R.: Erz- und Mineral-Reichthum Süd-Australiens. R. . . .	55	206
Reinhardt, J.: Beschreibung von Carterodon sulcidens. R.	54	864

	Jahrg.	Seite
Reinsch, P.: Untersuchung des versteinerten Holzes in den Monotis-Kalken des obren Lias in Franken, Tfl. A.	1859	263
— — chemische Untersuchung der Glieder der Lias- und Jura-Formation in Franken. A.	59	385
Remy, Th.: zerlegt natürliche Soda aus Ägypten. R	54	446
Remy, J.: Ersteigung des Chimborazo's, 1856 am 3. Nov. R.	59	478
Renevier, E.: Geologie der Gegend von Tours. R.	54	840
— — Schichten-Folge des Nummuliten-Gebirgs in Waadt und Wallis. R.	55	472
— — fossile Süsswasser-Thiere unter dem Kreide-Gebirge. R.	58	847
Renevier, E. u. E. Hébert: Versteinerungen des oberen Nummuliten-Gebirgs. R.	55	474
Reuschle, K. G.: „Lehrbuch der Geographie", II, Stuttg. 8°. R.	53	370
Reuss, A. E.: zweiter erloschener Vulkan in Böhmen. B.	51	61
— — Foraminiferen und Entomostraceen im Septarien-Thone Berlins. R.	52	252
— — neue tertiäre Foraminiferen in Österreich. R.	52	254
— — Foraminiferen und Entomostraceen von Lemberg. R.	52	510
— — Bernstein in Böhmen. R.	52	858
— — Alter der Braunkohlen-Gebilde im N. Böhmen. R.	52	969
— — geognostische Verhältnisse um Eger und Asch in Böhmen. R.	53	375
— — neue Pseudomorphosen in Böhmen. R.	53	475
— — Foraminiferen Englands und der Wetterau; Monographie'n aller Kreide-Foraminiferen und der alpinen Gosau-Schichten; Anthozoen, Bryozoen, Foraminiferen, Entomostraceen und Fische daselbst. B.	53	582
— — einige Foraminiferen, Bryozoen und Entomostraceen des Mainzer Beckens, Tf. 9. A.	53	671
— — geologische Untersuchung im Gosau-Thale, 1851. R.	53	712
— — Kupfer-Gehalt des Rothliegenden bei Böhmischbrod. R.	53	728
— — geognostische Verhältnisse Böhmen's, Prag 1854, 8°.	54	459
— — die Entomostraceen u. Foraminiferen im Zechstein der Wetterau. R.	54	489
— — die Clytia Leachi aus der Kreide-Formation. K.	54	624
— — zur Charakteristik der Kreide in den Ost-Alpen. R.	54	846
— — Charakteristik der Kreide-Schichten im Gosau-Thale R.	54	865
— — die Gastropoden des Gosau-Gebildes. R.	54	873
— — die Kreide-Schichten am Wolfgang-See; Geologisches über NW.-Mähren; vollständiges Dinotherium giganteum, Blätter-Kohle zu Böhmisch Leipa. B.	55	53
— — zweiter Vulkan in Böhmen, bei Eger.	55	360
— — Polyparien im obren Kreide-Mergel Lembergs. R.	56	95
— — Koprolithen im Rothliegenden Böhmens. R.	56	432
— — Paläontologische Miszellen. R.	56	482
— — zur Charakteristik der Tertiär-Schichten Nord- und Mittel-Deutschlands. R.	57	495
— — neue Fisch-Reste aus Böhmischem Pläner. R.	58	751
— — Lillit ein neues Mineral von Przibram. R.	59	77
— — dichter Pyroxen von Rochlitz. R.	59	81
— — Gediegen-Eisen im Pläner Böhmens. R.	59	290
— — Steinmannit von Przibram. R.	59	306
— — die kurzschwänzigen Krebse im Jurakalke Mährens. R.	59	638
— — Foraminiferen im Septarien-Thone von Pietzpuhl. R.	59	865
Reynoso, A.: chemischer Einfluss des Wassers bei Hitze und Druck. R.	53	367
Ribeiro, C.: Kohlen-Formation unter Silur-Formation in Portugal. R.	55	95
Richardson: Berechnung über das Kohlen Feld in Süd-Wales. R.	50	498
Richter, R.: Alter der Kalk-Geschiebe im Cypridinen-Schiefer Thüringens; Flora des zwischen letztem lagernden Sandsteins. B.	53	158
— — „Gæa von Saalfeld", 1853, 4°. R.	53	614

	Jahrg.	Seite
Richter, R.: Paläontologisches aus Thüringens Grauwacke. R. .	1853	628
— — Gitogranchon granulatus; Graptolithen; Gliederung der Thüringen'schen Grauwacke- und Silur-Schichten. B.	54	46
— — die Thüringen'schen Graptolithen. R.	54	124
— — die Thüringen'schen Tentakuliten. R.	54	633
— — Graptolithen, Nereiten und Pflanzen im Harze. B.	56	170
— — eigenthümliches Zersetzungs-Produkt von Bleiglanz. R. . .	56	435
— — ein untersilurisches Pleurodictyum. R.	56	482
— — fossile Reste aus dem Thüringen'schen Zechstein. R. . . .	56	503
Richter, R. u. Fr. Unger: Paläontologie des Thüringer Waldes, Wien 4°. R.	56	624
Rivero, E. de: Steinkohlen in Peru. R.	56	714
Richthofen, F. v.: Kontakt-Wirkungen des Syenits in Süd-Tyrol. R.	58	85
— — Gymnit bei Mezzavalle in Tyrol. R.	58	311
— — Ausscheidungen überschüssiger Kieselsäure im Trachyt-Porphyr. R.	59	304
— — edle Erz-Lagerstätten im Trachyt-Gebirge Ungarns. R. . . .	59	835
Riedheim, C. v.: die Solenhofener Schiefer. R.	54	210
Ringler-Tompson: Lage der Konchylien im Red Crag. R.	51	477
Rink: Geographie und Geognosie von Nord-Grönland A.	53	270
Rive, A. de la: Erscheinen und Verschwinden grosser Gletscher. R.	52	239
Rivière, A.: Erz Lagerstätten in Grauwacke des rechten Rhein-Ufers. R.	51	362
— — das Gneiss-Gebirge der Vendée. R.	52	83, 730
— — über das Alter einiger Feuer-Gesteine. R.	57	741
— — Streichen der Bleiglanz- und Blende-Gänge in Mittel-Europa. R.	59	216
— — Zinkerz-Lagerstätten in Santander. R.	59	318
— — Entstehungs-Weisen von Mineral-Brenzen. R.	59	463
Robineau-Desvoidy: fossile Knochen der Grotte aux Fées. R. . . .	55	236
Roche, E.: Gesetze der Dichte im Innern der Erde. R.	55	365
Rochet d'Hericourt: Fische in heissen Quellen Abyssiniens lebend. R.	50	492
— — Hebung Abyssiniens und des Arabischen Busens. R. . . .	51	724
Roemer, F.: „Texas", Bonn 1849, 4°: fossile Reste. R.	50	101
— — geognostische Zusammensetzung des Teutoburger Waldes zwischen Bielefeld und Rheine und der Hügelzüge von Bentheim. A.	50	385
— — Acanthocrinus, ein neues Krinoiden-Geschlecht. A.	50	679
— — Tod des Professors Troost in Nashville. B	51	74
— — Gault-Fossilien im Flammen-Mergel N.-W.-Deutschlands. A. .	51	309
— — Stephanocrinus, aus der Familie der Cystideen. R.	51	496
— — Gault-Fossilien im Flammen-Mergel N.-W.-Deutschlands; Spirulirostra im Tertiär-Thone Osnabrücks; Hils-Versteinerungen bei Bentheim; Werk über die Kreide-Versteinerungen von Texas; geologische Karten. B.	51	576
— — Sammlungen in London; Ausflug nach Wight; Lower Greensand. B.	52	59
— — Alter des Kreide-Sandsteins im Teutoburger Walde A. . . .	52	185
— — „Monographie der Blastoideen, insbesondre von Pentatrematites". R.	52	743
— — „Kreide-Bildung von Texas und ihre organischen Einschlüsse". R.	52	960
— — geologische Arbeiten über Texas; Oxford-Thon in Hannover; die Brachiopoden-Sippe Davidsonia. B.	53	39
— — Quarzit-Krystall von Heskinees-Co., Neu-York. R.	53	174
— — Fauna des Devon-Gebirges am Rhein, I. Crinoidea. R. . . .	53	238
— — Norddeutsche Tertiär-Versteinerungen. B.	53	445
— — Böhmische Trilobiten; Vergleichung Böhmischer und Nord-Amerikanischer Silur-Bildungen; Homalonotus und Dipleura; Jura-Schichten an den Oder-Mündungen. B.	53	579
— — Kreide-Formation bei Aachen; Geologie Gelderlands; das Tayler'sche Museum zu Harlem; Museum in Leyden. B. . . .	54	167

	Jahrg.	Seite
Roemer, F.: über Stansbury's Exploration of the Salt Lake of Utah, 1852. R.	54	202
— — Dorycrinus g. n. aus Kohlen-Kalk Nord-Amerikas. R. . . .	54	253
— — Dumont's geognostische Übersichts-Karte von Belgien; Jura-Versteinerungen im Rheinischen Diluviale. B.	54	321
— — die Sandstein-Schichten von Ober-Yssel. R.	54	364
— — geognostische Arbeiten bei Aachen. R.	54	364
— — Petrefakt in krystallinischem Strontianit. R.	55	75
— — Gliederung der devonischen Gesteine der Eifel; Neocomien-Bildung bei Bentheim. R.	55	321
— — devonische Sphenopteris, die älteste Land-Pflanze. R. . . .	55	488
— — Echinoideen aus dem Kohlen-Kalke von St.-Louis. R. . . .	55	492
— — Palaeoteuthis eine devonische Sepiarien-Sippe. R	56	110
— — das Devon-Gebirge in Belgien und der Eifel. R.	56	209
— — mineralogisch-geognostische Sammlungen in Breslau; Vollendung der Lethaea geognostica; Melonites multipora; Rothliegendes bei Löwenberg in Schlesien. B.	56	326
— — Meteoreisen von Atacama in Bolivia. R.	56	441
— — Reise nach Schweden; Osteophorus ein Saurier aus Rothliegendem. B.	56	545
— — Istiaeus aus der Kreide Westphalens. R.	56	611
— — Bericht von einer geologisch-paläontologischen Reise nach Schweden. A.	56	794
— — über die Kreide-Bildung von Aachen. R.	57	214
— — über Holländische Diluvial-Geschiebe. A.	57	385
— — ältres Gebirge von Aachen und Süd-Belgien verglichen. R. .	57	454
— — Fisch- und Pflanzen-Schiefer des Rothliegenden bei Löwenberg mit Acanthodes gracilis n. sp. R.	57	629
— — Alaunstein in Steinkohle Oberschlesiens. R.	57	716
— — geologischer Ausflug über Wien, Triest, Padua, Monte Spitz, Recoaro; Sammlung von Massalongo in Verona; Beobachtungen von Trient; Sammlungen in München und Stuttgart. B. . . .	57	809
— — zweites Exemplar von Archaeoteuthis Dunensis aus dem Thonschiefer von Wassenach am Laacher See. A.	58	55
— — über Dr. Scharenberg; über die geognostische Karte von Hannover. B.	58	199
— — Versteinerungen in den silurischen Diluvial-Geschieben um Gröningen und Holland. A.	58	257
— — gegen Marcou's „Geology of North-Amerika"; geologischer Ausflug nach Böhmen; Melaphyre, Steinkohlen, Graptolithen-Schiefer. B.	58	553
— — „die jurassische Weser-Kette", Berlin 1858, 8°. R.	58	581
— — Paläolithische Gebilde der Russischen Ostsee-Provinzen; Organisation von Pentatremites; Staring's geologische Karte von Holland; geologische Reise nach den Süd-Alpen, Mailand und Turin; Glacial-Erscheinungen und Sammlungen daselbst; Erz-Lagerstätten von Traversella. B.	59	57
— — Reise ins Altvater-Gebirge, nach Troppau und Teschen; Silur-, Jura-, Kreide- und Tertiär-Formation. B.	59	602
Roemer, F. u. G. Bronn: Lethaea geognostica, 3. Aufl., neue Lieff. R.	54	855
Roemer, F. u. v. Dechen: Geschiebe mit Eindrücken. R.	55	82
Roemer, Fr. A.: Analysen von Gang-Thonschiefer; Labrador aus Diabas; Prehnit und Kiesel-Mangan in Gabbro. B.	50	682
— — zur geologischen Kenntniss des N.-W. Harz-Gebirges. R. . .	51	223
— — zur geologischen Kenntniss des N.-W. Harz-Gebirges, II. R. .	52	978
— — „Synopsis der Mineralogie", Hannover 1853, 8°. R.	53	373
— — Reise nach England und Frankreich; das British Museum; Neo-		

	Jahrg.	Seite
comien bei Guildford; Devon-Bildungen in Devonshire; Portland-Kalk bei Oxford; Gault bei Folkstone; Devon-Gebirge im Boulonnais; Kimmeridge-Bildung dort und in Nord-Deutschland; Gliederung der Devon-Formation; Englisches Klima; Analyse des Arsenikal-Kieses vom Andreasberg. B.	1853	810
Roemer, Fr. A.: Graptolithen am Harze, Tf. 7. A.	55	540
— — mineralogische Reise nach Paris, Auvergne, Turin, Aost; Murchison am Harze. B.	56	171
— — zur geologischen Kenntniss des Harz-Gebirges. R.	56	255
Roger, E.: Anthrazit im Becken des Drac, Isère. R.	58	220
Rogers, H. D.: „Salt and Gypsum of the Breston Salt Valley", Boston 1854. R.	56	88
Rogers, W. B.: Paradoxides in Ost-Massachusetts. R.	56	876
Rohatsch, R. H.: Formation des Gebirgs, woraus die Jod-Quellen zu Krankenheil bei Tölz, zu Heilbronn, zu Benediktbeuren und Salzbrunnen bei Kempten entspringen. A.	51	161
Rolle, Fr.: Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Grauwacke und ihrer Fauna. A.	50	257
— — weisse Kalkstein-Findlinge am Laacher See. B.	50	602
— — das Süsswasser-Quarzgestein zu Muffendorf bei Bonn. A. . .	50	788
— — „vergleichende Übersicht urweltlicher Organismen", 1851. R.	51	377
— — neue devonische Petrefakten-Vorkommnisse, Tf. 9. A. . . .	51	661
— — zwei devonische Korallen aus der neuen Sippe Reptaria. A. .	51	810
— — Pflanzen im älteren Sandsteine der Wetterau: Walchia, Odontopteris, ihre Formation; Pfälzer Kohlen-Gebirge. B.	52	59
— — Untersuchung des S.-W. Theiles von Ober-Steyermark. R. . .	56	197
— — die Mollusken-reichen Tegel-Lager in Steyermark. R. . . .	56	716
— — Versteinerungen an der Keuper-Lias-Grenze Schwabens. R. .	58	353
— — einige an der Grenze der Eocän- und Neogen-Formationen auftretende Schichten. A.	53	513
— — geologische Stellung der Sotzka-Schichten. R.	58	584
— — Konchylien-reiche Tegel-Schichten in Steyermark. R. . . .	58	860
— — neue unter-tertiäre Acephala-Arten. R.	59	383
— — geologische Stellung der Horner Tertiär-Schichten in Niederösterreich. R.	59	837
Romanowskji: Glinkit, ein Uralisches Mineral. R.	50	67
— — Dicrenodus, eine neue Sippe fossiler Fisch-Zähne. R. . . .	54	876
— — Geognosie der Ufer des Nara-Flusses. R.	57	472
— — Verschiedenheit von Chilodus tuberosus und Dicrenodus. R. .	58	741
Röschel, A.: der Gokstcha-See am Kaukasus. R.	58	84
Roscoe, H. E. u. F. Schönfeld: zerlegen Gneisse. R.	55	453
Rose, C. B.: bohrende Parasiten in fossilen Fisch-Schuppen. R. . .	55	376
Rose, G.: Pseudomorphosen des Glimmers nach Feldspath; regelmässige Verwachsung des Feldspaths mit Albit. R.	51	585
— — Pseudomorphosen des Serpentins von Snarum etc. R. . . .	51	604
— — Speckstein-Knollen im Gypse von Stecklenberg und gelber erdiger Kalkstein von Gernrode. R.	51	709
— — über den Serpentin. R.	52	711
— — bei Schwetz aufgefundene Meteoreisen-Masse. R.	52	847
— — Graphit auf der Insel Mull, Hebriden. R.	52	853
— — Pseudomorphose des Serpentins von Snarum. R.	52	859
— — Pseudomorphose von Eisenglanz nach Kalkspath. R.	55	195
— — verwitterter Phonolith von Kostenblatt in Böhmen. R. . . .	55	598
— — Bromsilber aus Mexiko. R.	56	185
— — Schaumkalk als Pseudomorphose nach Aragonit. R.	56	558
— — Pseudomorphose von Kalkspath nach Aragonit. R.	56	843

	Jahrg.	Seite
Rose, G.: dichter Borazit zu Stassfurt vom Lüneburger verschieden. B.	1857	73
— — heteromorphe Zustände der kohlensauren Kalkerde. R. . . .	57	586
— — Babylon-Quarz von Beeralstone in Devonshire. R.	58	310
— — über den Leuzit vom Kaiserstuhl. R.	58	686
— — krystallisirter Arsenik-Nickel von Sangerhausen. R.	59	79
— — Pseudomorphosen von Eisenkies nach Magnetkies. R . . .	59	81
— — Faserquarz aus Braunkohle zu Teplitz. R.	59	293
— — Meteorit von Hainholz bei Borgholz im Paderborn'schen. R. .	59	297
— — grosser Eisenkies-Krystall aus Elba R.	59	302
— — Dimorphie des Zinkes. R.	59	620
— — Isomorphie der Zinnsäure, Kieselsäure und Zirkonsäure. R. .	59	735
Rose, H: Donarium ein neues Metall. R.	52	76
— — Carnalit ein neues Mineral von Stassfurt. R.	57	837
— — Tantalsäure-haltige Mineralien. R.	59	76
Ross, J. C : über die Aucklands-Inseln. R.	50	466
Rossi: Nuovi principj mineralogici, Venezia 1857, 4°. R.	58	75
Rössler, C.: die Petrefakten im Zechstein der Wetterau. R. . . .	54	489
Rosthorn, Fr. v.: Übergangs- und Trias-Bildungen der S.-O.-Alpen. B.	55	806
Rosthorn, v. u. Canaval: Geognosie Kärnthens. R.	55	583
— — — — Mineral-Vorkommnisse in Kärnthen. R.	55	821
Roth: fossile Spinnen im Solenhofener Schiefer. R.	51	375
— — geologische Verhältnisse von Predazzo in Süd-Tyrol. R. . .	52	490
— — Glimmer, pseudomorph nach Andalusit. R.	56	37
— — veränderte Kreide vom Divis-Berge bei Belfast. R.	57	432
Roth, F.: Mineral-Quellen und deren Erbohrung bei Homburg. R. .	55	208
Roth, J.: zerlegt dolomitische Kalksteine. R.	54	448
— — Muschelkalk u. a. Gesteine um Lüneburg. R.	54	839
— — „der Vesuv und die Umgegend von Neapel", 8°. R.	57	840
Roth, J. u. A Wagner: „fossile Knochen in Griechenland", München 1854, 4°. R.	55	375
Rotureau, A. u. A. Chalin: die Nauheimer Thermen. R.	58	859
Rouault, M.: eocäne Arten von Bos d'Arros bei Pau. R.	51	752
— — paläolithische Fossil-Reste aus Rennes. R.	53	102
— — neue Trilobiten in den Schiefern der Bretagne. R.	54	120
— — neues Glied der Untersilur-Formation in Bretagne. R. . . .	54	221
— — fossile Wirbelthier-Reste in West-Frankreich. R.	58	862
Rougemont, Fr. v : Erd-Geschichte nach Bibel und Geologie. R . .	58	340
Rouillier, Ch.: Rhynchonella Fischeri im Jura von Moskau. R . .	50	254
— — die fossilen Elenn-Arten. R	54	862
Rouillier u. Fahrenkohl: über Ichthyoterus Fischeri n. g. sp. R .	54	856
Rouillier u. Wosinsky: alte Foraminiferen um Moskau. R.	51	495
Rouville, P. de: Steinkohlen des Larzac. R.	51	466
— — Alter der alluvialen Eisen-Erze im S. und S.-W. Frankreichs. R.	54	732
Royle: Erhebung des Landes der Insel Aitutaki in der Südsee. R. .	55	732
Roys, de: Gebirgs-Störungen im Rhone-Thale. R.	55	464
Rozet: Geologie des unteren Theiles des Rhone-Beckens. R . . .	52	362
— — das Ost-Ende der Pyrenäen. R.	52	965
— — Fortschritt der Delta-Bildung der Tiber bei Fiumicino. R. . .	53	615
— — über Ponzi's Abhandlung über die Emporhebung der Apenninen. R.	53	618
— — Rheinisches Trachyt- und Basalt-Gebirge R.	55	352
— — geologische Zusammensetzung der Alpen. R.	55	469
— — Eocän-Gebirge der Alpen und Apenninen. R	55	849
— — die Alpen Frankreichs. R.	56	718
Rube u. Th. Scheerer: Analyse des Freiberger Gneisses. R. . . .	59	76
Rubidge, R. N.: geologische Notitzen aus Süd-Afrika. R.	57	90
Rumpf: Bayern'scher Schmirgel. R.	56	559

	Jahrg.	Seite
Rütimeyer, L.: „das Schweitzische Nummuliten-Terrain", Bern 8°. R.	1851	599
— — Anthracotherium-Arten der Schweitz. R.	56	637
— — über die im Keuper zu Liestal bei Basel gefundenen Reste von Belodon. A.	57	141
— — Anthracotherium magnum und A. hippoideum. R.	57	487
— — über lebende und fossile Schwein-Arten. R.	58	232
— — Encheizyphius (teretirostris) eine neue Cetaceen-Sippe. R.	58	240
— — die Schildkröten im Portland-Kalke Solothurns. R.	59	366
Ryckholt, P. de: „Melanges paléontologiques". R.	53	229

S.

Sack, A. L.: besondre Kupfer-Erze von Adelaide. R.	52	332
Sadebeck: geognostische Verhältnisse der Umgegend von Strehlen. R.	50	466
Saemann, L.: über „Dana's System of Mineralogie". B.	50	596
— — über die Nautiliden. R.	56	125
— — über das Atacama-Eisen. B.	57	415
— — über das Meteoreisen von Atacama. B.	59	178
Safford, J. M.: Zahn von Getalodus Ohioensis. R.	53	762
— — Tetradium-Arten in Mittel-Tennessee. R.	57	236
— — „Geological Reconnaissance of the state of Tennessee". R.	58	350
Salm-Horstmar. v.: Chlor-Metalle enthaltende Bergkrystalle. R.	53	54
— — Titan-Säure in Thonen. R.	53	186
Salter, J. W.: fossile Organismen in Schottland. R.	51	636
— — Graptolithen aus Süd-Schottland. R.	53	241
— — arktische Obersilur-Versteinerungen. R.	54	85
— — Britische Trilobiten. R.	54	500
— — Kruster-Fährten in den Lingula-Flags von Wales. R.	55	871
— — Himantopterus n. g., Eurypterus und Ceratiocaris. R.	56	611
— — die paläozoischen Asteriaden mit lebenden verglichen. R.	57	120
— — Cambrische Fossil-Reste von Longmynd, Nord-Wales. R.	57	238
— — neue cambrische Fossil-Reste von da. R.	57	239
— — über Diploceras n. g. und ein Britisches Ascoceras. R.	57	253
— — silurische Acidaspis-Arten aus Shropshire. R.	57	365
— — neue paläolithische Seesterne. R.	58	126
— — Landpflanzen-Reste aus dem Old-red von Caithness. R.	58	384
— — Wurm-Löcher u. a. Eindrücke in Kambrischen Gesteinen. R.	59	105
— — Versteinerungen in Grünsand von Aberdeen. R.	59	227
— — die Cephalopoden-Sippen Tretoceras n. und Ascoceras. R.	59	507
— — fossile Reste der Primordial-Fauna Nord-Amerika's. R.	59	509
Salter u. Aveline: der Caradoc-Sandstein in Shropshire. R.	54	487
Salter, J. W. u. E. Billings: Cyclocystoides eine silurische Echinodermen-Sippe. R.	59	636
Salvétat: Kieselerde-Hydrat von Algier. R.	50	340
Salvétat u. Ebelmen: Analyse von Kaolin aus China. R.	52	333
Sandberger, Fr.: Analyse des Palagonit's von Limburg. R.	50	58
— — Zusammenvorkommen von Augit und Hornblende. R.	50	70
— — Mineralien, neue für Nassau. B.	50	190
— — über die im Herzogthum Nassau vorkommenden Blei-Salze. A.	50	269
— — über den Aphrosiderit. R.	50	341
— — Analyse des Buntbleierzes von Ems. R.	50	616
— — Porphyre um Schaumburg; Cypridinen-Schiefer im Rupbach-Thale. B.	51	60
— — Mineralien aus der Nassauischen Diabase. A.	51	150
— — Tertiär-Bildungen vom Alter des Mainzer Beckens. B.	51	177
— — Analogie der Land- und Süsswasser-Fauna des Mainzer Beckens und des Mittelmeeres. B.	51	676

	Jahrg.	Seite
Sandberger, Fr.: Cypridinen-Schiefer in Deutschland und England. B.	1852	56
— — Hessische Gesteine und Versteinerungen in Hauptmann Becker's Sammlung zu Darmstadt. B.	52	197
— — Smaragdochalzit im Nassauischen. R.	52	224
— — Versteinerungen im Spiriferen-Sandstein von Coblenz. B.	52	452
— — Paläozoische Versteinerungen des Kap-Landes. A.	52	581
— — miocänes Alter und Versteinerungen des Mainzer Beckens. B.	53	38
— — Vorkommen verschiedener Mineralien in Nassau. R.	53	174
— — Nematura und Volvaria im Mainzer Becken; Liriodendron in Westerwalder Braunkohle; Helmersen's Arbeiten über Russisches Devon-Gebirge. B.	53	327
— — „Untersuchungen über das Mainzer Tertiär-Becken", Wiesbaden 1853, 8. R.	53	481
— — Voltz's Brief aus Surinam; Tertiär-Schichten dort. B.	53	682
— — Baryt und Blende als Versteinerungs-Mittel; Arbeiten des Mittelrheinischen Geologen-Vereins. B.	54	421
— — geognostische Gebirgs-Bildung um Weilburg. R.	54	454
— — „Versteinerungen des Rheinischen Schichten-Systems"; das Mainzer Tertiär-Becken. B.	55	187
— — Verwandlung von Cyanit in Pyrophyllit. B.	55	315
— — Anoplotheca, eine neue Brachiopoden-Sippe. R.	55	491
— — das Süsswasser-Gebilde von Locle und Guimott in Neuchatel verglichen mit dem Mainzer; Tertiär-Bildungen, Grauwacke- und Steinkohlen-Formation im obern Theile Badens. B.	56	332
— — innrer Bau einiger Rheinischer Brachiopoden. R.	56	381
— — Beiträge zur Kenntniss des Mainzer Tertiär-Gebirges. A.	56	533
— — Lias-Schiefer und Kalktuff-Versteinerungen bei Bruchsal. B.	56	545
— — Beitrag zur Kenntniss der jurassischen Schichten des Baden'schen Oberlandes. A.	57	126
— — Orthit in Oligoklas-Granit, und Rutil im Diorit des Schwarzwaldes. B.	57	808
— — geologische Aufnahme von Badenweiler; Tertiär-Bildungen im Breisgau und am Bodensee; Steinkohlen-Formation und Buntsandstein um Baden-Baden; Monographie der Tertiär-Reste in Mainz. B.	58	199
— — Lias um Baden-Baden. B.	58	296
— — Beudantit und dessen Modifikationen. R.	58	314
— — Ausbreitung des Mainzer Beckens bis nach Bühl u. dem Elsass. B.	58	451
— — die Konchylien des Mainzer Tertiär-Beckens, 4°, I. R.	58	506
— — die Geologie und Quellen von Badenweiler. R.	58	712
— — Bohrung auf Kohlensäure-haltiges Sool-Wasser zu Soden im Herzogthum Nassau. A.	59	46
— — die Konchylien des Mainzer Tertiär-Beckens, II. R.	59	114
— — über die offiziellen geologischen Aufnahmen Baden'scher Bäder. Badenweiler, Überlingen, Baden-Baden. A.	59	130
— — Karminspath von Horhausen in Rhein-Preussen. R.	59	190
Sandberger, Fr. u. Gümbel: Tertiär-Gebirge am N.-Rande der Ost-Alpen. R.	58	717
Sandberger, G.: zur Klassifikation der Trilobiten B.	50	49
— — über Goniatiten und insbesondre die Varietäten des Goniatites retrorsus. A.	51	536
— — über Clymenien, Tf. 7. A.	53	513
— — Bitte um Ceratites nodosus.	55	255
— — „Versteinerungen des Rheinischen Schichten-Systems"; tertiärer Gyps-Spath bei Wiesbaden. B.	55	320
— — Vergleichung lebender und vorweltlicher Cephalopoden. R.	56	747
— — über Goniatites restrictus Eichw. R.	57	626

	Jahrg.	Seite
Sandberger, G.: Übersicht der naturhistorischen Beschaffenheit des Herzogthums Nassau. R.	1859	627
Sandberger, G. u. Fr.: „Versteinerungen des Rheinischen Schichten-Systems", I—IV. R.	52	370
— — — — Versteinerungen des Rheinischen Schichten-Systems in Nassau. R.	54	767
— — — — die Versteinerungen des Rheinischen Schichten-Systemes in Nassau, II. Bände, 4°, Wiesbaden 1850—1856, 4°. R.	56	367
Sanders, W.: Alter von Thecodontosaurus und Paläosaurus R.St. R.	50	252
Sandmann, Fr.: Analyse einiger Fahlerze. R.	55	561
— — Mangan-haltiger Bleiglanz. R.	55	833
Santagata: Ursprung der Thone im Serpentin von Bologna. R.	58	836
Sartorius v. Waltershausen: Hornblende-Analysen. R.	55	70
— — zerlegt Olivin aus einer Fiumara des Ätna. R.	55	71
— — zerlegt Mesolith aus Sicilien. R.	55	73
— — zerlegt Parastilbit von Island. R.	55	707
— — Dolomit des Binnenthales in Wallis. R.	55	736
— — Cyclopit von Catania. R.	55	832
— — Eisspath vom Monte Somma. R.	56	43
— — Analysen von Labrador. R.	56	46
— — Stilbit von Eskifjord. R.	56	47
— — Xylochlor von Island. R.	56	187
— — Anorthit vom Hekla. R.	56	185
— — Skolezit aus Island. R.	56	196
— — Karphostilbit aus Island. R.	56	346
— — Grünerde aus Zeolith Islands. R.	56	348
— — zerlegt Epistilbit aus Island. R.	56	442
— — Thomsonit von den Cyclopen-Inseln. R.	56	446
— — Heulandit von Berufjord in Island. R.	56	562
— — Parastilbit, ein neues Mineral. R.	58	215
Sartorius v. Waltershausen u. Limprecht: Andesin von Island. R.	56	345
Sarzeaud, Durocher u. Malaguti: Blei, Kupfer und Silber in Seewasser und Organismen. R.	50	352
Saussure, de: Pimpla im Süsswasser-Gypse von Aix. R.	54	639
— — der Vulkan von San-Andrès in Mexiko, bisher noch unbekannt. R.	59	827
Sautier: der Berg Crussol im Ardèche-Dept. R.	56	57
Sauvage: auf dem Eilande Milo vorkommende Mineralien. R.	50	449
— — Geologie des Eilandes Milo. R.	51	461
Savi e Meneghini: Geologia della Toscana, Firenze 1851. R.	54	195
Sawkins. J. Gr.: Boden-Bewegung in den Südsee-Inseln. R.	58	101
Scacchi: Vorkommen und Krystallisation des Sodalit's bei Neapel. R.	50	68
— — Mineralien aus den vulkanischen Dämpfen zu Pozzuoli. R.	51	589
— — Ausbrüche des Vesuvs von 1840 — 1850. R.	51	603
— — die Phlegräischen Felder. R.	52	497
— — Vorkommen sublimirter Silikate am Vesuv. B.	52	590
— — Mizzonit und Mejonit vom Monte Somma. R.	53	61
— — Übersicht der Mineralien, welche unter den Auswürflingen des Vesuvs und des Monte di Somma erkannt worden sind. A.	53	257
— — Humit und Olivin am Monte di Somma. R.	54	76
— — Eisenglanz vom Ausbruch des Vesuvs im J. 1855. R.	58	218
— — Vorkommen des Cotunnits am Vesuv. R.	59	77
Scarabelli: Metamorphose gewisser Gypse in Toskana. R.	54	604
Schade: Kähne in Torfmooren Schlesiens. R.	56	202
Schafhäutl: zerlegt Porphyr-artige Wacke von Berchtesgaden. R.	50	64
— — zu Carpenter's Untersuchungen über Nummuliten. B.	50	603
— — zerlegt Salz-Thone der Salz-Formation in Berchtesgaden. R.	50	706

	Jahrg.	Seite
Schafhäutl: „geognostische Untersuchung des Süd-Bayern'schen Alpen-Gebirgs". R.	1850	719
— — Gliederung des Süd-Bayern'schen Alpen-Kalks, Tf. 2. A.	51	129
— — zur Charakteristik Versteinerungs-leerer Felsarten. R.	51	364
— — neue Petrefakten des Süd-Bayern'schen Vorgebirges, Tf. 7. A.	51	407
— — der Teissenberg oder Kressenberg in Bayern, Tf. 3, 4. A.	52	129
— — geognostische Bemerkungen über den Kramerberg bei Garnisch, Tf. 3. A.	52	282
— — Gebirgs-Bildung bei den Jod-Quellen von Krankenheil, Heilbrunn, Kressenberg; Kreide-Versteinerungen und Nummuliten; brennende Gas-Quelle bei Heilbrunn; Erscheinungen am Kochel-See; Besteigung der Zug-Spitze. B.	52	295
— — Beiträge zur nähern Kenntniss der Bayern'schen Voralpen, Forts. (Tf. 6). A.	53	299
— — über die geognostischen Horizonte in den Bayern'schen Voralpen, Tf. 6. A.	53	399
— — Kreide-Versteinerungen im Nummuliten-Gebirge am Kressenberge. B.	54	319
— — Beiträge zur näheren Kenntniss der Bayern'schen Voralpen, Tf. 7, 8. A.	54	513
— — die Versteinerungen des Kressenberges; Keuper- und Lias-Pflanzen der Bayern'schen Alpen; verworrene Lagerungs-Verhältnisse daselbst. B.	56	819
Scharenberg, W.: „über Graptolithen", Breslau 1851, 8°. R.	52	371
— — Gibraltar und dessen geologische Verhältnisse. R.	52	734
— — Geognosie der Süd-Küste Andalusiens. R.	55	457
— — die Hyerischen Eilande. R.	55	600
— — fossile Knochen aus der Scharlei-Grube Schlesiens. R.	56	356
— — geologische Verhältnisse am Ost-Ende des Altvater-Gebirges. R.	57	447
— — eine Blüthe aus dem tertiären Thon-Lager von Schossnitz. R.	58	256
Scharff, Fr.: „der Krystall und die Pflanze", Frankfurt 1857. R.	58	316
— — Axinit im Taunus. R.	59	289
Schauroth, K. v.: Kalktuff-Ablagerung im Koburgischen. R.	54	107
— — zur Fauna des Deutschen Zechstein-Gebirges. R.	54	118
— — die Trias und ihre Fossil-Reste um Recoaro. B.	55	315
— — zur Paläontologie des Deutschen Zechsteins. R.	55	498
— — geognostische Verhältnisse um Recoaro. R.	56	213
— — fossile Reste um Recoaro im Vicentinischen. R.	56	245
— — über Reduzirung der Petrefakten-Arten; Tertiär-Bildungen, Keuper- und -Lias-Grenze im Vicentinischen. B.	56	822
— — zur Paläontologie des Deutschen Zechstein-Gebirges. R.	57	223
— — Schaalthiere der Lettenkohle Coburgs. R.	57	759
— — „die Trias-Versteinerungen des Vicentinischen." R.	59	359
Scheerer, Th.: Mineralien mit Tantalsäure-ähnlichen Säuren R.	50	56
— — alte Gebirgs-Bildungen in Norwegen; seltene Mineralien von da; zur Geschichte des Euxenits und Yttrotitanits. B.	51	178
— — über Keilhau's Gaea Norwegica, III. Heft, dem Hauptinhalte nach skizzirt und mit Zusätzen versehen, Tf. 3. A.	51	257
— — „Löthrohr-Buch", Braunschweig 1851. R.	52	80
— — Reise in die Schweitz; Gletscher-Phänomene, Friktion, Karren-Felder; Fluth-Wirkungen; Vergleich mit Skandinavien; Nagelfluh-Geschiebe mit Eindrücken; Wiser's oryktognostische Sammlung. B.	52	824
— — Kalksteine, Gneisse und Schiefer Norwegens. R.	52	871
— — Melinophan, ein neues Mineral Norwegens. R.	53	185
— — Gediegen-Kupfer in Norwegen. R.	53	192

	Jahrg.	Seite
Scheerer, Th.: vulkanische Natur des Granites. R.	1853	203
— — angebliche Pseudomorphose von Natrolith nach Eläolith. R. .	53	464
— — Vermeintlicher Augit im Granit-artigen Porphyr bei Lössnitz. R.	53	609
— — Magneteisen pseudomorph nach Glimmer im Fassa-Thal. R. .	53	711
— — die Erz-Lagerstätten von Kongsberg und Modum. R.	53	720
— — der Glimmerschiefer mit Granaten und Belemniten in Zürich ist Quarz-reicher dolomitischer Kalk; Rother und Grauer Gneiss. B	54	43
— — zur Kenntniss der polymeren Isomorphie. R.	54	69
— — Prosopit ein neues Mineral; Kaolin nach Prosopit. R. . . .	54	189
— — Konkrezionen aus thoniger Sand-Schicht bei Döbeln. R. . .	54	367
— — über Olivin und Serpentin-Bildung. R.	54	451
— — Oligoklas und die Feldspath-Familie im Allgemeinen. R. . .	54	593
— — Eigenthümliches epigener Gebilde R.	54	815
— — Krystall-Form des Eukolith's und Wöhlerit's. R.	54	824
— — über Pechstein R.	55	60
— — Dolomit-Schiefer in der Schweitz. R.	55	468
— — angebliche Pseudomorphosen von Serpentin nach Amphibol, Augit und Olivin. R.	55	565
— — Paramorphismus und seine Bedeutung. R.	55	695
— — Astrophyllit eine neue Glimmer-Art von Brevig. R.	56	42
— — eigenthümlicher Feldspath von Zinnwald. R.	56	49
— — Spreustein-Krystalle aus Norwegen. R.	56	180
— — Hornblende des Norwegischen Zirkon-Syenits. R.	56	352
— — über Afterkrystalle. R.	58	572
— — einige Worte über Kern-Krystalle (Perimorphosen), besonders in Bezug auf die Prioritäts-Frage. A.	59	51
— — Kieselerde-Inkrustation aus einem Hohofen. R.	59	194
— — Traversellit und seine Begleiter: Pyrgom, Epidot und Granat, ein Beitrag zur plutonischen Frage. R.	59	204
— — sogen. Glimmerschiefer mit Belemniten und Granaten in der Schweitz. R.	59	474
— — Zinkblende von Titiribi in Neu-Granada. R.	59	813
Scheerer, Th. u. Rube: Analyse des Freiberger Gneisses. R. . . .	59	76
Schenk, R.: Kupferwismuth von Wittichen. R.	55	837
Scheult: Gold-Anschwemmungen in der Republik Venezuela. R. . .	54	106
Schiel, J.: „Reise durch die Felsen- und Humboldt-Gebirge nach dem Stillen Ozean". R.	59	847
Schill, J.: über den Ötzthaler Gletscher. A.	53	786
— — Erosions-Erscheinungen im Schwarzwalde. B	53	805
— — Analyse Baden'scher Bohnerze. R.	55	445
— — Leuzit am Kaiserstuhl-Gebirge. R.	55	560
— — Augit von Lützelberg am Kaiserstuhle. R.	55	573
— — schwarzer Granat vom Kaiserstuhl-Gebirge. R.	55	838
— — über Lauf und Wirkungen der Wutach im Schwarzwalde. B. .	56	667
— — die Basalte und ihre Sturzwälle im Höhgau, der Basalt-Gang im Granite des Hausteins im Schwarzwalde und der Nephelinfels des Hohenhöwen, Tf. 2. A.	57	28
— — die Tertiär- und Quartär-Bildungen an der Nord-Seite des Bodensee's und im Höhgau. R.	59	851
Schimper W. P.: Geologie Süd-Spaniens. R.	50	467
— — Palaeontologia Alsatica. R.	54	123
— — tertiäre Fische von Mühlhausen. R.	59	640
Schindling, C.: über sogenannten Fleisch-farbenen Schwerspath. A. .	56	664
Schlagintweit, A.: Höhen-Bestimmungen am Gross-Glockner. R. . .	50	744
— — Wirkungen der Erosion in den Alpen. A.	51	292
— — Thal-Bildung und Form der Gebirgs-Züge in den Alpen. R. .	53	70

	Jahrg.	Seite
Schlagintweit, A.: beabsichtigte Arbeiten. B.	1853	442
— — naturwissenschaftliche Reise nach dem Himalaya. B. . . .	54	582
— — Französische Alpen um das Isère-Thal. R.	55	213
— — orographisch-geologische Struktur des Monte Rosa. R. . . .	56	86
Schlagintweit, A. u. H.: „physikalische Geographie und Geologie der Alpen“, mit Atlas, Leipzig 1854. R.	55	91
Schlagintweit, H.: physikalische Eigenschaften des Eises. R. . . .	50	236
Schlegel: Mosasaurus und die Riesen-Schildkröte von Mastricht. R. .	55	246
Schleiden, E.: Wirkung des Nebengesteins auf die Erzführung der Gänge. R.	53	726
Schleiden u. Schmid: „die Natur der Kiesel-Hölzer“ Jena 1855. R. .	55	576
Schlossberger: über Muschel-Schaalen, Byssus und Chitin. R. . . .	56	845
Schmid, E.: die Schwarzerde im südlichen Russland. R.	50	350
— — die organischen Reste des Muschelkalks im Saal-Thale bei Jena. A.	53	9
Schmid, E. E.: Olivin im Meteoreisen Alabama's R.	52	864
— — Titan-Eisen von Miask. R.	54	181
— — Xanthosiderit ein neues Mineral vom Thüringer Wald. R. . .	54	181
— — zerlegt Phonolith von Ebersberg an der Rhön. R.	56	845
— — Andalusit von Meissen und Freiberg. R.	57	70
— — Voigtit ein neues Mineral von Ilmenau. R.	57	717
Schmid u. Schleiden: „die Natur der Kiesel-Hölzer“, Jena 1855. R. .	55	576
Schmidt: Höhlenbär-Knochen in der Baradla-Höhle Ungarns. R. . .	57	849
Schmidt, C.: devonische Dolomit-Thone von Dorpat. R.	57	325
Schmidt, Fr.: Silur-Formation in Esth- und Liev-Land und auf Ösel. R.	58	593
Schmidt, Fr.: analysirt körnigen Kalk von Wunsiedel. R.	58	468
— — analysirt Eisenspath von Wunsiedel. R.	58	472
— — Dolomit von Sinnatengrün bei Wunsiedl. R.	58	574
— — zerlegt Erlan, eine Felsart von Wunsiedel. R.	58	828
— — die Kalkstein-Lager im Fichtelgebirge. R.	59	486
Schmidt, Fr. jr.: die Speckstein-Gruben von Göpfersgrün bei Wunsiedel. R.	55	200
Schmidt, J. F. Jul.: neue Torf-Insel im Becler-See in Holstein. R. .	54	208
— — die Torf-Insel im See von Cleveetz. R.	58	345
— — die erloschenen Vulkane Mährens. R.	59	487
Schmidt, Jul.: geognostische Reise in San Salvador, Zentral-Amerika: Trachyt, Braunkohle. B.	55	170
— — Ausbruch des Vesuvs im Mai 1855. R.	59	633
Schmidt, O.: Elenn, Hirsch und Höhlenbär in einer Höhle. R. . .	59	757
Schnabel, C.: Stahlkobalt oder faseriger Speisskobalt in Siegen. R. .	51	590
— — Kobalt-Erz auf Gängen im Grauwacke-Gebirge Siegens. R. .	52	67
— — Kobaltnickelkies und Wismuth-Kobaltnickelkies. R.	52	71
— — zerlegt Kohleneisenstein und Steinkohlen von der Ruhr. R. .	52	72
— — Plakodin ist wahrscheinlich ein Hütten-Erzeugniss. R. . . .	52	490
— — Plakodin; Kobalt-Nickelkies. B.	52	588
— — Untersuchung von Eisenspäthen von Siegen. R.	52	844
— — neues Vorkommen von Allophan in Waldeck. R.	53	58
— — krystallisirte Hochofen-Schlacke von der Sayner Hütte. R. .	53	59
— — sogen. Stahl-Kobalt aus dem Siegen'schen. R.	53	182
— — Analyse kohlensaurer Eisen-Erze. R.	53	840
— — zerlegt Kohlen-Eisenstein von der Ruhr. R.	54	73
— — Nickel-Erz von der Grube Merkur bei Ems. R.	54	175
— — Krystall-Modelle aus Glas, zum Unterricht. B.	55	543
— — Zinkblüthe von Romsbeck in Westphalen. R.	59	80
— — oolithischer Thoneisenstein (Eisensandstein) von Nürnberg. R.	59	183
— — zerlegt einen Dolomit-Steinkern von einem Echinus. R. . .	59	183
— — Antimonocker von Eisern im Siegen'schen. R.	59	288
— — braune Blende von Burbach im Siegen'schen. R.	59	288

	Jahrg.	Seite
Schnabel, C.: Kieselzink-Erz (Galmei) von Cumillas in Spanien. R.	1859	449
Schneider, R.: Kupferwismuth-Glanz eine neue Mineral-Art. R. . .	54	444
— — Kupferwismuth-Erz von Wittichen. R.	55	836
— — Wolfram von Neuhaus-Stollberg bei Strasberg. R.	56	345
Schnur, J.: Beschreibung aller paläolithischen Brachiopoden der Eifel. R.	56	507
Schomburgh: der Magnetberg auf St.-Domingo. R.	55	89
Schönbein, C. F.: Riechender Flussspath von Weserdorf in Bayern. R.	59	451
Schönfeld, F. u. H. E. Roscoe: zerlegen Gneisse. R.	55	453
Schouppe, A. v.: über den Erzberg bei Eisenerz. R.	56	63
Schramm: Alkalien und Phosphorsäure in Kalksteinen Württembergs. R.	50	701
Schrenk, A. G.: Geognosie des Ural-Gebirges im hohen Norden. R. .	57	186
Schrötter u. Pohl: Analyse von Seesalz. R.	53	184
Schtschurowskji, G.: Gegend zwischen Barnaul und Smjejew. R. .	50	85
— — Vergleichung des Alatau und Kija-Gebirgs mit dem Ural. R. .	50	86
— — Geologisches von der Bjelusower Grube, Ridersk u. s. w. R.	50	463
Schubarth, E. C.: Vorkommen des Zinn's in Spanien. R.	53	460
Schubert: „Welt-Gebäude, Erde und Zeit des Menschen", Erlangen 1852, 8°. R.	52	240
Schultz, W. u. Paillette: Zinnerz-Lagerstätten in Spanien. R. , . .	50	710
— — — — Ballesterosit ein Zinn-haltiger Kies. R.	51	350
Schultze, M.: über den Organismus der Polythalamien. R.	55	749
— — Cellulose in Braun- und Stein-Kohle. R.	56	95
Schuster: geologische Bemerkungen über Karlsbad. B.	54	420
Schütz, F. v.: Erze und Bergbau im Schappach-Thale. B.	52	300
Schwabe, S. H.: Fuss-Spuren von Chirotherium Barthi aus Altenburg. B.	54	569
Schweizer, E.: vulkan. Asche 1843 vom Guntur auf Java ausgeworfen. R.	57	433
Scott, R. H.: Anorthit aus Diorit von Bogoslowsk im Ural. R. . .	59	300
Secchi: Meteorstein-Fall bei Civita-vecchia. R.	58	87
Sedgwick: Eintheilung der paläolithischen Gebilde Grossbritanniens. R.	53	97
— — Klassifikation der paläolithischen Gesteine Grossbritanniens. R.	54	486
Seebach, K. v.: Entomostraca aus der Trias Thüringens. R.	58	622
Seelheim, F.: Untersuchung eines bei Mainz gefundenen Meteorsteins. R.	59	194
Seely, H.: zwei neue Seestern- (Goniaster-) Arten aus Kreide. R. .	59	511
Seibert: tertiärer Sandstein zu Heppenheim in der Bergstrasse. R. .	59	211
Semenow, P. v.: Brachiopoden des Schlesischen Kohlen-Kalks. R. .	55	872
Semenoff, v.: Vulkane im östlichen Asien. R.	59	312
Semper, J. O.: Paläontologisches über den Sylter Limonit-Sandstein. R.	57	235
Senarmont, H. de: Wärme-Leitung in Krystallen. R.	50	451
— — Gang-Mineralien auf nassem Weg gebildet. R.	51	596
— — Korund und Diaspor auf nassem Weg erzeugt. R.	52	216
— — oktaedrische Antimon-Blüthe von Constantine. R.	52	705
— — Krystall-Formen des Glauberits von Iquique, Peru. R. . . .	53	188
— — Krystall-Form des Siliciums. R.	56	693
— — Wachsen der Krystalle und Ursachen ihrer Sekundär-Formen. R.	57	74
Senoner, A.: Höhen-Messungen in Österreich, Salzburg und Tyrol. R.	52	362
Serres, Marc. de: Alter der Menschen-Rassen. R.	50	246
— — Versteinerung der Konchylien in den jetzigen Meeren. R. . .	53	767
— — Knochen-Höhle von la Tour bei Lunel. R.	54	198
— — die Schiefer von Lodève und ihre fossilen Pflanzen. R. . .	55	353
— — ursprüngliche Vertheilung von Pflanzen und Thieren. R. . .	55	605
— — ein Vomer von Pycnodus rugulosus Ag. R.	56	610
— — die fossilen Pflanzen in den Schiefern von Lodève. R. . . .	57	113
— — Zirkon im Sande bei Montpellier. R.	57	718
— — Säugthier- und Menschen-Reste in der Höhle von Pontil. R. .	57	842
— — Sammlung fossiler Säugthier-Knochen aus Süd-Amerika. R. .	58	119
— — trockne Steinkohlen und Stipite von Larzac. R.	58	597

	Jahrg.	Seite
Serres, M. de: Kennzeichen der quartären Bildungen. R. . . .	1859	99
— — Knochen-Breccie des Pédémar Berges im Gard-Dept. R. . .	59	220
— — die Dünen und ihre Wirkungen. R.	59	484
Serres, M. de. u. Jean-Jean: Knochen-Breccien und -Höhlen bei Montpellier. R.	51	759
Sewell: Erz-Lagerstätten zwischen den Kordilleren und dem Stillen Ozean. R.	54	466
Seyfert: Wärme-Entwickelung in Kohlen-Flötzen bei Sangerhausen. R.	55	465
Seyferth, A.: das Wolkensteiner Mineral-Wasser. R.	55	450
Sharpe, D.: Geologie von Oporto; silurische Steinkohle. R. . . .	50	98
— — Tylostoma, eine subcretaceische Gastropoden-Sippe. R. . . .	50	375
— — über Schiefer-Gefüge, zweite Mittheilung. R.	50	477
— — Sekundärgebirgs-Distrikt in Portugal, N. vom Tajo. R. . . .	50	478
— — das Genus Nerinaea und einige neue Arten. R.	50	638
— — „Fossil Mollusca in the Chalk of England", I. Cephalopoda. R.	55	632
— — Fossil Remains in the Chalk of England, II, III. R. . . .	57	638
Shepard, Ch. U.: über Amerikanische Meteorite. R.	52	614
— — Jenkinsit von Monroe, Orange-Co. R.	53	463
— — Meteoreisen vom Lion-river, S.-Afrika. R.	53	473
— — Diamagnetit von Monroe in Orange-Co. R.	53	602
— — Meteoreisen vom Seneca-river. R.	53	694
— — Kalium im Meteoreisen der Ruff-Berge in Süd-Carolina. R. .	54	72
— — zerlegt Meteoreisen aus Süd-Afrika. R.	55	562
— — Xanthitan in Feldspath von Greenriver. R.	57	710
— — über Pyroklasit. R.	58	314
— — Pyromelan aus der Goldwäsche von Mac-Donald. R.	58	568
— — Glaubapatit und Eipiglaubit. R.	58	694
— — Lazulith, Pyrophyllit und Tetradymit in Georgia. R.	59	302
Shmith, J. L.: Meteorstein von Petersburgh in Tennessee. R. . . .	58	686
Shumard, B. F.: neue paläolithische Krinoideen der Vereinten Staaten. R.	58	628
— — die permische Formation in Neu-Mexiko. R.	58	726
— — neue paläolithische Blastoideen der westlichen Staaten. R. .	58	751
Shumard u. Jandell: Eleutherocrinus eine devonische Blastoiden-Sippe. R.	57	101
Siegert: Stilpnomelan in Eisenstein-Lager bei Weilburg. R. . . .	56	347
Sillem: über Pseudomorphosen. A.	51	385
B.	51	328, 576, 820
— — Bericht über eine Sammlung von Pseudomorphosen. A. . . .	52	513
Silliman, B.: Lancasterit im Serpentin von Texas. R.	54	179
— — Elephanten-Zahn aus Mexico. R.	58	757
Sismonda, E.: vollständiges Mastodon-Skelett bei Turin gefunden. R.	51	498
— — Osteographie eines Mastodon angustidens. R.	52	987
— — fossile Fische und Kruster Piemonts. R.	52	999
— — Alter der tertiären Formationen in Piemont. B.	53	332
— — das obre Nummuliten-Gebirge der Ligurischen Apenninen. R.	56	738
Sismonda, A.: über das Piemontesische Tertiär-Gebirge. R.	53	369
— — die Schicht-Gesteine zwischen Montblanc und Nizza. R. . .	54	205
— — zwei Nummuliten-Formationen in Piemont. R.	55	732
— — Geologie der Tarentaise und Maurienne. R	56	70
— — Geologie der See-Alpen und einiger Berge in Toscana. R. .	56	575
— — die fossilen Pflanzen von Taninge in Savoyen. R.	57	766
— — Lagerung der Thier- und Pflanzen-Reste am Col des encombres. R.	58	225
Smith, A.: Bos longifrons in Römisch. Aschen-Krügen in Roxburgshire. R.	53	766
Smith, J.: Konchylien im Till von Caithness. R.	51	483
und in dessen Zwischen-Schichten. R.	51	483
Smith, L.: Mineralien in Begleitung des Smirgels in Kleinasien. R. .	51	589
— — über den Pholerit mit Korund auf Naxos. R.	52	69

	Jahrg.	Seite
Smith, L: Molybdänsaures Blei aus Pennsylvanien. R.	1859	295
Smith, L. u. G. J. Brush: Unionit ist Oligoklas. R.	54	189
— — — — Bowenit gehört zum Serpentin. R.	54	189
— — — — Kerolith ist Wasser-haltiges Thonerde-Silikat. R. . .	54	192
— — — — Lankasterit aus Brucit und Hydromagnesit gemengt. R.	54	193
— — — — Chesterlith-Talk ist ein Glimmer. R.	54	442
— — — — zerlegen Nickel-Smaragd. R.	54	815
— — — — zerlegen Margarodit aus der Monroe-Co. R.	54	816
— — — — Emerylith identisch mit Margarit. R.	54	819
— — — — zerlegen sogen. Dysyntribit. R.	54	821
— — — — über den Euphyllit. R.	55	75
— — — — Wasser-haltiger Anthophyllit = Asbest. R.	55	194
— — — — Albit von Haddam in Connecticut-Oligoklas. R. . . .	55	198
— — — — Rhodophyllit ist Rhodochrom. R.	55	198
— — — — zerlegen Lazulith aus Nord-Carolina. R.	55	348
— — — — zerlegen Biotit aus Neu-York. R.	55	348
— — — — zerlegen Danbury-Feldspathe. R.	55	449
— — — — Carrolit ein neuer Kupfer-Linnäit aus Maryland. R. .	55	560
— — — — Shepard's Ozarkit ist Thomsonit. R.	56	36
— — — — Cummingtonit gehört zur Hornblende. R.	56	183
— — — — Saponit und Thalit sind einerlei. R.	56	184
— — — — Monrolith gehört zum Disthen. R.	56	188
— — — — Loxoklas ist mit Orthoklas einerlei. R.	56	194
— — — — Chesterlith mit Orthoklas einerlei. R.	56	555
— — — — Hudsonit und Augit sind einerlei. R.	56	687
— — — — über Gibbsit. R.	57	71
— — — — über Danburit aus Connecticut. R.	57	174
Smith, R.: ein neues Silber-Erz von Mexiko. R.	57	838
Smyth, W. W.: Bergwerks-Bezirke von Cardiganshire und Montgomery-shire. R.	52	242
— — Bergwerks-Distrikte in Cardigan- und Montgomery-shires. R. .	54	209
Söchting: Verdrängungs-Pseudomorphose von Malachit und Kupferlasur nach Weissbleierz. R.	58	697
— — Mangan-Erze von Öhrenstock in Weimar. R.	59	298
— — Gediegen-Kupfer in Pseudomorphosen. R.	59	299
Sonnenschein, Fr.: Gold-Amalgam in Kalifornien. R.	54	816
— — Carolathin in Steinkohlen Oberschlesiens. R.	55	699
— — Analyse des Steinsalzes von Sosniça bei Gleiwitz. R. . . .	56	692
Sorby, H. C.: Magnesia-Kalkstein aus Kalkstein entstanden. R. . .	57	89
— — mikroskopische Struktur der Glimmerschiefer. R.	57	89
Soubeiran, E.: über den Humus. R.	52	341
Spada-Lavini, A.: Folge der Mittel-Italienischen Tertiär-Schichten. R.	58	584
Spada-Lavini u. Orsini: Geologie der Apenninen Zentral-Italiens. R.	57	203
Spengler: Asphalt im Zechsteine von Kamsdorf. R.	56	84
Spratt: Erhebung des westlichen Theiles von Kreta. R.	56	82
— — Süsswasser-Ablagerungen an den Küsten Griechenlands. R. .	59	216
Squire u. Davis: Verarbeitung von Obsidian. R.	50	702
— — — — Verwendung des Silbers in ältester Zeit. R.	51	199
— — — — das Kupfer bei den alten Amerikanern. R.	52	79
Stache, G.: geologische Verhältnisse im San Steffano in Istrien. R. .	59	317
— — die Kreide-Bildung des Gottschee'r und Möttlinger Bodens. R.	59	465
— — geologische Forschungen in Unter-Krain. R.	59	856
Staring: das Eiland Urk und das Niederländische Diluvial-Land. R. .	55	99
— — das Eiland Urk. R.	56	572
Steen-Bille: Alter der Guano-Lager. R.	59	823
Stein: Eisenstein-Vorkommen bei Oberneisen in Nassau. R. . . .	53	727

	Jahrg.	Seite
Stein: Vorkommen von borsaurem Kalke in Südamerika. R. . .	1858	576
Stenzel. C. G.: „de trunco palmarum fossilium, Vratisl. 1850". R. .	50	253
— — die Staarsteine, 1854, 4°. R.	55	503
— — Farnen-Wurzeln aus dem Rothliegenden. R.	58	363
Stephan, Erzherzog: über Gust. Leonhard's Bearbeitung des Murchison'schen Werkes. B.	52	47
— — Meteor vom 11. Mai 1852; Ankauf von Struve's Sammlung. B.	52	586
— — Naturalien-Sammlungen auf Schloss Schaumburg. B.	54	164
Stephen, G. M.: Edelstein- und Gold-Vorkommen in Australien. R. .	55	826
Stevens, R. P.: Versteinerungen aus der Nord-Amerikanischen Kohlen-Formation. R.	59	506
— — paläontologischer Synchronismus der Kohlen-Formation in Ohio und Illinois. R.	59	825
Stiehler: Pflanzen aus der Kreide-Formation Quedlinburgs. R. . .	55	493
— — Flora im Quader-Sandstein bei Quedlinburg. R.	57	622
— — zur vorweltlichen Flora des Kreide-Gebirges. R.	58	364
Stifft, F.: chemische Untersuchung des Orthits von Weinheim in Baden. A.	56	395
Stitzenberger: „Versteinerungen des Grossherzogthums Baden", 1851. R.	51	377
Stöhr, E.: Kupfererz-Gebirge in Ostindien, mit 2 Holzschn. B. . .	57	47
Stoppani, A.: Studii geologici sulla Lombardia, Milano 1857, 8°. R. .	58	747
— — „Paléontologie Lombarde", Milan, 4°, I, II, 1858. R. . . .	58	766
— — „Paléontologie Lombarde", livr. III—V. R.	59	356
— — „Scoperta di una nuova caverna ossifera in Lombardia". R. .	59	465
— — „Paléontologie Lombarde", livr. VI—VIII. R.	59	499
Stotter, M.: die Ötzthaler und die Selvretta-Masse. R.	59	752
Strasky, F.: die Anthrazit-Kohle von Rudolfstadt in Böhmen. R. . .	57	165
Strecker, H.: Analyse des Orthits von Arendal. R.	56	191
Strippelmann, L.: Zinnober-Vorkommen in Siebenbürgen. R. . . .	54	444
— — Erz-Gänge im Trojagaer-Gebirge Ungarns. R.	55	735
Strombeck, v.: Neocomien-Bildung um Braunschweig. R.	50	230
— — die Muschelkalk-Bildung im N.-W. Deutschland. R.	50	483
— — über Terebratula oblonga Sow. R.	50	746
— — Steinsalz bei Salzgitter in Braunschweig; Gebirgs-Schichten und Quellen daselbst. B.	51	325
— — über Ceriopora und Heteropora. R.	52	766
— — neue Modiola und Delphinula im Muschelkalk. R.	53	220
— — die Terebratula trigonelloides aus Muschelkalk. R.	53	222
— — Gault im subhercynischen Quader-Gebirge. R.	54	201
— — die Echiniden des Hils-Konglomerates. A.	54	641
— — über Hils-Konglomerat und Speeton-Clay bei Braunschweig. A.	55	159
— — Alter des Flammen-Mergels. R.	55	457
— — untre Kreide-Formation in Braunschweig. R.	55	843
— — Schichten-Bau des Hügel-Landes im N. vom Harze. R. . . .	56	77
— — Vorkommen von Steinsalz im Norden des Harzes. R. . . .	57	463
— — Alter des Flammen-Mergels im N.-W. Deutschland. R. . . .	57	473
— — Beitrag zur Kenntniss des Gaultes im Norden von Harz. A. .	57	641
— — Gliederung des Pläners im N.-W. Deutschland nächst dem Harz. A.	57	785
— — über Myophoria pes-anseris. R.	59	383
Strozzi. C. et Th. Ch. Gaudin: Contributions à la Flore fossile Italienne; II. Val d'arno. R.	59	870
Struve, H.: zerlegt Vivianit von Kertsch und Eisen-Lasur. R. . . .	56	559
— — Brauneisenstein von Kertsch. R.	56	690
— — Vivianit von Kertsch. R.	57	582
— — Eisen-Lasur von Kertsch und dem Baikal. R.	57	715
Studer, B.: langsame Hebungen und Senkungen in der Schweitz. R.	50	221

	Jahrg.	Seite
Studer, B.: Bedeutung des Ausdruckes Flysch. R.	1850	742
— — geologische Karte der Schweitz; Untersuchung eines bisher unbekannten Fleckes in den Hochalpen; Schiefer-Struktur des Gneisses; Paläontologie der Schweitz; Nummuliten-Bildung; Neocomien; Châtel-Kalk = Weisser Jura; Anomalie'n in der Schichten-Folge der Kalk-Alpen; Anthrazit-Bildung der Tarentaise und Erklärung ihrer Verhältnisse; weisse Kreide zwischen Genf und Chambery. B.	50	826
— — „Geologie der Schweitz", I. Bnd. 1851, 8°. R.	51	717
— — Spalten und Verwerfungen im Schweitzerischen und Französischen Jura. B.	52	197
— — „Geologie der Schweitz", I, Bern 1851, 8°. R.	52	231
— — „Geologie der Schweitz", I. Bnd., 1853, 8°. R.	54	355
— — Alpen-Geologie; Alpen-Granit und -Gneiss; graue Schiefer, grüne Schiefer und ihre Mineral-Führung. B.	55	179
— — das Anthrazit-Gebirge der Schweitzer Alpen. R.	56	729
— — Vertheilung der Mineralien am Gotthard. R.	57	609
Stur, D.: Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen. R. .	57	255
— — Geologie der Gegend von Lienz und der Carnia. R.	57	619
— — Neogen-, Diluvial- und Alluvial-Ablagerungen der N.-O. Alpen. R.	58	834
— — Untersuchungen an beiden Ufern der Waag. R.	59	201
Stutchbury: Labyrinthodon-Bein von Aust-cliff in den Severn. R. .	53	104
Suess, Ed.: „Böhmische Graptolithen", Wien 1851, 8°. R.	52	245
— — zur Kenntniss von Stringocephalus Burtini. R.	53	380
— — über Terebratula diphya. R.	53	760
— — Übersicht von Davidson's Klassifikation der Brachiopoden. B .	54	58
— — die Brachiopoden der Kössener Schichten. R.	54	87
— — Merista, eine neue Brachiopoden-Sippe. R.	54	127
— — die Brachiopoden der Kössener Schichten. R.	54	763
— — Brachiopoden der Hallstätter Schichten. R.	55	502
— — über Catantostoma clathratum Sandb. R.	56	610
— — Vertheilung der Säugthier-Reste in den Wiener Tertiär-Stöcken. R.	58	765
— — Schädel von Bos primigenius aus der Raab. R.	59	113
— — Anthracotherium magnum im Vicentinischen. R.	59	113
— — neue Wirbelthier-Reste in Österreich. R	59	355
— — über die Wohnsitze der Brachiopoden. R.	59	869
Suess u. Dormitzer: Brachiopoden im Böhmischen Übergangs-Gebirge. R.	53	223
Suess, E. u. A. Oppel: Äquivalente der Kössener Schichten in Schwaben. R.	57	92
Suzani, G.: über Gorini's Versuche die Entstehung von Gebirgen und Vulkanen zu erläutern. R.	53	610
Svanberg, L.: Hafnefjordit oder Kalk-Oligoklas. B.	50	62
Swallow, G. C.: „Report on the Geological Survey of Missouri", 1855, 8°. R.	56	734
— — permische Gebirgs-Schichten in Kansas. R.	58	502
— — permische Versteinerungen von Kansas. R.	58	765
— — Zusammensetzung der Kohlen-Formation in Missouri. R. . .	59	849
Symonds, W. S.: geologische Verbreitung des Pterygotus problematicus. R.	56	81
— — Bänke todter See-Fische. R.	56	89
— — ein neuer Phyllopode aus dem Upper Ludlow rock. R. . . .	56	95
— — Versteinerungen im Keuper von Pendock, Worcestersh. R. .	57	344

T.

Tamnau: Fowlerit von Franklin, Neu-Jersey. R	53	62
— — über Shepard's Houghit. R.	53	176

	Jahrg.	Seite
Tamnau: Epidot vom Lake superior. R.	1854	176
— — Mineralien aus den Kupfer-Gruben von Michigan. R.	54	443
— — über Shepard's Dysyntribit aus Neu-York. R.	54	825
— — Epidot vom Lake superior in N.-Amerika. R.	55	75
— — gebrochne Beryll-Krystalle in Quarz oder Granit. R.	55	194
— — Fowlerit von Franklin in Neu-Jersey. R.	55	202
— — Houghit von Gouverneur in Neu-York. R.	55	202
— — gediegen Kupfer und Silber vom Lake superior. R.	55	349
— — Zinkblüthe von Brilon. R.	55	560
— — über Shepard's Dysyntribit aus Neu-York. R.	55	701
— — geologische Bedeutung der Zirkone. R.	55	828
— — Glimmer von Zinnwald im Sächsischen Erzgebirge. R.	56	195
— — Glimmer von Zinnwald im Erzgebirge. R.	56	688
— — Idokras-Krystalle aus Nord-Amerika. R.	57	167
— — Flussspath vom Schlackenwalde. R.	57	439
— — zwei bemerkenswerthe Pseudomorphosen. R.	57	720
— — merkwürdige Kalkspath-Druse von Adelsberg. R.	58	214
— — grosser Magneteisen-Krystall von Traversella. R.	59	80
— — viol blauer Flussspath von Schlackenwald in Böhmen. R.	59	301
— — Pinit-Pseudomorphose nach Turmalin R.	59	444
Tasche: Kupferschiefer-Formation und Basalt der Wetterau. B.	52	196
— — Porphyr-artiger Trachyt im Vogelsberg. B.	52	591
— — Bunte Sandsteine und Basalte im Vogelsberge. B.	52	690
— — thoniger Brauneisenstein, dessen vormalige und jetzige Gewinnung im Vogelsberge. A.	52	897
— — die Tertiär-Formation am Rande des Vogelsberges und ihre Bedeutung. A.	53	141
— — Temperatur-Verhältnisse in Braunkohlen-Werken. R.	53	743
— — Braunkohle der Wetterau. R.	54	211
— — Tertiär-Kalk von Grabenteich bei Giessen. B.	54	675
— — chemische Zerlegung eines Tertiär-Gesteins von Giessen. B.	55	436
— — Lagerungs-Folge eines Kreide-artigen Kalkes bei Giessen. B.	55	545
— — Übergangs- unter dem Tertiär-Gebirge der Wetterau. B.	56	418
Taylor, W. J.: chemische Zusammensetzung der Schichten der Kohlen-Formation. R.	52	329
— — zerlegt Meteoreisen von Xiquipilco in Mexiko. R.	57	578
— — zerlegt einen Meteoriten aus dem Mississippi-Staate. R.	58	823
Tennant: Koh-i-noor, der grosse Diamant. R.	53	474
Terquem: über die Sippe Ceromya. R.	53	112
— — Hettangia, eine fossile Muschel-Sippe. R.	54	636
— — Beobachtungen über Pleuromya und Myopsis Ag. R.	54	754
— — ein Chiton aus Lias des Mosel-Dept's. R.	55	254
— — „sur la Monographie des Myaires de Mr. Agassiz", Metz. R.	56	245
— — Paläontologie des untren Lias-Stocks in Luxemburg etc. R.	56	491
— — Foraminifères du lias du dépt. de la Moselle, Metz. R.	59	370
Teschenmacher: Vanadin-Ocker am Oberen See. R.	56	193
Thenard: Arsenik in den Wassern von Mont-Dore, St. Nectaire etc. R.	55	445
Theobald, G.: der Calanda in Graubündten. R.	57	727
— — Piz Minschun im Unter-Engadin. R.	58	91
— — das Felsberger Horn oder der Männersattel. R.	58	342
— — die Hohe Strasse bei Frankfurt. R	58	606
— — Tarasp in Graubündten und seinen Umgebungen. R.	59	85
— — über einen Theil des Unter-Engadins. R.	59	471
— — das Weisshorn in Erosa. R.	59	630
Theodori, C.: Pterodactylus-Knochen im Lias zu Banz. R.	52	1005
— — Beschreibung des Ichthyosaurus trigonodon, 1854, in fol.	54	369

	Jahrg.	Seite
Thiollière, V.: „Poissons fossiles du corallien du Bugey", Paris in fol. R.	1854	381
— — die fossilen Fische von Bugey und das Cuvier'sche Fisch-System. R.	59	381
Thirria: Bildungs-Weise der Bohnerze in Franche-Comté und Berri. R.	52	625
— — Entstehungs-Weise der Bohnerze von Franche-Comté u. Berri. R.	54	720
Thompson, Z.: Elephanten- und Delphin-Skelette in Vermont. R.	50	747
Thomson, A. S.: zwei Höhlen mit Moa-Knochen auf Neuseeland. R.	55	125
Thomson, W.: untersilurische Acidaspis-Arten Süd-Schottlands. R.	57	365
Thurmann, J.: „Essai de Phytostatique du Jura", II, 1849. R.	50	352
— — Schichten-Folge der Portland-Gruppe von Porrentruy. R.	54	353
Tobler, E.: Augit von Sasbach im Kaiserstuhl-Gebirge. R.	55	444
— — Brevicit oder Mesol auf Phonolith am Kaiserstuhl. R.	55	702
— — Kupfer-Vitriol auf Stypticit. R.	57	582
Toschi, A.: Koprolithen zu Imola in der Romagna. R.	55	607
Trask, J. B.: Gold in Californien. R.	58	340
Trautschold, H.: die Petrefakten vom Aral-See. R.	59	866
Treviranus, L. C.: systematische Stellung der gamopetalen und dialypetalen Dikotyledonen. B.	52	601
Triger: das Jura-Gebirge von Weymouth auf Portland. R.	57	848
— — Alter der Aachener und Mastrichter Kreide. R.	58	850
Trinker, J.: Verbreitung erratischer Blöcke im S.-W. Tyrol. R.	52	959
Troost: Krinoiden-Reichthum des Tennessee-Staates. R.	50	376
Troschel, Fr. H.: neue Fische der Kohlen-Formation zu Winterburg. R.	53	217
— — Amblypterus und Palaeoniscus-Arten der Kohlen-Formation. R.	54	124
— — die Fische in der Braunkohle des Siebengebirges. R.	54	623
— — Fische des Saarbrückener Steinkohlen-Gebirges. R.	58	612
— — Morelia papyracea eine Schlange aus der Braunkohle von Rott. R.	59	237
Troyon, F.: Knochen von Cervus eurycerus mit Kunst-Produkten bei Bern. R.	58	742
Tschermak, G.: analysirt Devon-Kalk von Neuschloss in Mähren. R.	58	466
— — analysirt Kalkstein-Trümmer aus Mährischer Lava. R.	58	472
— — zerlegt Kalkspath aus Basalt von Neutitschein. R.	58	574
— — Basalt vom Grossen Rautenberg in Mähren. R.	58	686
— — Trachyt-Gebirge bei Banow. R.	58	841
— — Roemerit ein neues Mineral von Rammelsberg. R.	59	83
— — Zerlegung des Bitterspathes von Zoptau in Mähren. R.	59	84
— — das Trachyt-Gebirge bei Banow in Mähren. R.	59	841
Tschihatschew, v.: Lagerstätte von Smirgel in Kleinasien. R.	50	215
— — Tertiär-Ablagerungen in Cilicien und Cappadocien. R.	55	594
— — paläozoische Ablagerungen in Kappadozien. R.	55	718
— — Tertiär-Ablagerungen in Süd-Carien und Pisidien. R.	55	844
Tuomey: Kreide-Versteinerungen aus den südlichen Staaten N.-Amerikas. R.	56	480
Turner, H. N.: Klassifikation der Zahn-losen Säugthiere. R.	54	111
Tylor, A.: Wechsel der Meeres-Höhen durch dauernde Ursachen. R.	54	474
Tyndall: Absonderungs- und Schieferungs-Richtung der Felsarten. R.	58	840

U.

Ubaghs, J. C.: verkauft Kreide-Versteinerungen von Mastricht. B.	55	255
— — neue Bryozoen-Arten aus Mastrichter Kreide. R.	59	120
— — Verkauf Mastrichter Kreide-Versteinerungen. R.	59	384
Ulex, G. L.: eine natürliche borsaure Verbindung. R.	50	614
— — über Struveit. A.	51	50
— — Brongniartin oder Glauberit aus Süd-Peru. R.	51	204
— — natürlicher Schwefel in Hamburg. R.	53	837
Ullgren: Aridium, ein wahrscheinlich neues Metall. R.	52	69

	Jahrg.	Seite
Ulrich, Fr.: Vorkommen von Titan am Harze. R.	1853	175
— — Voltait im alten Manne am Rammelsberg. B.	53	321
— — geognostische Zusammensetzung der Gegend um Goslar. R.	53	494
— — Voltait vom Rammelsberg bei Goslar. R.	53	599
— — über Ocker'sche Hütten-Produkte. B.	54	314
— — die unterhärzer Röst-Produkte und Mineralien des alten Mannes am Rammelsberg sind den Mineralien der Solfataren vergleichbar. B.	54	790
— — krystallinische Hütten-Produkte. B.	56	666
— — Kupfererz-Vorkommen zu Hahnenklee bei Klausthal. R.	59	321
Ulrich, G.: Skorodit aus den Gold-Feldern Victoria's. R.	59	822
— — Kupferindig (Covellin) aus den Gold-Feldern Victoria's.	59	624
— — Würfelerz (Pharmakosiderit) aus den Gold-Feldern Victoria's. R.	59	625
Unger, Fr: Blatt-Abdrücke im Schwefel-Flötz von Swoszowice, Galizien. R.	51	127
— — Genera et species plantarum fossilium, Vindob. 1850. R.	50	625
— — tertiäre Lokal-Floren Österreichs. R.	51	634
— — miocäne Pflanzen in Brannkohle bei Gratz. R.	51	635
— — die jetzige Pflanzen-Welt in historischer Bedeutung. R.	52	503
— — „Versuch einer Geschichte der Pflanzen-Welt", Wien 1852. R.	52	505
— — Pflanzen der lithographischen Schiefer Solenhofens. R.	52	990
— — die Pflanzen-Reste im Salz-Stock von Wieliczka. R.	53	382
— — „die Urwelt in ihren Bildungs-Perioden" Wien, in fol. R.	54	498
— — tertiäres Pflanzen-Lager im Taurus. R.	55	241
— — zur Flora des Cypridinen-Schiefers. R.	55	239
— — jurassische Pflanzen zu Nusplingen in Württemberg. R.	56	105
— — Pflanzen-Reste aus dem tertiären Kohlen-Flötze von Prevali. R.	56	633
— — Pflanzen des Süsswasser-Kalkes und -Quarzes. R.	57	636
— — Leitha-Kalk und seine vegetabilischen Einschlüsse. R.	58	336
Unger, Fr. u. R. Richter: Paläontologie des Thüringer Waldes, Wien 4°. R.	56	624
Ure, A.: Erd-Öl in Derbyshire. R.	50	339
Uricoechea, E.: zerlegt Meteoreisen vom Cap. R.	55	455
— — Analyse des Meteoreisens von Toluca. R.	55	572
Uspenskji: Asbest im Gouvt. Perm.	59	815

V.

Valenciennes, A.: Knochen des Aepyornis. R.	54	110
— — Fels-bohrende Seeigel. R.	56	128
Vauvert de Mèan: Luft-Vulkane von Turbaco in Neu-Granada. R.	55	466
Venema, G. A.: Bernstein in der Provinz Groningen. R.	55	577
Verneuil, E. de: Pradocrinus n. g., im Devon-Gebirge von Leon. R.	50	247
— — das Nummuliten-Gebirge von Santander. R.	50	486
— — Nord-Amerikas Kohlengebirgs-Fauna mit der Europäischen verglichen. R.	50	857
— — Durchschnitt vom Silur- bis Kohlen-Gebirge zu Mans. B.	51	64
— — devonische Fossilien von Sabero in Spanien. R.	52	339
— — Gebirgs-Bildungen in Valencia und Aragonien. B.	53	158
— — gegenwärtiger Zustand des Vesuv's. R.	58	842
— — über die Lagerstätte von Rouault's Machaerus. R.	58	870
— — Ausbruch des Vesuv's 1858 im Januar. R.	59	857
Verneuil, de u. J. Barrande: silurische und devonische Reste von Almaden. R.	56	499
Verneuil, de u. Collomb.: Geognosie von Spanien. R.	53	616
Verneuil, de u. de Lorière: Geologie Spaniens. R.	55	356
Vernon, V.: Anthrazit in Pennsylvanien. R.	53	62

	Jahrg.	Seite
Vézian, A.: zwei neue Hebungs-Systeme um Barzelona. R. . . .	1857	343
— — Klassifikation der Gebirge zwischen Kreide und Miocän. R. .	59	469
Vicary: zur Geologie des Himalaya's. R.	54	475
Ville, L.: geologisch-mineralogische Notitzen über West-Oran. R. .	53	741
— — Vorkommen von Smaragd im Harrach-Thale des Atlas. R. . .	56	566
— — Grüner Turmalin im Harrach-Thale Algeriens R.	58	310
— — geologische Bemerkungen über den Bezirk Laghouat in Algerien. R.	58	723
Ville u. Bayle: die Provinz Algerien. R.	55	710
— — — — Geologie der Provinz Oran in Algerien. R.	56	450
Villeneuve-Flayosc: unterirdische Wasser der Provence. R. . . .	57	447
Virlet: Wachsthum der Buchen auf Eisenoxydhydrat-Boden bei Reims. R.	50	512
Virlet d'Aoust: Insekten-Eier die Ursache fortdauernder Oolith-Bildung in Mexiko. R.	58	226
— — ein meteorisches oder Wind-Gebirge in Mexico. R.	59	218
Visse: die Wander-Blöcke der Anden in Quito. R.	50	460
Vogel, A. jr.: Jod-Gehalt im phosphorsauren Kalke. R.	58	822
Vogelgesang: Kupfer- und Magneteisen-Lager zu Berggieshübel. R. .	54	843
Vogt, C.: „Lehrbuch der Geologie und Petrefakten-Kunde", 2. Aufl., I. B.	54	367
— — Archegosaurus ist kein Batrachier, doch ein Amphibium. B. .	54	676
Vogl, J. F.: Paterait Haidinger's, ein neues Mineral aus Joachimsthal. R.	57	324
— — Lavendulan, Verwitterungs-Erzeugniss aus Joachimsthal. R. .	54	344
— — Lindackerit ein neues Mineral von Joachimsthal. R.	54	450
— — Silbererz-Anbruch am Geistergange zu Joachimsthal. R. . .	56	82
Volborth, A. v.: Prioritäts-Rechte von Zethus vor Cryptonymus. R.	55	872
— — Crotalurus- und Remopleurides-Arten Russlands. R.	59	357
Völckel, C.: Asphalt im Kanton Neuenburg. R.	55	200
Volger, G. H. O.: neue Beobachtungen über die Umwandlung kalzitischer Sediment-Schichten in Feldspath-Gestein und über andre Gegenstände in der Entwickelungs-Geschichte der Mineralien. A.	54	257
— — die Hälblichkeit des Würflings und des Knöchlings bei'm Boracit, ein Beitrag zur Würdigung der Hälblichkeit quoad nuomenon der quoad phaenomenon unhalbirbaren Krystall-Formen. A. .	54	769
— — Tauriszit, ein neues Subgenus des Eisen-Vitriols. A. . . .	55	152
— — die Hemiedrie des Kubus und Granatoeders. A.	55	286
— — Epidot und Granat. A.	58	393
— — Verhalten des Borazits gegen Magnetismus. R.	55	838
Volkmann: über Datolith und Haytorit aus England. R.	56	563
Völker: chemischer Gehalt des Anthrazits von Edinburg. R. . . .	52	70
Völkner: Cimolit im Alexandrow'schen Kreise. R.	56	183
Völter, D.: „Deutschland und die angrenzenden Länder", Esslingen 1857. R.	58	97
Voltz, Fr.: Geologie des Grossherzogthums Hessen. B.	51	816
— — „geologische Verhältnisse des Grossherzogthums Hessen". R. .	52	82
— — mittel-tertiäre Gebirge und Fossil-Reste in Rhein-Hessen. B.	52	433
— — Verbreitung der einzelnen Tertiär-Schichten im Mainzer Becken. B.	52	586
— — die Schichten-Folge des Mainzer Beckens, erläutert durch eine Reihe von Profilen. A.	53	129
Vorhauser u. Liebener: „die Mineralien Tyrols", Innsbruck 1852. R.	53	839

W.

Wagner, A.: Lepidotus oblongus zu Solenhofen. R.	51	496
— — Ichthyosaurus n. sp. von Solenhofen; Polyptychodon aus Grünsand von Kelheim. R.	54	624
— — die Wirbelthier-Arten von Pikermi bei Athen. R.	54	637
— — Gavial-artige Saurier aus Lias in Sammlung zu München. R. .	55	494

	Jahrg.	Seite
Wagner, A.: Unterscheidung der Deutschen Ichthyosauren. R. . .	1855	496
— — Beschreibung einer neuen Ornithocephalus-Art. R.	55	619
— — die urweltlichen Thiere der Muggendorfer Höhlen. R. . . .	55	624
— — Schildkröte u. a. Reptilien aus den lithographischen Schiefern und dem Grünsande von Kelheim. R.	55	740
— — Saurier-Reste der Solenhofener Schiefer. R.	55	763
— — zwei neue Antilopen-Arten von Pikermi. R.	57	124
— — neue Säugthier-Reste von Pikermi in Griechenland. R. . . .	57	234
— — neue Knorpel-Fische aus Solenhofener Schiefern. R.	57	366
— — neue fossile Säugthier-Reste von Pikermi. R.	57	759
— — neue Flieg-Saurier aus den lithographischen Schiefern Bayerns. R.	58	366
— — zur Fauna des lithographischen Schiefers, I. Saurier. R. . .	59	108
— — die nackten Cephalopoden aus dem süddeutschen Jura. R. .	59	368
— — Monographie der Fische der lithographischen Schiefer. R. . .	59	763
Wagner, A. u. J. Roth: „fossile Knochen in Griechenland", München 1854, 4°. R.	55	375
Waitz, A.: zerlegt das Wasser von Banju-Pait. R.	54	446
Walferdin: Erd-Temperatur im Bohrloche zu Mondorff. R.	56	846
— — Temperatur-Zunahme des Bodens bei der Therme Mondorff. R.	57	471
— — Temperatur der Erde in grossen Tiefen. R.	58	102
Wallace, A. R.: Gesetzliches im Auftreten neuer Organismen-Formen. R.	57	221
Waltl: Porzellan-Erde und deren Bezirk bei Passau. R.	53	460
— — Graphit bei Passau. R.	53	466
Wandesleben, F.: zerlegt die Mineral-Quelle von Langenbrücken. R.	56	694
Wangenheim v. Qualen: neuer Schädel von Zygosaurus lucius. R. .	54	497
— — Bildung der Schwarzerde in N.-Russland. R.	56	74
Wappäus: Gold-Vorkommen in Venezuela. R.	55	564
Ward: Gebel-Nakous, der Glockenberg auf der Halbinsel Sinai. R. .	57	725
Warnsdorff, v.: zur geologischen Kenntniss von Marienbad und Karlsbad, Tf. 9. A.	51	769
— — Geognosie von Marienbad in Böhmen. R.	54	217
— — Glimmer-Trapp mit Eurit in Glimmerschiefer. R.	54	476
— — Vorkommen von Orthit im Roberitzsch-Thale. R.	54	821
— — Bergbau im Silberberg unfern Greitz. R.	59	198
Warren, J. C.: Mastodon giganteus mit überzähligem Zahne. R. . .	56	127
Weber, C. O.: Flora der Niederrheinischen Braunkohlen-Formation. R	52	751
— — die fossilen Pflanzen der Zechstein-Formation. R.	53	124
— — Süsswasser-Quarz von Muffendorf bei Bonn. R.	54	213
— — Pflanzen aus altem vulkanischem Tuff zu Pleidt bei Andernach. R.	57	249
— — Ursprung und Verbreitung der Planzen-Welt, Bremen 8°. R. .	57	749
— — ein Palmen-Blatt aus der Braunkohle von Rott. R.	59	237
Weber, C. O. u. Ph. Wessel: zur Niederrheinischen Braunkohlen-Flora, II. R.	56	504
Weber, Fr. Ch.: Speisskobalt von Riechelsdorf in Churhessen. R. .	56	444
— — Krystall-Bildung bei Zink-Destillation. R.	59	82
Websky: Mangan-Idokras von St. Marcell in Piemont. R.	51	89
— — Automolith und Epidot zu Querbach. R.	52	69
— — Zerlegung des Arsenik-Kieses von Altenberg und Querbach. R.	52	76
— — kohlensaures Blei und Molybdän-Bleispath zu Kupferberg. R.	52	210
— — Zirkon, Spinell und Turmalin von der Isar-Wiese. R. . . .	52	706
— — Krystall-Form des Tarnowitzit's. R.	58	691
— — Vorkommen von Phlogopit von Alt-Kemnitz in Schlesien. R. .	58	822
Weddel: fossile Säugthier-Knochen in Süd-Bolivia. R.	53	751
Weibye, P. H. u. N. J. Berlin: über den Trilomit. R.	51	352
— — — — über den Atheriastit von Arendal. R.	51	705
Weibye, Berlin u. v. Borck: über den Eudnophit von Brevig. R. .	50	703

	Jahrg.	Seite
Weibye, P. H. u. Sjögren, K. A.: über den Katapleiit. R. . . .	1851	88
Weidenbusch, H.: zerlegt Quecksilber-haltiges Fahlerz aus Tyrol. R. .	50	337
Weiss, Fr.: Umrisse der Orologie der Erde. R.	53	852
— — über die Grund-Gesetze der mechanischen Geologie, I. A. . .	54	385
— — die Grund-Gesetze der mechanischen Geologie, II. (Tf. 4, 5). A.	55	288
III. (Tf. 8). A.	55	641
— — Berichtigungen zur Pfaff'schen Beurtheilung der Grund-Gesetze der mechanischen Geologie. A.	56	768
— — zur näheren Erläuterung des Struktur-Gesetzes der Erde. A. .	57	789
Weiss, O.: Ursprung der Sool-Quelle von Sooden an der Werra. R.	52	494
— — die Churhessische Saline Sooden an der Werra. R.	53	70
Weisse, J. T.: mikroskopische Untersuchung der Schwarzerde Russlands. R.	57	473
Werssilow, N.: Vorkommen des Lapis lazuli im Baikal-Gebirge. R. .	58	824
Weselsky u. Bauer: zerlegen ein Mineral-Wasser aus Österreich. R.	58	825
Wessel: der Jura in Pommern. R.	55	847
Wessel, Ph. u. O. Weber: zur Niederrheinischen Braunkohlen-Flora. II. R.	56	504
Westwood, J. O.: Beiträge zur Kenntniss fossiler Insekten. R. . . .	55	746
Wetherill, C. M.: Gold in Pennsylvanien. R.	54	204
— — zerlegt Melan-Asphalt von Neu-Braunschweig. R.	54	816
— — Molybdän-Glanz von Reading in Pennsylvanien. R.	56	444
Wetherell, N. T.: Graphularia-Art in London-Thon und Red Crag. R	59	747
Whitney, J. D.: neues Uran-haltiges Mineral vom Lake superior. R.	51	592
— — derber Datolith von Isle royal im Ober-See. R.	55	73
— — Metall-Vorkommen in den Vereinten Staaten. R.	58	327
Whitney u. Desor: über fossile Regen-Tropfen. R.	52	110
Whitney u. Forster: Azoisches Gebirge am Oberen See. R. . . .	54	829
— — — — Pechstein aus Trapp von Isle Royale. R.	55	449
Whitney, J. D. u. J. Hall: „Geological Survey of Iowa", 1858. R. .	59	340
Wicke, W: Beobachtung über Entstehung der Blitzröhren. R. . . .	59	623
Wiggins: Reichthum des Crags in Suffolk an phosphorsaurem Kalke. R.	50	90
Wildenstern, R.: Borsäure in der Kaiserquelle zu Aachen. R. . . .	54	184
Williams, D.: Küsten-Durchschnitt am Lundy-Eilande Englands. R. .	50	858
Willkomm, M.: Quecksilber-Bergwerk zu Almaden in Spanien. R. .	50	497
Wilson, G.: Fluor in Meerwasser. R.	50	61
— — ob der Diamant von Anthrazit oder Graphit abstammt. R. . .	51	588
Wilson, J. S.: Geologie der Gegend von Sydney etc. in Australien. R.	58	229
Wimmer, Fr. W.: Erz-Gänge der Gruben Ring und Silberschnur bei Clausthal. R.	54	841
Wineberger, L.: geognostische Beschreibung des Bayern'schen Waldgebirges", Passau. R.	53	372
Windakiewicz, E.: Torf-Moor am Passe Thurn. R.	54	94
— — Bergbau im Brennthal in Salzburg. R.	54	194
Winkler, G. G.: „die Pseudomorphosen des Mineral-Reichs", München 1855. R.	56	564
— — „die Schichten der Avicula contorta inner- und ausser-halb der Alpen", München 1859, 8°. R.	59	628
— — Allgovit (Trapp) in den Allgäuer Alpen Bayerns. A. . . .	59	641
Wirtgen, Ph.: Spiriferen-Sandstein mit Petrefakten zu Bertrich. B. .	54	38
Wirtgen Ph. u. P. Zeiler: Übersicht der um Coblenz in den unteren Lagen der devonischen Schichten vorkommenden Petrefakte. A.	52	920
— — — — Echinodermen aus dem Eifeler Kalke. R.	56	233
Wiser, D. F.: Kupferkies und Gediegen-Gold auf Gängen von Schemnitz; wasserhelle Zirkone im Pfitsch-Thale; Magnet-Kies zu Schneeberg. B.	50	429
— — Diamant aus Brasilien; Eisen-Rosen vom St. Gotthard; rothe		

	Jahrg.	Seite
Flussspathe in Uri; Hyazinth-Granaten am Dissentis; Ammonit in Schwarzmangan. B.	1851	571
Wiser, D. F.: Bericht über Mineralien aus der Schweitz. A.	52	289
— — Mineralien seiner Sammlung aus der Schweitz. A.	54	26
— — Bericht über Schweitzische Mineralien seiner Sammlung. A.	56	11
— — Brookeit, Bergkrystall, Anatas u. Eisenglanz aus der Schweitz. B.	56	168
— — mineralogische Mittheilungen über Flussspath, Anatas, Brookeit und Apatit A.	58	447
— — mineralogische Beobachtungen an Flussspath, Kalkspath, Quarz, Brookeit, Anatas, Analzim. B.	58	549
— — desgleichen über Flussspath und Scheelit. B.	58	664
— — mineralogische Notitzen. A.	59	424
Wisse, S.: der Cuica der Anden des Äquators. R.	54	726
Witt, H. M.: die Schwefel-Quelle Issisu am Ararat. R.	57	324
— — analysirt Wasser des Urmiah-See's am Ararat. R.	57	581
Witte: über fossile Eier. R.	59	863
Wittstein, G. C.: über die Kreide. R.	50	708
— — Analyse des Steinmarks von Münden R.	51	202
— — Untersuchung weisser Marmor-Arten. R.	51	444
Wöhler, F.: Arsenik-Gehalt des Karlsbader Sprudelsteins. R.	51	587
— — die bisher für Titan-Metall gehaltene Substanz. R.	52	702
— — Schwefelkies und Speerkies. R.	56	192
— — der Meteorit von Borgholz bei Paderborn. R.	58	567
Wöhler u. Hausmann: Meteorstein-Fall bei Bremervörde i. J. 1855. R.	57	332
Wolf, H.: geologische Verhältnisse des Bikk-Gebirges. R.	59	739
— — Braunkohlen-Ablagerungen in den Komitaten Honth, Neograd, Heves und Borsod. R	59	854
— — Mineral-Quellen von Szanto, Magyarad und Bory in Ungarn. R.	59	198
Wood, T. V.: „Monograph of the Crag Mollusca; II. Bivalves". R.	52	1003
— — „Monograph of the Crag Mollusca, I. Univalves". R.	53	762
— — „Monograph of the Crag Mollusca, II. the Bivalves, contin. R.	54	505
— — „Monograph of the Crag Mollusca, II. Bivalves, Schluss. R.	57	506
Wood, L. V.: fremde Fossil-Reste eingeführt in den Red Crag. R.	59	747
Woodward, S. P.: Struktur und Verwandtschaft der Hippuritiden. R.	55	376, 377
— — ein Conoteuthis aus dem Gault von Folkstone. R.	56	610
— — Struktur eines Orthoceras aus China u. a. A.	57	251
Worthen, A. H.: Fische aus Kohlen-Kalk und -Schiefer in Illinois. R.	57	342
Wosinsky u. Roeillier: alte Foraminiferen um Moskau. R.	51	495
Woskressenskij, A.: Untersuchung Russischer Brenn-Materialien. R.	50	617
Wright, Th.: Tertiär-Schichten im Küsten-Durchschnitte von Hampshire. R.	51	711
— — zur Paläontologie der Insel Wight. R.	52	1001
— — zur Paläontologie der Oolithe in Gloucestershire. R.	56	100
— — tertiäre Echinodermen auf Malta. R.	56	100
— — Hemipedina eine mesolithische Cidariden-Sippe und ihre Arten. R.	56	490
— — British oolitic Cidaridae, Hemicidaridae and Diademadae. R.	57	767
— — die „Sands of the Inferior Oolite". R.	58	354
Württemberger, G.: Gerölle mit Eindrücken im Bunt-Sandsteine zu Frankenberg in Churhessen. A.	59	153
Wüstemann: geologisches Relief der Rosstrappe. R.	58	843
Wutzer: Erdbeben bei Brussa im westlichen Kleinasien, 1855. R.	57	449
Wyman, J.: Wirbelthier-Reste von Richmond, Virginien. R.	51	254
— — fossile Knochen von Memphis, Tennessee. R.	54	860
— — Knochen im rothen Sandsteine des Connecticut-Thales. R.	56	82
— — Reptilien in der Kohlen-Formation des Ohio-Staates. R.	57	340
— — Batrachier-Reste in der Kohlen-Formation des Ohio-Staates. R.	59	126

Jahrg. Seite

Y.

Yandell u. Shumard: Eleutherocrinus, eine devonische Blastoiden-Sippe. R. 1857 101

Z.

Zekeli, Fr.: die Gastropoden der Gosau-Gebilde. R. 53 632
Zeiler: Versteinerungen der älteren Rheinischen Grauwacke. R. . . 58 744
Zeiler, P. u. Ph. Wirtgen: Echinodermen aus dem Eifeler Kalke. R. 56 233
Zepharovich, V. v.: Pseudomorphose von Weissbleierz nach Bleiglanz. R. 51 92
— — Mineral-Vorkommnisse bei Strakonitz in Böhmen. R. 54 348
— — Jaulingit, ein fossiles Harz aus Nieder-Österreich. R. 55 819
— — Mastodon angustidens in der Jauling. R. 56 90
— — zur Geologie des Pilsener Kreises in Böhmen. R. 56 577
— — Braunkohle zwischen Priszlin und Krapina. R. 59 633
— — Muschelkalk zu Füred am Plattensee. R 56 730
— — Geologie der Halbinsel Tyhany und Füred. R. 57 181
— — Werk über die Mineralien des Österreichischen Kaiserstaates. B. 58 57
Zerrenner, C.: die Diamant-Grube Adolphsk am Ural. R. 50 237
— — „Anleitung zum Gold-, Platin- und Diamant-Waschen". R. . 52 499
— — der Magnet-Berg Katschkanar im Ural. R. 52 738
— — die Gliederung der Steinkohlen-Formation bei Stockheim im N. Bayern, und das Auftreten der Zechstein-Formation daselbst (Tf. 1). A. 53 1
— — Versteinerungen im Zechstein zu Pössneck in Thüringen. R. . 53 128
— — Metalle im Gold-Sande von Oláhpian, Siebenbürgen. R. . . . 54 68
— — geognostische Verhältnisse von Oláhpian in Siebenbürgen. R. 54 711
Zeuschner, L.: Schwefel-Lager von Swoszowice bei Krakau. R. . . 51 732
— — Nerinäen-Kalk von Inwald und Roczyny. R. 52 346
— — Löss in den Bieskiden und dem Tatra-Gebirge. R. 52 971
— — Obre Jura- und Kreide-Bildungen in Polen mit Versteinerungen. B. 57 155
— — alte Längen-Moränen bei Zakopane in der Tatra. R. 58 343
— — Löss in den Karpathen. R. 59 202
Zigno, A. de: fossile Pflanzen in den Jura-Gebilden der Venetischen Alpen (Tf. 2). A. 54 31
— — neue Lagerstätte miocäner Fische zu Chiavona. R. 54 734
— — Werk über die Flora der Venetischen Alpen. B. 56 171
Zimmermann. K. G.: Lager von Binnen- und See-Konchylien im Alluvial-Boden Hamburgs; Lager kieselschaliger Infusorien. B. . . . 52 193
— — Gibt Tacitus einen historischen Beweiss von vulkanischen Eruptionen am Niederrhein? A. 53 537
— — Schwefel-Vorkommen bei Hamburg; Philippi in Chili; Lager lebender Muschel-Arten bei Hamburg. B. 53 562
— — jugendliche, organische Reste enthaltende Schichten bei Hamburg. B. 54 36
— — Quecksilber-Vorkommen in der Lüneburger Haide. B. . . . 54 323
— — ein Brief Philippi's über seine Thätigkeit in Chile. B. . . . 54 566
— — Pläner-Gebirge zu Doberan in Mecklenburg. B. 54 670
— — Koch's geognostische Beobachtungen in Mecklenburg; Braunkohlen; Septarien-Thone. B. 55 435
— — anstehendes Kreide-Gebirge bei Hamburg. B. 56 671
— — Semper's Entdeckung miocäner Konchylien bei Altona B. . . 57 50
Zincken: über Quellen-Bildung. R. 52 742
— — Quarz-Bildungen auf nassem Wege, R. 52 866
Zinken u. Rammelsberg: zerlegen Apophyllit vom Harze R. 50 68

	Jahrg.	Seite
Zinken u. Rammelsberg: Epichlorit vom Harze. R.	1850	215
— — — — über Scheelit vom Harze. R.	50	346
— — — — das Gänseköthig-Erz vom Harze. R.	50	349
— — — — über die Fahlerze vom Harz. R.	50	691
— — — — Wollastonit vom Harze. R.	50	846
— — — — das Arseniksilber vom Harze. R.	51	197
— — — — 2 Nickelerze der Antimon-Grube bei Wolfsberg. R. .	51	348
— — — — Strontian und Schwerspath von Köthen. R.	51	353
— — — — über den Bournonit vom Harz. R.	52	701
Zippe, F. X. M.: Rittingerit, eine neue Mineral-Spezies. R.	52	865
— — Krystall-Gestalten des Alumits. R.	53	477
Zittel, C.: Analyse des Arendaler Orthits. R.	59	816
Zobel: Graphit-Vorkommen zu Sacrau bei Münsterberg. R. . . .	51	600
— — Braunkohlen-Lager im Nimpt'scher Kreise. R.	52	495
— — Graphit-Vorkommen in Schlesien und der Grafschaft Glatz. R.	54	724
Zollikofer, Th. v.: geologische Verhältnisse an der Sann in Unter-Steyermark. R.	59	313
Zschau, E. F.: über ein neues Vorkommen des Orthits im Plauen'schen Grunde bei Dresden, und die Orthit-Fundstätten auf Hitteröe in Norwegen. A.	52	652
— — Vorkommen der phosphorsauren Yttererde in den Gang-artigen Graniten des Norits auf Hitteröe in Norwegen. A.	55	513
Zuchold: Bibliotheca historico-naturalis et physico-chemica, 1851, I. R	52	81

II. Sach-Register.

Blosse Zitate von Mineralien und Gebirgs-Arten ohne weitre Details sind in der Regel unberücksichtigt geblieben, Petrefakte dagegen vollständig aufgezählt. — In der Schreib-Weise der Fremdwörter ist, wo ein K und Z statt C zulässig, das erste gewöhnlich vorgezogen worden, auch wenn es im Texte anders geschrieben ist. — Wo ein Deutsches Beiwort mit einem Hauptworte zusammen einen Eigennamen bilden, ist dieser meistens nach dem Anfangs-Buchstaben des vorausgehenden Beiwortes im Register eingereiht worden (z. B. Edler Opal; Rother Sandstein; Gediegen Eisen). — Bei Petrefakten-Namen ist die Schreib-Weise wie z. B. Ammonites Rangi und Ranganus statt A. Rangii und Rangianus vorgezogen worden; aber auch der Unterschied zwischen Martin-i und Martin-anus einerseits und Martini-i und Martini-anus anderseits gewahrt, soweit der Name verlässig bekannt war. — Ist die zitirte Seitenzahl ohne Beisatz, so hat man dort nur ein Zitat oder wenig mehr zu erwarten; hat sie einen Exponenten (^{2}, ^{3}), so bedeutet Diess, dass derselbe Namen auf derselben Seite zwei- oder drei-mal vorkomme; ist ihr ein * beigefügt, so ist daselbst eine weitere Erörterung, — und ist ihr ein ! zugesetzt, so ist dort bei Petrefakten und Gebirgsarten eine vollkommene Definition oder Beschreibung, bei Mineralien eine Analyse zu erwarten.

A.

Aachenien 8. 850
Aachener-Sand 0. 92, 298
Aalensis-Schicht 8. 450
Aberdeen bleu-marl 0. 181
Aberlya gen. 7. 865
  nodosa 7. 866
Abies 0. 127
  alba 7. 100
  balsamea 3. 746
  Canadensis 3. 747
  Oceanines 2. 760
  spp. 0. 502; 1. 382
Abietineae fam. 5. 638
Abietites acutatus 3. 747
  anceps 3. 747
  claveolatus 3. 747
  crassifolius 3. 747
  curvifolius 6. 640
  elongatus 3. 747
  glaucescens 3. 747
  Goepperti 6. 640
  Hartigi 6. 640
  lanceolatus 3. 746
  Lincki 0. 112; 2. 888
  microphyllus 3. 747
  mucronatus 3. 747
  obtusatus 3. 747
  obtusifolius 3. 226, 747
  Oceanicus 3. 120
  pungens 3. 747
  Reicheanus 3. 226, 747
  rotundatus 3. 747
  striolatus 3. 746
  trinervis 3. 747
  Wredeanus 3. 226, 747
Abkühlungs-Gang der Erde 5. 217
Ablenkungs-Achsen der Schichten 5. 659
Abplattung der Erd-Pole 4. 474
Abra alba 7. 506
  fabalis 7. 506
  obovalis 7. 506
  prismatica 7. 506
Abracrinus gen. 6. 602
Abrazit 3. 183, 257
Abrutschung am Havraneck 0. 76 *
Absätze des Rheines 2. 385 !
Absonderungen in den Felsarten 8. 840
Absorption von Wasser-Dunst durch Mineralien 3. 696
Acacia 0. 637
  amorphoides 6. 506
  caesalpiniaefolia 9. 376
  coriacea 4. 380
  cyclosperma 3. 506
  Dianae 4. 380
  Kunkleri 3. 506
  Meyrati 3. 506
  mimosoides 4. 380
  microphylla 3. 506; 9. 376
  Parschlugana 4. 380, 491; 9. 376
  Proserpinae 4. 380
  Sotzkiana 3. 506; 4. 380; 6. 506; 9. 376
  Succini 4. 145
Acaementodontae 1. 497 !

Acalypha Prevaliensis 6. 633
Acamarchis gen. 4. 113 !
Acamarchisidae fam. 4. 113
Acanthastraea gen. 0. 763 !, 765; 2. 118 *
hirsuta 0. 765
Acanthias bicarinatus 2. 999
Acanthichnus gen. 9. 869
cursorius 9. 869
saltatorius 9. 869
tardigradus 9. 869
Acanthocladia (Polyp. gen.) 1. 489 !; 3. 127 !; 6. 114
anceps 3. 7, 126; 4. 119, 489. 745; 8. 727, 766
Acanthocnemis gen. 3. 487
Acanthocoenia 2. 117*
Acanthocrinus gen. 4. 254
Acanthocrinus 0. 679
longispina 0. 679; 6. 233
brevispina 0. 680
spp. 2. 938
Acanthocyathus 2. 115 *
Acanthodes gen. 7. 630! 8. 612!
Bronni 7. 631; 8. 612
gracilis 7. 630, 631 !
pusillus 7. 631
sulcatus 7. 631
Acanthodermus (Squatina) gen. 5. 614
platystoma 5. 614; 6. 487
Acanthogramma gen. 3. 487
Acanthoidei fam. 6. 123
Acantholophus spp. 5. 124
Acanthonemus filamentosus 5. 380
Acanthopora Lamourouxi 5. 653
spinosa 5. 653
Acanthopleurus brevicauda 9. 862
brevis 9. 862
longipennis 9. 862
serratus 9. 862
Acanthopsis acutus 5. 234
angustus 0. 501; 5. 622
Acanthopyge gen. 1. 509; 3. 487
Anglica 6. 116
Acanthosoma Morloti 3. 873
Acanthoteuthis gen. 4. 853; 9. 369
Acanthoteuthis
acuta 9. 370
antiqua 6. 378; 8. 484
barbata 5. 613
Ferussaci 9. 370
gigantea 9. 370
Lichtensteini 9. 370
speciosa 9. 370
Acanthurus Canossae 6. 481 !
Duvali 5. 235
Acanus arcuatus 9, 862
gracilis 9. 862
minor 9. 862
oblongus 9. 862
ovalis 9. 862
Regleyi 9. 862
Acapetus aequalis 6. 622
Acarus rhombeus 5. 124
Acaste gen. 3. 487
albifrons 4. 501
apiculata 4. 501
Brongniarti 4. 501
conophthalmus 4. 501
Dalmani 4. 501
Downingae 4. 500
Jamesi 4. 501
Juckesi 4. 501
undulata 7. 117
Acephala 2. 757; 7. 742
Acer gen. 0. 635
angustilobum 3. 505
Beckeranum 2. 894; 3. 228; 8. 365
Bruckmanni 0. 507; 3. 505
campestre 4. 627
campylopteryx 3. 47
cistifolium 3. 228
cyclospermum 2. 754
cytisifolium 9. 501
decipiens 0. 507; 2. 761; 3. 505
giganteum 2. 894; 3. 228
hederaeforme 3. 228; 9. 501
indivisum 2. 754; 3. 505
integrilobum 2. 754; 3. 505; 4. 627
Monspessulanum 4, 627; 4. 832
montanum 9. 348
Oeynhausenanum 3. 228; 9. 501
opuloides 3. 505
Acer
otopteris 3. 228
otopteryx 2. 894; 6. 633
Parschluganum 9. 501
patens 0. 507; 3. 505
platyphyllum 0. 507; 3. 505
Ponzianum 9. 117; 9. 871, 873
productum 0. 507; 1. 634; 2. 754, 761; 3. 120, 505; 4. 627
protensum 2. 761
pseudo-campestre 0. 507; 2. 754, 761; 3. 505; 6. 505
pseudo-creticum 2. 628; 4. 491
pseudo-monspessulanum 3. 384, 505; 4. 491
pseudoplatanus 8. 501
radiatum 0. 508
ribifolium 3. 228
semitrilobum 3. 228
sepultum 6. 252
siifolium 3. 228
Sismondai 9. 117, 873
Sotzkianum 9. 375
strictum 3. 228
subcampestre 3. 228
triangulilobum 3. 228
tricuspidatum 0. 507; 2. 754, 987; 3. 505
trifoliatum 0. 507
trilobatum 0. 507; 1. 634; 2. 754; 3. 120, 384, 505; 4. 491; 7 614; 9. 505, 754
vitifolium 2. 754, 762; 3. 505
Aceratherium gen. 7. 869
Croizeti 5. 372
Gannatense 4. 244 !, 756, 758 !
Goldfussi 4. 758 !; 9. 166
incisivum 1. 360, 501. 503; 2. 627; 3. 378; 4. 756 !, 758 !; 7. 59, 315, 375; 9. 163*
Lemanense 5. 372
minutum 4. 758 !; 9. 166
Nebrascense 7. 247; 5. 115; 8. 376
occidentale 8. 376
tetradactylum 3. 106; 4. 756, 758; 5. 225
typus 4. 756 !, 758 !

Acerinium 0. 635
Acerites 0. 635
elongatus 4. 627
ficifolius 4. 627
integerrimus 1. 128; 4. 627
repandus 5. 493; 8. 365
Acerocare spp. 4. 493
Acerotherium
vid. Aceratherium
Acervularia 2. 122*
ananas 6. 114
basaltiformis 6. 255
Goldfussi 2. 341
granulosa 6. 255
impressa 6. 255
irregularis 6. 255
Koninckı 6. 255
macrommata 6. 255
marginata 6. 255
pentagona 6. 114
Pradoana 6. 601
Roemeri 6. 255, 341
tubulosa 6. 255
spp. 4. 497; 7. 104
Acervulina gen. 5. 749, 755
Acervulinida fam. 5. 754! ff
Acetabulifera, ordo 4. 852
Achat 4. 219
-Kugeln, innrer Bau 3. 150
Achaenites dubius 3. 504
Ungeri 3. 504
Achatina acicula 4. 249
antiqua 2. 637
costellata 4. 864
elegans 4. 249
loxostoma 4. 249
lubrica 9. 38
porrecta 5. 768
Achnanthes longipes 0. 473
subsessilis 0. 473
spp. 0. 491
Achras 0. 634
Achse der Erde stetig 2. 726
Achsen-Änderung der Erde 6. 527
Achtarandit 3. 596
Acichelys Redenbacheri 4. 579!
Acidaspis gen. 0. 777, 785; 1. 509; 3. 487; 6. 224[2]
biserialis 4. 501
bispinosus 4. 501
Brighti 4. 501; 6. 116
Buchi 7. 638
callipareos 7. 365
Caractaci 4. 501; 7. 365
coronatus 4. 501
Halli 6. 736
Hercyniae 8. 753
hystrix 7. 365
Jamesi 4. 501
Lalage 7. 365
ornata 7. 365
Selcana 6. 256; 8. 753
unica 7. 365
spp. 4. 493; 5. 249
Acipenser gen. 3. 223*
Aclis spp. 6. 750
minuta 9. 506
robusta 9. 506
Acme spp. 6. 750
Acmaea gen. (vid. Helcion et Lottia 3. 765
depressa 6. 626[2]
cellulosa 3. 230
Acodus gen. 8. 112
acutus 8. 112
crassus 8. 112
erectus 8. 112
planus 8. 112
sigmoideus 8. 112
Acontheus g. spp. 2. 242. 243!
Acontiodus gen. 8. 112
gracilis 8. 112
latus 8. 112
triangularis 8. 112
Acotherulum Saturninum 0. 499; 5. 228
Acramphibrya (Vegetabilia) 0. 632!; 2. 504!
Acreagris crenata 5. 125
Acridium spp. (Lias) 2. 985
Acrobrya (Vegetabilia) 0. 626!; 2. 504[1]
Acrocidaris 7. 122
depressa 4. 653
Acrocladia 7. 122
Acroculia acuta 6. 256; 7 762; 8. 753
angulata 7. 762
Bischofi 6. 256; 7. 762; 8. 753
compressa 7. 762
contorta 7. 762; 8. 753
Haliotis 6. 256; 7. 762; 8. 753
naticoides 7. 762; 8. 753
Niagarensis 7. 762
ornata 8. 754
ovalis 9. 506
psittacina 7. 762
sigmoidalis 7. 762
sinuosa 7. 762
trigona 7. 762
trigonalis 9. 506
uncinata 7. 762; 8. 753
Zinkeni 7. 762; 8. 753
spp. 5. 248;
Acrocyathus 2. 122
Acrocyllia rectius pro Acroculia 7. 761
Acrodontae 5. 742
Acrodus acutus 1. 81; 3. 17; 6. 745
Brauni 6. 745
Gaillardoti 1. 81; 3. 13, 17; 4. 840; 5. 234; 6. 616; 6. 745; 8. 615; 9. 360
immarginatus 6. 745
minimus 8. 354; 9. 12
nobilis 5. 234
spp. 3. 109; 9. 764
Acrogaster parvus 9. 494
Acrogenae (plantae) 0. 107; 2. 504!
Acrohelia 2. 116*; 2. 249!, 250
Acrolepis gen. 3. 117*
Hopkinsi 6. 123
Sedgwicki 4. 751
Acroloxus gen. 4 865
Acropeltis 7. 122
Acrosaurus Frischmanni 4. 56!; 6. 420
Acrosalenia 7. 122
crinifera 6. 100, 850
decorata 6. 95
hemicidaroides 4. 621
Hoffmanni 1. 485; 2. 229
Lycetti 8. 357
minuta 6. 454
rarispina 6. 100; 7. 768
spinosa 8. 357
Acrosmilia 2. 116*
Acrostichites 0. 627
obliquus 8. 358
Acrostichum Silesiacum 6. 97
Acrotreta 0. 369, 373
dispari-rugata 0. 373; 4. 504
recurva 0. 373; 4. 504

Acrotreta recurvirostra 0. 372
subconica 0. 373; 4. 61, 504
Actaeon acuminatus 7. 210
alpinus 7. 94
attenuatus 8. 497
Burdigalensis 3. 74
Buvignieri 6. 494
concinnus 7. 864; 8. 494
costatus 3. 604
crenatus 1. 716
elongatus 1. 716
glaber 2. 229
globulosus 3. 74
gracilis 1. 741
Grateloupi 3. 74
inermis 6. 494
Levidensis 3. 765
milium 6. 494
Noae 3. 765
oliva 7. 866
papyraceus 3. 74
pullus 3. 235
punctulatus 3. 74
secale 6. 494
Sedgwicki 3. 235
semistriatus 3. 74
simulatus 1. 715
Staszycii 2. 348; 6. 763
subellipticus 7. 492; 8. 494
subfasciatus 3. 74
subulatus 3. 765
tornatilis 3. 765
spp. 6. 750
Actaeonella Caucasica 3. 634; 4. 874
conica 3. 633, 634; 4. 874; 7. 204, 618
de Cristoforis 6. 217
dolium 0. 102
elliptica 3. 634; 4. 874; 7. 618
gigantea 3. 633, 634, 715, 719, 4. 712, 870, 873; 6. 64
glandiformis 3. 633, 634
Goldfussi 4. 874
laevis 3. 633, 634, 715, 4. 870, 874; 7. 613
Lamarcki 3. 633, 634, 717; 4. 870, 874; 7. 618
obtusa 3. 634; 4. 873; 7. 618
Actaeonella Renauxana 3. 633, 634, 4. 874, 870; 7. 618
rotundata 3. 634; 4. 873
Voluta 3. 633, 634; 4. 874
Actaeonina gen. 3. 237! 6. 494
alpina 3. 167; 7. 94
Arduennensis 7. 210
armata 9. 356
bulimoides 3. 235
De Cristoforis 9. 356
Dewalquei 6. 454
Esinensis 9. 356
fragilis 6. 454; 8. 643
fusoides 9. 356
gigantea 3. 235
glabra 3. 235
inornata 9. 356
milium 8. 643
olivaeformis 3. 235
ovata 2. 229
parvula 3. 235
tumidula 2. 229; 3. 235
spp. 9. 123
Actinacis 2. 119*
elegans 4. 868
Haueri 4. 868
Martiniana 3. 582; 4. 868
Actinantha 2. 122
Actinaraea granulata 3. 877
Actinastraea 2. 117*
Actineda malleator 5. 124
subnuda 5. 124
venustula 5. 124
Actinhelia 2. 118
Actiniscus pentasterias 6. 104
Sirius 6. 104
tetrasterias 6. 104
Actinocamax verus 5. 633
Actinoceras gen. 4. 853; 5. 385 ff., 395; 6. 126*; 7. 252. 679* ff.
Bigsbyi 5. 400*; 6. 126; 7. 681*
giganteum 5. 407*; 6. 122; 7. 681*
Mocktreense 6. 122
Richardsoni 5. 396* ff.
Simmsi 5. 407*
Actinoceratitae fam. 6. 126
Actinocrinus gen. 4. 253!
Agassitzi 0. 376
Actinocrinus armatus 6. 602
Atlas 1. 748; 6. 115
Christyi 6. 735
cingulatus 2. 108
concinnus 6. 735
cornutus 0. 376
costus 6. 602
cyathiformis 6. 374
decadactylus 6. 374
deornatus 6. 602
dorsatus 6. 602
fibula 0. 376
gibbosus 0. 376
Gilbertsoni 6. 115, 602
Humboldti 0. 376
icosidactylus 6. 602
Konincki 6. 735; 9. 635
laevis 2. 108; 6. 602; 8. 754
Missouriensis 6. 735
moniliformis 0. 376
Nashvillae 0. 376
olla 1. 748; 6. 115
parvus 6. 735
polydactylus 6. 115, 602
Prumiensis 6. 233; 7. 860
pulcher 6 115
pyriformis 6. 735
rotundus 6. 735; 9. 635
rugosus 9. 635*
stellaris 6. 602; 9. 635*
striatus 6. 625
tenuiradiatus 9. 636
tenuis 6. 602
tenuistriatus 6. 626
tessellatus 6. 115
tesseracontadactylus 8. 286
triacontadactylus 6. 115, 602²
tricuspidatus 6. 602
urna 0. 376
Verneuili 0 376
Verneuilanus 6. 735; 9. 635
Yandelli 8. 628
spp. 9. 343
Actinocyathus 2. 122
Actinocyclus nonarius 0. 473
sedenarius 0. 473; 0. 473
Actinoderma gen. 6. 376!
malleiforme 6. 373
Actinodiscus sol 0. 489
Actinodonta gen. 6. 119

Actinolepis gen. 1. 494
Actinolithis dichotoma 6. 104
Actinopeltis gen. 3. 488
clavifrons 4. 501
Actinophrys gen. 6. 127*
Actinophyllum gen. 6. 114
Actinopora gen. 5. 635
Actinoptychus apicatus 6. 103
biternarius 6 103
denarius 6. 103
duodenarius 6. 103
pyxidicula 6. 103
quaternarius 6. 103
senarius 4. 739; 6. 103
ternarius 6. 103
Actinoseris 2. 119*
Cenomanensis 2. 377
Provincialis 2. 377
Actinosiphitae fam. 6. 126
Actinosmilia 2. 116*
Actinostrobites 0. 632
Actinurus gen. 3. 487
Actita gen. 7. 761
Acuarius-Schicht 8. 450
Acucephalus crassiusculus 3. 874
curtulus 3. 874
Acutilaterales (Goniatitae) 1. 547!
Adacna laevigata 6. 592
plicata 6. 592
Adams-Hölzer 0. 127
Adapis Parisiensis 5. 228
Adelastraea leptophylla 4. 868
Adelocoenia 2. 117*
Adelomys gen. 5. 225
Adelophthalmus gen. 6. 612
granosus 3. 161; 4. 500; 9. 760
Adelosina gen. 5. 755; 7. 377
cretacea 2. 511
Adelpholith 8. 313!
Adeorbis gen. 3. 766; 7. 254
pulchralis 3. 765
striatus 3. 765
subcarinatus 3. 765
supra-nitidus 3. 765
tricarinatus 3. 765
spp. 5. 768
Aderflügeler 0. 24*
Adern in den Gesteinen 1. 561
Adiantites 0. 627
Adiantites
auriculatus 6. 97
cyclopteris 5. 630; 6. 97
Germari 5. 630
Haidingeri 6. 97
Schlehani 4. 877
Adiantum psychodes 9. 253
Adinole 5. 317
Adna Anglica 7. 117
Adnether-Schichten 4. 456; 5. 178, 219, 625p; 6. 361, 747p; 7. 618, 619; 8. 105
Adular 0. 430; 1. 444; 4. 30*; 7. 712*; 9. 680
Aechmodus gen. 6. 755
Egertoni 5, 862
Aeger crassipes 8. 22!, 505
Aegle gen. (Barr.) 3. 487
Aeglina gen. 0. 777, 785!; 3. 487; 6. 224²
major 4. 502
mirabilis 4. 502
oblongula 6. 225
prisca 7. 638
speciosa 6. 225
spp. 4. 493, 502
Aegocerus spp. 5. 227
Aellopos spp. 9. 764
Aelodon gen. 9. 110*
priscus 5. 107; 6. 760; 9. 109, 110
Aeonia gen. 1. 508!; 3. 487
concinna 6, 370. 375
Aepiosaurus
elephantinus 5. 233, 744
sp. 5. 233
Aepyornis 4. 110; 5. 480!; 7. 124
maxima 1. 374
sp. 4. 496
Aerolithe: von
Mezö-Madaras 6. 694*
in Mexico 6. 257!
von Montrejean 9. 622
von Ösel 7. 842
von Stannern 3, 699
Aesculus
Europaea 8. 499; 9. 122
Aeshna (Libell.)
Brodiei 0. 18*; 4. 122
multicellulosa 8. 623
Aeshnium Bubas 5. 747
Aetea gen. 4. 114!
Aëtobates arcuatus 5. 234
Aëtobates arcuatus 6. 601; 8. 870
Aëtobatis eximius 7. 115
perspicuus 7. 115
Tardiveli 8. 870
Aethalion gen. 3 118
spp. 9. 764
Aethiopus Lyellanus 9. 867
minor 9. 867, 868
Aëthophyllum 0. 631
speciosum 2. 994; 4. 204; 6. 207, 738; 7. 778
stipulare 2. 994
Afer gen. 9, 498
bellalyratus 9. 498
Affaisements 1. 100
Affinität der Organismen 0, 374
Afrikanische Breccie 7. 594
Afterkrystalle 8, 572!
Ägirin 2. 70!; 8. 701!, 684
Agalmatolith 2. 848; 4. 70; 9. 561!, 586
Aganides gen. 8. 617
Aturi 4. 854
Barbotanus 6. 122
carbonarius 6. 122
crenistria 6. 122
diadema 6. 122
Deshayesi 4. 854
Gilbertsoni 6. 122
Henslowi 6 122
implicatus 6. 122
Listeri 6. 122
reticulatus 6. 122
sphaericus 6. 122
spirorbis 6. 122
Ustjurtensis 8. 740; 9. 866
vinctus 6. 122
ziczac 4. 854
Agaricia 2. 119*
agaricites 2. 378
Apennina 2. 378
aspera 2. 378
Ataciana 2. 377
boleti ormis 0. 766
circularis 2. 378
convexa 2. 378
crassa 2. 378
elegans 2. 378
elegantula 2. 378
falcifera 7. 233
graciosa 2. 378
granulata 1. 412!, 419; 2. 119, 287, 378; 3. 318, 877; 9. 629

Agaricia
inflata 7. 233
infundibuliformis 2. 377, 9. 844
irregularis 2. 378
lima 2. 378
lobata 0. 766, 2. 378
Ludovicina 0. 766
maeandrinoides 7. 233
neocomiensis 2, 378
papillosa 2. 378
plana 2. 378
ramulosa 2. 377
rotata 2. 378
Soemmeringi 2. 378
spelaea 2. 377
sulcata 2. 378
Swindernana 2. 121, 378; 8. 266
Agariocrinites tuberosus 0. 376
Agaricocrinus gen. 9. 343
Agassizichthys gen. 8. 117! 9. 343
Manni 8. 117!
Sullivanti 8. 117
Agassizocrinus
dactyliformis 0. 377
gracilis 0. 377
Agathelia gen. 4. 871
asperella 4. 867
Agavites Araraticus 7. 502
Agelacrinites spp. 5. 248, 252
Agelacrinus gen. 3. 238; 4, 233
Dicksoni 9. 636
Rhenanus 2. 925, 938; 3. 238
Agelena tabida 5. 122
Agentien bei Gesteins-Metamorphosen 8. 727
Agger-Schiefer 5. 49
Agnostinae fam. 1. 510!; 6. 116
Agnostus 6. 224*
gen. 0. 777, 785; 1. 510; 3. 488
glandiformis 6. 814
latus 5. 876
pisiformis 6. 795, 809
tardus 7. 638
tuberculatus 5. 876
spp. 2. 242; 9. 504
Agnotherium antiquum 1. 501; 3. 377; 4. 50; 9. 272
Agraulus gen. 3. 487
Agrilium Cyllabacus 5. 747
Cyllarus 5. 747
Stomphax 5. 747
Strombus 5. 747
Agriochoerus gen. 5. 117!
antiquus 5. 114, 117; 8. 376
major 7. 855!; 8. 376
Agrion antiquum 6. 621
Buckmani 4. 122
coloratum 0. 854
Agrionidium Aetna 5. 748
Agriotherium gen. 4. 751, 752
Ahrien 1. 105; 7. 219
Aimestry-limestone 3. 97
Akanthit 6. 434!
Akmit 8. 684, 701!
Alabaster 7. 604
Alaria gen. 3. 235!; 7. 372*
armata 3. 234
atractoides 3. 234
circus 3. 234
hexagona 3. 234
hamulus 3. 234
hamus 3. 234
laevigata 3. 234
pagoda 3. 234
paradoxa 3. 234
parvula 3. 234
Phillipsi 3. 234, 235
subpunctata 6. 852
trifida 3. 234
Alaricien (terrain) 9. 470
Alaun 2. 796; 5. 156
-Gebirge 5. 436
-Werke 0. 356
-erde-Krystalle 1. 693*
-Fels 0. 449; 1. 503!
-Schiefer 1. 270; 2. 99 ff.; 3. 615; 4. 492; 6. 795, 803 ff.; 8. 236, 594
-stein 0. 449; 1. 32; 7. 716!
-stein-Bildung 9. 836
Alausa latissima 4. 734
Albatros 5. 376
Alberese 0. 358, 743! 1. 722; 4. 357; 5. 46; 6. 216; 7. 204, 598*
Albula brevis 4. 734; 5. 380
lata 4. 734; 5. 380
Zignoi 3. 683; 4. 734; 5. 380
Albertia latifolia 9. 751
Albien 3. 329; 4. 204, 508; 7, 480; 9. 124p, 762p
Albit 0. 349!, 551, 552; 1. 444, 585, 153*; 3. 174, 257, 696; 4. 30*, 296, 600!, 729; 5. 198, 822; 8. 37, 53, 698*!; 9. 622!
-Orthoklas 4. 600!
Alca impennis 6. 811
Alces antiquorum 4. 862
platycephalus 4. 862
resupinatus 4. 862
Savinus 4. 862
spp. foss. 5. 227
Alcyonites
parasiticus 1. 761!
Alcyonium 2. 123
Alecto dichotoma 5. 633
rugulosa 4. 869
Smithi 5. 635
Alectrionia acuta 3. 759
Alethopteris 0. 628
aquilina 1. 476; 5. 630
Bredowi 1. 476
Brongniarti 0. 671; 1. 476; 5. 630
Christoli 7. 113
cristata 5. 630
Defrancei 0. 732; 1. 476
dentata 0. 733; 6. 253
elegans 5. 623
erosa 5. 630
gigas 8. 503
Goepperti 2. 886; 8. 503
grandiflora 9. 826
Lonchitidis 5. 243; 9. 826
longifolia 5. 630
marginata 8. 401
Martinsi 8. 503
Mertensioides 5. 630; 8. 503
muricata 6. 98
nervosa 5. 630
ovata 1. 476
Phillipsi 6. 253
pinnatifida 8. 503
Pluckeneti 5. 243, 630
pteroides 5. 630
pteridoides 9. 149
recentior 2. 886
Reichana 2. 886
Sauveuri 8. 401
Serli 5. 243

Alethopteris
Serlei 9. 949
sinuata 1. 476
Sternbergi 6. 98
vulgatior 6. 98
Whitbyensis 6. 254; 6. 741
spp. 9. 379, 380
Algacites 0. 626
acutus 6. 97
filicoides 6. 253
Algerit 5. 444*
Algodonit 8. 691!
Alisma plantaginoides 3, 746
Allanit 3. 58!, 271; 4. 185!; 6. 445!, 552!; 7. 434!; 8. 576!
Allantoidiei (Reptilium subclass.) 5. 742
Alligator Hantonensis 1. 713; 2. 380; 7. 538
Allgovit 9. 641!
Allgäu-Schiefer 7. 481
Alloierisma elegans 5. 498
cfr. Allorisma
Allomorphina gen. 1. 379!; 2. 256!, 755
trigona 2. 255; 7. 497
spp. 2. 511*
Allophan 3. 58!, 708! 4. 417*; 7. 176!; 8. 471!
Allopora 2. 116*, 249!, 250
oculina 2. 250
Allorisma gen. 6. 644, 864
altirostratum 9. 869
constrictum 6. 644, 650
Cooperi 9. 869
curtum 8. 766
elegans 4. 118, 119; 6. 644², 651; 7. 223, 637
elongatum 6. 644, 650
gibbosum 6. 644
Hannibalense 6. 636
lanceolatum 8. 766
Leavenworthense 9. 869
lunulatum 6. 644
Minnahaba 8. 766
Münsteri 6. 644, 645
priscum 6. 643, 644
regulare 6. 644, 651; 8. 493; 9. 850²
rotundatum 6. 643, 644
subcuneatum 9. 969
sulcatum 6. 643, 650
terminale 7. 491; 9. 850²
undatum 6. 644, 647
Urei 6. 644
spp. 6. 864
Alluaudit 0. 348!
Alluvial-Bildungen 1. 805 3. 376; 4 36; 8 834
-Bildungen der Elbe 2. 194
-Fauna 5. 223, 370
-Flora 4. 631*
-Formation 1. 728; 8. 742
-Gebilde Batavia's 0. 83
-Gebirge 5. 862
von Gorinchem 4. 195
Alluviale Eisenerze 4. 732
Alluvionen 8. 334
Erz-führende 2. 971
Gold-führende 4. 822
Alluvions glaciaires 5. 721
Alluvium 2. 623; 8. 602
Almandin 6. 559; 8. 77!
Alnites 0. 633
devius 3. 226
emarginatus 2. 895, 3. 226
Goepperti 2. 894; 3. 226
Kefersteini 9. 501
macrophyllus 3. 226
pseud-incanus 2. 894; 3. 226
pseudoglutinosus 3, 226
pumilus 3. 226
Reussi 4. 378
rotundatus 3. 226
similis 3. 226
subcordatus 2, 894; 3, 226
succineus 3. 226, 747
venosus 4, 627
sp. (Saamen) 3. 226
Alnus 0. 633
glutinosa 4. 832
gracilis 3. 503; 6. 505; 9. 501, 873
insueta 9. 122
Kargi 2. 760; 3. 503
Kefersteini 1. 128; 2. 628, 753; 3. 120. 384, 503; 4. 491; 8. 500; 9. 117, 501
nostratum 9. 501
Alnus
Oeningensis 9. 501
rostrata 8. 333
suaveolens 4. 627
sp. 0. 503
Alopias spp. 9. 124
Alosa latissima 3. 683
Alotrichin
(Halotrichin) 1. 589
Alpen-Dolomit 0. 586; 7. 689 ff.; 8. 3, 8. 85, 88, 591; 9. 472
-Gerölle 0. 641
-Granit 2. 232!
-Kalk 0. 305, 733, 738; 1. 231, 465; 2. 770; 3. 191; 4. 87, 88, 456; 6. 568; 7. 221, 617, 691; 8. 2
-Kalk, Gliederung 0. 584, 620; 1. 129!
-See'n 8. 84
-Trapp 9. 666
-Schiefer 5. 181
Alpines Diluvial 1. 470 9. 349
Alstonit 2. 223!; 4. 448
Alvania ascaris 3. 764
Alveolites gen. 2. 120²; 8. 243
Buchanus 4. 744; 8. 498
Labechei 8. 594
microporus 2. 766
orbicularis 3. 42
Producti 3. 126, 772, 778; 4. 119, 744, 489; 5. 316, 498
ramosus 6. 255
repens 8. 265, 754
reticularis 6. 375
spongites 2. 341
suborbicularis 6. 375
tuberosus 2. 766
variabilis 6. 255
vermicularis 2. 989; 6. 113
spp. 2. 990; 4. 497; 7. 104
Alveolina gen. 5. 640*; 7. 377; 8. 243!; 247
Bosci 4. 737; 8. 245
longa 1. 378; 9. 844
melo 5. 640; 8. 740
Novae-Hollandiae 6. 608
prisca 7. 633

Alveolina Quoyi 6. 609
spp. 4. 737
Alveolinida fam. 5. 754! ff.
Alveopora gen. 2. 120*; 3. 876, 877*
incrustata 3. 876
Microsolena 3. 876
racemosa 3. 876
regularis 3. 876
tuberosa 3. 876
Alv(e)it 8. 309!
Alter der Feuer-Gesteine 7. 741
des Menschen 5. 221
Alters-Folge eruptiver Gesteine 9. 833
-Folge der Mineralien auf Gängen 1. 368
-rother Sandstein 1. 607; 5. 853
Älteste Sediment-Gesteine 7. 238, 239, 240
Alum shale 0. 152, 181; 6. 457; 9. 95
Aluminate, künstliche
Aluminosilikat von Eisen-Per- und Prot-Oxyd 0, 444
Alunit 3, 476!
Alydus pulchellus 3, 871, 873
Amaltheen-Mergel 0. 590, 621; 2. 92; 3, 192; 4, 456
-Thone 0, 180; 6. 742; 7. 12; 9. 24
Amaranthus palustris 8. 499
Amaurobius faustus 5. 122
rimosus 5, 122
spinimanus 5, 122
Amay-Schiefer 1. 225
Amberlya gen. 3, 236
nodosa 3. 234
Amblonyx gen. 9. 867
giganteus 9. 867
Lyellanus 9. 867
Amblycyathus 2. 115*
Amblyceras gen. 6, 126!
Amblypneustes 7. 122
Amblypterus gen. 3, 117*; 8. 612!
Agassizi 8. 614*
decipiens 6. 616; 8. 614*, 615
eupterygius 4. 124; 8. 613*
lateralis 4. 124; 8. 613*
latimanus 6. 614*
latus 4 124; 8. 613*
macropterus 0. 104; 4. 124; 8. 613*
nemopterus 8. 614*
Olfersi 8. 614*
ornatus 8. 614*; 9. 751
Portlocki 3. 744
punctatus 8. 614*
striatus 8, 614*
Amblypus gen. 9. 868
dextratus 9. 868
Amblypygus Achenoris 3, 606
apheles 3. 606
Americanus 8 612
dilatatus 4. 120, 121
latus 8. 874
Michelini 7. 859
Amblysemius spp. 4. 382
Ambonychia acuticostata 6. 119
obtusa 9. 755
striata 6. 119
vetusta 6. 119
sp. 1. 253
Amenda (Gestein) 7. 251
Amesoneuron gen. 2, 895!
anceps 3. 434; 4. 630
calyptrocalyx 3. 434; 4. 630
dracophyllum 3. 434; 4. 630
Noeggerathiae 2. 894; 3. 226; 8. 333
sagifolium 3. 434; 4. 630
Amethyst 4. 404; 8. 788
Amia gen. 3. 117*, 223*
Amianth 5. 184
Ammon-Salze, metamorphisch wirkend 8, 832
Ammoniak-Bimalat 7. 74
Ammonicolax
longimanus 0. 122
Ammoniten
unsymmetrische 5. 487
-Kalk (rother) 4. 456; 5. 178, 219; 6. 216; 8. 4
-Marmor 0. 586, 621, 733, 738; 1. 130; 2. 92; 3. 192; 6. 849; 8 88, 89
Ammonites gen. 4. 853; 6. 316*
Aalensis 0. 154; 5. 213; 6. 850; 7. 595, 698; 8. 450; 9. 27
abnormis 5. 488; 6. 748
abyssinus 8. 494
Achilles 4. 355
Actaeon 6. 456, 748; 7. 205
Adelae 6. 57; 8. 873;
adeloides 3. 379
Adnethicus 5. 625; 6. 748
aequatorialis 0. 480
Agassizanus 8. 450
alpinus 1. 738
alternans 0. 226; 1. 496; 2. 349, 456
alternatus 7. 639
alterniplicatus 5. 502
altus 6. 748
Amaltheus 0. 149 ff., 181, 412; 1. 137, 140, 142; 2. 173; 3. 167, 429, 494; 4. 204, 205, 370, 830; 5. 175; 6. 743, 818; 7. 11 ff., 698 8. 552; 9. 24, 94, 95², 143, 345, 518
Ammonius 0, 156
amplus 7. 492
anceps 0. 165; 4. 35; 7. 133, 382; 8. 484
anguinus 6. 850
angulatus 0. 145, 180, 181; 4. 850; 6. 454, 494, 743, 818; 7. 93, 209, 390, 698; 8. 643; 9. 15, 16 ff., 94, 453
angulicostatus 9. 124
angusti-lobatus 0, 251
angustus 6. 480
annularis 0. 165, 166, 182; 2. 349; 8. 484
annulatus 0. 153, 154, 180; 1. 140; 6. 71, 850; 8. 226
antecedens 9. 497
Aon 0. 251, 587, 588; 4. 549; 5. 480; 6. 738, 758, 7. 615, 617, 621, 622; 8. 46; 9. 753²
aratus 1. 418, 419
arbustigerus 3. 234; 7. 133

Ammonites
Arduennensis 4, 545
arietiformis 6. 456
armatus 0. 152, 181; 4. 549; 6. 456, 743
ascendens 8. 874
asper 5. 160, 162; 8. 874
aster 5. 502
Astieranus 0. 231; 2. 92, 455, 885; 3. 192; 5. 160, 364; 6. 847; 7. 813; 8. 859; 9. 123, 372
athleta 0. 164, 166, 183, 734; 4. 35; 7. 205; 8. 484
auritulus 8. 484
auritus 4. 201; 5. 457; 6. 818; 7. 474* ff. 7. 659², 660
Ausseeanus 0. 251
Austeni 7. 639
Babeanus 8. 486
Bakerae 0. 166; 6. 57, 58, 254; 8. 226
Baugieri 8. 484
Bechei 0. 152; 4. 205, 370; 6. 71; 8. 552
Becheri 6. 370
Beckei 8. 226
Belus 1. 738
Benacensis 4. 760
beta-calcis 6. 744
Beudanti 3. 329; 4. 250, 760; 5. 364
bicarinatus 0. 251; 4. 549; 8. 486
bicarinoides 0. 251
bicostatus 8. 484
bicurvatus 1. 64
bidichotomus 0. 231, 394, 408; 2. 191; 4. 202; 5. 160
bifer 0. 146, 147, 180, 181; 6. 454; 7. 698²
bifrons 0. 165, 181, 734; 4 850; 6. 58, 210, 451, 545, 748; 7. 205², 206². 613; 8. 356; 9. 95
bifurcatus 0. 164, 165, 182, 481; 2. 349; 4, 81
binodosus 6. 480
bipartitus 0. 166, 182
biplex 0. 174, 178, 184, 185, 830; 2. 349, 352, 456; 3. 192, 329, 494; 4. 79; 8. 488
bipunctatus 0. 251; 6. 456
Birchi 5. 625; 6. 454, 744, 748
biarmatus 8 486
bispinosus 7. 547
bisulcatus 0. 148; 4. 109, 552, 557, 558, 850; 6. 71, 454, 748, 749; 7. 206, 211, 212, 595; 8. 226
Blagdeni 0. 183; 3. 235; 4. 830; 6. 852; 8 356: 9. 134
Bogotensis 8. 859
Bollensis 7. 130
Bonnardi 6. 454; 7. 209
borealis 0. 227
Boucaultanus 7. 209
Brackenridgei 3. 235
Braunanus 4. 850; 6. 850
Breuneri 0. 251
brevispina 4. 553; 5. 625 6. 456, 748
Brighti 8. 484
Brocchii 6. 852. 8. 356
Brongniarti 0. 160; 5. 633; 6. 451, 852; 8. 356, 873
Bronni Schafh. 5. 625; 6. 745; 7. 698; 8. 583
Brookei 0. 147, 180, 181; 6. 454; 8. 552
Buchi 3. 11, 13, 19, 29; 9. 497
Bucklandi 0. 145, 147, 180, 181, 733; 1. 140, 142, 417, 419, 818; 2. 173, 174, 343, 455; 3. 167, 430 ff.; 4. 76, 370, 549, 557, 830; 6. 41, 217, 494, 744; 7. 8, 19, 93, 209, 211; 8. 105, 552, 583; 9. 2, 16 ff., 9. 94³, 195²
bullatus 0. 160, 164; 3. 379; 4. 63; 8. 484, 582; 9. 135
Bunburyanus 5. 633
Burgundiae 9. 453 ff.
Buvignieri 0. 152
Ammonites
callosus 6. 748
Calloviensis 0, 165; 8. 484
calvus 8. 484
Calypso 0. 589, 734; 1. 744; 4. 760; 6. 748; 8. 105!
canaliculatus 2. 348; 3. 617; 6. 57; 7. 548; 8. 486
canteriatus 7. 660
capellinus 7. 16; 9. 263
Capitanei 4. 760
capricornus 0. 149, 412; 5. 625; 6. 743, 456, 818; 7. 130, 390, 698²; 8. 583; 9. 94, 95
caprinus 0. 166, 183; 6. 254
carinatus 6. 480
Carlavanti 1. 738
Carolinus 7, 639
Carusensis 6. 454
catenatus 7. 206
catinus 7. 639
Cenomanensis 7, 639
Centaurus 0. 149; 6. 456
ceras 6. 748
ceratitoides 5. 219; 6. 748; 7. 618
cesticulatus 1. 738
Charmassei 6. 748
Charpentieri 1. 143; 2. 173; 3. 430; 4. 558; 6. 748
Chaumasseti 0. 723
Cheyennensis 8. 494
cinctus 5. 633
clypeiformis 1. 744
cnemiaphorus 4. 81
Comensis 4. 850; 6. 748, 850; 7. 205², 206
communis 0. 160 f., 180, 181; 3. 348; 4. 850; 6. 850; 7. 17, 698; 8. 356; 9. 25, 95
complanatus 4. 850; 5. 633; 6. 58, 748; 7. 205, 595, 613
complexus 7. 764; 8. 494
compressaries 6. 744²
Comptoni 0, 167; 8. 484
comptus 0. 154; 6. 850
concavus 4. 850; 6. 850; 8. 356

Ammonites
Condeanus 4. 850
Conradi 8. 494, 360
consobrinus 4. 540; 7. 648
constrictus 8. 874
Contejeani 4. 355
convolutus 0. 165 ff. 3. 379; 6. 254
Conybearei 0. 181, 733; 3. 167, 531, 717; 4. 830, 850; 6. 454, 744, 748; 7. 206, 212, 390, 595
cordatus 0. 165, 169, 183, 405, 723; 2. 343, 349, 351, 352; 3. 41; 6. 57, 58; 7. 135, 390. 469, 472; 8. 6, 486², 582², 710; 9. 135, 136
cordiformis 8. 496, 497; 9. 824
Cornuelanus 1. 357; 7. 480, 647, 149 ff.
cornu-copiae 0. 153; 4. 850; 6. 71, 850; 7. 205; 8 226
coronaries 6. 744
coronatus 0. 142, 158, 159; 3. 40; 4. 322; 6. 57; 8. 484
Corregonensis 5. 487
corrugatus 8. 356
costatus 0. 145, 149 ff., 180, 412; 1. 137, 140; 2. 298, 455; 3. 425, 429, 494; 4. 370; 6. 214, 215, 818; 7. 11 ff., 698; 8. 552; 9. 24, 94, 518
costellatus 7. 648
costula 0. 154; 6. 850; 9. 27
Cottae 9. 847
Coupei 5. 633
crassicostatus 1. 738; 9. 124
crassus 6. 850
Credneri 0. 251
cristatus 8. 486
cryptoceras 6. 847; 9. 124
Cunningtoni 7, 639
curvicosta 8. 484
Ammonites
cycloides 6. 451
cylindricus 4. 760, 6. 748
Cymodoce 8. 488
Czjzeki 6. 748
Dannenbergi 6. 370
Davoei 0. 149, 180, 181; 6. 456, 742, 748; 7. 130, 205, 206, 212, 698; 9. 24, 94², 95². 133
Decheni 0. 394, 397, 408; 2. 190; 4. 202; 4 364
decrescens 5, 502
Delawarensis 8, 360
delphinocephalus 5. 502
Deluci 0, 409
densinodus 6 454, 743
dentato-carinatus 0. 102
denticulatus 8. 484
depressus 0. 180, 405; 6. 850; 8. 874
Deshayesi 1. 357, 738, 744; 5. 163; 7. 480, 647*, 659
Deslongchampsi 6. 852
Desplacei 0. 153; 6. 850; 7. 205
Deverianus 4. 840
dichotomus 5. 480
Didayi 7. 618
difficilis 9. 124, 372
difformis 6. 748; 8. 105
dilucidus 6. 852
dimorphus 8. 356
discoides 7. 205, 698; 8. 356
discus 0. 182, 722; 2. 349; 6. 58; 7. 382; 8. 482; 9. 31 ff.
Döderleinanus 4. 760
Domeykanus 0, 481; 4. 81*
Dontianus 9. 497
Dorsetensis 8. 356
dorsocavatus 7. 545
dubius 3. 759; 8. 874
Dudressieri 5. 625; 6. 454
Dufrenoyi 1. 738; 7. 614
Duncani 0. 165, 183; 7. 205; 8. 484
Dunkeri 3. 494
Dupinanus 1. 738
Duvalanus 1. 738, 744; 7. 668
Ammonites
dux 5. 871!
Edouardanus 6. 852
Ehrlichi 5. 502
Elisabethae 0. 167
Emerici 1. 738
Engersianus 4. 856
Erato 3. 379
Erbaensis 6. 748
erinus 8. 488
Escheri 6. 748
Eudesanus 7. 205; 8. 448
Eugenii 2. 351, 352; 8. 486
euomphalus 7. 639
exaratus 6 850
excavatus 2. 349
exiguus 5. 502
eximius 4. 760; 6. 748
falcaries 6. 744; 9. 17
falcatus 5, 633; 7. 785
falcifer 6. 850
Ferstli 5. 625
fibulatus 6. 850
fimbriatus 0. 412; 1. 130 ff., 2. 455, 457; 3. 405 ff.; 4. 205, 553, 830; 5. 178, 219; 6. 71, 217, 456, 748, 818; 7. 205², 216, 212, 595, 618, 698; 8. 226, 873, 583;
fissicostatus 7. 639, 648
flaccidicosta 7. 458
flexicostatus 1. 744
flexispinatus 8. 484
flexuosus 0. 168, 178; 2. 348, 349; 5. 613; 8. 486
floridus 1. 539; 5. 512; 7. 615, 616; 8. 345; 9. 477
Foetterlei 6. 748
Fraasi 8. 484
funatus 8, 484
funiferus 0. 165; 8. 484
furcillatus 3. 811
furti-carinatus 6 744; 7. 546
Gaetani 0. 251
galeatus 0. 251; 4. 552
galeiformis 0. 251
Gardeni 7. 369
Gargasensis 1. 738; 5. 364

Ammonites
Garrantanus 6. 852
Gaytani 6. 758
gemmatus 0. 165
geniculatus 5. 502
Gentoni 7. 639
geometricus 6. 454
Germaini 0. 153. 180; 6. 850; 8. 450; 9. 27
Gervilleanus 5. 162
Gervillei 0. 160; 4. 64; 8. 356; 9. 35
Gibbonanus 4. 80
giganteus 8. 488, 873
gigas 0. 174, 185; 7. 469
globosus 6. 456; 6. 744
globus 0. 251
Gosauicus 8. 505
Goupilanus 7. 639
Goweranus 0. 165, 723; 8. 484
gracilis 3. 234
Grantanus 8. 484
Grasanus 6. 847; 7. 618
Greenoughi 6. 748
Greenowi 6. 748
Griffithi 7. 639
Grohmanni 6. 748
Guadalupae 7. 458
Guersanti 7. 474* ff. 7. 659
Guettardi 1. 738
Guibalanus 0. 152
Guidonii 5. 487
Hagenowi 5. 487; 6. 494; 7. 209; 8. 354 [2]; 9. 629
Halli 7. 492; 8. 494
Haloricus 4. 760
hecticus 0. 160, 164, 165, 166, 178, 182; 1. 140; 2. 349; 3 348; 6. 57; 7. 382; 8. 484
heliacus 6. 847
Henleyi 0. 152; 4. 830 6. 456, 748; 8. 226
Henrici 3. 379; 8. 486
Henryi 8. 496; 497
Herveyi 0. 160, 164; 1. 491; 2. 349; 5. 734, 856; 8. 484
heterophyllus 0. 148, 152 ff., 180, 181, 733, 830; 3. 379; 4. 759, 760, 830, 850; 5. 178, 219; 6. 451, 744, 748, 850; 7. 205, 618, 698[3]; 8. 356, 450; 9. 23 ff.
Hettangensis 6. 494; 7. 209
Hierlatzicus 6. 748
hippocastanum 7. 639
hircinus 0. 156; 180; 6. 850; 7. 18; 8. 356, 450, 874; 9. 27
Hoernesi 0. 251
Hogardanus 1. 358
Hollandrei 0. 154, 181; 4. 850; 6. 850; 7. 205
Hommairei 3. 379; 4. 35, 760; 6. 57; 7. 205; 8. 873
Hugardanus 0. 480; 1. 744; 4. 80
Humphriesanus 0. 142, 158, 160, 182, 183; 3. 379; 6. 210, 451; 719, 852; 7. 205[2], 382; 8. 356, 383, 5. 583; 9. 134, 136
Hungaricus 6. 748
hybridus 6. 745
Jamesoni 0. 146, 180, 181; 5. 219, 625; 6. 456, 745, 748; 7. 698; 8. 583; 9. 23, 94
Janus 5. 488; 6. 748
Jarbas 4. 760; 5. 500; 6. 758
Jason 0. 165 ff., 182, 183, 405, 723; 3. 40, 494; 8. 484, 582
Jaubertanus 1. 738
ibex 0. 149 ff., 180; 9. 94
imperator 0. 251
impressus 1. 738
inermis 5. 502
inflatus 0. 170, 480; 1. 64, 312 ff., 575; 2. 55; 3. 495; 4. 80, 202; 5. 457, 613; 6. 818; 7. 475 *ff., 547, 659, 813
infundibulum 1. 357, 744; 4. 760; 6. 847
inopinus 9. 361
inornatus 1. 738
insignis 0. 154, 155, 180; 1. 140; 6. 850; 7. 130, 205, 595; 8. 356, 450, 553
interruptus 0. 409; 1. 310, 470; 4. 201; 7. 663
Jo 7. 205
Jockelyi 5. 502
Johannis-Austriae 0, 251; 6. 758; 7. 615, 616, 617, 621, 695; 8. 4, 125, 345
Johnstoni 5. 625; 6. 454; 9 24
Ishmae 0. 731
jurensis 0. 153, 180; 6. 71, 850; 7. 18, 7. 698; 8. 226, 356, 448, 450, 553, 873; 9. 26, 94, 133, 345
Keindeli 5. 625; 6. 748
Koenigi 0. 165, 227, 723, 8. 484
Kridion 4. 549; 6. 454, 748; 7. 698
Kudernatschi 4. 760; 7. 614
lacunatus 6. 454
laevigatus 3. 579; 6 454
Lalandeanus 8. 486
Lamberti 0. 165, 166, 168, 182, 734; 3. 41, 811; 6. 818; 8. 484, 486, 582;
Landrioti 6. 494
laqueus 9. 16*, 453
Largilliertanus 5. 633
laticlavius 7. 639
latidorsatus 1. 738; 4. 739
latesulcatus 6. 748
lautus 5. 457; 6. 818; 7. 474* ff., 7. 659[2]
Lavizzarii 4. 760
lenticularis 8. 494
leptonema 7. 639
Lestocquei 4. 355
Levesquei 0. 154; 4. 850; 7. 205
Lewesiensis 1. 730; 7. 474* ff.

Ammonites
liasicus 0, 148; 6. 748
liasinicus 6. 454
ligatus 9. 124, 372
Lilli 6. 748; 8. 105
Lindigi 8. 859
lineatus 0. 150, 151, 180; 6. 748; 7. 17; 698; 8. 448; 9. 24
linguiferus 6. 852; 7. 205, 382
lineo-cinctus 8. 449, 450
Lipoldi 4. 760; 6. 748 7 614
Livizzani 7. 205
lobatus 6. 480; 8. 494
longispinus 4. 355; 8. 488
Lonsdalei 0. 723
Loscombi 0. 152; 6. 208, 456, 744;
Luganensis 5. 479, 480
lunula 6. 57; 7. 382; 8. 484, 726, 873
lynx 6. 456, 744
Lythensis 0 180, 405; 6. 545; 7. 16, 698; 8. 583; 9. 25, 263
Mac-Clintocki 9. 222
macrocephalus 0. 142, 160, 164, 165, 182, 183; 3. 234, 235, 324; 7. 133 ff., 8. 484, 582[2], 713, 9. 135, 136
maculatus 0. 151; 5. 625; 6. 744; 7. 698
magnificus 6. 480
mammillaris 9. 762 p.
mammillatus 1. 738; 3. 329; 7. 649; 9. 313
Mandanensis 8. 494
Mantelli 0. 386, 408; 1 743; 5. 27, 457; 6. 817; 7. 477, 639, 785[2]
Marantianus 7. 548
margaritatus 0. 150 ff. 180, 181; 4. 205; 6. 71, 456, 743, 748; 8. 226, 296, 356, 552; 9. 133, 143
Martinii 1. 357, 744; 6. 852; 7, 614, 645*, 659; 9. 124
Ammonites
Martinsi 8. 356
Masseanus 6. 456, 748; 7. 205
Masylaeus 9. 124
Maugenesti 5. 625; 6. 456, 748; 8. 552
Mayoranus 0. 480; 1. 312, 738, 744; 3. 495; 4. 202; 5. 457; 6. 818; 7. 474* ff., 659, 660; 785, 786
Mercatii 6. 748
Metternichi 1. 130
Michelianus 9. 763 p
microstoma 0. 160, 164, 8. 484; 9. 135
Milletanus 1. 357, 738, 744; 2. 454; 3. 329; 6. 818; 7. 475* ff., 480, 639, 659[2], 662 ff.; 9. 607
Mimatensis 4. 760; 5. 219; 6. 748; 7. 205, 206
miserabilis 6. 744[2]
modestus 0. 251
mediolaris 0. 723; 8. 484; 9. 135
monilis 5. 207; 7. 813
Moreanus 6. 454, 494, 748
Moreauensis 8. 494
Morloti 0. 251; 4. 760
Mortilleti 9. 124
Mortoni 7. 864
mucronatus 0. 154; 4. 850; 6. 850; 7. 205
multicostatus 0. 148; 4. 850; 6. 744, 748, 9. 18 ff.
Murchisonae 0. 142, 155, 156, 157, 158, 160, 182; 1. 137, 140; 2. 343, 349, 3. 429; 6. 852; 7. 205; 8. 226, 356, 9. 31, 33, 133, 136, 526
mutabilis 8. 488
muticus 6. 454, 743; 7. 205, 206
Münsteri 6. 370
natrix 0. 149, 150, 180; 5. 625; 6. 748; 8. 552; 9. 23
Ammonites
navicularis 7. 639
Nebrascensis 8. 494
neojurensis 4. 760; 5. 500
Neptuni 7. 787
Neubergicus 8. 505
Neuffensis 6. 852
Nicoleti 7. 864; 8. 494
Nisus 1. 738; 4. 643; 5. 163; 6. 818; 7. 480, 651, 659[2] ff.
nodo-gigas 6. 744
nodosaries 6. 744[2]; 7. 698
nodosus 0. 484, 485; 2. 53; 3. 19, 29; 4. 840; 6. 818, 9. 91; 9. 497
nodoso-costatus 1. 738; 3. 329; 251
Nodotanus 6. 744, 748
Noeggerathi 6. 371
Noricus 0. 393; 3. 811
Normannanus 6. 456, 748; 7. 205, 206
Novi-Mexicanus 8. 709
oblique-costatus 6. 748
obtectus 5. 633
obtusus 0. 147; 4. 850; 6. 217, 454, 743
oculatus 8. 486
Oldhami 7. 639
oolithicus 6. 852
opalinus 0. 153, 156, 182, 481; 3. 494; 4. 81; 5. 213; 6. 818, 852; 8. 356[2], 553, 583, 713; 9. 28, 94[3], 95, 133, 136, 518
opalis 8. 494
Orion 8. 484*
ornatus 0. 165, 168, 182, 183; 8. 484, 582[2]
Orthoceras 4 355
Ottonis 9. 497
oxynotus 0. 146, 180, 181; 6. 454, 742; 8. 552; 9. 19 ff.
parabolis 3. 379
parallelus 8. 484
parcus 3. 19, 30
Parisiensis 9. 361
Parkinsoni 0. 142, 159, 160, 164, 182, 183; 1. 140; 2. 187;

Ammonites Parkinsoni 3. 494; 4. 64, 553; 5. 848; 6. 210, 254, 818, 852; 7. 133; 134; 9 356, 583[2] 9. 94, 133, 136
Partschi 4. 760; 6. 748,
Pedemontanus 6. 748
Pedernalis 0. 102; 7. 458, 816
Pemphix 5. 479, 480
peramplus 0. 386. 727; 1. 311; 5. 633; 6. 817; 6. 787 [2]
perarmatus 0. 165, 166, 170, 183; 3. 494; 6. 57; 8. 4[illegible]6[2], 582[2], 873; 6. 135
percarinatus 7. 864 8. 494, 496
Peruvianus 4. 80
Petersi 6. 748
pettos 6. 456; 9. 23
phylli-cinctus 8. 449, 450
placenta 8. 360, 494; 9. 497
planicosta 0. 150; 4. 370, 830; 6. 71, 208, 454, 494, 743; 8. 226
planicostatus 4. 205; 5. 625; 6. 748; 7. 212
planorbis 6. 378, 454, 744; 7. 93, 94, 595; 8. 353, 354, 552; 9. 14, 453, 629
-planorbis-Bett 6. 454 !
planulatus 0, 160. 174; 7. 639
planus 7. 672
platynotus 8. 486
plicatilis 6. 57, 58; 7. 204, 205; 8. 486, 726; 9. 135
plicomphalus 8. 486
polygonius 8. 484
Poeschli 0. 251
polygyratus 0. 168, 178; 1. 140; 2. 349, 456; 3. 304; 4. 79; 5. 613; 8. 486
polymorphus 6. 745, 852; 7. 205, 698; 9. 23
polyplocus 0. 178, 227; 1. 132, 134, 140; 2. 349; 8. 486
Ammonites polyptychus 0. 731
Portlocki 7. 639
pretiosus 1. 738
primordialis 5. 213; 7. 205
Prosperanus 5. 633
pseudo-aries 0. 251
psilonotus 0. 145, 146, 180; 6. 378, 494, 744; 8. 353, 354, 552, 583; 9. 2, 14* ff. 9. 94[2], 453, 629
ptychoicus 4. 760
Truellei 7. 544
punctatus 8. 484
pustulatus 7. 382, 544, 8. 484
pustulifer 0. 481
Quadalupae 0. 102
Quenstedti 1. 143; 2. 173; 3. 307, 429, 430; 6. 748
quinquecostatus 7. 205
radians 0. 153 ff., 180, 181, 160; 1. 130, 137; 2. 343, 456; 3. 167, 348, 494, 617; 4. 204, 205, 830, 850; 5. 175, 178, 219; 6. 71, 208, 211, 451, 748, 818, 850; 7. 17 ff., 130, 205, 206, 547, 595, 613, 698; 8. 226, 296, 356, 450, 553; 9. 26, 94, 133
radiatus 9. 372
ramosissimus 6. 480
Raquinanus 0. 154; 4. 850; 7. 613; 8. 356, 873
rare-striatus 0 251
raricostatus 0. 146, 147, 180, 733; 1. 131, 132, 140, 143; 3. 192, 416, 531; 5. 625; 6. 454, 742, 748; 7. 212, 618; 9. 15, 19 ff.; 94, 133
Raulinanus 7. 474* ff.,
recticostatus 2. 885 9. 203
rectilobatus 8. 383
refractus 8. 484
Ammonites Reginaldi 0. 723
Regnardi 0. 151; 3. 167; 4. 830; 5. 578, 625
regularis 3. 329; 7. 659, 660 ff.
Rehmanni 8. 484
Renauxanus 7. 475* ff. 659
respondens 5. 500
reticulatus 0. 251
retiformis 6. 744
Reussi 6. 748
Rhotomagensis 0. 386; 1. 357, 643, 744; 3. 495; 5. 457; 6. 217, 483, 817; 7. 639, 480, 786
Riesenbrocki 6. 744
Roberti 5. 625; 6. 748
robustus 5. 502
Roissyanus 0. 480; 4. 80
rostratus 7. 475* ff.
rotiformis 0. 148; 6. 454, 748; 7. 698
rotundus 8. 488
Rouyanus 1. 738; 4. 760; 9. 124, 372
Rüpelli 0, 251
Ruppelensis 8. 486
Sabandianus 7. 205
sagitta 0. 227
Salisburgensis 6. 748
Sandlingensis 0, 251
Sauzei 6. 852; 9. 136;
Sauzeanus 6. 454, 744
scaphitiformis 5. 512
Schimperi 4. 123
Scipionanus 0. 147; 6. 454, 744; 9. 17
Selliguinus 9. 228
semiglobosus 5. 502
semilaevis 6. 748
semiplicatus 0. 251
semistriatus 4. 760 6. 847
semisulcatus 9. 372
septentrionalis 0. 227
sero-plicatus 4. 760; 6. 748
serpentinus 3. 494; 4. 850; 6. 58, 210, 211, 850; 7. 16, 205[2], 206, 613, 698; 8. 105, 356; 9. 95, 263
serratus 0. 409; 8. 486

Ammonites
serridens 4. 549; 6. 850; 8. 450
Simonyi 4. 760
simplex 7. 205
Sinemuriensis 6. 454
solaris 3. 348
Soutoni 7. 369
Sowerbyi 6. 852 8. 356; 9. 94 [2]
sphaerophyllus 4. 760; 8. 383
spinaries 6. 744; 9. 17
spinatus 0. 150 ff.; 1. 137, 140; 4. 850; 6. 456; 8. 356
spinescens 5. 502
spiniferus 5. 480
spiratissimus 6. 454, 744, 748; 8. 643; 9. 17 ff.
splendens 1. 64; 7. 475* ff., 659[2]; 9. 762
Stangeri 7. 369
Stauffensis 6. 852; 9. 32
stella 4. 760; 6. 748
stellaris 0. 147; 4. 850; 6. 454, 748; 7. 209, 698
stellatus 6. 217
sternalis 0. 154, 155, 180; 6. 850; 7. 205, 595
Stobiecki 1. 738
Stockesi 0. 181
strangulatus 1. 738, 744
striaries 6. 744
striato-costatus 6. 748
striato-falcatus 0. 251
striato-sulcatus 1. 738
striatulus 6. 850; 8. 356
striatus 6. 370, 744; 7. 698, 816; 9. 23
Studeri 8. 383
subarmatus 0, 180, 181; 6. 748, 850; 7. 205, 206
subbullatus 0. 251
subcarinatus 6. 850
subcontractus 3. 234
subdiscus 7. 382
subfimbriatus 6. 847; 8. 380; 9. 123, 203
subfurcatus 6. 852
subinsignis 6. 852
Ammonites
sublaevis 0. 164, 167, 183; 6. 818
subobtusatus 4 760
subobtusus 3. 379
submuticus 6. 456
subradiatus 0. 160; 6. 852; 8. 356
subumbilicatus 0. 251, 7. 615; 9. 477
Suessi 5. 487; 8. 354
Suevicus 8. 484
sulcatus 4. 370
sulciferus 8. 484
Sussexiensis 7. 639[2]
Sutherlandae 7. 205; 8. 486
Talitzianus 4. 856
tarde-crescens 6. 748
tarde-furcatus 6. 818; 7. 480, 659[2], 660 ff.
Tatricus 0. 178, 589, 734, 735, 830; 1. 316; 2. 622; 3. 479; 4. 759, 760; 5. 219, 364; 6. 57, 748; 7. 205, 614, 618; 8. 105!, 873
Tauricus 8. 874
Taylori 0. 180, 181; 6. 456
tenuilobatus 8. 486
Texanus 0. 102; 4. 870; 8. 505, 554
Thetys 9. 124
Thouarsensis 0. 160, 181; 4. 205; 6. 71, 748, 850; 8. 226, 356
Tirolensis 6. 748
tornatus 4. 552; 5. 500; 7. 621
tortilis 0. 148; 6. 494
tortisulcatus 0. 589, 590, 734; 4. 760; 6. 57; 8. 873
tortuosus 6. 114
torulosus 4. 830; 6. 852; 9. 28, 519
torus 0. 148
transversarius 8. 486
tripartitus 6. 53
trimarginatus 8. 486
triplicatus 0. 160, 164, 830; 2. 349; 6. 254; 8. 582
Truellei 0. 160; 8. 356
Ammonites
Tscheffkini 4. 79
tuberculatus 5. 633; 7. 474* ff., 659[2]
Tucuyensis 0. 480
tumidus 3. 759; 8. 484
Turneri 0. 146, 147, 180, 733; 1. 140; 2. 455; 6. 454, 743, 748; 9. 2, 19, 94, 345
Umbulazi 7. 369
undato-costatus 7. 618
undulatus 6. 850
Uralensis 8. 873
Valdani 0. 149; 3. 167; 4. 830, 850; 5. 625; 6. 208, 748; 7. 205; 9. 23
variabilis 4. 850; 6. 850; 7. 205; 8. 356
varians 0. 386; 1. 311, 314; 2. 28*, 60; 3. 495; 5. 364, 457, 633; 6. 817, 818; 7. 471, 480, 785, 786
varicosus 0. 480; 4. 80, 167; 7. 475* ff., 659
Velledae 3. 329; 7. 639
ventri-cinctus 8. 449, 450
Vernoni 2. 352
viator 4. 35; 8. 873
Vielbanki 7. 639
virgatus 1. 496; 7. 472
Voironensis 9. 124
Walcotti 0. 153, 154, 181; 2. 456; 6. 545; 7. 698[2]; 8. 105; 9. 94
Wapperi 4. 854
Waterhousei 3. 234
Wogauanus 3. 19
Woolgari 1. 743; 7. 639[2]
Wosnessenskii 4. 79
Württembergicus 8. 482
Yo 8. 488
Zarbas 9. 753
Zetes 4. 760; 6. 456, 748; 7. 205
Zieteni 6. 456
Zignoanus 3. 379; 4. 35, 760; 6. 748; 7. 205, 614
Zignoi 4. 760

Ammonites
Zigzag 6. 852
Ziphius 6. 454; 7. 698
spp. 1. 382; 9. 123
Ammonitidae fam. 6. 308!
8. 617!
Ammonoceras
Conradi 6 480
Amomocarpum 0. 631
depressum 2. 993
Amorpha 0. 637
Ampelisca Bellana 9. 490
Ampélite 1. 105
Amphechinus
Arvernensis 5. 224, 371
Amphiarctos gen. 4. 752
sp. 4. 495
Amphibol 4. 70; 5. 565*,
822
Amphibolit 7. 741; 9. 657
Amphibrya (Vegetabilia)
0. 630!; 2. 504!,
992!
Amphiceras spp. 6. 753
Amphichneumon 5. 229
Amphictis antiqua 5. 372
Lemanensis 5. 372
leptorhyncha 5. 372
Amphicyon
agnotus 5. 372
Blainvillei 5. 229, 372
brevirostris 5. 229, 372
crassidens 5. 372
cultridens 5. 372
diaphorus 5. 372
Elaverensis 5. 229
Elaverii 3. 378 5. 372;
Eseri 1. 504, 512; 4. 50
giganteus 5. 229, 372
gracilis 5. 229, 372;
7. 115, 246!; 8. 376
incertus 5. 372
intermedius 1. 75, 503,
512; 2. 759; 8. 204;
9. 428
Laurillardi 5. 372
Lemanensis 5. 229, 372
leptorhynchus 5. 372
major 4. 581; 5. 229,
372
minor 1. 512; 2. 759;
5. 229, 372
vetus 8. 376
spp. 5. 615
Amphidesma gen. 6. 859
arcuatum 6. 752
axiniforme 6. 647
Amphidesma
carbonarium 6. 647
constrictum 6. 752
decurtatum 0. 722;
4. 620; 7. 744
deltoideum 6. 647
donaciforme 6. 872
lacteum 6. 864
linosum 6 752
lunulatum 4. 749; 6. 644,
647, 650
Mississippiense 6 752
nuculoides 6. 752
obovale 7. 506
pristinum 6. 647
protextum 6. 752
recurvum 0. 723; 4. 620
securiforme 4. 620;
6. 858; 7. 744
subobliquum 6. 752
subtruncatum 6 647
spp. 6. 859
Amphidesmidae
fam. 6. 859
Amphidetus
cordatus 4. 762
Amphidiscus gen. 6. 104
brachiatus 6. 104
disphaera 6. 104
naucrates 6. 104
trianchora 6. 104
verticillatus 6. 104
Amphientomon
gen. 6. 623!
paradoxum 6. 621
Amphigen-Laven 7. 357*
Amphigena (Vegetabilia)
2 504!
Amphihelia 2. 116*, 249!
Amphilagus gen. 7. 876
antiquus 5. 371
Amphimeryx gen 5. 227
Amphimorphina
gen. 2. 631!; 7. 377
Hauerana 2. 631; 7. 378
Amphion
gen. 0. 778!, 785; 1. 510;
3. 488; 6. 224
actinurus 9. 121
Beaumonti 3. 489
Fischeri 9. 121
gelasinosus 4. 501
Lindaueri 7. 638
polytomus 6. 803
spp. 4. 493. 501
Amphipleura rigida 0. 473
Amphisbaenii (ord.) 5. 742
Amphisile
Heinrichi 2. 980; 9. 640
Amphisorex
tetragonurus 5. 224
Amphisorus gen. 5. 617,
618!, 755; 7. 227
Amphistegina gen. 5. 616*,
751, 755; 7. 377;
Haueri 7. 498
Javanica 7. 750
nummularia 7. 498
Amphistium
paradoxum 5. 380
Amphitetras
antediluviana 4. 739;
6. 103
Amphitherium
Aurelianense 9. 428
Amphitragulus
Boulangeri 5. 373
communis 5. 227, 373
elegans 5. 373
gracilis 5. 373
Lemanensis 5. 373
meminnoides 5. 373
Amphitryo 6. 224
Amphitryon
Murchisoni 4. 502;
9. 359
Amphodelit 1. 442!;
2. 879; 4. 598!,
601; 8. 313
Amphora gen. 6. 602
borealis 0. 473
elliptica 0. 473
gracilis 4. 613
Libyca 0. 491; 4. 613, 739
paradoxa 0. 491
ovalis 0. 473
Amphoracrinus
gen. 4. 253!; 6. 602
Atlas 1. 748; 6. 115
olla 1. 748; 6. 115
Amphorosteus
gen. 2. 764!
Brumbyi 2. 764*
Amplexus 2. 121*
annulatus 2. 340
coralloides 6. 114
Hercynicus 6. 255
infundibulans 6. 255
lineatus 6. 255
stigmatophorus 6. 375
tortuosus 6. 375
spp. 2. 990; 4. 497
Ampullaria angulata 6. 41,
494

Ampullaria
carinata 6. 494
conica 2. 163, 169
gigas 7. 86
gracilis 6. 494; 7. 209
mutabilis 0. 861
obesa 1. 740
obliqua 6. 494
obtusa 6. 494
planulata 6. 494
ponderosa 0. 862
speculi 8. 874
subcarinata 1. 764; 7. 229
subconica 2. 163, 169
Ampyx gen 0. 780!, 785; 3. 487; 6. 224 [2]
baccatus 4. 501
Caractaci 4. 502
fimbriatus 4. 502
gratus 4. 1
latus 1. 509; 6. 116
nasutus 6. 803
nudus 6. 116; 7. 381
parvulus 6. 116
radiatus 4. 502
tessellatus 4. 502
tetragonus 6. 807
spp. 2. 242; 4. 493
Amusium
deornatum 6. 119
Sowerbyi 6. 119
Amygdalocystites
gen. 9. 636
florealis 9. 636
radiatus 9. 636
tenuistriatus 9. 636
Amygdaloides 2. 366
Amygdalophyr 3. 385 ! 4. 401 ! ff.; 5. 798; 6. 665
Amygdalus 0 637
communis 4. 832
Hildegardis 1. 635
insignis 6. 506
pereger 3 47; 6. 506; 9. 375
persicifolia 2. 755
persicoides 1. 635
Amyloxylon Huttoni 1. 102
Amyxodon gen. 4. 751
Sivalensis 4. 752
Anabacia 2. 118*
Bajociana 2. 376
Bouchardi 2. 376
complanata 2. 376
hemisphaerica 2. 376
Anabacia
Normaniana 2. 376
orbulites 2. 376, 758
spp. 2. 758
Anabathra
pulcherrima 0. 106; 6. 99
Anachoropteris 0. 628
rotundata 6. 98
pulchra 6. 98
Anagenit 6. 216; 9. 633; 5. 364
Analoge Pole der Krystalle 4. 776
Analogie der Organismen 0. 374
Analysen eruptiver
Gesteine 1. 837 ! ff.
Jurassischer Felsarten 9. 385
Analzim 1. 157*; 3. 63, 257; 4. 423; 5. 822; 8. 291, 549; 9 84, 303 !, 623, 653
Anamesit 3. 707; 5. 78; 8. 606; 9. 657
Ananchytes
cinctus 3. 380; 8. 360
cordatus 7. 748
fimbriatus 3. 380; 8. 360
gibbus 7, 613; 614
laevis 9. 228
ovatus 0 470, 737; 1. 470, 481, 730; 2. 512; 5, 42, 87, 364; 6. 817; 7. 155, 481, 614, 786[2], 787[2]; 8. 739; 9. 847
semiglobosus 7. 748
semiglobus 1. 730
spatangus 7. 748
tuberculatus 0. 734
sp. 5. 236
Anarthrocanna
gen. 0. 627; 2. 892 !
approximata 2. 890
deliquescens 2 890
stigmarioides 2, 280, 890; 6. 375
tuberculosa 2. 890
Anatas 0. 238; 4 78, 447, 453; 5. 181, 823; 6. 16*, 170, 49*; 8. 447, 549
Anatifa
Burdigalensis 3. 75
convexa 2. 633
Anatifa
cretae 2. 623, 633
turgida 2. 633
Anatifopsis
Bohemica 7. 638
Anatina Agassizi 6. 858
attenuata 6. 643, 653
bifida 2. 161, 169
convexa 7. 510
Cornuelana 0. 393
deltoidea 6. 645[2], 653
Duretana 3. 102
myalis 7. 507
Münsteri 6. 644, 645[2]
pinguis 8. 482
plicatella 7. 743
praecursor 7. 93, 94; 8. 353; 9. 452 ff.; 9. 629
praetenera 7. 507
rostrata 6. 858
Royana 6. 858
rugosa 3. 605; 6. 739; 9. 844
spatulata 8. 488
subrostrata 6. 858
Suessi 8. 353; 9. 452 ff.
undulata 7. 743
spp. 2. 977
Anatone marginata 5. 123
spinipes 5. 123
Anaulax staminea 9. 234
Anauxit 4. 697 !
Anceps-Bett 8. 484
Ancilla subcanalifera 3. 75
spp. 6. 753
Ancillaria altilis 6. 753
australis 1. 229
buccinoides 4. 528
canalifera 7. 420
glandiformis 0. 223; 6. 739; 9. 839
inflata 3. 370; 4. 515; 5. 594; 6. 93
limnaeoides 6. 753
obsoleta 3. 370; 6. 93, 739
olivula 3. 604
scamba 6. 753
Studeri 5. 475
subcanalifera 7. 420
subglobosa 6. 753
subulata 1. 712, 715
tenera 6. 753
turritella 1. 715
spp. 2. 630; 3. 627; 6. 479, 750

Ancistroceras
undulatum 8. 236 !
Ancistrodon spp. 0. 102, 103
Ancistrophyllum 0. 629
stigmariaeforme 2. 891; 5. 631
Anchilophus
Desmaresti 5. 226; 7. 490
Anchitherium gen. 0. 748; 5. 118!, 761
affine 9. 250 !
Aurelianense 1. 493; 2. 304. 998; 3. 164, 617; 5. 226; 6. 331; 7. 845
Bairdi 5. 115, 118; 8. 376
cognasum 9. 250 !
Dumasi 0. 878; 5 226
Ezquerrae 1. 493; 3. 617
Radegondense 5. 226
Ancodus gen. 4. 48; 5. 228, 373; 6. 638
Aymardi 5. 373
bovinus 5. 373
crispus 5. 373
incertus 5. 373
leptorhynchus 5. 373
macrorhynchus 5. 373
Veitanus 5. 373
Velaunus 5. 373
Ancyloceras gen. 4. 853; 6. 316*
annulatum 6. 852
approximans 6. 480
Calloviense 0. 722; 8. 484
Cheyennensis 7. 492; 8. 494
Duvalanus 7. 480
Duvali 8. 380; 9. 372
Emerici 7. 480, 675; 9. 124, 372
Etalensis 7. 209
Mortoni 8. 494
Nebrascensis 7. 492; 8. 494
Nicoleti 8. 494
plicatile 8. 874
Renauxanum 7. 480
Sabaudianum 9. 124
spinatum 9. 361
Tabarelli 9. 124
uncus 8. 497
Ancyloceras-Kalke 1. 739
Ancylus Brauni 3. 751
deperditus 4. 249
elegans 1. 714; 4. 865
fluviatilis 4. 832
lacustris 9. 475
latus 4. 865
minutus 7. 494; 8. 494
Ancyropus gen. 9. 868
heteroclytus 9. 868
Andalusit 2. 522, 524, 290*
3. 366; 5. 349! 822; 6. 37; 7. 70!
Andesin 0. 423; 1. 444; 2. 962; 4. 599 !, 601, 602; 5 447 !; 6. 345 !; 7. 360 !, 737 ; 8. 565!, 860
Andriania 0. 628
Baruthina 6. 253, 254
Andrias
Scheuchzeri 4. 168; 5. 622!; 6. 759
Tschudii 9. 723!
Androgeus gen. 5. 120
militaris 5. 121
triqueter 5. 121
Andromeda 0. 634
Berendtana 3. 747
dubia 9. 505
elongata 3. 227
ericoides 3. 747
ferruginea 9. 505
hypnoides 3. 747
incerta 4. 627
protogaea 2. 754; 3. 384, 505, 510; 4. 379, 491; 6. 252; 7. 614, 776; 9. 117, 375
reticulata 4. 379
revoluta 0. 505; 3. 505
rosmarinoides 3. 747
Senogalliensis 4. 627
tremula 3. 505
tristis 9. 375, 503
truncata 3. 747
vacciniifolia 3. 505; 5. 241; 9. 375, 506
Vulcanica 4. 491
Weberi 4. 491; 6. 252
Andromedites
paradoxus 2. 628
Anenchelum
breviceps 9. 862
dorsale 9. 862
Glarisianum 9. 862
heteropleurum 9. 862
Anenchelum
isopleurum 9. 862
latum 9. 862
marginatum 9. 361
Aneuacanthus 6. 224
spp. 9. 504
Aneura palmata 3. 745
Angia gen. 0. 767 !
2. 118
Angiosperma
(Vegetabilia) 0. 113
2. 504 !
Angulaten-Schichten 8. 641
Angulatus-Bett 6. 454 !
Anguste-stellati
(Cidaridae) 7. 121
Anguilla brevicula 5. 380
latispina 5. 380
pachyura 5. 622
Anguillula fluviatilis 0. 250
Anguinaria gen. 4. 114
Anguis acutidentatus 5. 233
Bibronanus 5. 233
Laurillardi 5. 233
Anhydrit 0. 482 ff.; 2. 515, 525; 3. 258; 4. 187; 5. 821 *
-Gruppe 2. 53, 914
Anisodon magnus 5. 228; 6. 615
Anisodonta gen. 8. 617 !
spp. 8. 617
Anisophyllum 2. 121 *
Anisopoden-Fährten 7. 878
Anisopus
Deweyanus 5. 864; 9. 867
gracilis 9. 867
Ankerit 4. 262* ff.; 5. 821
8. 832 !
Anlaufen
der Mineralien 6. 191
Annelliden 7. 753, 754
-Fährten 5. 863, 864; 7. 878
Annellidae class. 8. 357
Annularia 0. 627
brevifolia 0. 110, 673; 7. 113
carinata 6. 543, 666; 8. 503
fertilis 0. 659, 674; 5. 629 [2], 6. 97; 8. 159
flliformis 5. 629
floribunda 1. 476; 6. 97; 7. 113

Annularia
longifolia 0. 91, 110, 120; 1. 476; 3. 121; 5. 97, 629; 6. 97; 8. 625
minuta 5. 629; 6. 97
radiata 5. 629; 6. 97
reflexa 5. 629; 6. 97
sphenophylloides 5. 629; 6. 97; 8. 201; 9. 149
spinulosa 5. 629; 6. 97
spp. 9 379, 380
Annulata spp. 2. 757
Annulaten-Höhlen 9. 105
Anodon anatinus 1. 760
Juckesi 6. 606
Anodonta
anatinoides 2. 765
Californiensis 7. 242
cygnea 2. 1004
Daubréeana 3. 739
keuperina 9. 4
Lettica 6. 616; 7. 760
postera 9. 9, 11.
spp 6. 870
Anodontopsis gen. 1. 253!
angustifrons 6. 119
bulla 6. 119
deltoidea 6. 119
laevis 6. 119
pristina 6. 119, 647
quadrata 6. 119
securiformis 6. 119
Anogene Metamorphose 5. 715
Anoglochis Ardeus 5. 373
cladocerus 5. 373
ramosus 5. 373
Anomalina gen. 5. 616*, 755; 7. 377
anomala 7. 280*
complanata 4. 867
subaequalis 7. 498
tenuissima 7. 498
variabilis 7. 280!
spp. 2. 511*
Anomalocystites
gen. 9. 236!, 636
spp. 9. 236
Anomia Beryx 6. 363; 7. 760
Burdigalensis 9. 839
aculeata 2. 1004
alpina 9. 629
alta 6. 363; 7. 760
Andraei 6. 363; 7. 760
antiqua 7. 57
Anomia costata 2. 43; 4. 515; 9. 854
detruncata 3. 240
disci 9. 33
ephippium 2. 1004; 3. 756
irregularis 6. 496
jurensis 4. 765
Kateruensis 9. 750
laevigata 1. 358, 744
modiola 9. 750
opalina 9. 29
patellaeformis 2. 1004
pellucida 4. 851; 6. 496; 7. 210; 8. 643
praecursor 9. 629
psittacea 4. 507
Schafhäutli 9. 629
sellaeformis 9. 498
striata 2. 1004; 7. 502
striatula 8. 643
subcostata 6. 480; 7. 241, 242
subradiata 5. 728
tenuis 0. 99; 7. 760
tenuistriata 2. 153, 168
truncata 0. 728; 4. 869; 7. 471
Vercellensis 4. 354
Anomianella Proteus 3. 231
Anomites striatus 4. 508
Anomocare 6. 224
spp. 4. 493; 9. 504
Anomodon gen. 0. 873!
Snyderi 0. 873; 5. 113 7. 376!
Anomoenus Barratti 9. 868
Anomoepus major 9. 867
minor 9. 867
scambus 5. 864; 9. 867
Anomophyllum
gen. 2. 119; 3. 877*
Anomopteris 0. 629
Schlechtendali 1. 115
sp. 5. 493
Anomuren-Fährten 7. 878
Anona 0. 635
lignitum 1. 634; 6. 633
Anoplodii 0. 866, 867
Anoplomya gen. 1. 384
Lutraria 1. 384
Anoplotheca gen. 5. 491!
lamellosa 5. 491; 6. 374, 381
Anoplotherium
gen. 3. 754*; 7. 867!, 868!, 869
Anoplotherium
cervinum 1. 501
commune 0. 499, 878, 1. 502, 504; 2. 305, 759; 3. 378, 754*; 5. 228; 7. 250, 845
Cuvieri 3. 754*; 5. 228
Duvernoyi 3. 754*; 5. 228
gracile 1. 504; 2. 759; 7. 845
grande 5. 228
laticurvatum 5. 228
Laurillardi 3. 754*; 5. 228
leporinum 2. 305, 346, 759
medium 4. 84; 5. 227
minimum 5. 227
murinum 2. 759; 3. 617
obliquum 5. 227
platypus 3. 754*; 5. 228
secundarium 3. 754*; 5. 228
Sivalense 1. 502
Anopocare
spp. 4. 493; 6. 223
cfr. Anomocare
Anorthit 0 446!; 1. 444; 2. 317!, 615; 3. 258; 4. 296, 598!; 6. 186!; 7. 346; 8 698²!; 9. 300!
Anorthopygus gen. 7. 852!
sp. 7. 852
Anschwemmungen 1. 729
Ansulus vdr. Ancylus
Ansylus vdr. Ancylus
Antepyrenäisches Tertiär-Gebirge 9. 470
Anthes spp. 4. 493
Anthelia 2. 123
Anthocrinus gen. 4. 242!
Loveni 4. 242; 6. 801
Antholithus 0. 630, 638
Marti[us]i 5. 639
nymphoides 0. 116
Anthophora 2. 251
Anthophyllit 3. 271; 4. 70; 5. 194, 822; 8. 684, 701!
-Gestein 1. 266
Anthophyllum 2. 117*
Atlanticum 8. 360
Brauni 0. 767
conicum 0. 291

Anthophyllum
decipiens 0. 759
detritum 3. 369; 6. 93
distortum 2. 377
explanatum 0. 759
obconicum 0. 170, 184
patellatum 0. 759
proliferum 1. 102.
sessile 0. 759
truncatum 0. 759
Anthozoa (class.) 7. 230, 232, 499
Anthracida xylotoma 1. 759
Anthracosia gen. 6. 227!
acuta 6. 228
Beanana 6. 228
Smithi 6. 228
Anthracotherium gen. 6. 638!; 7. 869
Alsaticum 1. 736; 4. 48; 5. 228, 373; 6. 231, 615, 638
crispum 5. 373
Cuvieri 5. 373
Dalmatinum 4. 48!; 6. 231, 487, 638
Gergovianum 4. 48; 5. 228, 373; 6. 231, 638
hippoideum 6. 640!; 7. 487
Lembronicum 6. 615, 638
magnum 0. 203; 2. 831; 4. 48; 5. 228, 373; 6. 231, 606, 615, 638; 7. 487!; 8. 298, 738; 9. 113, 356
minimum 2. 979; 4. 48; 5. 228; 6. 231, 487, 638
minus 6. 638
minutum 4. 48; 5. 227, 373; 6. 638
Neostadense 0. 202
onoideum 5. 227, 373, 6. 638
Sandbergeri 2. 305; 4. 48; 6. 231, 638; 7. 487
Silistrense 6. 638
Velaunum 4. 48; 5. 373; 6. 231, 638
Vindobonense 0. 202
spp. 3. 369; 8. 233
Anthrakolith 2. 854!
Anthrakonit 2. 418
Anthrakotherien-Fauna 7. 624
Anthrakoxen 7. 327!
Anthrax? sp. 3. 105
Anthrazit 1. 588; 2. 70!; 7. 593, 605, 766; 8. 95, 220
in Pensylvanien 3. 62
-Bildung 0. 831
-Flora der Alpen 0. 656
-Formation 8. 326!, 375; 9. 379 p
Formation: Flora 0. 119!
-Gebirge 4. 205; 6. 475, 719, 729
-Kohlen 5. 712; 7. 165!; 9. 131
-Schiefer 4. 356; 6. 67
Antigorrit 9. 445!
Antiloge Pole der Krystalle 4. 776
Antilope gen. 7. 869
antiqua 5. 373
Aymardi 5. 373
boodon 3. 617
Borbonida 5. 227
brevicornis 5. 375; 7. 235, 370, 759
capricornis 5. 375; 4. 639
Christoli 5. 227; 9. 100
clavata 5. 227
compressa 5. 227
Cordieri 1. 492; 2. 998; 4. 495; 5. 227
deperdita 5. 227
dichotoma 5. 227; 9, 100
incerta 5. 373
Lindermayeri 4. 639; 5. 375; 7. 235, 370, 759
major 1. 502
Martiniana 5. 227
minor 1. 502
Pallasi 7. 124!, 235, 759
pygmaea 1. 503
recticornis 1. 492; 2. 998; 4. 495; 5. 227
Rothi 7. 124!, 759
Sansaniensis 5. 227
speciosa 4. 639; 5. 375; 7. 370, 759
spp. 3. 378; 6. 595
Antilopii 0. 868
Antimon 2. 531; 3. 175, 197*; 6. 48
gediegen 1. 577*
-erze 4. 77! 5. 574; 8. 330
-blende 0. 616; 1. 400*; 2. 534
Antimon
blüthe 2. 519, 531, 705; 4. 192!
glanz 0. 452; 5. 79, 351, 824: 6, 196*
Antimonit 1. 400*; 2. 519
Antimonkupfer 1. 707
-nickel: künstlich 3. 179!
-ocker 2. 534; 9. 288!
-oxysulphür 1. 597
-saures Bleioxyd 3. 175
-saures Bleioxydhydrat 0. 274
-saures Quekksilberoxydat 2. 468
-silber 3. 694
-silber, rothes 1. 597
Antiker Rother Porphyr 1. 422!
Antipathes 2. 122*
glaberrimus 1. 512
Antipus gen. 9. 868
bifidus 9. 868
flexiloquus 9. 868
Antopia obscura 5. 121
punctulata 5. 122
tenera 5. 122.
Antrimolith 4. 182!
Antrimpos gen. 5. 613
descendens 5. 613
longidens 5. 613
nonodens 5. 613
Anvil-rock (Gestein) 9. 848
Anyphaena fuscata 5. 122
Anziehungs-Kraft der Gebirgs-Massen 7. 98
ihre Wirkungen 2. 437
Aodon (Cet.) gen. 4. 848
Apateon gen. 8. 761*
pedestris 8. 239
Apatichnus bellus 9. 868
circumagens 9. 868
Apatit 0. 190; 1. 710*, 820*; 2. 515, 529, 703*, 879; 3. 176, 184*, 258, 465; 4. 787; 5. 180, 821; 6. 12*, 422, 800; 7. 330!; 8. 447; 9. 191, 625
künstliche Krystallisation 5. 100!, 5. 587
Apatoid 2. 615
Apedodus priscus 7. 369
Aperostoma gen. 4. 865
Apetala (Vegetabilia) 2. 504!, 9. 376!

Aphanit 7. 357*
Aphelosaurus gen. 9. 235*
Lutevensis 9. 235*
Aphelotherium
Duvernoyi 5. 227.
Aphis araneiformis 6. 620
delicatula 6. 503
hirsuta 6. 620.
macrostyla 3. 874
Morloti 3. 874
pallescens 3. 874
transparens 6. 620
Aphlebia 0. 628
acuta 6. 97
crispa 6. 97
pateraeformis 1. 476
patens 1. 476
ramosa (Farn) 5. 629
tenuifolia 6. 98
Apholidemys
granosa 5. 232
laevigata 5. 232
Aphrastraea gen. 0. 763!, 767; 2. 118*
Aphrodita columba 4. 505
electrina 6. 620.
Aphrophora carbonaria 6. 620
mollassica 3. 874
pinguicula 3. 874; 6. 503
spumarioides 3. 874
spumifera 3. 867, 874; 6. 503; 9. 377
vetusta 6. 620
Aphrosiderit 0. 341!; 1. 158*; 4. 695
Aphthartus ornatus 6. 746
Aphyllum gen. 6. 629!, 630
paradoxum 4. 496; 5. 240; 6. 627
Apiaria antiqua 0. 18*
dubia 1. 759
lapidea 0. 18*
Apioceras gen. 6. 126!
inflatum 6. 126
olla 6. 126
recurvum 0. 243; 1. 491
Apiocrinites
ellipticus 1. 419, 420!
incrassatus 8. 873
Apiocrinus cornutus 3. 315; 4. 538, 556
dichotomus 0. 163
ellipticus 0. 295; 1. 140; 2. 462; 3. 86, 109, 315; 4. 538, 556; 5. 369
Apiocrinus
elongatus 0. 142; 0. 163
intermeduis 0. 142; 163, 183
Meriani 0. 173, 184; 4. 354
mespiliformi 1. 146
Milleri 0. 169, 170, 184, 185
obconicus 0. 243
Parkinsoni 0. 142, 183, 722; 8. 482
Roissyi 4. 354
rotundus 0. 163, 183. 722; 3. 431
rotundatus 2. 349
subpentagonalis 0. 170
Apiocystites gen. 2. 746; 4. 234
spp. 5. 248; 9. 236
Aplax Oberndorferi 4. 579*
Aploceras sp. 8. 617
Aplocyathus
(Haploc.) 2. 115*
Aplophyllia
(Haploph.) 2. 117*
crassa 4. 868
Aplosastraea
(Hapl.) 2. 117*
Aplysia asciola 7. 510
grandis 6. 873
Apocynum
lanceolatum 0. 505
Seyfriedi 0. 505
Apocynophyllum 0. 634
acuminatum 2. 754; 3. 504
alyxiaefolium 4. 379
glossopteris 4. 252
Haeringanum 4. 379
lanceolatum 1. 128 2. 754, 761; 3. 505; 9. 375, 502
ochrosioides 9. 375
parvifolium 4. 379
plumieriaefolium 3. 510
plumeriaeforme 8. 500
ramosissimum 3. 435
Reinwardtanum 3. 435
rhododendrifolium 3. 435
Russeggeri 3. 384
Seyfriedi 2. 761; 9. 502
Sotzkianum 9. 375
Apodidae fam. 7. 746
Apodites antiqum 4. 123
Apophyllit 0. 68!, 190; 4. 423; 5. 348!
Aporosa (tribus) 2. 115*
Aporoxylon gen. 6. 629!, 630
primigeninm 5. 240; 6. 627
Aporrhais alata 7. 51
decemlyrata 9. 498
extensa 6. 230
Mellingtoni 6. 230
pes-pelecani 3. 763
spp. 4. 626
Apsendesia
vidr. Apseudesia
Apseudesia clypeata 5. 635
cristata 5. 635
dianthus 5. 634
Apt-Mergel 1. 738
Apterornis (pro Aptornis) 0. 125
Apteryx gen. 4. 496
australis 1. 251
Oweni 1. 256
Aptien 1. 738; 4. 250!, 375 p, 508; 5. 164, 473, 615 p; 7. 480, 623 p, 659; 9. 123. 124 p
Aptornis (vdr. Apterornis) 0. 125!
otidiformis 1. 229
Aptychen-Kalke 3. 192; 5. 219; 7. 618
-Schiefer 0. 621, 585, 735, 738; 2. 92, 455
Aptychodon gen. 6. 484!
Bohemicus 6. 484!
Aptychus 0. 244!
alpinus 5. 178
angulicostatus 9. 124
antiquus 2. 279
Berno-jurensis 8. 486
crassus 9. 361
cretaceus 2. 633
depressus 7. 614
Didayanus 8. 638
Didayi 2. 455; 3. 192; 7. 204
flexuosi 5. 613
Gollevillensis 7. 639
heteropora 8. 486
Icenicus 7. 639
imbricatus 0. 178, 831; 2. 456; 3. 192; 5, 613; 6. 57; 7. 618
insignis 7. 639; 9. 361
laevis 0. 830; 5. 219, 613; 6. 57
lamellosus 0. 585, 589, 734, 735; 2. 349; 3. 403; 4. 35; 5. 219

Aptychus
latus 0. 585, 589, 734; 2. 456, 458; 3. 192, 617; 4. 35; 7. 614
leptophyllus 7. 639
Lythensis 3. 405, 531
Mortilleti 9. 124
obtusus 9. 361
peramplus 7. 639
perarmati 5. 613
planulati 5. 613
Portlocki 7. 639
radians 9. 124
raricostatus 7. 618
reticulatus 3. 405!
rugosus 7. 639
Seranonis 9. 124
Sesanonensis 7. 204
striato-costatus 2. 455
subalpinus 3. 405!
undulo-costatus 7. 614
spp. 6. 378
in Scaphites 1. 357
Apudites antiquus 4. 123
Apus cancriformis 4. 123
Aquila spp. 5. 231
Arachnichnus gen. 9. 868
dehiscens 9. 868
Arachnoidea (class.) 6. 765
Arachnophyllum 2. 122
Hennahi 6. 114
Richardsoni 4. 86
typus 6. 114
Aradus
antediluvianus 3. 873
assimilis 6. 620
consimilis 6. 620
superstes 6. 620
Araeacis 2. 251!
Auvertiaca 2. 251
lobata 4. 867
Michelini 2. 251
sphaeroidalis 2. 251
Aräoxen 1. 594! 7. 397!
Aragon[it] 0. 452; 3. 701; 4. 189; 5. 706*; 9. 197!
Aragonit 1. 454, 699, 700; 2. 223!, 516; 3. 258; 5. 692*, 821; 6. 168, 558, 842; 7. 176, 587; 8. 852
Araliaceae fam. 7. 777
Aralianthea n. g.
Brongniarti 7. 777
Zizioides 7. 777
Arapaima gen. 8. 761*
Araucaria peregrina 6. 496
Reichenbachi 0. 94
Araucarites
Agordicus 0. 732; 7. 778; 8. 135
Beinertanus 2. 891
Brandlingi 1. 477; 8. 90
carbonarius 2. 891; 5. 712
Catulloi 7. 778
Cordai 6. 99
curvifolius 2. 888
Dunkeri 2. 888
Kutorgae 7. 363
peregrinus 9. 266
permicus 7. 363
Reichenbachi 0. 299
Rhodeanus 8. 755
Saxonicus 8. 503
Schrollanus 8. 90, 755
Sternbergi 1. 740; 3. 510; 4. 378, 532, 627; 5. 638; 6. 99; 7. 692; 8. 587; 9. 374, 376
spiraeformis 1. 477
stigmolithus 8. 503
subtilis 7. 363
Thuringicus 6. 618
Tschihatscheffanus 1. 610; 2. 891; 8. 756
spp. 0. 632; 6. 60; 9. 557
Arbacia granulosa 7. 747
sp. 0. 101
Arbutus eocaenica 4. 379
Arca gen. 6. 873
acutangula 6. 873
aemula 4. 765; 6. 873, 874
aequivalvis 0. 155
alata 6. 874
Albertina 6. 874
anatina 6. 647
angulata 6. 874
antiqua 4. 748; 6. 875
antiquata 3. 81; 4. 748; 5. 594, 595; 6. 874
appendiculata 1. 716
Araucana 7. 404
Archiacana 2. 157, 168
Aspasia 6. 875
aspera 6. 874
aviculina 4. 546
barbata 6. 874
bicornis 6. 868
Arca bilobata 6. 874
Bonellii 3. 605
Breislacki 6. 873
Brongniarti 5. 475
Caillaudi 3. 605
canalis 7. 853
cancellata 6. 874
cardiiformis 3. 74
carinata 6. 873, 875^3; 7. 476*, 659; 9. 228
Chilensis 7. 404^2, 406!
clathrata 3. 74; 6. 874^2
Clymeniae 6. 256
concentrica 6. 875
concinna 2. 352; $6. 875^2$
congesta 7. 853
Conradi 6. 875
cordata 7. 492
costata 3. 126; 4. 749; 7. 637
Cottaldina 6. 873
cucullata 1. 486; 2. 230
cucullcaeformis 6. 873
decussata 6. 874
depressa 1. 486
didyma 6. 874
dilatata 6. 874
diluvii 3. 74; 4. 515; 5. 603; 6. 451, 716, 717, 873, 874^2; 8. 861; 9. 854
divisa 6. 874
Dufrenoyi 5. 592
Dumortieri 5. 592
Eastnori 6. 81, 649
edmondiaeformis 6. 120
elegans 1. 712; 4. 851
elongata 0. 871; 6. 874
errata 6. 874
Eudesi 4. 765
fibrosa 4. 250
Fichteli 6. 874; 9. 839
fimbriata 6. 874
Fischeri 6. 875
formosa 6. 875
formosissima 6. 875
fragilis 6. 872
funiculosa 1. 486; 2. 230
Gabrielis 6. 874
Genei 3. 605; 9. 844
gibbosa 6. 874
glabra 0. 292, 294, 727; 6. 875^3
globosa 8. 874
globulosa 4. 528
granulosa 3. 605
Gravesi 1. 101

Arca Griffithi 6. 874
Guerangeri 4. 870
Harpyia 6. 874
Hausmanni 0. 99
Hecate 6. 874
Helbingi 6. 874
Helecita 6. 875
hiantula 3. 369; 6. 93, 533, 739
Hibernica 6. 874
Janira 6. 875
Jason 6. 873, 874
impressa 3 307, 319
inaequivalvis 6. 857; 8. 357
inermis 6. 373
inornata 8. 496, 497; 9. 824
Keyserlingi 6. 875
Kilverti 4. 765
Kingana 3. 128; 4. 118, 748; 5. 875; 6. 874; 7. 637
Kurracheensis 6. 874
Lacordaireana 6. 874
lactanea 6. 874
lactea 2, 1004; 3. 756; 6. 874^2
laevis 6. 874
lata 1. 148; 2. 230; 6. 874
Ligeriensis 4. 840; 6. 206
lima 6. 874
lineata 6. 875
lineolata 6. 874
Loftusana 4. 748; 7. 637
longirostris 8. 488
Mailletana 2. 157, 168, 171
Martiniana 8. 302
Matheronana 4. 870; 6. 875; 7. 613
Melvillei 6. 874
Merope 1. 101
Michelini 6. 373
microdonta 7. 242
minuta 4. 765; 6. 874^3, 875
minutissima 6. 874, 875
Mississippiensis 6. 229
multiradiata 6. 874
mytiloides 2. 157, 168; 3. 74
Naranjaana 6. 500
Natalensis 7. 369
Noae 4. 717; 6. 874
Arca Nysti 6. 874
obliqua 6. 874
obliquata 6. 874
oblonga 4. 851; 6. 874
obscura 2. 157, 168
Orbignyana 3. 102; 4. 870
Oreliana 6. 373; 9. 847
ovata 1. 486; 2. 230
parvula 6. 874, 875
Passyana 6. 875
pectinata 5. 595; 6. 875
pectunculoides 2. 1004
pella 6. 872
Perezi 3. 605
permiana 6. 874
pernula 6. 872
pexata 6. 874
Philippsana 6. 875
Portlocki 6. 874
ponderosa 6. 874
Pratti 4. 765
primitiva 6. 120
pseudo-Noae 6. 874
pulchra 1. 486; 2. 230; 4. 765
pulla 6. 495; 7. 210; 8. 643
pusilla 6. 874
radiata 6. 874
reticulata 6. 874
Reussi 6. 874
Rouaultana 3. 102
rudis 4. 765; 6. 873
rudiuscula 2. 230
rugosa 4. 765
scapha 2. 43
scapulina 6. 874
Schmidi 9. 360
Schübleri 2. 765
semicostata 3. 319; 6. 874
semidentata 6. 874
semitorta 6. 874
Shumardi 7. 492
Sicula 6. 874
sienosa [?] 6. 874
simplex 3. 605
Smithi 6. 874
socialis 6. 363
squamosa 6. 874
striata 6. 120; 7. 223
striatula 2. 157, 168
subaequalis 6. 120
subaffinis 6. 874
subalata 6. 874
subangulata 6. 874
Arca subantiqua 6 875
subantiquata 6. 874
subclathrata 6. 874
subconcinna 6. 875
subdiluvii 3. 74
subglabra 6. 875
subhelbingi 6. 874
sublata 6. 874
sublineata 6. 875
sublineolata 6. 874
subovata 6. 875
subparvula 6. 874, 875
subradiata 6. 874
subrostrata 6. 874
subscapulina 3. 74; 6. 873, 874
subtetragona 0. 723
subtumida 6. 874
sulcicosta 6. 874
supracretacea 1. 101
Tarsensis 5. 595
tenuistria 6. 875
tenuitexta 4. 765
Terquemi 8. 643, 644!
tetragona 2. 1004; 3. 756; 5. 594, 595; 8. 484
tortuosa 6. 874
transversa 6. 874^2
triasina 0. 99; 3. 25; 6. 218, 363, 857, 875
trigona 6 874
trilineata 7. 853
trisulcata 1. 486; 2. 230; 6. 874
truncata 6. 874
tumida 3. 128, 772, 776, 777; 4. 118, 489, 748; 6. 874; 7. 637
Turonica 6. 873; 7. 204
Umzambaniensis 7. 369
ungula 6. 481
Vandenheckei 3. 605
Zerrenneri 4. 119
spp. 1. 253, 382; 2. 977; 6. 873; 7. 623
Arcella gen. 5. 750, 753, 755
globulus 0. 250
hyalina 0. 250
vulgaris 0. 249, 250
Archaea conica 5. 121
hyperoptica 5. 121
incompta 5. 121
laevigata 5. 121
paradoxa 5. 120, 121

Archaea sphynx 5. 121
Archaeacanthus
gen. 8. 509 !
quadrisulcatus 8. 509
Archaeocarabus
n. g. 0. 123
Bowerbanki 0. 123
Archaeocidaridae
fam. 1. 749 !
Archaeocidaris
gen. 7. 122; 9. 343
Nerei 6. 637; 7. 860
Verneuilana 4. 119, 745; 8. 766
vetusta 6. 115
Archaeomys
Arvernensis 5. 371
chinchilloides 5. 225, 371
Laurillardi 5. 225
Archaeonectes
pertusus 8. 205!
Archaeoniscus
Brodiei 1. 505
Edwardsi 5. 747
Archaeoides gen. 9. 862 !
longicostatus 9. 862
Archaeoteuthis
Dunensis 8. 55 !
Archaeotherium
gen. 5. 117!
Mortoni 5. 115, 117!; 8. 376, 876
robustum 5. 115, 117!; 8. 376
Archaias spirans 8. 241
Archegosaurus gen. 0. 103!, 754!; 4. 422!, 676; 5. 326*; 6. 330; 8. 239*!, 760*
Decheni 0. 103, 380; 3. 624; 4. 423, 431; 5. 328; 8. 239
latirostris 4. 423, 431; 5. 328; 8. 239
medius 0. 103; 8. 239
minor 0. 103, 104; 8. 239
Archelix spp. 8. 507
Zelli 6. 604
Archiaciana
sandalina 7. 852
Archimedes gen. 8. 616
of Lesueur 8. 616
-Kalkstein 7. 862; 8. 98, 628
Limestone 6. 735
Archimedipora gen. 8. 615
spp. 8. 616.
Archimediporen-Kalk 7. 342
Archiope
gen. 0. 244!; 3. 255!
Bronni 7. 116
Buchi 7. 116
cristellula 3. 255
cuneata 3. 255
Davidsoni 5. 239
decollata 3. 255
Forbesi 3. 255
cfr. Argiope
Architectonica acuta 6. 230
belle-striata 6. 230
Arcinella carinata 7. 507
Arcomya gen. 6. 248!; 7. 743
acuta 6. 248
brevis 3. 96
calceiformis 6. 248
elongata 6. 248
ensis 3. 96; 6. 248
gracilis 6. 249
Helvetica 6. 249
inaequivalvis 2. 943; 6. 249
lateralis 6. 248
tatissima 6. 248
oblonga 2. 230
sinistra 6. 248
Arcopagia corbis 3. 74
elegans 3. 605
excentrica 3. 605
medialis 7. 853
numismalis 7. 613
patellaris 3. 605
raristriata 3. 605
reticulata 7. 229
sinuata 3. 605
subrotunda 3. 605
spp. 6. 599, 752
Arctocephalus spp. 0. 125
Arctocyon primaevus 7. 490
Arctodon gen. 5. 115
spp. 8. 376
Arctomys alpinus 3. 378
antiquus 5. 371
Arvernensis 5. 224
bobac 6. 111
Fischeri 5. 371
Gastaldi 5. 371
Lecoq 5. 371
marmotta 1. 505
primigenius 2. 463; 3. 378; 5. 224, 371
superciliaris 5. 224
Arctopithecus gen. 4. 111
Arctopodium
gen. 6. 629!, 630
Arctopodium
insigne 6. 627; 5. 240
radiatum 5. 240
Arctos gen. 5. 229
Arcuaten-Kalk 6. 742
Ardeacites
mollassicus 6. 601
Ardisia Oceanica 4. 379
Areia 6. 224
Arenarie serpentinose 3. 483
Arenicola
baculipuncta 8. 621
carbonaria 7. 754!
didymon 7. 238
Arenicolites 7. 239
didymus 9. 105
sparsus 9. 106; 7. 239
spp. 9. 504
Arenig-Slates 6. 112
and porphyry 3. 97
Arethusa gen. (Barr.) 3. 487
Arethusina gen. 0. 780!, 785; 3. 487; 6. 224
Arfvedsonit 2. 712; 8. 684, 702!; 9. 803;
Arges gen. 3. 487
Anglicus 1. 255
bimucronatus 4. 501
phlyctanodes 3. 341
planospinosus. 4. 501
spp. 5. 248
Argentit 2. 531
Argillaceous Lias 0. 148
Argiles brulées 9. 872
de Dives 0. 164!, 183
de Honfleur 0. 185
écailleuses 8. 836
ostréennes 2. 512
plastiques 7. 503 p
Argille scagliose 7. 600
Argilophyr 6. 203
Argiope gen. 4. 62
Bronni 7. 482
cristellula 4. 507
cuneata 4. 504
decemcostata 4. 254, 504, 508; 7. 482
decollata 4. 60, 504, 254
detruncata 7. 604
liasina 5. 509
megatrema 7. 482
Perieri 5. 509
Suessi 5. 509
cfr. Archiope
Argoides gen. 7. 634
Argonauta gen. 4. 852
spp. 8. 584

Argozoum gen. 9. 867
disparidigitatum 9. 867
minimum 9. 867
pari-digitatum 9. 867
Redfieldanum 9. 867
Argovien 8. 726, 487!
Argyope cfr. Archiope
Arion gen. 3. 487
Arionellus gen. 0. 779!, 785; 3. 487; 6. 224
spp. 9. 504, 721
Arionides gen. 3. 487
Arionius gen. 7. 110!
servatus 1. 501; 2. 303; 6. 330, 331; 7. 110; 8. 61
Aridium (eines Metalls) 2. 69
Arieten-Kalk 8. 583
Aristerospira gen. 8. 632*
octarchaea 8. 632
Aristolochia gen. 9. 503
hastata 6. 505
Aesculapi 3. 504; 9. 503
dentata 6. 505
Oeningensis 9. 503
primaeva 2. 754
Arkansit 0. 453!, 0. 619?, 846!
Arktische Silur-Versteinerungen 4. 85
Arkose 0. 355; 4. 730; 9. 104
Armatus-Bett 6. 456
Arni 3. 124
Aroideae (fam.) 5. 639
Aroides crassispatha 2. 995
Aronites dubius 5. 639
Arrhaphidae fam. 4. 493
Arraphus spp. 1. 493; 6. 224
Arseniatischer Eisensinter 8. 693*
Arsenige Säure 0. 694!; 5. 692*
Arsenik 1. 587, 694; 2. 790; 3. 175; 9. 733, 9. 822
-Gehalt im Wasser 5. 445
Arsenikal-Kies 3. 818!; 6. 446
Arsenikblei-Erz 8. 316
-blüthe 0. 695
-eisen 7. 713!
-ocker 9. 822
-glas 0. 695
-kies 2. 76!, 532; 4. 345!; 5. 674!, 823; 7. 713!, 835; 9. 293!, 815!
Arsenik-kobalt 1. 707
-nickel 0. 70!; 8. 311; 9. 79*, 85
-saures Blei 1. 591!
-saures Nickel 6. 554!
-silber 1. 197; 3. 694!;
-zinn 2. 789
Arseniksulphüre 1. 597
Artamus radiatus 5. 123
Artemis gen. 6. 862
Basteroti 6. 862
discus 6. 753
elegans 6. 753
exoleta 4. 506; 6. 862
lentiformis 4. 506
lincta 2. 43; 3. 756; 4. 506; 6. 862
parva 6. 648, 862
Philippii 6. 862
sinuata 4. 506; 6. 862
spp. 6. 862 (cfr. Arthemis)
Arten-Leben 3. 381
-Abänderungen 4. 128
-Dauer der Organismen 5. 221; 9. 381
-Reichthum unserer Florula 9. 383
verschiedenen Formationen gemeinsam 4. 620
Artefakte 8. 742
-Breccie 7. 454; 9. 310
Artesische Brunnen 1. 470; 2. 352; 6. 585, 846
Arthemis Basteroti 3. 74
orbicularis 3. 74
cfr. Artemis
Arthraster Dixoni 3. 109
Arthrocanna
deliquescens 1. 610
Arthrolithis
constricta 6. 104
Arthropleura
armata 3. 161; 4. 500
Arthrophyeus gen. 5. 249!
Harlani 5. 249
spp. 5. 248
Arthrorhachis gen. 1. 510; 3. 488; 6. 116
Arthrotaxites
gen. 0. 632; 2. 990!
Baliostichus 6. 105
Frischmanni 6. 105
princeps 2. 990!
spp. 5. 613
Articulina gen. 5. 755; 7. 377
Articulina
angustissima 2. 255
compressa 3. 673!
concava 2. 255
concinua 2. 255
foeda 2. 255
Grinzingensis 2. 255
latidorsata 2. 255
lenticularis 2. 255
notata 2 255
pygmaea 2. 255
regularis 2. 255
signata 2. 255
striolata 2. 255
sulcata 3. 673!
suturalis 2. 255
tenuis 2. 255
Artiodactyla (trib.) 0. 867; 7. 868, 869
Artisia 0. 106
gen. 8. 871*
approximata 6. 98; 1. 609
distans 6. 98
transversa 1. 476; 5. 631, 6. 99
Artocarpidium cecropiaefolium 2. 628; 3. 120
Ephialtae 4. 877
integri olium 4. 378, 627; 9. 374
olmediaefolium 9. 374, 502
Artocarpus
Oeningensis 9. 502
Arundo anomala 5. 638
Goepperti 5. 638; 7. 636
protodonax 4. 252
Arvicola agrestis 6. 489
ambiguus 5. 371; 6. 489!; 7. 876
amphibius 6. 489
antiquus 5. 371
arvalis 2. 998; 5. 225
arvaloides 5. 371
brecciensis 5. 225
Bucklandi 5. 225
Delabrei 5. 371
dubius 5. 225
glareolus 6. 489
Joberti 5. 371
minimus 5. 225
pseudoglareolus 5. 371
riparius 6. 489
robustus 5. 371
spelaeus 5. 225
terrestris 5. 225; 6 489
spp. 2. 998; 6. 490; 9. 862

Arytaena
troguloides 5. 124
Asaphagus gen. 3. 487
Asaphinae fam. 1. 507!; 6. 116
Asaphus
gen. 0. 778!, 785; 1. 507!; 3. 487; 6. 224²
acuminatus 8. 594; 9. 121, 864
Brongniarti 3. 102; 4. 122
Buchi 7. 381
Canadensis 9. 489
caudatus 3. 341; 7. 380
Cawdori 4. 500
Cianus 6. 500
contractus 6. 500
cornigerus 1. 507; 6. 809
delphinus 9. 379
Derbyensis 1. 608
devexus 9. 121
dilatatus 7. 381; 9. 121
expansus 0. 373; 5. 852, 872; 6. 803; 7. 608; 8. 594, 632; 9. 121, 605, 608
gemmulifer 1. 608
glabratus 6. 500
Halli 9. 489
Hausmanni 3. 102
incertus 3. 102
Kowalewskii 9. 379
laciniatus 5. 852; 9. 121
laeviceps 6. 625
latisegmentatus 9. 121
lepidurus 9. 864
longicaudatus 7. 380
micrurus 3. 341
nobilis 6. 500
obscurus 9. 121
obsoletus 1. 609
platycephalus 9. 121
pleuroptyx 3. 341
Powisi 4. 501
raniceps 9. 121
subcaudatus 4. 500
subtyrannus 6 370
truncatus 9. 864
tuberculato-caudatus 7. 380
tuberculatus 1. 255; 4. 501
tyrannus 7. 380²; 9. 121
Vulcani 9. 121
Zinkeni 6. 625; 8. 753
spp. 4. 493
Asbest 2. 525, 879; 3. 68!; 5. 194; 9. 815
Ascalaphus proavus 9. 115
Ascoceras gen. 4. 3* ff.; 5. 257!, 320; 6. 316*; 9. 507
Barrandei 7. 253
Bohemicum 5. 257, 284!
Buchi 5. 257, 284!
spp. 4. 3
Asche, vulkanische 3. 463!; 7. 433!
Asellus major 5. 622
minor 5. 622
Ashburnham-Schichten 7. 100
Asimina
Meneghinii 9. 872, 873
Asinus primigenius 1. 502
Aspasiolith 2 522; 9. 567
Aspergillum
Leognanum 6. 857
Asphalt 0. 60!; 5. 200; 5. 824; 6. 84; 7. 607; 8. 549
Aspidiaria gen. 0. 257
confluens 0. 264
cristata 0. 265
imbricata 0. 265
Menardi 0. 265
oculata 5. 631
Steinbecki 0. 265
Suckowana 5. 631
undulata 5. 631, 712, 868; 8. 402
Aspidiscus gen. 0. 758!, 760; 2. 117*
cristatus 0. 760
Shawi 0. 760
Aspidites acutus 6. 97
bifurcatus 6. 98
bullatus 8. 358
macilentus 5. 629
Schübleri 8. 140
Silesiacus 5. 630
taeniopteris 6. 253
Aspidium 0. 628
Brauni 3. 502
elongatum 3. 502; 5. 637
Escheri 3. 502; 5. 637
filix-antiqua 0. 502; 5. 637
Lethaeum 1. 634; 3. 762
Lyelli 6. 244; 9. 253
Meyeri 5. 637
Aspidocrinus gen. 9. 236!
spp. 9. 236
Aspidosoma
Arnoldi 1. 380; 2. 452, 924, 937; 6. 233
Aspidospira gen. 5. 755
sp. 6. 609
Aspidorhynchi, fam. 9. 766
Aspidorhynchus
gen. 3. 117, 118*
Fischeri 5. 870
Genevensis 9. 372
spp. 4. 382; 8. 382; 9. 764
Aspidura Ludeni 3. 26
Aspius gracilis 5. 622
Asplenioptteris
difformis 2. 750
Nilssoni 8. 139
Schranki 2. 750; 3. 504; 9. 503
Asplenites 0. 627
alethopteroides 6. 98
allosuroides 9. 374
angustissimus 6. 98
elegans 3. 121
fastigiatus 6. 98
lindsaeoides 6. 98
longifolius 6. 98
nodosus 5. 630
ophiodermaticus 5. 630
Radnicensis 6. 98
Reussi 3. 121
similis 6. 98
tenuifolius 5. 630
Trevirani 0. 117
spp. 9. 379, 380
Asplenium
Bunburyanum 6. 244
difforme 2. 750
lignitum 6. 505
marinum 6. 244
Assilina gen. 5. 755
Asiminea Grayana 7. 509
Astacus Leachi 4. 625!
longimanus 0. 123
Mandelslohi 0. 167
modestiformis 5. 614
ornatus 0. 124
papyraceus 3. 164!
rostratus 0. 125
Astarte gen. 6. 868
acutimargo 6. 732
aliena 6. 863
alta 6. 868
Amalthei 6. 744
angulata 4. 505; 6. 869; 7. 743
antiquata 4. 505; 6. 861

Astarte Antoni 6. 363, 365
arctica 6. 869
Arduennensis 6. 869
arealis 6. 456
Basteroti 4. 505
Beaumonti 6. 869
bipartita 4. 505
borealis 1. 483, 505; 6. 869
Bosqueti 9 125
Bronni 1. 384
Buchana 6. 869
bullata 2. 230
Burtini 4. 506
Capensis 1. 384
carinata 0. 723
castanea 6. 869
cincta 6. 868
cingulata 6. 495; 7. 210
complanata 3. 530; 8. 357, 873
compressa 4. 505; 6. 868, 869
concentrica 2. 359; 6. 869
Conradi 6. 869
consobrina 4. 851; 7. 210
crebricostata 4. 506
crebrilyrata 4. 505
crenulata 6. 821
cuneata 0. 174; 5. 848; 6. 869²; 8. 488
cyprinoides 4. 505; 6. 869²
Danmonensis 4. 505; 6. 869
Darwini 6. 868
depressa 0. 160; 6. 852; 7. 743
detrita 6. 869
digitaria 4. 506
Duboisana 6. 869
elegans 2. 348, 349; 6. 868, 869; 7. 743
elliptica 4. 505; 6. 869
exarata 6. 868
excavata 6. 871; 2. 230; 4. 370, 621; 6. 852, 868; 7. 743; 8. 357
excentrica 7. 743
excurrens 4. 506
Fischeri 6. 869
formosa 1. 744
Galeottii 4. 505
Garensis 1. 483
Geinitzi 3. 772
gigantea 6. 869
Astarte gracilis 4. 505
Grateloupi 6. 869
gregaria 4. 354; 7. 492; 8. 495
Gueuxi 8. 643
Herzogi 1. 384
imbricata 4. 506
incerta 4. 506
incrassata 4. 505
integra 6. 868, 869
interlineata 7. 743
irregularis 6. 495; 7. 210
Koninckі 6. 869
laevigata 4. 505; 6. 869
lamellosa 6. 869
laticostata 6. 869
lineata 8. 488
lineolata 0. 102
longa 1. 764; 7. 229
longirostris 1. 412!, 419
lurida 6. 869
lyrata 4. 505; 8. 357
macrodonta 6. 869
minima 0. 173, 184; 4. 354; 6. 868, 869; 7. 743²
modiolaris 6. 868; 8. 357
Montagui 6. 869
multicostata 6. 869
mutabilis 4. 505
Neptuni 6. 868
nitida 4. 505
nitidula 4. 505
numismalis 6. 869
nummulina 3. 348, 581
obliqua 0. 160; 6. 868
obliquata 4. 506
oblonga 4. 505
obsoleta 6. 868
Omaliusi 4. 505
Oppeli 8. 643, 644!
orbicularis 1. 486; 7. 743
ovalis 4. 505; 6. 861
ovata 6. 869²
parva 4. 506
parvula 4. 505
pisiformis 4. 506
plana 4. 505, 506; 6. 869²
planata 1. 741; 4. 505; 6. 868
planissima 6. 869
porrecta 6. 869
propinqua 4. 505
pseudolaevis 6. 869
pulla 3. 581; 5. 848; 7. 133, 743
Astarte
pulchella 8. 874
pumila 7. 743
pusilla 8. 643, 644!
pygmaea 4. 506
quadrata 2. 230; 6. 648; 8. 874
recondita 7. 743
Reussi 6. 869
rhomboidalis 6. 868; 7. 743
Roemeri 6. 869
rotunda 6. 869; 7. 743
rotundata 4. 766; 6. 863
rugosa 6. 869; 8. 488
rugulosa 8. 357
scalaria 6. 869
scalaris 6. 869
scitula 7. 492
Scotica 6. 869
semisulcata 4. 505; 6. 869
socialis 6. 869
squamula 7. 743
striata 6. 869²
strato-costata 1. 358; 6. 869
subclathrata 4. 355
subcostata 6. 869
subtetragona 4. 851; 6. 852
subtrigona 4. 505
Suessi 8. 643
sulcata 4. 505; 6. 869²
sulcato-striata 1. 486
supracorallina 6. 869; 8. 488
suprajurensis 5. 848; 6. 869
terminalis 6. 869;
Thomasi 6. 480
transversa 6. 869, 871
triangularis 4. 505
trigona 6. 869
trigonalis 6. 868
truncata 6. 869
Tunstallensis 4. 749
undata 8. 484
Vallisnieriana 3. 126; 4. 119, 749; 7. 637
Veneris 0. 227; 6. 869
Voltzi 0. 225; 6. 852, 868; 9. 29
Wiltoni 7. 743
Withami 1. 483; 6. 869
spp. 1. 382; 2. 977; 6. 865; 7. 623

Astarten-Kalk 3. 771!, 773; 7. 469
-Zone 4. 353
Astartien 4. 353!, 360
Astartila gen. 1. 382!
spp. 1. 382, 383
Asteracanthion
rubens 4. 762
Asteracanthus
granulosus 5. 870; 8. 383; 9. 373
ornatissimus 5. 234, 849
semiverrucosus 5. 870
verrucosus 5. 870
Asteriacites
patellaris 2. 148
Asteriadae (ordo) 7. 120, 746; 8. 126; 9. 636
Asterias Adriatica 9. 365
antiqua 0. 376
Dunkeri 0. 292
jurensis 0. 225; 8. 486
laevis 3. 73; 9. 365
lumbricalis 6. 454; 8. 551, 643
poritoides 9. 365
primaeva 8. 126
quinqueloba 2. 462
Rhenana 6. 233
rubens 4. 762
scutata 6. 637
Tennesseae 0. 376
spp. 2. 937
Asterien-Kalk 3. 73
Asterigerina
gen. 5. 755; 7. 377
planorbis 7. 280!, 309, 498
Asterocarpus 0. 628
mertensioides 5. 630
microcarpus 5. 630
multiradiatus 5. 630
Sternbergi 5. 630; 8. 159
truncatus 1. 477
Asterochlaena 0. 628
angulata 1. 115
Cottai 1. 115
Schemniciensis 1. 115
Asterocrinites 2. 747
Asterodermus platypterus 6. 419, 487, 825
spp. 9. 764
Asterolepis gen. 2. 383; 3. 228; 8. 249!, 251[2]; 9. 491[2]
concatenatus 8. 252
Asterolepis
Hoeninghausi 4. 581; 6. 610
ornata 8. 508
Asterolithus 5. 505
Asteromphalus
Brookei 7. 111
Asterophyllit 6. 42!
Asterophylliteae
fam. 9. 380!
Asterophyllites 0. 627
anthracinus 0. 674
Artisi 5. 629
Brardi 6. 97
charaeformis 6. 97
comosus 6. 97
coronatus 5. 240; 6. 626
delicatulus 6. 97
diffusus 6. 97
dubius 5. 628; 6. 97
elegans 2. 890; 6. 97; 9. 131
equisetiformis 0. 120; 1. 476; 5. 97, 5. 628[2]; 6. 97[2]; 8. 201, 400; 9. 149
fertilis 1. 609
foliosus 5. 629
galioides 6. 97
grandis 5. 243, 628
Hausmannanus 2. 890
jubatus 5. 629
Lindleyanus 5. 628
longifolius 5. 629; 6. 97
ovalis 9. 849
radiatus 5. 629; 6. 97
rigidus 1. 609; 5. 628[2]; 6. 97; 8. 400
Roemeri 2. 890
pygmaeus 2. 890
spicatus 8. 503
tenuifolius 6. 97
tuberculatus 5. 629[2]; 6. 97
spp. 8. 625; 9. 379, 380
Asteroptychius ornatus 6. 122
semiornatus 6. 122
Asteropyge
gen. 3. 487; 7. 122
Astraea
gen. 0. 763!; 2. 118*
affinis 7. 233
agaricites 0. 765
alveolata 0. 170
ambigua 0. 766
Ameliana 3. 876
Astraea
ananas 1. 225; 6. 375
aranea 0. 765
Argus 0. 763, 764; 7. 233
astroides 6. 93[2]
astroites 0. 764; 7. 233
Auvertiaca 2. 251
Baudouini 3. 606
bellula 3. 876
Bertrandiana 0. 765
bistellata 7. 233
brevissima 0. 767; 7. 233
Burdigalensis 0. 764
Burgundiae 0. 764
Cadomensis 0. 766
calycularis 3. 876
Calypso 1. 102
carbonaria 6. 114
caryophylloides 0. 767 8. 873
Castellinii 7. 233
cellulosa 2. 855
cincta 2. 108
compressa 7. 233
concinna 0. 766
confluens 0. 765
conica 0. 765
coniformis 0. 765
continua 8. 873
corollaris 4. 868
coronata 4. 868
crenulata 0. 765
cribraria 0. 764
crispa 3. 876
cristata 0. 766; 8. 873
cylindrica 7. 233
decipiens 0. 765
deformis 0. 765
Defranceana 0. 766
Defrancei 0 763; 7. 502
Delcrosana 0. 764
dendroidea 0. 766
deserta 7. 233
Desportesana 6. 821
diversiformis 0. 765
Doublieri 0. 756
Ellisana 0. 764; 5. 595, 5. 844; 7. 502, 773
erinacea 7. 233
escharoides 0. 766
explanata 0. 765; 8. 873
exsculpta 4. 868
Firmasana 0. 765
flexuosa 0. 766
formosissima 0. 765
funesta 7. 233
Genevensis 0. 766

Astraea
geometrica 0. 766
Goldfussi 0. 766
gracilis 0. 766; 1. 413
grandistella 7. 502
granulata 1. 412, 419
Guettardi 0. 764; 3. 74; 6. 740; 7. 502, 773
Hebertana 1. 102
helianthoides 0. 170, 765
Hennahi 2. 341
hirto-lamellata 0. 767
incrustans 3. 876
nigens 7. 233
intersepta 0. 765
interstincta 0. 763
irregularis 0. 765
lamellosissima 0. 765
lamello-striata 0. 766
Lamourouxi 0. 766; 1. 412
lepida 4. 868
Leunisi 0. 765
Lifolana 0. 764
limbosa 2. 348
limitata 0. 765
lobato-rotundata 6. 93
maeandrites 0. 767
media 0. 765
Micchelottiana 7. 233
miocaena 7. 233
micrantha 0. 766
micraxona 0. 765
microphyllia 1. 102
Montecchiana 7. 233
Montevialensis 7. 233
Moravica 0. 764
multilateralis 0. 767
muricata 3. 876
nobilis 0. 764
oculata 0. 765
palmata 7. 233
pediculata 4. 744
pentagonalis 1. 412, 419; 2. 348; 3. 318
perforata 0. 764
piana 0. 763
plana 0. 764
polygonalis 0 765; 7. 233; 8. 873
porosa 6. 375; 7. 233, 386; 8. 263
Prevostana 0. 764
profunda 7. 233
pseudo-maeandrina 0. 766
pulchella 7. 233
puritana 7. 233
Astraea putealis 0. 764
quincuncialis 0. 764
radiata 7. 233
ramosa 0. 767
raristella 2. 251
reticularis 0. 765
Raulini 0. 764
regularis 0. 764
Requieni 0. 766
reticulum 5. 865
Reussana 0. 764; 5. 595
Rocchettina 0. 764; 6. 93; 7. 233
rosacea 0. 767
rotata 0. 766
rotundata 7 233; 8. 587
rudis 9. 844
rustica 0. 764
septem-digitata 7. 233
sexradiata 2. 252
Simonyi 4. 868
sphaeroidalis 2. 251
striata 0. 768
stylinoides 0. 764
subdenticulata 7. 233
sulcato-lamellosa 0. 764
superposita 0. 766
Teissierana 0. 766
tessellata . 0. 766
textilis 0. 766
tuberosa 7. 233
tubulifera 0. 170
tubulosa 8. 873
Turonensis 0. 764
Vallis-clausae 0. 756
varians 0. 764, 766
variolaris 0. 768
velamentosa 0. 766
vesiculosa 0. 764
vesparia 0. 764
Websteri 3. 876
Astraeidae fam. 6. 114
fossiles 0. 756, 757
Astraeomorpha gen. 4. 871!
crassisepta 4. 868
Goldfussi 4. 868
Astraeopora 2. 119*
vetusta 3. 876
Astrangia
gen. 0. 767!; 2. 118*
Astrocerium gen. 1. 766!
constrictum 1. 766
parasiticum 1. 766
pyriforme 1. 766
venustum 1. 766
spp. 5. 248
Astrocladium 0. 626
Astrocoenia 2. 117*
Caillaudi 3. 606; 7. 230
contorta 5. 475
decaphylla 3. 718; 4. 867
formosissima 4. 867
magnifica 4. 867
numisma 3. 606
Quadalupae 0. 101
ramosa 3 582; 4. 867
reticulata 3. 582; 4. 867
triangularis 8. 591
tuberculata 4. 867
spp. 1. 627
Astrocrinites gen. 2. 745, 747!; 9. 236*
tetragonus 2. 747
Astrodaspis gen. 7. 853!
Antiselli 7. 853
Astrohelia 2. 116*; 249!, 250
Lesueuri 2. 250.
palmata 2. 250
Vasconiensis 2. 250
Astroides gen. 0. 763!, 765; 2, 119*
Astroite circulaire 0. 765
Astroites 2. 119*
Astropecten
armatus 4. 762; 7. 746
Colei 4. 762; 9 365
crispatus 4. 762; 7. 746; 9. 365
Forbesi 9. 365
Hastingsiae 7. 746
Phillipsi 7. 746
verrucosus 9. 365
Astropetrologie 2. 616
Astropodium
multijugum 6. 602
Astroria gen. 0. 761!, 762; 2. 117*
Astyages 6. 224
Astylocrinitae 0. 377
Atactoxylum Linki 2. 753
Atagma, Bryoz. gen. 3. 109
Atakamit 3. 452!; 5. 839!
Ateleocystites gen. 9. 636
Huxleyi 9. 636
Atelodii 0. 867
Atelodus elatus 5. 372
leptorhinus 5. 372
Atlantisches Wasser 6. 697
Athera exilis 5. 124
Atheriastit 1. 705!; 4. 440
Athleta-Bett 8. 484
Athyris gen. et spp. 4. 62; 6 117

Athyris Herculea 4. 504
hirsuta 7. 863
nucella 8. 753
prisca 8. 753
Roissyi 5. 856
Roysi 5. 735
scalprum 4. 504
tumida 4. 60, 504; 6. 117
Atmosphärische
Agentien bei der
Mineral-Bildung 6. 725
Ausnagung 7. 82
Leben 0. 248
Luft 4. 817!
Atoll 4. 223; 4. 460
Atom-Volumen 4. 77
Wärme 7. 176!
Atoposaurus Jourdani
0. 198; 5. 233, 744
Oberndorferi 0. 199
Atops 0. 100!, 105!
trilineatus 0. 100, 105
Atractopyge
gen. 1. 509; 6. 116
Atrypa canaliculata 8. 269
congesta 8. 855
curvata 6. 508
galeata 1. 225
hemisphaerica 3. 344;
8. 855; 9. 339
implexa 6. 374
indentata 6. 508
lenticularis 6. 225
marginalis 4. 504
marginiplicata 8. 753
micula 6. 225
naviformis 8. 855²
obovata 6. 508
pectinifera 4. 747; 7. 637
phoca 9. 222²
plebeja 6. 508
plicatula 8. 855
primipilaris 6. 374; 9. 222
prisca 0. 228
prunum 4. 504
reticularis 3. 344; 4. 60,
86, 504, 6. 797;
7. 387; 8. 268;
753, 855; 9. 222
rotundata 8. 753
socialis 8. 753
tumida 6. 798
Wilsoni 0. 225
spp. 5. 252; 9. 504
Attus gen. 5. 120
argutus 5. 123
felinus 5. 123
Attus griseus 5. 123
latifrons 5. 123
pumilus 5. 123
Aturia gen. 4. 853; 6. 126
ziczac 4. 854
Aturidae fam. 8. 617!
Aucella Caucasica 1. 744
Fischerana 0. 226
gryphaeoides 4. 202
speluncaria 6. 119
Auchenaspis
gen. 8. 624!; 9. 491
Salteri 8. 624, 625
Auchenia gen. 7. 869
Auerbachit 9. 189!; 9. 736
Auerochs-
Antilope 5. 226, 227
Aufeinanderfolge, geolog.,
der Eruptivgesteine 4. 301
der Fische 8 381; 9. 381
der Mineral-Bildungen
8. 399
der Mollusken 6. 641
der Organismen 4. 606;
4. 768; 7. 221
der Pflanzen-Formen
2. 504!, 505!, 601
Augensteine 5. 505
Augit 0. 3, 70*; 1. 399*,
447!, 557, 658,
695; 2. 78*, 318!,
521, 851!, 877;
3. 258, 609, 696,
837; 4. 71, 181;
5. 444!, 565*, 569*,
573!, 6. 268, 563*,
687; 7. 440; 8. 683!,
826!; 9. 297*
(künstlich) 3. 641!
-Familie 8. 699
-Fels 7. 737*
-Gestein 4. 302!; 6. 82
-Krystalle künstlich er-
zeugt 5. 130
-Laven 7. 357*, 361!;
-Porphyr 2. 716; 4. 833;
9. 657, 664
-Spathe 7. 441
Aulacodiscus crux 6. 103
Aulacodus gen. 8. 113
obliquus 8. 113
Temmincki 4. 864
Aulacopleura gen. 3. 487
Aulacopleuridae fam. 4. 493
Aulacophyllum 2. 121*
Elhuyari 2. 340
spp. 7. 104
Aulacophycus sulcatus 9. 63
Aulacopodia gen. 5. 128!
Riemsdycki 5. 127
Aularthrophyton sp. 7. 776
Aulaxodon
gen. 5. 113; 6. 240
Aulocopium
aurantium 1. 757
Aulodus, gen. pisc. 3. 109
Aulonotreta 0. 369, 373
polita 0. 370, 373
sculpta 0. 373
Aulophyllia
astraeoides 3. 718
Aulophyllum 2. 122*
spp. 2. 990
Aulopora 2. 121*
Bouchardi 5. 634
campanulata 7. 374
compressa 1. 414, 419;
5. 634
dichotoma 5. 633
intermedia 5. 634
ramosa 8. 873
repens 6. 375
serpens 2. 192, 341;
6. 375; 9. 847
striata 8. 754
tubaeformis 5. 384
Voigtana 4. 744; 8. 745*
spp. 4 115
Aulopsammia gen. 4. 872!
Murchisonia 3. 582;
4. 868
Aulosteges
gen. et spp. 6. 118
umbonillatus 7. 381, 382
variabilis 3. 636; 4. 504;
7. 382
Wangenheimi 4. 61, 504
spp. 8. 727
Auricula
Alsatica 1. 122*; 8. 589
decurtata 3. 634
protensa 1. 122*; 8. 589
Sedgwicki 0. 722
Auripigment 0. 694!;
5. 824; 7. 549
Ausbreitungs-Weise der
Pflanzen auf der Erd-
oberfläche 8. 877
Ausbruch-Erscheinungen
7. 353; 8. 736, 840
-Gesteine 0. 310; 4. 217;
5. 205; 8. 83, 332,
338, 473, 605, 651,
9. 468, 469

Ausbrüche 7. 701; 8. 101; 9. 213, 229, 314, 323, 633
des Hekla 5. 578
des Vesuvs 1. 465, 603 7. 590
eines Schlamm-Vulkans 5. 460; 6. 715
hydroplutonische 7. 604
plutonischer Gesteine 2. 966
vulkanische 4. 96; 6. 199; 9. 857
von Gruben-Gasen 5. 731
Ausdehnung
durch Krystallisation 2. 781 !
Ausnagung
der Gesteine 7. 82
Äussere Temperatur
der Erde 7. 188
Ausströmungen
von Gasen 1. 865
Australische Vögel und Säugthiere:
niedrig organisirt 0. 639
Austrella sp. 1. 382
Auswaschungen 1. 293 !; 6. 668
Auswurfs-Kratere 2. 497
Auswürflinge 2. 574
vulkanische 3. 254
Automolit 2. 69
Avellana
Archiacana 0. 293
cingulata 4. 869
decurtata 3. 634; 4. 874
subglobosa 7. 492
subincrassata 3. 329
Avicula Abichi 1. 358
acuta 1. 655
aequiradiata 4. 555
Albertiana 3. 103
Albertii 0. 99; 1. 649, 655; 2. 912, 917; 3. 11, 24, 223; 4. 840; 6. 245, 818; 7. 615; 9. 383, 477
Alfredi 6. 495; 7 210
alternans 2. 285; 3. 319
antiqua 4. 748; 8. 502; 9. 847
Aptiensis 1. 738; 7. 652*, 659
aspera 7. 694!
Austeni 6. 256
Avicula
Bartoniensis 1. 715
Bavarica 4. 545 !
bifida 6. 373
Binneyi 4. 748
bipartita 6. 218
Braamburyensis 7. 743
Bronni 0. 99, 485; 1. 647; 2. 912 ff.; 3. 11, 24, 29; 6. 363
Buvignieri 6. 495
Cenomanensis 6. 206
ceratophaga 4. 748
circulus 6. 736
clathrata 6. 373
complicata 1. 486; 2. 229; 8. 357
concinna 5. 501
contorta 7. 93, 94; 8. 352, 353; 9. 12—19, 452! g. ff., 628, 852
contracta 7. 760
convexo-plana 0. 101
Cooperensis 6. 736
Cornuelana 0. 393, 415; 5 160; 7. 659
costata 0. 163, 722; 4. 205, 765; 6. 71; 7. 760; 8 482
crenata-lamellosa 6. 373; 8. 745
crispata 1. 655; 7. 760
cygnipes 0. 148
Danbyi 6. 119
Damnoniensis 1. 225; 3. 817; 6. 500, 606
decussata 8. 873
Deshayesi 6. 495
discors 4. 748
dispar 6. 373
Duclosana 3. 103
Dunkeri 6. 495; 9. 455 ff.
echinata 0. 722; 4. 765, 851; 7. 132, 133; 8. 357, 482, 583²; 9. 134
elegans 6. 852; 7. 130; 9. 31
Escheri 4. 204, 555, 830, 835; 5 219; 6. 218²; 7. 94, 617²; 9. 12, 629
exarata 3. 813
expansa 8. 486; 0. 723
fasciculata 6. 500; 7. 220
Avicula
fibrosa 7. 492; 8. 495
Fischerana 0 226
fissicosta 4. 869
flabella 6. 373
flexuosa 7. 220
Gastaldiana 3. 103
genuina 7. 760
gibbosa 6. 625
globulus 7. 760
gryphaeata 1. 141; 2. 285!; 3. 167, 191, 309; 8. 766
gryphaeoides 0. 292; 1. 314, 415, 419; 3. 126, 495; 4. 202, 747; 6. 818; 7. 476* ff., 659, 660, 785
Haydeni 7. 864
Ibergensis 6. 256
impressa 5. 875
inaequiradiata 1. 141; 2. 284, 288; 3. 309, 312, 319; 7. 94, 617; 9. 12, 629
inaequivalvis 2. 349; 3. 306, 312, 319, 581; 4 205, 544, 621; 6. 71, 217, 744; 8. 226, 375, 484; 9. 629
inflata 4. 748; 6 373; 7. 637
intermedia 5. 219; 9. 629
Kazanensis 3. 128, 772, 776, 777, 783; 4. 118, 747, 489; 5. 875; 7. 637
Kurri 6. 454
laevigata 7. 760
laevis 6 500
lamellosa 7. 220
laripes 8. 874
Lejeanana 3. 103
lepida 2. 279; 6. 373
leptotus 6. 373, 626
Leplayei 6. 500
lineata 1. 656!; 5. 501; 7. 760; 9. 847
Lithuana 8. 874
Luganensis 8. 383
macroptera 0. 393, 415; 7 659, 672
modiolaeformis 7. 760
modiolaris 5. 848

Avicula
Moutonana 2. 156, 168
Münsteri 7. 743
Neptuni 2. 931; 6. 500
obrotundata 6. 373
orbicula 9. 827
orbicularis 6. 119
orbiculus 9. 506
ovata 1. 486; 2. 229; 4. 765
Paillettei 6. 500
pectiniformis 5. 501; 6. 214
pectita 7. 659
Pedernalis 0. 101
phalaenacea 3. 74; 9. 839
pinnaeformis 8. 374
planiuscula 0. 101
polyodon 4. 765
Poseidonis 6. 256
pygmaea 4. 765
radiata 3. 307
raricosta 4. 869
rectilatera 9. 848
reticulata 2. 107; 6. 372; 7. 220
retroflexa 6. 81, 797; 8. 704²; 9. 66
rugosa 3. 313; 6. 373
salinaria 5. 500, 501
salvata 5. 479, 480
Schafhäutli 7. 617
Schultzi 6. 500
Scythica 1. 609
semiradiata 0. 731
sexcostata 6. 456
simulata 9. 228
Sinemuriensis 4. 851
socialis 0 99, 485; 1. 642; 2. 909, 912; 6. 64, 363; 7. 594
speciosa 4. 204, 555; 6. 218; 7. 614; 9. 476, 629
speluncaria 3. 126, 128, 776, 777; 4. 118, 747, 489; 7. 223, 374; 8. 844
Avicula
Studeri 2. 40, 43; 4. 658
subarcuata 2. 156, 168, 171
subcostata 1. 650; 2. 288
subcrinita 6. 500
subglobosa 8. 494
subretroflexa 9. 847
substriata 0. 180; 4. 851; 6. 850; 7. 760
Tarentina 2. 1004
tegulata 4. 765; 7. 132
tenuicostata 8. 496², 497, 874; 9. 824
texturata 6. 119, 373
triloba 0. 294
triplistriata 9. 506
undulata 3. 307
Venetiana 0. 732; 4. 544; 6. 737; 7. 615
Wurmi 6. 373
Zeuschneri 0. 732; 9. 359
spp. 1. 253, 382; 4. 249; 5. 252
Avicula-Kalk (des Muschelkalks) 3. 11, 24
Aviculopecten
gen. 2. 239 !
caelatus 6. 119
cancellatus 6. 119
concavus 6. 119
concentrice-striatus 6. 119
conoideus 6 119
docens 6. 119
elongatus 6. 125
granosus 6. 119²
illegalis 6. 119
incrassatus 6. 119
intercostatus 6. 125
interstitialis 6. 119
mactatus 6. 119
papyraceus 6. 119
pectinoides 6. 119
pera 6. 119
plano-radiatus 3. 238; 6. 119
Aviculopecten
Ruthveni 3. 238; 6. 119
segregatus 6. 119
sublobatus 6. 125
transversus 6. 119
Axinaea
Barbadensis 7. 853
filosa 9. 234
Axinit 9. 289*
Axinura 2. 122
Axinus
angulatus 1. 741; 6. 863
dubius 7. 637
elongatus 7. 637
obliquus 6. 652
obscurus 3. 126*; 4. 749; 6. 651; 7. 637²
parallelus 4. 749
parvus 4. 749; 7. 637
productus 7. 637
pusillus 4. 749; 7. 637
rotundatus 6. 651; 7. 637
rotundus 4. 749
Schlotheimi 4. 749; 6. 643
undatus 4. 749; 7. 637
unicarinatus 5. 435
spp. 9. 125
Axis gen. spp. foss. 5. 227
Axogaster
gen. Anthoz. 3. 109
Axohelia 2. 116*, 249 !, 250
Axophyllia 2. 117*
Axophyllum 2. 122*
spp. 2. 990
Axopora 2. 120
Axosmilia 2. 116*
Wrighti 8. 357
spp. 2. 758
Aymestry-Limestone 6. 112
Azalea 0. 634
minuta 3. 227
spp. 3. 747
Azoisches Gebirge 1. 104; 3. 622; 4. 829; 6. 223; 9. 101
Azoische Gesteine 9. 825

B.

Babingtonit 6. 40; 8. 684, 702 !
Babylon-Quarz 8. 310 !
Baccites 0. 631
cacaoides 2. 995
rugosus 2. 995
Backofen-Stein 0. 790
Bacteridium spp. 3. 168
Bactridium gen. 4. 114, 115 !
Hagenowi 4. 115
Bactrites gen. 6. 316
Bactrites carinatus 6. 371
compressus 6. 256
gracilis 6. 371
subconicus 6. 371
spp. 1. 225; 2. 268; 6. 209

Bactryllium gen. 4. 203!
canaliculatum 4. 203, 204
deplanatum 4. 203, 204
giganteum 4. 203
Meriani 4. 203, 204
Schmidi 4. 203, 204
striolatum 4. 203, 204; 6. 218
Baculina
gen. 6. 316*; 8. 617
Baculites
gen. 4. 853; 6. 316*
acuarius 8. 484
anceps 0. 102; 1. 730; 2. 961; 3. 314; 4. 539, 557; 6. 80
annulatus 6. 480
asper 0. 102; 7. 458
baculoides 7. 785
compressus 7. 864; 8. 494
Faujasi 0. 293, 296; 1. 101; 2. 512
grandis 7. 864; 8. 494
incurvatus 3. 314
ovatus 7. 864; 8. 360, 494
Spillmani 9. 498
sulcatus 7. 369
Tippahensis 9. 498
vertebralis 7. 595
Bäder 9. 129
Baetis anomala 6. 621
gigantea 6. 621
grossa 6. 621
longipes 6. 621
Bagrationit 0. 449!
Bagshot beds 2. 882
sands 7. 503; 9. 228
Bajera 0. 630
Scanica 2. 995
Huttoni 0. 112
Baierine 0. 618!
Baierit 3. 367!
Bajocien 4. 32, 850; 8. 583, 725; 9. 94
Bairdia gen. 1. 510; 3 101!; 5. 110!; 7. 505
acuminata 4. 869
acuta 4. 745
ampla 4. 489, 490
angulosa 8. 412!, 441
angusta 4. 869; 5. 111
arcuata 3. 99, 676!; 5. 126; 7. 498; 8. 405!, 441; 9. 494
attenuata 4. 869
Berniciensis 9. 761
Bairdia
calcarea 9. 360
contracta 7. 504;
cribrosa 8. 411!, 441
crista-galli 8. 408! 441
curta 4. 745; 6. 504; 9. 761
curvata 3. 99; 7. 498
cylindracea 6. 757
dactylus 8. 406!, 441
exilis 8. 409!, 441
faba 9. 494
foveolata 3. 99
frumentum 4. 489!, 490
Geinitzana 4. 489, 490, 745; 6. 504
glutaea 8. 407!, 441
gracilis 4. 489, 490; 6. 504; 9 761
gyrata 8. 410!, 441
Hagenowi 7. 498
Harrisana 5. 111, 126
Hebertana 3. 99
Jonesana 9. 761
Kingi 4. 489, 490, 9. 761
laevissima 6. 757
linearis 3. 99
lithodomoides 3. 99
lucida 8. 407!, 441
marginata 3. 99
mucronata 4. 489, 400; 6. 504; 9. 761
mytiloides 7. 498
neglecta 8. 405!, 441
oblonga 4. 869
perforata 3. 99
pernoides 6. 757
pirus 8. 622
plebeja 4. 490; 9. 761
procera 8. 622
punctatella 3. 99
pusilla 8. 408!, 441
reniformis 9. 761
Reussana 9. 761
rhomboidea 9. 761
Schaurothana 9. 761
semipunctata 6. 757
seminotata 7. 498
silicula 5. 111
siliqua 3. 99; 5. 111; 126
strigulosa 3. 99
suberibrosa 8. 411!, 441
subdeltoidea 1. 228; 3. 99, 3. 675!; 4. 869; 5. 111, 126;
Bairdia subdeltoidea 7. 498, 504; 8. 405!, 441
subfalcata 7. 498
subglobosa 3. 99; 5. 126
subradiosa 3. 99
subteres 7. 498
subtrigona 6. 757
subtumida 8. 409!, 441
teres 8. 622
triasica 9. 360
triquetra 3. 99; 5. 111, 126
truncata 9. 761
ventricosa 9. 761
Bakewellia antiqua 4. 118, 748; 7. 223; 8. 766
bicarinata 4. 118, 748; 7. 223, 637
ceratophaga 4. 118. 748; 6. 119; 7. 223
costata 7. 760; 9. 359
inflata 6. 119; 7. 223
keratophaga 3. 126 (cfr. ceratophaga)
lineata 7. 760
manipularis 6. 626
parva 8. 349
pulchra 8. 766
Sedgwickana 4. 748; 5. 493; 7. 637
tumida 4. 748; 7. 223, 637
Bakteridium s. Bacteridium
Bakuliten-Kalk 4. 108
Bala group 3. 97; 6. 112
-Limestone 6. 112
-Schichten 4. 488
Balaena Cortesii 6. 751
Cuvieri 6. 751
Lamanoni 5. 231
palae-atlantica 5. 112
prisca 5. 112
Balaenodon 0. 202
spp. 5. 632
affinis 6. 491
definitus 6. 491
emarginatus 6. 491
gibbosus 6. 491
Lentianus 2. 623!
Balaenoptera sp. 4. 89
Balanidae
fam 7. 117; 8. 620
Balanocrinites
sculptus 0. 376
Balanophyllia
gen. spp. 1. 627; 2. 119
praelonga 6. 740

Balantites 0. 628
Balanus spp. 1. 382, 484
Aegyptiacus 1. 765; 7. 229
bisulcatus 7. 117
calceolus 7. 117
concavus 7. 117
crassus 7. 117
crenatus 7. 117
cylindricus 7. 117
dolosus 7. 117
erisma 7. 117
Hameri 7. 117
inclusus 7. 117
miser 4. 515
perplexus 7. 117
pictus 4. 515
porcatus 7. 117
pustularis 4. 515
radiatus 0. 83
Scoticus 1. 621
spongicola 7. 117
stellaris 4. 515
sulcatus 1. 621; 7. 117
sulcatinus 7. 717
tessellatus 7. 117
tintinnabulum 7. 117; 8. 584
tulipa 7. 117
Uddewallensis 7. 117
undulatus 3. 609
unguiformis 1. 712; 7. 117
-Versteinerungs-Art 4. 658
Baliostichus 0. 626
ornatus 6. 105
Ballesterosit 1. 350!
Baltimorit 2. 849!; 6. 347*
Baltische Küsten 6. 730
Bambusium 0. 630
eocaenicum 3. 503; 5 638
liasinum 2. 983
Moussoni 3. 503; 5. 639
sepultum 2. 753, 992; 3. 47, 502; 4. 525; 5. 638; 6. 252; 9. 374
Bamleit 6. 183*
Banbury-Sandstone 0. 181
Bangor-group 3. 97; 6. 112
Banisteria 0. 635
Haeringana 4. 379
Stotzkiana 9. 375
Banksia acutiloba 3. 509
basaltica 2. 750; 3. 509
brachyphylla 9. 374
cuneifolia 9. 503
Banksia dillenioides 2. 750; 3. 510; 4. 379
Deikeana 9. 503
Haeringiana 2. 750; 3. 510; 4. 379; 8. 587; 9. 374
Helvetica 9. 503
longifolia 2. 750; 3. 508, 510; 4. 379; 6. 505; 9. 374, 503
Laharpei 9. 503
Morloti 9. 503
Orsbergensis 6. 505
parvaefolia 2. 750
prototypus 2. 750; 3. 509
Ungeri 2. 750, 4. 379, 4. 877; 9. 374, 503
Valdensis 9. 503
Baphetes planiceps 4. 633!
Baralit 4. 822!
Barbus Stotzkianus 8. 587
Bardiglio 8. 89
-Marmor 6. 216; 7. 594*
Barnhardit 7. 432! 8. 565!
Barrande[i]a gen. 1. 509
Cordai 1. 509; 6. 116
Barren des Meeres: Entstehung 0. 79
Barsowit 1. 444; 4. 598!
Barton-clay 2. 882; 3. 189; 4. 507 p; 7. 503 p; 9. 228, 229
-Thon 8. 714
Baryastraea gen. 0. 763!, 765; 2. 118*
Baryphyllum 2. 121*
Barysmilia 2. 116*
tuberosa 4. 867
Baryt 1. 596, 707, 819*; 2. 517, 529; 3. 461, 601*, 837; 4. 421, 683!; 6. 48, 185
-Apatit 9. 191!
-Bildung: fortdauernde 4. 683
-ocalcit 2. 517; 2. 224
-ocölestin 5. 736!;
-ozölestin 8. 592*
-Sandstein 3. 130, 138!
-spath 0. 452; 1. 453*; 5. 411, 447, 821; 7. 549, 720; 8. 319
Basalt 0. 355; 1. 33, 555; 3. 659, 707; 4. 91, 161, 218; 5. 352, 597; 6. 25, 705, 733; 7. 28!, 185, 7. 349, 357*, 361!, 460, 607, 737*, 834; 8. 475, 548, 606, 686!, 835, 836*, 857; 9. 201, 308, 485, 605, 773, 830, 832
mit fremden Einschlüssen 3. 660
mit Glimmerschiefer-Einschlüssen 5. 179
wirkt metamorphisch 8. 389
Ausbrüche 6. 584
der Azoren 0. 14;
Durchbruch 4. 722
Erzführung 5. 166
-Gänge 7. 34; 8. 857
-Gesteine 2. 592; 5. 829
-Jaspis 8. 391!
-Konglomerate 3. 194; 6. 26
-Porphyr 2. 716
-Tuff 2. 851
-Wacke 4. 723
Basaltiformen-Bank 6. 742
Basaltit 6. 665; 9. 657, 663
Basanit 7. 357*; 9. 657
Basanomelan 1. 571
Basilicus gen. 1. 508!
laticostatus 6. 116
tyrannus 7. 380
Basilosaurus cetoides 0. 746; 3. 94; 5. 112
Harlani 6. 760
pygmaeus 5. 112
serratus 3. 95; 246* 5. 112
Squalodon 3. 95
Basinotopus n. g. 0. 121!
Lamarcki 0. 121
Basisches Chlorblei 3. 173
Gesteins-Gruppe 7. 357!
Bastard-Freestone 1. 484
-Gestein 7. 357!
Bathonien 1. 617; 8. 379 p, 483!, 583, 725
Bathycyathus 1. 627; 2. 115*
Bathygnathus gen. 5. 499!
borealis 5. 499
Batrachia 9. 126!
ornithoidea 9. 867
Batrachier-Eyer 3. 106

Batrachier-
Fährten 1. 496; 7. 878
Batrachoides
gen. Hitchc. 9. 868
antiquior 9. 868
nidificans 9. 868
Batrachosaurus
gen. (Jaegeri) 6. 760
Batrachus (Batrach. g.)
lacustris 5. 374
Lemanensis 5. 374
Najadum 4 374
Batr[ach]ichnis
Stricklandi 4. 860 !
Battersbyia 2. 120*
inaequalis 6. 255
spp. 4. 497
Battoides 1. 510
Battus gen. 3. 488
tuberculatus 8. 270
Bau der Gebirge 1. 181 !
Bau-Steine 9. 741
Bauhinia 0. 637
Baulit 4. 600!
Bäume
versteinerte 4. 862
Baum-Stamm
in Mollasse-Mergel 5. 711
senkrecht im Boden
7. 100
Bayern 2. 282 !
Geologie 0. 719
Bdella bicincta 5. 124
bombycina 5. 124
lata 5. 124
obconica 5. 124
Bdellacoma gen. 8. 127 !
vermiformis 8. 127
Beacon-cliffs 1. 711 ff.
Beatricea gen. 8. 854
Beauchamps 7. 503 p
Beaumontia 2. 120*
antiqua 8. 754
Venelorum 6. 255;
8. 754
spp. 2. 990
Becher[i]a
ceratophylloides 5. 629;
6. 97
charaeformis 6. 97
diffusa 6. 97
dubia 5. 629; 6. 97
grandis 5. 628; 6. 97
myriophylloides 6. 97
Becken
von Paris 7. 631 p
Beckit 4. 815
Beinertia 0. 627
minor 5. 630
Münsteri 5. 630²
Belemnitella gen. 4. 853
bulbosa 7. 492; 8. 494
lanceolata 5. 633
mucronata 1. 101; 4. 168;
5. 76, 633; 6. 80;
7. 656; 8. 360², 494, 739, 874;
9. 361, 421*, 494²
plena 5. 633
quadrata 5. 633; 7. 656;
8. 850; 9. 421*, 494
vera 5. 633; 9. 494
Belemnites gen. 0. 744!;
2. 641*; 4. 853;
8. 373
abbreviatus 0. 723;
4. 850
absolutus 0. 226;
7. 472
acuarius 0. 180; 1. 140;
2. 648*; 4. 850;
6. 545, 743, 850;
7. 17, 206, 698²;
8. 105; 9. 25, 94
acutus 4. 109, 830, 850;
5. 364; 6. 217,
454; 8. 226
Beaumontanus 2. 352
Bessinus 3. 234
bicanaliculatus 7. 698;
9. 373
binervius 9. 373
bipartitus 0. 735; 9. 123,
203, 372², 373
Bollensis 2. 649
breviformis 2. 649*;
6. 456; 9. 29 ff.
8 356
brevis 2. 649*; 7. 5,
698²
Bruguiereanus 0. 151;
5. 213; 7. 612
Brunsvicensis 5. 161,
324; 7. 480, 659³,
670 !, 672, 676
bulbosus 8. 494
Calloviensis 8. 484
canaliculatus 0. 160,
164, 405; 1. 140;
2. 650*; 3. 324;
6. 718, 818², 852;
8. 582², 583
cinereus 2. 647
Belemnites
clavatus 0. 156, 182,
585; 3. 530; 4. 850;
5. 95; 7. 10, 130,
612
clavus 7. 698²
compressus 0. 156;
1. 140; 2. 166, 170,
343, 646; 4. 850;
6. 456; 8. 256;
conicus 9. 123, 372
crassus 6. 456
curtus 0. 227; 6. 210
densus 8. 496, 497;
9. 824
digitalis 0. 180; 1. 140;
2. 648*; 5. 213;
545, 818; 7. 18,
698²; 8. 553; 9. 26
dilatatus 5. 364; 7. 618,
813; 8. 380; 9. 123,
203
Dorsetensis 6. 852
electrinus 5. 633
elongatus 6. 217, 456;
7. 206
excentralis 8. 486
excentricus 8. 496, 582,
710
exilis 6. 850; 7. 613
Fischeri 5. 623
fusiformis 3. 234;
5. 633; 7. 132, 133;
9. 134
giganteus 0. 158, 159,
160, 182; 2. 649*;
3. 235; 4. 850;
6. 818, 852; 7. 134;
8. 356, 583², 713;
9 35, 94, 133, 134
Gingen[en]sis 6. 852
grandis 5. 848
granulatus 5. 633
Grasanus 1. 738
hastatus 0. 166, 167,
182, 178, 585, 734,
830; 2. 643*;
3. 304; 4. 540;
5. 613; 6. 57, 58,
254; 8. 484, 486,
873; 9. 135
inaequalis 8 582
incurvatus 2. 651;
6. 850
irregularis 4. 850;
5. 213; 6. 850;
8. 356

Belemnites
lagenaeformis 6. 456; 6. 743
lanceolatus 5. 633
lateralis 3. 811
latisulcatus 0. 164, 165; 6. 57; 8. 873
latus 9. 123, 372, 373
Listeri 5. 633
longissimus 6. 456
longisulcatus 6. 850
macer 8. 105
mammillaris 0. 227
minaret 9. 123, 372
minimus 3. 319; 4. 201, 202; 5. 457, 633; 6. 71, 818; 7. 480, 659, 660 ff.; 9. 373
monosulcus 2. 644
mucronatus 0. 94, 295, 296, 737, 835; 1. 140, 481; 2. 50; 4. 319, 643; 5. 42, 633; 9. 847
Neumarktensis 6. 852
niger 2. 647; 6. 818; 7. 209; 7. 612
Nodotanus 8. 356
olifex 6. 742
opalinus 9. 29
Orbignyanus 9. 123, 373
orthoceropsis 7. 595
Oweni 2. 351, 352; 6. 378
oxyconus 9. 26
Panderanus 9. 226; 7. 472
papillatus 6. 850
paxillosus 0. 149, 412; 1. 140, 143, 414, 419; 2. 646; 3. 319; 4. 370; 5. 95, 213; 7. 11, 130, 698²; 8. 296, 552, 583²; 9. 24, 143
penicillatus 0. 181
pistilliformis 5. 160; 7. 651; 8. 380; 9. 123, 372, 373
pistillum 7. 658
Puzosanus 0. 723; 6. 378
pyramidalis 6. 850
quadricanaliculatus 2. 644
Quenstedti 6. 852
Rhenanus 6. 852
Royeranus 4. 354
Russiensis 0. 227
semihastatus 2. 343, 349, 643*
semisulcatus 0. 585; 2. 643*
semicanaliculatus 1. 738; 4. 375, 643; 5. 163, 364; 6. 818; 7. 480, 650*, 659; 9. 373
Souichi 8. 488
spinatus 2. 649*; 6. 852
sulcatus 0. 160
subclavatus 2. 644; 9. 29
subfusiformis 0. 231; 1. 744; 4. 540; 7. 651; 8. 637; 9. 494
subhastatus 8. 484
subquadratus 0. 231, 390, 396 ff., 408, 415; 3 811; 5. 100; 6. 818; 7. 674; 9. 494
subventricosus 3. 608
sulcatus 2. 352, 645
tenuis 7. 698²
tricanaliculatus 2. 647; 6. 850
tripartitus 1. 140; 2. 646; 3. 530; 4. 850; 5. 213; 6. 58, 545, 850; 7. 17, 130, 613, 698²; 8. 105
trisulcus 2. 646
ultimus 5. 633
umbilicatus 6. 456
unicanaliculatus 6. 719; 8. 486
Württembergicus 6. 852
Belemniten
in Glimmerschiefer 4. 44
-Mergel 6. 451
-Schicht 8. 583
Belemnobatis
Sismondae 4. 382
Belemnon
pustulatum 5. 633
Belemnosepia gen. 4. 853
Belemnosis
gen. 4. 853, 854!
plicata 4. 853
Belemnoteuthis 0. 744!
gen. 4. 853
antiquus 0. 723
bisinuata 8. 44
Belgische
Fauna 4. 850
Tertiär-Formation 7. 503p
Belinurus 1. 506
Bellerophon
acutus 2. 581, 585; 6. 500
Alixi 3. 102
bilobatus 3 336; 6. 121, 500
bisulcatus 1. 662; 6. 121, 371
cancellatus 7. 863
carinatus 6. 121; 8. 715; 9. 847
clathratus 6. 371
compressus 6. 371
cornu-arietis 6. 121
costatus 6. 121; 9. 827
decussatus 6. 121, 371
Delanouei 3. 102
dilatatus 6. 121; 8. 594, 634
Duchasteli 6. 121
Dumonti 6. 121
Duriensis 0. 98
expansus 6. 121
globatus 2. 930; 9. 847
globosus 9. 506
Goslariensis 6. 256
hiulcus 3. 229; 6. 121; 7. 374; 9. 850²
hyalinus 3. 229
Larcomi 6. 121
latifasciatus 6. 371
L'Huissieri 3. 102
lineatus 6. 371
macrostoma 0. 285; 2. 928, 930; 6. 371
Montfortanus 7. 116
Murchisoni 6. 121, 371
nautarum 4. 86
nitidus 7. 639
nodulosus 3. 230
papyraceus 3. 229
percarinatus 7. 116; 9. 827
phalaena 3. 229
Phillipsi 6. 121
plicatus 3. 229
primuloides 3. 747
reticostatus 6. 121
Saemanni 3. 102
sculptus 1. 661;
striatus 2. 192; 6. 371², 625
subdecussatus 6. 121

Bellerophon
subdiscoides 3. 230
sublaevis 7. 863
tangentialis 6. 121
tenuifascia 6. 121
Treali 3. 102
tricarinatus 5. 98
trilobatus 0. 285; 1. 662; 2. 930; 5. 98; 6. 121, 370
tuberculatus 3. 230; 6. 371
Urei 6. 121; 7. 116; 9. 827
Wenlockensis 6. 121
spp. 1. 253, 382; 5. 248
Bellingera (Coleopt. g.)
ovalis 2. 983, 984
Bellia arenaria 9. 874
Belodendron
gracile 0. 117
lepidendroides 0. 117
Neesi 0. 117
Belodon gen. 7. 751 !
Plieningeri 5. 757; 7. 141 !, 751
Belodus gen. Pand. 8. 112
gracilis 8. 112
Belonorhynchus
gen. 8. 17 !
striolatus 8. 7 !
spp. 8. 12
Belonostomus
gen. 3. 117, 118*
acutus 8. 12
Anningae 8. 12
crassirostris 1. 183
gracilis 1. 183
spp. 4. 382; 9. 764
Belopeltis
gen. et spp. 9. 370
Beloptera gen. 4. 853
anomala 4. 853
belemnitoidea 4. 853
belemnoidea 4. 853
Levesquei 4. 853
longirostrum 4. 853
Parisiensis 3. 604
sepioidea 4. 853
Belosepia gen. 4. 853
Blainvillei 4. 853
brevispina 4. 853
Cuvieri 4. 853
longirostris 4. 853
longispina 4. 853
Oweni 4. 853
sepioidea 4. 853
Beloteuthis
gen. 4. 852; 9. 368, 370
acuta 9. 370
ampullaris 9. 370
subcostata 9. 370
substriata 9. 370
venusta 9. 370
Bembidium
infernum 6. 503
Bengalit 7. 50
Benzoin antiquum 8. 712
attenuatum 9. 503
Berardius
Arnouxi 3. 93 !
Beraunit 4. 174, 692
Berbyce 2. 123
Berchemia
multinervis 9. 117
Berendtia 0. 637
primuloides 3. 227
Berenicea
Archiaci 5. 634
dilatata 5. 634
diluviana 0. 722; 5. 634
Hagenowi 4. 869
heterogyra 6. 114
irregularis 1. 767
laxata 5. 634
Lucensis 5. 634
megastoma 1. 767
microstoma 5. 634
orbiculata 5. 634
phlyctaenosa 4. 869
radiciformis 5. 634
rugosa 5. 634
striata 5. 634; 6. 96
subflabellum 5. 634
tenuis 4. 869; 5. 634
Bergeria 0. 629
gen. 5. 868
Berge, die höchsten 7. 98
Berg-Bildung
in Java 4. 96 !
-butter 4. 28 !
-holz 0. 705 !
-kalk 0. 729; 1. 491, 496; 6. 368; 7. 472; 8. 350; 9. 873
-kalk-Formation 9. 845p, 846p
Russlands 1. 607
-kalk-Korallen 2. 989
-ketten-Bildung 5. 289!, 641, 769
-kork 3. 70!
-krystall 1. 700; 3. 54*; 5. 822; 9. 424*; 679
Berg-leder 3. 70
-naphtha 9. 624*
-pech 3. 69
-schlipf 4. 205!
-sturz 8. 342
-theer 3. 69; 7. 440
-Zeichnung 4. 362!
Bergwerks-Ertrag
in Spanien 1. 45
-Distrikte in England 2. 242
Bernstein 2. 496, 985; 3. 128, 745; 4. 819; 5. 119! p; 6. 619p; 8. 609
enthält Flüssigkeiten 5. 842
-Fauna 5. 119!
-Flora 3. 225; 3. 744!
-Lager 1. 735
-Pflanzen 4. 142
-Verbreitung 3. 710; 4. 123; 6. 227
-Vorkommen 3. 701, 739, 749; 5. 444; 8. 313
in Groningen 5. 577
Berthierin 5. 450!
Berthierit 4. 422
Berührungs-Metamorphismus 8. 385
Berycopsis, gen. pisc. 3. 109
Beryll 0. 451; 1. 185!, 329, 398, 674!, 699; 2. 524; 3. 367! 4. 69*; 5. 194, 822, 827; 6. 184
Berytopsis femoralis 3. 873
Beryx Germanus 9 494
Lewesiensis 9. 361
ornatus 9. 361
radians 1. 183
Valenciennesi 9. 361
vexillifer 3. 108
spp. 5. 235
Berzelin 3. 183*
Bestimmung fossiler Pflanzen 2. 506!
Beta-Kalk 6. 742
Betula 0. 633
Aeoli 4. 252
attenuata 3. 226
alba 4. 832
Blancheti 9. 501
Brongniarti 2. 628; 3. 120, 384, 503; 4. 491; 8. 500; 9. 501, 873

Betula
carpinifolia 6 505
carpinoides 9. 501
caudata 3. 226
crenata 3. 226
denticulata 9. 117, 873
Dryadum 3. 47, 226, 503; 4. 491, 627, 631; 6. 252; 9. 501
elegans 3. 226
eocaenica 9. 374
flexuosa 3. 226
insignis 9. 873
macrophylla 3. 120
primaeva 6. 505
prisca 2. 628; 3. 226, 384; 4. 491, 631; 9. 873
subtriangularis 3. 226
succinea 3. 747
Weissi 9. 501
Betulinium 0. 633
Parisiense 1. 635; 3. 383
Rossicum 7. 363
tenerum 1. 635
Betulites elegans 2. 894
Beudantit 3. 261; 5. 839*; 7. 712?!; 8. 314!
Beutelthiere 8. 510; 9. 120
Beyrichia
gen. 0. 99, 5. 249; 7. 746
affinis 5. 876
Barrandeana 5. 876
bicornis 5. 876
Bohemica 5. 876
Buchana 5. 876; 7. 362
Bussacensis 5. 98, 876
clathrata 8. 756
complicata 5. 876; 6. 115
Dalmanana 5. 876
gibba 5. 876
Hardouinana 3. 102
hians 7. 362
Jonesi 7. 362
Kloedeni 5. 876; 6. 115
lata 5. 876; 8. 756
Logani 5. 876; 8. 756; 9. 636
Mac Coyana 5. 876; 8. 756
mundula 5. 876
Pennsylvania 8. 756
plagiosa 8. 756
Ribeiroana 5. 876
rugulifera 8. 756
Salterana 5. 876; 7. 362
seminulum 5. 876
Beyrichia
sigillata 8. 756
siliqua 5. 876
simplex 5. 98, 876
spinulosa 7 362
strangulata 5. 876; 6. 115
symmetrica 5. 876; 8. 756
tuberculata 5. 876; 6. 812; 7. 362; 8. 270
Wilkensana 5. 876; 7. 362
Biancone 6. 215; 7. 597
Bibasisches Kalkammoniak-Arseniat 3. 470
Bibio antiquus 2. 467; 6. 757
Curtisi 6. 503
fusiformis 6. 503
moestus 6. 503
morio 6. 503
Bibiluto-Vulkan 9. 197
Biblarium sp. 6. 103, 354
Bibliotheca historico-naturalis et physico chemica 2. 81
Bicalcareocarbonate of Barytes 4. 448
Biddulphia sp. 4. 739
bidentata 6. 103
includens 6. 103
tridentata 6. 103
Bidiastopora 4. 116
cervicornis 5. 634
Eudesia 5. 634
latifolia 5. 634
Luciana 5. 634
macropora 5. 634
Michelini 5. 634
micropora 5. 634
ramosissima 5 634
Biflustra gen. 4. 117!
Bifrontia zanclaea 3. 382
Bifurculapes gen. 9. 869
clachistotatus 9. 869
laqueatus 9. 869
scolopendroideus 9. 869
tuberculatus 9. 869
Bigenerina gen. 5. 755
Bigge-Schiefer 5. 49
Bignonia eocaenica 9. 375
Bildungs-Dauer einzelner Schichten 9. 347
-Folge der Mineralien 2. 877; 4. 93, 402; 5. 803
Bildungs-Perioden der Erde 4. 498
-Weise der Bohnerze 2. 625
Glimmer 4. 129
Bilobites furcifera 4. 221
spp. 4. 738; 6. 500
Biloculina
gen. 5. 755; 7. 377
amphiconica 2. 255
caudata 6. 757
cyclostoma 2. 255; 3. 671!
globulus 6. 757
sacculus 9. 371
turgida 2. 254; 5. 435; 6. 757
spp. 4. 738
Bimsstein 2. 487!, 2. 572! 5. 68!; 7. 354! 357*, 360!, 737*; 8. 77; 9. 446*
der Azoren 0. 7
-Konglomerat 5. 223p, 370p
Binnen-Konchylien 3. 751; 6. 604
Binnit 8. 592*
Biolithe 4. 612, 735; 8. 630
Biolithische Gesteine 4. 726
Süsswassermergel 4. 612
Biotin 3. 258
Biotit 5. 348!; 6 192!, 346; 8. 849
Biradiolites
gen. 3. 240, 381!; 6. 753
cornu-pastoris 3. 382; 7. 756
subhercynicus 7. 756
Birdseye limestone 7. 729
Bisiphites gen. 4. 853
Bisilicate
of Manganese 0. 447
Bismutit 0. 450; 6. 445
Bison
gen. 3. 124; 5. 244
Americanus 5. 244! 6. 109
antiquus 4. 127; 5. 112, 244!; 6. 109
bombifrons 6. 109
latifrons 4. 127; 5. 112, 244!; 6. 109
priscus 1. 760; 6. 109; 7. 868
Bithynia impura 1. 760; 6. 332, 333

Bittacus antiquus 6. 622
validus 6. 622
Bitter-erde-Dämpfe 3. 701
-erde-Mergel
bituminöse 0. 706!
-kalk-Mergel 4. 478
-salz-See 9. 309
-spath 1. 389*; 5. 417, 821; 6. 553!; 9. 84!
Bitumen 1. 736
Bituminöse
Mergelschiefer 6. 851
Fisch-Schiefer 8. 1 ff.
Bivalven,
im Crag 4. 505!, 507
im Grossoolith 4. 764
Blackband-ore 9. 826
Blainvillimys spp. 5. 225
Blaniulus spp. 5. 121
Blapsium Egertoni 5. 747
Blasenräume 1. 561 ff.; 5. 803; 8. 220
Blastoidea
(subordo) 2. 747!; 4. 230!; 6. 115; 8. 751
Blastoidocrinus 9. 635
Blastotrochus 2. 116*
Blatta Balthica 6. 620
didyma 6. 620
Gedanensis 6. 620
Blätter-Kohle 2. 453; 5. 54 7. 491p, 554, 555
-kohlensandstein 3. 482, 483
-tellur 3. 476
Blattidium Achelous 5. 747
molossus 5. 747
Nogaus 5. 747
Symyrus 5. 748
Blattina formosa 2. 985
gracilis 6. 108
Lebachensis 6. 108
primaeva 6. 108
spp. 2. 996
Blatt-Skelett 4. 621!
Blaueisenerde 5. 821*
Blauer Porphyr 5. 704!
Blau-Erz 2. 708! 5. 140
Blechnum Brauni 4. 877
Blei 5. 455; 6. 264
Gediegen 5. 837; 6. 40; 7. 68
metallisches 6. 442
in Seewasser und Organismen 0. 352
arseniksaures 1. 591!
Blei
Vanadinsaures 0. 220
-Apatit 9. 191!
-Bergbau 2. 769
Bleiberger-Schichten 7. 615; 8. 4, 345
Blei-Erze 4. 92, 315, 605, 827; 6. 462; 8. 329
Silberhaltige 5. 212
Bleierz-Gänge 5. 449
-Gemenge 5. 449
-Züge 2. 772
Blei-Gänge,
Silber-haltige 1. 15
Bleigelb, als Hüttenprodukt 2. 333
Bleiglanz 0. 451; 1. 331, 390*, 392*, 397*, 578*, 707; 2. 517, 875, 879; 3. 475, 476; 4. 404; 5. 72, 450!, 824; 6. 189, 435, 442; 7. 549; 9. 188*
grosse Masse 2. 712
Silber-haltiger 7. 352
Mangan-haltiger 5. 832!
-Gänge 1. 362; 9. 216
-Kalkstein 9. 341
-Vorkommen 2. 97; 9 344
Bleiglätte 9. 85
(natürliche) 6. 40
Blei-Gruben 6. 135
-Hornerz 3. 173!
-lasur 3. 175; 9. 84
-Niere 3. 176; 7. 709!
-Oxychlorid 4. 182!
Bleioxyd,
kohlensaures 2. 210
vanadinsaures 2. 214!
molybdänsaures 2. 336
Blei-Salze,
in Nassau 0 269
-schiefer 0. 270
-spath 1. 390*; 2. 223!, 2. 519 ff.
-vitriol 0. 269; 1. 453*; 2. 220!, 223!; 4. 453; 5. 821; 7. 550; 9. 188*
-zinkvanadat 1. 594
Blende 0. 451; 1. 392*, 578*, 597, 707; 2. 517 ff.; 3. 259, 709; 4. 421, 827; 5. 824, 841; 8. 690; 9. 288!, 803
Blende
schwarze 5. 417
weisse 2. 76!
-Gänge 1. 362; 9. 216
Blenniomoeus gen. 184!
brevicauda 1. 183
longicauda 1. 183
major 1. 183
Blitzröhren 9. 623*
Blochius longirostris 2. 982; 5. 380
Blöcke, erratische 2. 959; 3. 495; 5. 77
Blomberg
(in Bayern) 2. 296
Bluff-Formation 1. 636!
-series 8. 350
Blumenbachium
globosum 7. 104
Blüthen, fossile 8. 256
Bockschia 0. 627
flabellata 5. 628
Boden
von Caldeca 6. 842!
Deutschlands 9. 107
-Bewegungen 7. 465
-Einfluss auf
das Leben 2. 52
Schmetterlings-Farben 3. 489
Vegetation 0. 352, 512
-Erschütterung
zu Brest 0. 234
-Gase 5. 352
-Hebungen 1. 724; 6. 68, 82, 730; 8. 223; 9. 464
in Neuholland 8. 294
in Skandinavien 0. 477
-Schwankungen 5. 709
-Senkungen 9. 469
-stete Pflanzen 7. 255
Bogenläufer (Pflanzen-Blätter) 4. 376
Boghead-Cannel-Kohle 4. 636
Boghead Parrot Cannel-Coal 8. 217
Bognor rock 4. 507p
Bohnerze 2. 625; 3. 251p; 4. 360; 5. 166; 6. 572!; 7. 346; 8. 348, 610; 9. 296!
Badensche 5. 445!
Württembergs 2. 359; 3. 463

Bohnerze
Bildungsweise 2. 625; 4. 720*
Bohnerz
-Lagerstätten 1. 501 p; 3. 377 p; 4. 720*; 5. 858; 8. 344; 9. 137
-Vorkommen 2. 493
Bohrbrunnen
(Artesische Br.) 6. 585
Bohrende Thiere
in Granit 6. 499
Bohrlöcher 1. 325
Bohrmuscheln 5. 795
Thätigkeit 4. 733
Bohrungen 8. 102
Bohrungs-Weise der Bohrmuscheln 4. 733
Bolania gen. 4. 865
Bolboporites 2. 120
Bolderien (terrain) 2. 359, 882; 3. 482, 625
Boletia 7. 122
gen. 9. 255
Bolide 4 485
Bolina Raiblana 8. 22 !, 504; 9. 39, 860
Bolivina gen. 5. 755; 7. 377
antiqua 7. 294! 309
Beyrichi 2. 254; 6. 756; 7. 498
dilatata 2. 255
spp. 2. 511*
Boltonit 5. 571 !
Bombaceae (fam.) 9. 377
Bombax Sagorianus 2. 628
Bomben,
vulkanische 6. 351 !
Bombur Aonis 8. 30, 504
Bonasus
gen. 3. 124*; 5. 226
Bonebed 6. 499, 741; 7. 93; 8. 115, 353, 550, 625, 715; 9. 5, 120
-Gruppe 9. 628
Bonsdorffit 9. 567
Bootherium gen. 5. 245!
bombifrons 4. 127; 5. 112, 245 !; 6. 109
cavifrons 4. 127; 5. 112, 245 !; 6. 109
Boracit (-zit) 4. 769 !; 5. 838; 7. 73
Borax 2. 799; 8. 704
-See'n 8. 704 !
Borax-säure
Bildung 0. 341 !
-saures Natron 5. 835
Borealis-Bank 8. 594
Borelis gen. 6. 608
melonoides 8. 243
sphaeroidea 7. 633
spp. 4. 737
Bornholmische
Schicht 8. 594
Bornia 0. 627
equisetiformis 6. 97
scrobiculata 2. 890; 6. 255
stellata 6. 97
Bornit 2. 701
Borocalcit 6. 563
Boronatrocalcit 6. 563 !
Borsäure 4. 72, 183, 184
in Schwefelwasser 3. 474, 475
Borsaurer Kalk 8. 576 !
Borsaure
Verbindung 0. 614 !
Bor-Verbindungen
(in Dämpfen) 5. 834
Bos gen. 7. 869
Americanus 5. 244
antiquus 5. 244
bombifrons 4. 127; 5. 245
Bonasus 5. 226
brachycerus 3. 124; 5. 226
cavifrons 4. 127
elaphus 5. 373
elatus 5. 226, 373
frontosus 4. 767
giganteus 5. 226, 373
intermedius 5. 226
latifrons 4. 127; 5. 244
longifrons 0. 204; 3. 766; 5. 226; 7. 868
Marathonicus 4. 639; 5. 375; 6. 595
moschatus 8. 109, 379
Pallasi 3. 124; 4. 127, 610; 5. 245; 6. 109
primigenius 0. 204; 1. 730; 2. 998; 3. 766; 4. 473; 5. 226, 373, 624; 6. 357; 7. 868; 9. 113, 202, 355
priscus 0. 88; 1. 728, 730, 760; 2. 998; 3. 124; 5. 226, 244, 373; 6. 111; 8. 61, 128; 9. 100, 202, 427, 355
taurus 3. 45; 5. 226
trochocerus 5. 226
urus 3. 122
Velaunus 5. 226; 373
spp. 3. 378; 8. 743
Bostrichopus
antiquus 2. 279; 6. 370
Bothodendron 0. 630
punctatum 5. 631
Bothriceps
Australis 9. 496 !
Bothriodon
gen. 5. 228, 373; 6. 638
leptorhynchus 5. 373
platyrhynchus 5. 373
Vetaunus 5. 373
Bothriolepis
gen. 8. 249
favosa 8. 509
jurensis 4. 857
Bothroconis plana 4. 743
Bothryodon
vdr. Bothriodon
Botrytis similis 3. 745
Bouchardia 0. 244!
gen. 3. 255 !
rosea 3. 255; 4. 504
tulipa 4. 60, 504
Bourguetocrinus
Londinensis 4. 762; 9. 366
ellipticus 2. 151, 167, 462; 5. 369; 6. 245
Thorenti 9. 366
Bournonit 0. 452; 2. 533, 701 !, 5. 824; 8. 214 !
-Glanze 6. 566
-Nickelglanz 1. 348
Bouteillenstein 5. 577
Bouts de la canne de la calotte rouge 8. 621
Bowenit 4. 189
Bowerbankia 0. 299
attenuata 0. 117
emarginata 0. 117
maxima 0. 117
repanda 0. 117
rotundifolia 0. 117
Brachiocrinus
gen. 9. 236 !
spp. 9. 236
Brachionus pala 9. 510

Brachiopoda (ordo) 0. 244; 3. 252!; 4. 58!, 503!, 507; 6. 507; 7. 482, 637; 9. 758, 869!
liasic and oolitic 3. 209!
des Lias 5. 508
Brachiopoden-Kalk 1. 224
-Werk Davidsons deutsch 5. 54
Branchiostegi (ordo) 3. 240
Brachyceren (Fliegen) 0. 22*
Brachycladium Thomasanum 3. 225, 745
Brachygaster serratus 6. 746
Brachygnathus gen. 5. 228; 6. 638
Brachymys ornatus 3. 164
Brachyops gen. 5. 254!
breviceps 5. 254!
laticeps 5. 254; 9. 752
Brachypleura 6. 224
Brachyphyllia depressa 4. 868
Dormitzeri 4. 868
glomerata 4. 868
Brachyphyllum 0. 632; 7. 778
Brardi 2. 991
Bucklandanum 2. 991
Caulerpites 2. 991
Orbignyanum 2. 991
peregrinum 6. 496
spp. 9. 379, 381
Brachytrema gen. 3. 236!; 7. 865, 866!
Buvignieri 3. 234; 7. 866
breve 7. 866
granulosum 7. 866
turbiniforme 3. 234
Brachyura (ordo) 9. 638
Brachyurites hispidiformis 0. 120, 200; 2. 166, 302
rugosus 9. 640
Bräcka 3. 68
Bracklesham-beds 2. 882
-Sands 4. 507p; 7. 503p; 9. 228, 229
Brackwasser
-Bildungen 1. 746; 7. 845; 8. 717, 847
jurassische 2. 351
tertiäre 1. 714
Bracon macrostigma 7. 555; 9. 115
Bradford-clay 0. 160!, 183; 8. 482
-oolith 9. 133
Bradypus gen. 4. 111
Branchastraea 2. 117*
limbata 2. 252
Brände in Kohlen-Schichten 9. 273
Brandisit 2. 848; 8. 692
Brandschiefer 3. 3; 5. 852; 8. 594; 9. 200*
Brandung 7. 607
Brass(-Erze) 7. 586!
Brauneisen-Erz 6. 182; 2. 98
Brauneisen-Stein 1. 329, 387,* 390,* 391,* 396,* 398, 401; 3. 467,* 475; 4. 20, 191, 665, 809*; 5. 463!, 823; 6. 690!; 7. 433, 65ff; 8. 213, 472!, 574!, 784, 789; 9. 190!, 555
(thoniger)
-Lagerstätten 2. 897!
Brauner Jura 0. 155, 182!; 6. 853; 8. 486
Braun-erz 2. 708!; 5. 140;
-kohlen 0. 339!; 1. 469; 2. 57p, 453, 465p; 3. 710, 739; 4. 48, 49p, 197*, 211!, 227, 376, 518, 573, 623p, 818, 827, 5. 188, 206, 858; 6. 242, 421, 458, 475, 578, 707, 757²p, 828, 849; 8. 77, 86, 95, 468!; 9. 505; 723p, 820!, 854 (vgl. Lignit.)
von Brennberg 0. 85,*
von Urgenthal in Steier 0. 63*
-Becken:
Deutschlands 5. 463
-Bildung 3. 533; 5. 745
-Entstehung 8. 79
-Flora des Niederrheins 2. 54
NO. Deutschlands: 3. 225!
-Formation 2. 969, 985p, 3. 193 ff, 750p; 4. 196; 6. 504, 584,
Braunkohlen
-Formation 6. 633, 732; 7. 216, 610, 723; 8. 102, 202, 224, 332, 350, 475, 498g, 610; 9. 113, 114, 115p, 237²p, 273, 427p, 633
Brandenburgs 4. 89!
Häring 3. 330
Schlesiens 2. 495
Wildshut 3. 120
-Gebirge 7. 77
in Bayern 4. 517!
im Harz 3. 128
-Insekten 3. 105
-Lager 5. 435; 9. 854
von Polen 5. 463
in Ungarn 3. 190
-Lagerstätten 3. 441, 443; 4. 723
-Lagerung 4. 675
-Letten 3. 133, 137!, 144
-Sandstein 3. 138!, 143, 482, 483. 631, 686
-Vorkommen 4. 210, 211, 227
-Werke:
Temperatur 3. 743
Braunit 3. 696, 9. 77!
Braunspath 1. 820*; 3. 475, 476; 4. 404, 449!; 5. 69, 415ff, 821
-Hornstein 2. 132!
Braunstein 1. 702
-Lager 5. 317
Brecciated limestones 4. 743
Bredea oroides 3. 435; 4. 631
Brennender Berg 3. 295
Brenngas: Einfluss auf Pflanzenleben 9. 256
Brenn-Materialien Russlands 0. 617!
Brennstoff 8. 95
Brenz, fossiles 2. 68!
Brenze Russlands 0. 617!
durch Trapp metamorphosirt 8. 386
Bretschko (Sandstein) 0. 717
Brevicit 5. 702!
Brevigit 4. 445
Breynia gen. 9. 255

Breynia sulcata 7. 859
Briarean
Pentacrinite 6. 762
Briareum 2. 123
Brick-earth 2. 882
Brissopsis
contractus 3. 606
Crescenticus 6. 101
Duciei 6. 101
elegans 7. 859
Genei 7. 859
Menippes 3. 606
oblongus 3. 606
Brissus antiquus 7. 859
depressus 7. 859
Jutieri 7. 844
latus 6. 101
imbricatus 6. 101
oblongus 6. 101
placenta 4. 762
Scillae 3. 104; 4. 762, 763
subacutus 7. 859
Britisch
Nordamerika 8. 333 g
Paläontologie 6. 111
Brocatella (Marmor) 7. 595
-Gestein 8. 89
d'Arzo 1. 316, 337
Brochantit 5. 351
Brochus vdr. Ditrypa
Broddbo-Tantalit 2. 863!
Brom-Kalium 2. 794
-haltige Wasser 5. 834!
-Metalle 8. 852
-Silber 6. 185
Bromelia Gaudini 5. 639
Bromeliaceae (fam.) 5. 639
Bromit 4. 816
Brongniarti-
Schichten 7. 786
Brongniartia gen. 3. 487
carcinoidea 0. 105*
Brongniartin 1. 204!; 5 446
Brongniartit 5. 446!
Brongniartites 0. 638
Graecus 4. 863
Bronnites 0. 638
Bronteidae (fam.) 4. 493
Brontes gen. (Gf.) 3. 488
Brontes flabellifer 2. 107
glabratus 8. 753
Bronteus 6. 224²
gen. 0. 777, 785!; 1. 509; 3. 488
alternaus 6. 256
alutaceus 6. 116, 370
Bronteus
Barrandei 7. 220
Bischofi 8. 753
Clementinus 4. 1
flabellifer 6. 370
insularis 9. 864
laciniatus 6. 370
laticauda 9. 864
minor 6. 256
signatus 8. 594; 9 121
spp. 4. 493; 5. 248
Brontozoum
gen. 9. 509, 867
exertum 9. 867
giganteum 5. 478; 6. 238; 9. 867
isodactylum 9. 867
loxonyx 9. 867
minusculum 9. 867
Sillimanium 9. 867
tuberculatum 9. 867
validum 9. 867
Brook[e]it 0. 453!, 619!, 703!; 4. 453; 5. 181; 6. 14*, 168*; 8. 447, 549, 820*
künstlich 5. 215
Brown ore 4. 665
Bruceit 1. 556; 2. 66; 4. 193
Bruchus
decrepitus 7. 555
Bruckmannia
longifolia 5. 629; 6. 97
rigida 5. 629; 6. 97
tenuifolia 1. 476; 5 628²; 6. 97
tuberculata 5. 629; 6. 97
Brunnen,
artesische 1. 470
-Wasser 0. 623
von Bristol 3. 175
Brussellien (terrain) 2. 882; 7. 503 p; 9. 228
Bryocarpus
monostachys 0. 116
polystachys 0. 116
Bryozoa (classis) 2. 757; 4. 113!; 6. 374; 7. 230, 232, 498; 9. 120
der Kreide 2. 124!
der Jura-Formation 5. 633!
Bubalcia
globifera 7. 777
Bubalus gen. 3. 124*
Bubalus antiquus 3. 124
moschatus 7. 222, 868; 9. 349
Bucania spp. 3. 343; 5. 248
Bucardites
abbreviatus 6. 871
Buccinites communis 7. 760
gregarius 0. 99; 3. 20, 29
absoletus 3. 20; 7. 760
Buccinum
angulatum 8. 488
angustatum 8. 875
antiquum 7. 760
arculatum 2. 107, 192
Badense 3. 75
baccatum 2. 43; 4. 659; 9. 839, 851
bullatum 9. 125
canaliculatum 1. 715
Caronis 9. 839
Cassidaria 2. 435, 587; 3. 134, 138, 327
ciliatum 7. 509
coloratum 7. 420
constrictum 8. 494
Corbianum 8. 875
corniculatum 0. 751
corrugatum 0. 751
curtum 0. 751
Dalei 3. 763
Daveluinum 8. 875
desertum 1. 715
dissitum 8. 875
Doutchinae 8. 875
Dujardini 7. 420; 8. 585; 9. 854
duplicatum 7. 421
echinatum 2. 978
elegans 2. 943
elongatum 9. 763
excavatum 7. 53
granulatum 1. 741
Grateloupi 2. 978
gregarium 0. 485; 1. 647; 2. 943; 7. 760
Gossardi 0. 862
harpula 0. 751
Haueri 9. 854
helicinum 7. 760
Holsaticum 7. 50
interstriatum 7. 242
junceum 1. 715
laevigatum 7. 866
lavatum 1. 715
macula 3. 763
marginulatum 7. 404
moniliforme 8. 875

Buccinum
mutabile 0. 721; 2. 43; 7. 420
naticoides 0. 174, 185; 8. 488
Nebrascense 7. 492; 8. 377, 494
obesum 8. 875
obsoletum 2. 943; 7. 760
oliva 7. 866
polygonum 0. 223; 3. 75; 8. 584
prismaticum 0. 223; 1. 741; 8. 584
propinquum 1. 741
reticulatum 1. 623 ff; 2. 43; 5. 595; 7. 420
rugosum 1. 741
scabriculum 7 635
semistriatum 8. 584
stromboides 3. 807
subclathratum 6. 372
subpolitum 3. 75
tiara 4. 573
Turanense 8. 740
turbilinum 2. 908, 910; 2. 943; 7. 760²
turgidulum 0. 751
undatum 1. 621; 3. 763
unilineatum 7. 865²
Veneris 3. 75
vinculum 7. 864; 8. 494
spp. 1. 362; 2. 978; 4. 626; 6. 479, 750
-führende Schichten 3. 140
Buckeltimpling 4. 769
Bucklandia 0. 631
anomala 2. 887, 992
squamosa 2. 992
Bucklandi-Belt 6. 452!
Bucklandium gen. 7. 634
Buckling 4. 769
Buchia 0. 393
sp. 1. 358
Bufo calamita 2. 245
variabilis 2. 245
viridis 2. 245
Bulicami (Gas-Ausströmungen) 0. 493
Bulimella gen. 7. 864!
bulimiformis 7. 863
canaliculata 7. 863
elongata 7. 863
Bulimina spp. 2. 511*
gen. 5. 755; 7. 377
Bulimina aculeata 2. 254
buccinoides 7. 282!
Buchana 7. 498
elongata 7. 498
inconstans 7. 283!
ovulum 4. 867
pygmaea 7. 284!
socialis 6. 756!
tuberculata 7. 284!
Bulimus acutus 0. 869
calvus 4. 36
costellatus 4. 864
ellipticus 4. 864
granum 3. 21; 7. 760
heterostomus 4. 864
laevo-longus 9. 864
limnaeiformis 7. 494; 8. 494
minutus 4. 249
Nebrascensis 7 494; 8. 494
obscurus 0. 869
Osiridis 1. 764; 7. 229
politus 4. 864
Sharmani 8. 875
sublubricus 9. 116
tenuistriatus 4. 864
teres 7. 494; 8. 494
turbo 3. 21
vermiculus 7. 494; 8. 494
spp. 1. 122;* 9. 114
Bulla spp. 1. 382; 6. 750
acuminata 3. 765; 7. 510
ampulla 7. 510
attenuata 1. 715
Baylei 5. 593
Brocchii 4. 515
Clot-Beyi 1. 764; 7. 229
concinna 3. 765
conoidea 7. 510
conulus 3. 765; 7. 510
constricta 1. 716
convoluta 4. 515
cylindracea 3. 765
cypraeata 2. 164, 169, 170, 171
doliolum 3. 235
elliptica 1. 716
filosa 1. 716
Fortisi 1. 764; 4. 515
hydatis 7. 510
jugularis 7. 242
laevissima 7. 229
Lajonkaireana 3. 74, 765
lata 2. 164, 170
lignaria 3. 765
lineata 7. 53
Bulla
minor 7. 492; 8. 495
nana 3. 765
obtusa 3. 765
occidentalis 7. 492; 8. 495
olivaeformis 3. 237
ovoides 5. 593
Palassoui 5. 593
punctata 8. 740; 9. 866
Regulbiensis 3. 765
semicostata 3. 604
striata 2. 509
subcylindrica 8. 495
suprajurensis 5. 848
truncata 3. 765
undulata 3. 235; 8. 462
volvaria 7. 492; 8. 495
quadrata 3. 765
scabra 3. 765
sculpta 3. 765
ventrosa 3. 765
Bullopsis gen. 9. 498!
Tippahana 9. 498
Bumastus
gen. 1. 508!; 3. 487
Barryensis 3. 341; 7. 380; 8. 655
spp. 4. 493; 5. 249; 6. 224
Bumelia ambigua 2. 628
oblongifolia 3. 510
Oreadum 2. 754; 3. 505, 510; 4. 379; 9. 375
Pygmaeorum 3. 505; 9. 375
Bündtner-Schiefer 8 725
Bunodes gen. 9. 864
lunula 5. 865, 867!; 9. 664
rugosus 9. 864
Buntblei-Erz 0. 616
Bunterz 2. 708!
Buntkupfererz 5. 197!; 6. 191!; 7. 169!; -Lager 2. 290*
Bunte Mergel 9. 352
Bunter Sandstein 0. 355, 732; 2. 9, 536!; 3. 614, 802; 4. 123p; 5. 755p; 6. 64, 207; 7. 195, 463; 8. 202, 363 p, 445, 555, 603². 719
in Spanien 1. 38
mit Thier-Fährten 1. 512; 3. 753; 4. 858

Bunstone (Stein) 4. 121
Buprestium Bolbus 5. 747
Dardanus 5. 747
Gorgus 5. 747
Stygnus 5. 747
Taleas 5. 747
Valgus 5. 747
Woodleyi 5. 747
Buprestis
decrepitus 9. 115
Meyeri 7. 555; 9. 115
senecta 7. 555; 9. 115
xylographica 1. 759
Buria gen. 8. 623 !
rugosa 8. 623
Burlington
-Kalkstein 7. 862
Burtinia 0. 631
cocoides 2. 995
Faujasi 2. 753, 995; 9. 238
Busicon Bairdi 8. 494
Busieon gen. 9. 234
Bustam[ente]it 1. 820* 8. 701 *
Busycon gen. 9. 234
Busyeon spp. 6. 753
Buthotrephis
antiquata 2. 890
flexuosa 2. 890
gracilis 2. 890
subnodosa 2. 890
succulenta 2. 890
spp. 5. 248
Butirinus gen. 3. 118*
Butomeae fam. 5. 639
Butomus
Acheronticus 5. 639
Buxus 0. 636
arborescens 9. 348
Bysicon Blakei 7. 242
Byssanodonta gen. 6. 238
Byssoarca gen. 6. 120
cuculloides 6. 752
Kingana 4. 118, 748; 7. 637
lima 6. 752
Marylandica 6. 752
Mississippiensis 6. 752
protracta 6. 752
striata 4. 118, 748
tumida 4. 118, 748
spp. 9. 498
Byssolith 6. 11
Byssus 6. 845 !
Bythoscopus
homousius 6. 620
melanoneurus 3. 874
muscarius 3. 868, 870, 874; 6. 503
Bytownit 1. 442*; 4. 598!

C.

Cabacocrinites
sculptus 0. 376
Cabarea gen. 4. 114!
Cabocle (Mineral) 3. 598; 8. 819*
Cabomba lignitica 4. 525!
Cacona (Mineral) 8. 561
Cadmium-
Zinkspath 8. 289!
Caecum glabrum 3. 764
incurvatum 3. 764
mammillatum 3. 764
trachea 3. 764
spp. 6. 750
Caementodontae 1. 497!
Caenocrinus
tintinnabulum 9. 366
cfr. Cainocrinus
Cänolithisch 6. 634, 656
Caenotherium gen. 7. 869
commune 5. 228, 373; 9. 108
Courtoisi 5. 228
elegans 5. 228, 373
Geoffroyi 5. 373
gracile 5. 228, 373
laticurvatum 5. 228, 373
leptognathum 5. 373
leptorhynchum 5. 228
medium 5. 228
metopias 5. 228, 373
minimum 5. 228
spp. 5. 615
Caesalpinia 0. 637
ambigua 3. 506
emarginata 0. 508; 3. 506
Haidingeri 4. 380; 877
major 0. 508; 2. 761; 3. 506
Norica 3. 506, 510; 9. 376
Proserpinae 3. 506
Caespitularia 2. 123
Caillasses 3. 198
Cainocrinus gen. 4. 762
tintinnabulum 4. 762
cfr. Caenocrinus
Cainotherium
vdr. Caenotherium
Caithness-group 3. 97; 6. 112
Calamariae (ordo) 5. 240
Calamitea 0. 627
bistriata 8. 503
concentrica 8. 503
lineata 8. 503
striata 8. 503; 9 555
Calamites 0. 627; 2. 117
aequalis 5. 628; 6. 97
alternans 5. 628; 6. 97
ambiguus 2. 992
anomalus 2. 992
arenaceus 0. 666; 3. 222, 508; 4. 204, 556; 6. 618, 737; 7. 344; 8. 359[3], 759; 9. 104
Calamites
arundinaceus 2. 992
approximatus 0. 120; 1. 476, 609; 5. 628; 8. 159, 400
bambusioides 2. 992
Brongniarti 5. 628; 6. 97
cannaeformis 0. 661; 1. 476, 609; 2. 270, 890; 5. 243, 628, 712; 6. 97, 375[2]; 8. 101; 9. 131, 149
carinatus 5. 628; 6. 97
Cisti 0. 673; 1. 476; 5. 628[2]; 6. 97
columella 6. 97
communis 3. 508; 5. 628, 629; 6. 96, 97
cruciatus 1. 476; 5. 628, 6. 97
decoratus 5. 628; 8. 400
deliquescens 1. 610
difformis 5. 628
dilatatus 2. 890; 6. 97
disjunctus 8. 358
distans 2. 890
dubius 5. 628
elongatus 5. 628; 6. 97; 8. 159
equisetiformis 6 97
equisetimorphus 2. 992
fasciatus 6. 99
Germaranus 5. 628

Calamites
giganteus 8. 758
gigas 6. 97; 8. 503
Goepperti 2. 890; 2. 992; 6. 97
gracilis 2. 457
infractus 6. 97; 8. 503
interruptus 5. 628²
nodosus 1. 476; 5. 243, 628; 6. 97
obliquus 2. 890
ornatus 5. 628
pachyderma 1. 476; 5. 628; 6. 97; 7. 165
Petzholdti 5. 628
posterus 9. 9
priscus 2. 992
pseudobambusia 6. 97
ramosus 1. 476; 4. 565; 6. 97
regularis 5. 628; 6. 97
Roemeri 2. 800, 889; 5. 243; 6. 97
Steinhaueri 5. 628
Succowi 0. 120, 673; 1. 476, 608, 609; 5. 628, 712; 6. 97; 9. 849
sulcatus 6. 97
tenuifolius 5. 629; 6. 97
tenuissimus 2. 890; 6. 97
transitionis 2. 280, 800, 889; 3. 161, 622; 4. 46, 564; 5. 243; 6. 375; 9. 131
tripartitus 5. 628
undulatus 0. 673; 1. 609; 5. 628; 6. 97
varians 1. 476; 5. 628; 6. 97
variolatus 2. 890
verticillatus 5. 628
Volkmanni 3. 121
Voltzi 2. 890; 9. 131
Zignoanus 2. 992
spp. 3. 511; 4. 33, 743; 9. 379, 380
Calamophyllia
gen. 0. 758; 2. 117*
articulosa 0. 759
dichotoma 0. 759
Edwardsi 0. 760
fastigiata 3. 718
Taxoënsis 1. 102
fenestrata 4. 868
flabellum 0. 759
funiculus 0. 760
Calamophyllia
gracilis 0. 760
Guettardi 0. 760
laevis 0. 759
Moreausiaca 0. 760
multicincta 4. 868
pseudostylina 0. 759
striata 0. 759
subdichotoma 0. 759
spp. 2. 758
Calamopitys gen. 6. 628!
Saturni 5. 240; 6. 626
Calamopora 2. 120*
aspera 8. 264, 594
Costana 7. 233
cristata 8. 264
fibrosa 2. 115; 8. 265, 754
Gothlandica 1. 225; 2. 108, 193, 341; 5. 853 ff.; 7. 456; 8. 264; 63², 222
Hisingeri 8. 265
infundibuliformis 2. 120
Mackrothi 4. 119, 744; 5. 498
polymorpha 0. 731; 1. 225; 2. 108, 193, 341; 6. 209; 7. 386, 455 ff.; 8. 264; 9. 159
ponderosa 7. 233
ramosa 6. 375
spongites 0. 731; 2. 108, 120, 103, 341; 3. 42; 6. 375; 7. 104, 386
Calamopteris gen. 6. 627!
debilis 5. 240; 6. 626
Calamosyrinx
gen. 0. 638; 6. 627!
devonica 5. 240; 6. 626
Zwickawiensis 5. 631
Calamoxyleae fam. 5. 240
Calamoxylon 0. 630
Calathocrinus
digitatus 6. 746; 8. 763*
Calcaire à Astarte 3. 483
à Belemnites 6. 457
à chailles 8. 487*
à entroques 0. 158, 182; 7. 206
à Gryphées arquées 0. 145; 9. 94
à polypiers 0. 158, 182; 8. 725
de Beauce 2. 882; 7. 503p
Calcaire de Givet 7. 219
de Ranville 0. 160!
de Visé 7. 219
épi-astartien 4. 353!
épi-ptérocérien 4. 353!
épi-virgulien 4. 353!
grossier 2. 882; 7. 503p; 9. 228, 229
hypo-astartien 4. 353!
hypo-ptérocérien 4. 353!
hypo-virgulien 4. 353!
laedonien 0. 158, 182
noduleux 4. 108
pisolithique 7. 732!
Calcare
ammonitifero rosso 0. 734, 738; 6. 208
rosso ammonitico 3. 456
salino 4. 456; 6. 216, 749
screziato 7. 598
Calcareous
grit 8. 487!, 582
Calcarina gen. 5. 751, 755
Calceocrinus gen. 5. 251!
spp. 5. 248
Calceola
Gothlandica 6. 798
heteroclyta 6. 373
sandalina 0. 225, 372; 1. 225, 226; 2. 192; 3. 817; 4. 61, 504; 5. 321; 6. 209², 508; 7. 57, 456
Tennesseensis 6. 798
-Schiefer 1. 224; 3. 812, 817; 5. 49, 322; 6. 209!, 255, 7. 457
-Schichten 6. 368, 369
Calceolidae
fam. 4. 61!, 504
Calchihuitl
(Mineral) 8. 560!
Calciferous
Sandstone 9. 341
Calcit (Kalzit) 2 515 ff.; 7. 69
Calcoferrit 8. 287!
Caledonit 2. 852!
Calix gen. 3. 103!
Sedgwicki 3. 102
Callantica gen. 5. 126
Callidina
hexodon 0. 250
octodon 0. 250
rediviva 0. 250
tetraodon 0. 250

Callianassa
antiqua 0. 299, 367, 728
Danai 7. 864; 8. 494
Faujasi 0. 367; 5. 86, 127; 9. 494
sp. 1. 382
Callipteris Carroni 7. 113
conferta 7. 630; 8. 758
Goepperti 7. 113
heteromorpha 7. 113
Wangenheimi 7. 113
spp. 5. 353; 9. 379, 380
Callistemon
eocaenicum 9. 375
Callistemophyllum
diosmoides 4. 380, 877; 9. 375
melaleucaeforme 4. 380, 877
speciosum 4. 380
verum 4. 380; 9. 375
Callitris
Brongniarti 0. 114; 6. 502; 8. 712
Saviana 8. 501
Callitrites 0. 632
Brongniarti 3. 47; 4. 378, 491
manicatus 3. 746
Callitroxylon
Aykei 1. 102
Callocystites
gen. 5. 251 !
Jewetti 5. 248. 252
spp. 9. 236
Callopterus
spp. 4. 382
Callovien 8. 484, 582, 726
Calloxylon
Hartigi 1. 102
Calophyllia
Stockesi 8. 873
Calophyllum
Donatianum 4. 744
phragmoceras 9. 222²
spinosum 6. 114
Calopora
gen. 1. 766 !
aspera 1. 766
elegantula 1. 766
florida 1. 766
laminata 1. 766
nummiformis 1. 766
spp. 5. 248
Calopteris 0. 628
dubia 6. 98
Calopteryx
lithographica 8. 623
Calotermes
gen. 6. 623; 8. 374
affinis 6 621
Berendti 6. 621
Calycanthus 0. 637
Calydonius
tener 7. 248, 249
trux 7. 248, 249
spp. 8. 233
Calymene gen. 0. 778 !, 785, 1. 507 !; 3. 487; 6. 224
aequalis 6. 370
Arago 5. 98; 6. 500; 7. 638; 8. 870
Baylei 6. 116
Beaumonti 3. 489
bellatula 5. 853
Blumenbachi 2. 581, 585, 982; 3. 341; 6. 116, 370, 797, 813; 7. 381²; 8. 594, 855; 9. 66, 121
brevicapitata 6. 116; 9. 121
Brongniarti 6 370
clavifrons 4. 501
concinna 8. 270, 704
Downingiae 4. 500
furcata 6. 625
granulata 6. 370
hydrocephalus 6. 370
laevis 1. 507; 6. 370, 625
Latreillei 6. 370
macrophthalma 0. 277; 4. 500
marginata 6. 625
Odini 4. 501; 5. 852
parvifrons 6. 116
polytoma 6. 803
pulchra 6. 500; 7. 638
punctata 1. 255; 4. 501; 5. 872
rugosa 6. 736
Salteri 3. 102
Schlotheimi 6. 370
sclerops 4. 501
senaria 2. 981, 982
speciosa 4. 501
Sternbergi 6. 370
subdiademata 6. 116
Tarnemini 3. 102
Tristani 0. 99; 1. 65, 68; 2. 581, 585;
Calymene Tristani 5. 98; 6. 500; 8. 842; 870
transiens 6. 500
tuberculosa 6. 116; 7. 381
variolaris 1. 255; 4. 501
Verneuili 3. 102
spp. 2. 242; 4. 493; 5. 248
Calymenidae fam. 4. 493
Calymma s. Kalymma
Calymmene cfr. Calymene
Calyptraea
antiqua 7. 637
Chinensis 2. 43; 3. 765; 7. 783; 9. 839
costata 2. 510
deformis 2. 43; 3. 74; 9. 839
depressa 2. 43; 5. 796; 9. 839
Italica 2. 43
muricata 1. 741
squamata 1. 741
striatella 0. 862
trochiformis 1. 101
spp. 6. 750
Calyptraeophorus
gen. 9. 234
trinodiferus 9. 234
velatus 9. 234
Camarophoria vdr. Camerophoria
Camarocystites
gen. 9. 636
punctatus 9. 636
Cambrian series of rocks 3. 97 !; 6. 112
Cambrien 1. 104
Cambrische
Formation 7. 238 gp., 239 p.
System 4. 486 !; 6. 111
Schichten-Folge 9. 105
Camelii 0. 868
Camelopardalis
gen. 7. 867, 869
Attica 7. 370
Biturigum 5. 227
Duvernoyi 7. 370
spp. 4. 637; 5. 375
Camelops
Cans[as]anus 7. 375 !; 8. 376
Camelus gen. 7. 867, 869
spp. 6. 381; 8. 509

Cameroceras gen. 6. 126!
Trentonense 5. 266*
Camerophoria
Geinitzana 4. 119; 8. 727
globulina 4. 504; 6. 117; 7. 223, 381, 382, 637
Humbletonensis 7. 637
isorhyncha 6. 117
laticliva 6. 117
multiplicata 4. 504, 746; 7. 223, 381, 382
Schlotheimi 4. 60, 119, 504, 746; 5. 874; 6. 117, 7. 223, 382, 637; 8. 727; 9. 761
sulcirostris 6. 117
superstes 7. 382
Campagnole de Kirkdale 6. 489
Campanulites
tessellatus 0. 376
Camphora
polymorpha 9. 503
Campocaris
vdr. Kampecaris
Campinien (terrain) 4. 89
Campophyllum 2. 121*
torquium 9. 850
spp. 2. 990; 4. 497
Camptopteris 0. 628
Nilssoni 6. 253
Campulites
gen. 4. 853; 6. 126!
Campylacea spp. 8. 507
Campylaea inflexa 6. 604
Campyloceras gen. 6. 126!
Gesneri 6. 122
Campylodiscus
clypeus 0. 491; 4. 739
Cancellaria
acutangula 3. 74.
acutangularis 8. 635
Bellardii 8. 635²
calcarata 8. 635
callosa 4. 760
cancellata 2. 43; 8. 635
cassidea 3. 45
contorta 3. 74; 4. 760; 8. 635
coronata 3. 763; 7. 509
costellifera 3. 764
Dufouri 3. 74
elongata 1. 712; 3. 45; 8. 635
evulsa 1. 716; 8. 635²
Geslini 3. 74
gradata 4. 760
Cancellaria
granulata 8. 635
hirta 4. 515
imbricata 4. 760
laevicosta 3. 763
laeviuscula 3. 764; 8. 635
lyrata 8. 635
minuta 8. 635
mitraeformis 3. 764
muricata 1. 712
Neugeboreni 7. 420
Nysti 4. 760; 8. 635
Partschi 4. 760
pusilla 8. 635
quadrata 1. 716; 8. 635
reticulata 2 509
scalaroides 7. 509
scrobiculata 4. 760
subangulosa 3. 764; 8. 635
subcancellata 3. 74
torquilla 3. 635; 4. 875
trochlearis 3. 74
turricula 3. 74
varicosa 8. 635
spp. 4. 760; 6. 479; 6. 750
Cancer Bosci 2. 302; 4. 572; 7. 154
bullatus 2. 303
Bruckmanni 2. 166, 170; 3. 85
Desmaresti 2. 166, 170
hispidiformis 0. 100; 2. 302; 9. 844
Klipsteini 2. 166, 170
Kressenbergensis 4. 538
Leachi 0. 121
macrodactylus 4. 572; 7. 154
pachychelus 4. 572; 7. 154
Paulino-Württembergensis 7. 229
punctulatus 2. 302; 4. 58, 572; 7. 154
quadrilobatus 4. 58
Seguierei 4. 572; 7. 154
Sismondai 4. 572; 7. 154
tridentatus 4. 57!, 538
verrucosus 2. 166, 170, 171, 296, 298, 302; 3. 315
Cancrinit 4. 453; 5. 73,* 447!; 8. 319!
Canda gen. spp. 4. 114!
Candeina gen. 5. 755; 7. 505
Candona candida 7. 503
Forbesi 7. 503
lucens 3. 768
reptans 3. 768; 7. 503
Richardsoni 7. 503
subaequalis 7. 503
torosa 3. 768; 7. 503
Cangagua-Thonsandstein 3. 563
(-Erde) 4. 727
Caninia 2. 121
gigantea 6. 114
ibicina 7. 373², 374
lata 6. 114
Lonsdalei 7. 373
subibicina 3. 238; 6. 114
turbinata 6. 114
spp. 5. 248
Canis
Borbonicus 5. 229, 372
brevirostris 5. 229, 372
dirus 9. 246!
familiaris 2. 998; 5. 229
giganteus 5. 372
gypsorum 5. 229
Haydeni 9. 246!
Isiodorensis 5. 229, 372
lagopus 5. 229
lupus 2. 998; 5. 229, 624, 736; 6. 491; 7. 234, 759; 9. 100, 862
megamastoides 5. 229, 372
meridionalis 9. 862
Neschersensis 5. 229, 372
occidentalis 6. 109
Parisiensis 2. 759; 5. 229
primigenius 4. 638
primaevus 6. 109; 7. 375!; 9. 246*
saevus 9. 246
spelaeus 4. 473; 5. 372, 624
temerarius 9. 246!
vafer 9. 246!
viverroides 4. 85; 5. 229
vulpes 5. 229, 372, 624; 6. 574; 9. 100, 862
vulpinarius 4. 473; 5. 624
spp. 8. 510; 3. 377 ff
Cannel-Kohle 4. 636; 8. 852!
Cannophyllites 0. 631
Nilssoni 2. 993
Virleti 2. 993

Cannophyllites
Vrieseanus 3. 434; 4. 630
spp. 9. 380
Cannapora gen. 8. 263
junciformis 5. 248, 249
Cannopora placenta 7. 386
Cantonit 9. 196!
Canthidium 9. 634
Caphyra gen. 9. 358!
radians 4. 502; 9. 358!
Capitodus gen. 3. 123
Capitosaurus 0. 754!
fronto 8. 556
nasutus 8. 555*
robustus 5. 757
spp. 5. 756
Caporcianit 6. 844!; 7. 600;
Capparis 0. 635
Capra Amalthea 4. 639; 5. 375; 7. 235, 370, 759
Cebennarum 5. 227
Rozeti 2. 453; 5. 227,
Capreolus gen. spp. 5. 227
Cusanus 5. 373
furcifer 5. 373
leptocerus 5. 373
platycerus 5. 373
Solilacus 5. 373
Caprina
gen. 3. 239!, 240
adversa 7. 204
Aigilloni 4. 869; 3. 718
Coquandana 3. 718
crassifibra 0. 102
occidendalis 6. 480
paradoxa 0. 366
Partschi 0. 366; 5. 87
planata 6. 480
Quadalupae 0. 102
quadrata 6. 480
quadri-oculata 1. 603
Texana 0. 102
triangularis 7. 204
Caprinella
gen. 3. 240!; 5. 377, 378*
coralloidea 7. 864; 8. 495
triangularis 5. 592
spp. 6. 481
Caprinidae fam. 3. 239!
Caprinula
gen. 3. 240!; 5. 377, 378*
Caprotina
gen. 3. 240; 5. 378
ammonia 0. 735; 3. 166, 328, 329; 4. 250, 312; 5. 473; 7. 481
costata 1. 742
Lonsdalei 9. 466, 857
quadripartita 5. 377*
semistriata 1. 742
-Kalk 3. 166!; 4. 250
Capsa discrepans 6. 859
elegans 6. 859
spp. 6. 860; 8. 616
Capulus gen. 7. 761
acutirostris 7. 863
acutissimus 7. 762, 763; 8. 753
acutus 7. 762, 763; 8. 753
adroceras 3. 230
Americanus 6. 230
angulatus 7. 763
auricularis 7. 762
auriculatus 6. 120
Bischofi 7. 762, 763; 8. 753
Brauni 7. 763
cassideus 6. 500; 7. 762
compressus 6. 500; 7. 763
consobrinus 1. 101
contortus 7. 762, 763; 8. 753
corpuratus 3. 230
De la Hayei 3. 102
disjunctus 7. 762, 763; 8. 753
Dumontanus 3. 230
elongatus 3. 230
Ermani 7. 762
euomphaloides 3. 230, 232; 6. 120; 7. 762
fallax 3. 765
flexicostatus 3. 230
fragilis 7. 492; 8. 494
gracilis 6. 372; 7. 763
Haliotis 3. 102; 6. 120; 7. 762, 763; 8. 753
hecticus 3. 230
Hericarti 3. 102
Hungaricus 2. 43; 3. 756
lineatus 7. 763
militaris 3. 765
monoplectus 7. 763
multiplicatus 7. 762, 763; 8. 753
naticoides 7. 762, 763;
neritoides 7. 763
Capulus
obliquus 3. 765
occidentalis 7. 864; 8. 494
ornatissimus 1. 101
priscus 2. 340; 7. 763
psittacinus 6. 372; 7. 763
pustulosus 9. 499
quadrilobus 7. 763
rectus 3. 230
rhynchoides 3. 230
Selcanus 7. 762 763; 8. 753
substriatus 7. 762, 763
sulcatus 7. 763
trigonus 7. 763
trilobus 7. 763
trochleatus 7. 763
tubifer 3. 230
uncinatus 7. 763; 8. 753
vetustus 7. 762, 763; 8. 753
virginis 7. 762, 763; 8. 753
Zinkeni 7. 762, 763; 8. 753
spp. 6. 750
Carabidium
Dejeani 5. 747
Carabites
anthracinus 2. 984
Caradoc-group 3. 97; 6. 112
-Sandstone 1. 104; 4. 487, 488!
Carangodes
gen. 6. 481!
cephalus 6. 481!
Carangopsis analis 5. 380
dorsalis 5. 380
latior 5. 380
maximus 5. 380
Caranto (Gestein) 8. 88
Caranx
ovalis 3 683; 4. 734
rigidicaudus 3. 683; 4. 734
Caratomus avellana 8. 873
pulvinatus 7. 785
Carbonate
(Diamant) 7. 64, 328!
(Mineral-Art) 3. 597
Carbonicola gen. 6. 228
acuta 6. 120
robusta 6. 120
subconstricta 6. 120

Carbonicola
turgida 6. 120
Carboniférien 1. 104
Carboniferous
limestone 8. 97, 101
strata 6. 112
Carbonites
crypticus 3. 535; 5. 841
diamesus 6. 38
dimerus 3. 535
hystaticus 3. 535 !
Carcharias
heterodon 9. 844
megalodon 1. 747
2. 1001 !; 4. 515
medius 6. 758
polygyrus 4. 515
productus 4. 515
tenuis 8 382
turgidens [?] 4. 515
Carcharodon
acutidens 0. 868
angustidens 0. 868;
1. 254; 2. 166,
2. 1000; 8. 869
auriculatus 0. 868;
1. 183
crassidens 2. 999
crassus 2. 166, 170
disauris 5. 234
Escheri 2. 166
heterodon 0. 868; 2. 1000
Interamniae 1. 183
lanceolatus 0. 868
lanciformis 0. 868
latissimus 1. 183
leptodon 0. 746; 2. 166
megalodon 0. 868;
1. 183; 2. 508, 999;
3. 370; 5. 234;
6. 93, 101, 739;
8. 869; 9. 748
megalotis 0. 868
Mortoni 0. 868
polygyrus 2. 999; 3. 370;
6 93, 739
productus 1. 183; 2. 1000
rectidens 0. 868; 1. 183
rectus 7. 243 !
semiserratus 0. 868
subauriculatus 0. 868
subauritus 1. 183
sulcidens 0. 868
Toliapicus 0. 868
tumidissimus 1. 183
turgidus 0. 868
Carcinurus gen. 0. 575
Carcinium gen. 3. 379 !
sociale 1. 511
Cardiaster
Ananchytis 7. 787
pilula 7. 859
punctatus 7. 859
pygmaeus 3. 380
Cardilia
spp. 6. 858; 7. 632
Cardinia gen. 6. 870
abbreviata 6. 870
abducta 6. 871
acuta 6. 870
Agassizi 6. 870
Anglica 6. 648, 870
angulata 3. 230
angustata 6. 495, 870
angustiplexa 4. 850;
7. 210
Aptychus 6. 870
aquilina 5. 875; 6. 870
atrata 3. 230; 5. 628
Bartlingi 7. 627
carbonaria 6. 870
carinata 6. 256; 7. 627
centralis 6. 870
colliculus 3. 230
complanata 6. 648, 870
compressa 6. 647
concinna 0. 146, 180;
4. 205, 851; 6. 71,
454, 495, 870;
7. 93; 8. 226, 643
copides 3. 231; 4. 851
cordata 8. 766
crassissima 6. 871
crassistria 6. 648
crassiuscula 4. 851;
7. 210; 8. 643
Deshayesi 6. 495
Desoudini 6. 495
donaciformis 6. 870
dorsata 6. 647
Dunkeri 4. 851; 7. 210
Eichwaldana 6. 870
elegans 6. 648
elliptica 6. 648, 870
elongata 3. 348; 6. 454,
870, 871; 7. 210
exigua 6. 495; 7. 210
Eveni 6. 495
Fischeri 6 495; 7. 210
Freysteini 5. 628
gibba 4. 851
Goldfussana 0. 243;
5. 628; 6. 373, 626,
647
Cardinia
Goldfussi 6. 870
Hamiltonensis 6. 870
Heberti 6. 871
Hennocquei 6. 495
hians 3. 230
Hullosana 3. 230
hybrida 4. 851; 6. 71,
217, 454, 871;
7. 211; 8. 226
imbricata 7. 211
inflata 6. 256, 870
interrupta 4. 846
Konincki 4. 851
laevigata 6. 647
laevis 6. 871
lamellosa 4. 851; 6. 870
laminata 6. 870
lanceolata 6. 870
Lebruni 6. 870
Listeri 4. 851; 6. 742,
870; 7. 210; 8. 583,
643, 766
macilenta 3. 231
minor 6. 495, 870
Morrisi 6. 495
Münsteri 6. 870
nana 6. 870
Nilssoni 4. 851; 7. 210
nucularis 3. 230
oblonga 6. 871
ovaliformis 6. 648
ovalis 3. 230; 6. 870
ovata 6. 646, 870
phaseolus 6. 870
Philea 6. 871
porrecta 4. 851; 7. 210
problematica 8. 124, 125
regularis 6. 495
robusta 6. 870
Roemeri 6. 647
salebrosa 3. 231
salvata 6. 217
scapha 6. 495; 7. 210
Scherpenzeelana 3. 230
securiformis 0. 180;
6. 871
similis 4. 851; 6. 495
striata 6. 647
striatula 6. 646
subaequilateralis 4. 851
subangulata 8. 766
subconstricta 6. 870;
7. 220
subcuneata 8. 349
sublaevis 6. 648, 870
subparallela 6. 870

Cardinia
sulcata 6. 871; 7. 210
tellinaria 3. 231; 5. 628; 6. 870
Toilliezana 3. 230
trapezoidalis 6. 256
umbonata 6. 870
uncinata 3. 230
Ungeri 6. 647, 871
uniformis 6. 870
unioides 4. 851
Veslonensis 6. 871
vetusta 6. 256, 870; 7. 628
spp. 1. 382; 6. 228, 870
-Schichten 8. 583; 9. 94
Cardiocarpum
gen. 8. 627 !
acutum 5. 631; 8. 626², 627
apiculatum 8. 626
cicatricatum 8. 626, 627
cordiforme 8. 626
emarginatum 5. 243; 8. 626, 628
gibberosum 8. 503
Gutbieri 8. 626
Künsbergi 5. 243; 8. 626
majus 8. 626
marginatum 8. 201, 626²; 9. 149
operculatum 8. 626
orbiculare 3. 121; 8. 628
Ottonis 8. 503
ovatum 5. 631; 8. 626
Pomieri 8. 626
punctatum 8. 626
punctulatum 2. 891
reniforme 8. 503
spp. 0. 629; 1. 477; 8. 504; 9. 379, 381
Cardiodon gen. 5. 238
Cardiodonta gen. 3. 213 !
Cardiola articulata 6. 373
concentrica 6. 373
elegans 6. 865
interrupta 6. 869
cornu-copiae 6. 120
duplicata 6. 373
fibrosa 6. 120
interrupta 0. 523, 731; 1. 65; 5. 96, 98, 5. 322; 6. 120, 469
retrostriata 2. 276; 3. 523; 4. 454; 6. 373; 7. 457
Salteri 9. 222
Cardiola spp. 6. 865
-Schiefer 1. 66
Cardiomorpha
gen. 6. 643, 865, 866
alata 6. 372
compressa 6. 644
elliptica 6. 648
flexuosa 6. 256
Kansasensis 8. 766
lamellosa 6. 866
minuta 5. 875; 7. 374
modioliformis 3. 127; 4. 119, 749; 6. 120; 7. 637
oblonga 6. 120
obsoleta 6. 648
orbicularis 3. 760; 6. 120
ovata 6. 648
pleuromorphiformis 5. 498
pristina 6. 647
pygmaea 6. 647
radiata 6. 866
rhomboidea 8. 766
scalaris 6. 644
similis 3. 319
striata 6. 647, 866
suborbicularis 6. 372
sulcata 6. 866
tenuistriata 6. 649
tellinaria 6. 626
vetusta 6. 642, 643; 9. 755
spp. 6. 856, 866
Cardita gen. 6. 869
aculeata 6. 870
acuticostata 3 605; 7. 227
ajar 6. 870
analis 4. 505
angulata 6. 864
angusticostata 3. 602; 6. 870
antiquata 6. 870²
Archiaci 6. 869
Ardouini 3. 369; 6. 93, 739
asperula 3. 605
Austriaca 9. 629
Bajocensis 6. 869
Barrandei 3. 605
Basteroti 6. 870
borealis 6. 870
Brocchii 6. 870
calyculata 2. 43; 6. 870
cardissoides 6. 868
Cardita
chamaeformis 2. 359; 4. 505
clathrata 6. 869
Conradi 6. 869
corbis 4. 505
Cottaldina 6. 869
crassa 6. 870
crassicosta 6. 870
crenata 1. 141, 412; 2. 287, 288; 3. 167, 308, 319; 4. 204, 555, 830, 835; 5. 219; 6. 218², 361; 7. 616, 617, 694; 8 4²; 9. 753
cretacea 6. 869
decussata 3. 605; 6. 869; 7. 695
densata [?] 6. 229
dentata 6. 870
depressa 6. 868
Duboisi 6. 870
Dunkeri 4. 505; 9. 125
Dupinana 6. 869
elegans 1. 141, 419; 6. 869
elegantula 6. 869
elongata 6. 870
Esmarcki 3. 231
Etrusca 6. 870
exigua 4. 505
Forbesi 6. 870
Freisteini 8. 201
Geinitzi 6. 869²
Gervillei 6. 870
Goldfussi 0. 293, 297; 6. 869²
granulata 6. 869
haliotoidea 6. 869
Hebertana 1. 101
Heberti 6. 495; 7. 210; 8. 643
Hoeninghausi 6. 868
imbricata 3. 605
intermedia 6. 870³
interrupta 6. 869
Jouanneti 3. 74; 6. 870; 7. 204
Kayei 6. 870
lineata 5. 246
lunulata 1. 486; 4. 766; 6. 868²
minuta 4. 505
modiolus 3. 231; 6. 870
Moreana 6. 869
Mülleri 6. 869

Cardita
multicostata 7. 229
Murchisoni 3. 126, 128, 772, 776; 4. 118, 489, 749; 6. 869, 7. 637
nuculina 4. 505
occidentalis 6. 480
orbicularis 4. 505; 6. 534, 870²
ornata 5. 246
pectinata 6. 870
Perezi 3. 605
pinnula 3. 74; 6. 870
planicosta 0. 724; 3. 189; 6. 870; 7. 241, 242
plicata 6. 869
plicatilis 6. 869
producta 6. 870
rotundata 6. 870
rugosa 6. 869
scalaris 4. 505
senilis 4. 505; 6. 870
similis 6. 868²; 7. 743
sinuata 6. 870
squamulosa 4. 505; 6. 870
striata 2. 230; 6 869
strigilata 6. 869
Suessonensis 6. 870
sulcata 6. 870²
tenuicosta 6. 869³
tenuis 6. 869
terminalis 6. 869
Terquemi 6. 869
tetragona 6. 495
trapezia 5. 796; 6. 870
trigoniaeformis 6. 869
tuberculata 4. 505; 6. 866
unidentata 6. 870
Valenciennesi 0. 481
variabilis 9. 750
Y-costata 7. 743
spp. 1. 382; 2. 977; 6. 869; 7. 623
-Schichten 6. 662; 7. 617, 691; 9. 753
Carditen-Kalk (des Zechsteins) 3. 775
Cardium gen. 6. 865
absconditum 6. 867
acardo 8. 875
aculeatum 5. 595; 6. 867; 7. 510
acuti-costatum 6. 867
aequistriatum 8. 873
alaeforme } 0 465;
aliforme } 6. 372, 866
alternans 6. 866
alternatum 6. 866
alveolatum 6. 867
ambiguum 3. 74
amplum 8. 875
anguliferum 6. 373
angulosum 6. 867
angustanum 4. 505
angustatum 4 505
anomalum 6. 867
apertum 1. 361; 2. 627; 6. 867
Aralense 8. 740; 9. 866
arcuatum 4. 505; 6. 865
Arkansense 6. 480
asperatum 6. 866
asperulum 6. 866
asperum 6. 866
Atacense 5. 592
Austriacum 6. 867; 7. 94; 9. 629
aviculare 6. 866
Balticum 4. 505
Bannesianum 4. 355
Basteroti 6. 867
Bavaricum 6. 866
Beani 6. 866
Beaumonti 4. 766
Becksi 0. 297
bifrons 4. 869
bispinosum 6. 866
Bonellii 3. 605
Brauni 6. 865
brevialatum 6. 372, 867
Buckmani 4. 766
Bruguierei 6. 866
Burdigalinum 3. 74; 6. 867; 9. 839
Buvignieri 6. 866
calcitrapoides 6. 870
carinatum 6. 867; 8. 874
carpomorphum 6. 865
caudatum 3. 231
ciliare 6. 867²
cingulatum 4. 514; 6. 867²; 9. 125
citrinoideum 4. 621; 6. 866
clathratum 6. 865
Clery 6 867
cloacinum 7. 93, 94; 8. 353²; 9. 452 ff.
Clodiense 4. 505; 6. 867
cognatum 0. 723; 1. 486; 2. 230; 6. 866²
Collegnoi 6. 218, 866
comptum 6. 866
concentricum 6. 866
concinnum 4. 766; 6. 866
conjungens 1. 361; 4. 514
Conniacum 8. 874
corallinum 7. 755
Corbierense 5. 592
corbuloides 8. 875
cordiforme 2. 230
cornucopiae 2. 287, 288; 3. 310
cornutum 6. 867
crassatellatum 8. 875
crassum 6. 592, 867
crenulatum 4. 505
Cyprium 6. 867
cyreniforme 6. 866
decorticatum 4. 505
decussatum 6. 866, 866²
defectum 6. 866
Demidoffi 8. 875
denticulatum 7. 369
depressum 8. 874
Deshayesi 2. 43; 6. 716, 867²; 8. 861
devonicum 6. 865
dilatatum 6. 865
dimidiatum 6. 500
discors 3. 605
discrepans 2. 43; 4. 505; 6. 867
dissimile 0. 174; 3. 814; 4. 621; 6. 866³; 8. 488
dubium 6. 867
Dutempleanum 1. 101
echinatum 1. 483, 624; 2. 43; 3. 756; 4. 505; 6. 867
echinulatum 6. 867
edentulum 8. 875
edule 0. 721; 1. 483, 621 ff.; 2. 43, 194; 4. 36, 196, 505; 5. 607. 954; 6. 593, 730, 867²; 7. 180, 236, 611; 8. 595; 9. 260
eduliforme 5. 848
edulinum 4. 505; 6. 867
Eduardi 8. 875

Cardium
eduliforme 6. 866²
Eichwaldi 4. 505; 6. 867
elegans 6. 865, 867
elegantulum 0. 102; 6. 867, 869
elongatum 2. 218; 4. 505; 6. 866
emarginatum 6. 806; 8. 874
erinaceum 6. 867
Erosne 6. 218; 6. 866
exiguum 6. 866, 867
Faujasi 6. 866
Fittoni 8. 875
Forbesi 6. 870
fragile 4. 505; 6. 866, 867
friabile 2. 765
Galloprovinciale 6. 864
Gentianum 6. 866
gigas 3. 605; 6. 867
glabrum 6. 865
glaucum 4. 505
globosum 6. 866²
Goldfussi 6. 866
gracile 0. 523, 731; 6. 865
granulatum 2. 230
granulosum 5. 475; 6. 740
gratum 3. 605; 6. 866
Groenlandicum 4. 505; 6. 867
Gurieffi 8. 875
guttiferum 6. 866
Haldeni 6. 866
Haitense 6. 867
Halli 6. 865
Hausmanni 6. 867
hemicyclicum 6. 480
hians 2. 43; 3. 74; 5. 594, 595; 6. 867; 8. 584
Hibernicum 2. 108; 6. 866
Hillanum 0. 102, 397; 2. 186; 4. 167, 869; 6. 866²; 8. 474; 9. 202
hippopaeum 0. 860
hirsutum 6. 867
Hugardi 3. 103
Hulli 8. 357
Huoti 6. 867
hybridum 6. 866
inaequicostatum 6. 866
incertum 1. 486; 2. 107, 230; 4. 766; 6. 865, 867²; 8. 875
Cardium Indicum 6. 867
inflatum 6. 866²
intercostatum 6. 866²
intermedium 6. 866, 867;
interruptum 4. 505
intextum 6. 866
irregulare 4. 514; 6. 866
jugatum 2. 765
Kayei 6. 870
Kloedeni 6. 866²
Koninckı 6. 866²
Kübecki 9. 839
laevigatum 2. 230; 6. 867
Lamarcki 4. 505
lamellosum 6. 866
latisulcatum 6. 867
latum 6. 865
lene 6. 230
linteum 7. 242
Lipoldi 8 585, 587²
lithopodolicum 6. 867
litorale 9. 861
lobatum 6 866
loricatum 6. 645
Lotharingicum 8. 488
lucerna 3. 231
lunatum 6. 866
Lyelli 6. 372
macrodon 8. 875
Madridi 1. 486; 2. 230; 4. 766
magnum 6. 867
marginatum 6. 865
Marquarti 0. 297
Marticense 6. 866
Michelottii 6. 867
minax 6. 866
minimum 6. 867
minutum 4. 766; 6. 866,
modestum 7. 241
modiolaeforme 6. 866
modioloides 3. 605
Monodacna 6. 867
Moutonanum 6. 206, 866
mucronatum 4. 505
multicosta 6. 865
multicostatum 2. 43; 4. 659; 5. 594; 6. 866², 867²; 9. 20
multistriatum 7. 623
Murchisoni 6. 865
Münsteri 6. 865
Nicense 3. 605
Nicoleti 6. 229², 230
nitens 6. 866
nodosum 4. 505; 6. 867
nodulosum 4. 505
Cardium
Norwegicum 6. 867³
novatum 6. 866
Nysti 6. 867; 7. 854
obliquum 1. 764; 3. 605; 4. 505; 6. 867²; 7. 229
oblongum 4. 505; 6. 867²
obscurum 6. 866
Oppeli 8. 357
orbiculare 2. 159, 168, 172
Orbignyanum 9. 844
ovatum 6. 867; 8. 875
palmatum 1. 225; 3. 813, 817; 6. 373
papillosum 0. 862; 6. 867
paradoxum 6. 868
Parkinsoni 4. 505; 6. 867
parvum 6. 866
paucicostatum 6. 865, 867; 8. 875
pectinatum 4. 505; 6. 866², 867
pectunculoides 6. 373
Pedernale 0. 102
peregrinorsum 0. 480; 4. 80; 6. 866
Perezi 3. 605
pes-bovis 4. 766
Philippianum 6. 495; 7. 94, 210; 8. 354, 643; 9. 629
Philippii 6. 867
Picteti 3. 103
pisolithicum 1. 101
planicostatum 6. 865, 867; 8. 875
planum 8. 874
plicatum 2. 627; 7. 181
Plumsteadianum 6. 866
Podolicum 6. 867
Ponticum 6. 867
porulosum 1. 101, 716; 6. 866; 8. 874
problematicum 6. 625
procumbens 6. 372
productum 4. 870; 6. 866
propinquum 6. 866, 867
protractum 6. 867; 8. 875
proximum 6. 867
pseudo-cardium 2. 230
pulchellum 6. 867
punctato-striatum 2. 230
punctatum 6. 867
pusillum 6. 867
quadratum 6. 866
raricostatum 6. 865

Cardium
raristriatum 3. 605
Raulini 0. 862; 9. 136
recurvum 6. 865
Requienanum 6. 866
retrostriatum 6. 373, 866; 7. 457
Rhaeticum 4. 555; 6. 218; 7. 93, 94; 8. 352, 353; 9. 452, 629
ringens 6. 867
Ripleyense 9. 498
Rouaulti 3. 605
rostratum 6. 866²
rusticum 4. 505; 6. 593; 8. 584
Sancti-Sabae 0. 102
scabrum 4. 505; 6. 866
Scacchii 6. 867
scobinula 4. 505; 6. 533
Sedgwickii 6. 867
semialatum 6. 867
semicostatum 2. 230; 4. 766; 7. 133
semiglabrum 6. 865
semigranosum 6. 866
semigranulatum 3. 605; 8. 740; 9. 866
semigranulosum 8. 516
semipapillatum 6. 866
semistriatum 3. 605; 6. 866², 867
semisulcatum 8. 516
septiferum 6. 866
simulans 6. 867
sociale 2. 765
solitarium 2. 765
Sowerbyanum 6. 865
speciosum 2. 168; 8. 495
sphaeroideum 6. 866
Spillmani 9. 498
spinosum 4. 505
spondyloides 6. 867
squamulosum 7. 623; 8. 874
strangulatum 6. 866
striatissimum 6. 867
striatulum 6. 866, 867; 7. 94; 9. 34, 629
striatum 4. 766; 5. 98; 6. 205; 6. 865, 866²
Stricklandi 4. 766
strigilliferum 4. 505
subangulatum 6. 867
subcarinatum 8. 875
subdentatum 8. 875
Cardium
subdissimile 6. 866
subedentulum 8. 875
subemarginatum 8. 874
subgracile 6. 865
subguttiferum 5. 592
subincertum 6. 865
sublineatum 6. 867
subminutum 6. 866
submulticostatum 6. 866
subplanicostatum 8. 875
subpygmaeum 6. 648
subserrigerum 3. 74
substriatulum 6. 852; 6. 866
substriatum 6. 648
subtrigonum 4. 766; 6. 647
subtruncatum 6. 218; 6. 852
sulcatum 6. 867*
sulcatinum 6. 867; 8. 875
sulciferum 6. 866
tenue 4. 505; 6. 869
tenuicosta 6. 869
tenuistriatum 6. 865
tenuisulcatum 0. 862; 6. 533; 6. 866, 867; 8. 590
tetragonum 6. 869
Tippahanum 9. 498
transpositum 6. 866
transversale 0. 102
trigonale 6. 866
trigonoides 6. 592
trigonum 6. 867; 7. 204
triquetrum 0. 732; 3. 167; 4. 88, 204; 6. 217, 737, 738*, 865; 7. 621; 8. 1; 9. 629
truncatum 3. 319; 6. 456, 866²
tubuliferum 0. 294; 6. 866
tumidum 6. 866
turgidum 1. 715
umbonatum 6. 867
Uralicum 6. 866
vau 2. 933
ventricosum 6. 866
venustum 4. 505
Verneuili 8. 875
verrucosum 6. 866, 867
Villmariense 6. 372
Vindobonense 6. 867; 9. 854
Voltzi 6. 866
Cardium
zonatum 4. 505
des Malmsteins 8. 354
spp. 1. 382; 2. 977; 6. 599, 865; 7. 623; 8. 616; 9. 125
Carex eximia 3. 746
leporina 5. 639
Scheuchzeri 5. 638
tertiaria 5. 638
spp. 0. 503
Cargneule (Gestein) 9. 351!
Caricella polita 6. 230
subangulata 6. 230
Carmon 6. 224
Carnallit 7. 720*, 737!
Carolathin 5. 699!
Carpantholithes 0. 638
Berendti 3. 747
Carpinites 0. 633
dubius 3. 227, 747
gypsaceus 2. 894; 3. 227
macrophyllus 2. 894, 6. 633
Carpinus 0. 633
adscendens 3. 227
alnifolia 3. 227
betuloides 3. 503; 4. 252; 9. 501
Gaudini 9. 754
grandis 1. 634; 3. 503; 4. 627; 8. 740; 9. 123, 501
Heeri 8. 500
involuta 3. 227
macrophylla 3. 227
macroptera 1. 128; 2. 753; 3. 227; 9. 375, 501
Norica 1. 634
nostratum 1. 635
oblonga 2. 753; 894; 3. 227, 503; 6. 505; 9. 501
Oeningensis 0. 503; 2. 762; 3. 503; 9. 501
ostryoides 3. 227
platycarpa 6. 505
producta 6. 505, 633; 9. 375
pyramidalis 8. 501; 9. 117
vera 6. 252
spp. 3. 227

Carpolithes (-thus) 0. 630, 631, 638; 6. 235 !
acuminatus 6. 99
acutiusculus 6. 99
annularis 6. 99
arecaeformis 2. 995
avellanaeformis 0. 117
bicuspidatus 5. 631; 8. 626
Brongniarti 2. 888
cerasiformis 6. 99
clavatus 5. 631; 6. 99
clypeiformis 5. 631; 8. 504, 626
cociformis 0. 116
contractus 6. 99
copulatus 6. 99
corculum 5. 631; 6. 99 8. 626
cordatus 2. 888
costatus 6. 99
cycadinus 6. 99
disciformis 6. 99
discoideus 5. 631
discus 6. 99
dubius 5. 631; 8. 626
ellipticus 5. 631; 6. 99
euphorbioides 0. 117
excavatus 6. 99
ficiformis 8. 626
folliculus 6. 99
Gaudini 3. 506
granularis 6. 99
gregarius 1. 676
implicatus 6. 99
incertus 6. 99
juglandiformis 0. 117
Köflachanus 8. 501
lagenarius 5. 631; 6. 99; 8. 626
lenticularis 6. 99; 8. 626
lentiformis 6. 99
liasinus 6. 254²
Lindleyanus 2. 888
macropterus 6. 99
macrothelus 6. 99
Mantelli 2. 888
marginatus 5. 631; 8. 626²
Mentzelanum 5. 631
microspermus 6. 99
minimus 6. 99
morchellaeformis 5. 631; 6. 99; 8. 626
oblongus 0. 117
ovoideus 6. 99; 8. 626
Carpolithes
ovulum 1. 712, 714; 6. 235 !
placenta 6. 99
punctatissimus 0. 116
putaminifer 6. 99
pyriformis 6. 99; 8. 627
regularis 5. 631; 6. 99
reticulatus 3. 506
reticulum 6. 99
retusus 5. 631; 6. 99
rostellatus 2. 888
rugulatus 3. 506
semen-amygdalae 5. 631; 8. 626
sepelitus 6. 99
Smithae 0. 116
Sternbergi 6. 99; 8. 627
sulcatus 5. 631; 6. 99; 8. 626
sulcifer 5. 631²; 6. 99; 8. 626
tessellatus 6. 99
thalictroides 1. 712, 714; 2. 994
trilocularis 8. 626
truncatus 6. 99
umbonatus 6. 99
Websteri 2. 994
spp. 9. 379, 381
Carpolithus cfr. Carpolithes
Carrarischer Marmor 9. 742
Carrolit 3. 181 !; 4. 69; 5. 560 !; 8. 685 !
Carterodon
sulcidens 4. 864
Carya
Bilinica 3. 384; 4. 491
striata 9. 117
ventricosa 8. 749
Tusca 9. 873
Carychium
Delocrei 5. 746
minimum 0. 869; 5. 746
spp. 9. 114
Caryocrinites
globosus 0. 376
granulatus 0. 367
hexagonus 0. 376
insculptus 0. 376
meconideus 0. 376
Caryocrinus gen. 4. 235 ff.
ornatus 6. 761
spp. 5. 248; 9. 236
Caryocystites
gen. 4. 234 ff.
Davisi 6. 115
Caryocystites
granatum 4. 236 ff.; 6. 115
Litchi 4. 238
munitus 4. 238
pyriformis 4. 238
Caryophyllia
gen. 0. 758 !; 2. 117*
Basteroti 0. 759
bifrons 7. 233
bisulcata 7. 233
bithalamia 7. 233
caespitosa 0. 762
cingulata 7. 233
cyathus 7. 233
cylindrica 0. 170
dichotoma 0. 759
dolium 7. 233
fasciculata 0. 757
Faxöensis 1. 102
globularis 7. 233
gracilis 0. 760
Grumi 7. 233
lacera 0. 758
multistellata 2. 250
mutabilis 7. 233
Pantheniana 7. 233
pedata 7. 233
ponderosa 0. 759
pseudo-Calvimontii 7. 233
pseudo-cernua 7. 233
pseudo-turbinolia 7. 233
quadrifida 4. 744
reptans 0. 762
subvasiformis 7. 233
sulcata 1. 608
truncata 0. 759
Caryophyllium
plicatum 0. 760
Caryophyllus
lapideus 5. 669
Carystio 9. 742
Casseler Schichten 7. 459
Cassia 0. 637
ambigua 2. 628; 3. 506, 510; 4. 380, 491; 9. 873
Berenices 3. 506; 6. 506; 9. 376
Diones 4. 877
Feroniae 4. 380; 9. 376
Fischeri 3. 506
grandis 1. 635
hyperborea 3. 47, 510; 4. 380, 491; 9. 376, 873

Cassia
lignitum 4. 380, 491; 9. 117, 873
Memnonia 4. 491
palaeogaea 6. 506
Pannonica 4. 491
phaseolites 2. 755; 3. 506, 510; 4. 380; 9. 376
pseudo-glandulosa 4. 380
Vulcanica 3. 384
Zephyri 4. 380, 877
Cassian-Bildung 5. 317
-Formation 5. 83
-Schichten 7. 92, 94 (vgl. St.-Cassian-Sch.)
Cassida Blancheti 6. 503
Cassidaria
bicarinata 2. 163, 169
bicatenata 3. 763
carinata 2. 163, 169; 9. 844
coronata 1. 717
depressa 3. 38; 7. 53
echinophora 7. 51, 236
fasciata 6. 739
lintea 6. 753
Orbignyi 3. 604
Petersoni 6. 230
striata 1. 717; 3. 370, 604; 6. 93; 8. 740; 9. 866
subcarinata 2. 163, 169
spp. 2. 978; 4. 626; 6. 479
Cassidulina gen. 5. 755
globulosa 7. 296!
oblonga 2. 254; 7. 295!, 309
punctata 2 254
Cassidulinida (fam.) 5. 754! ff.
Cassidulus
amygdala 4. 120, 121, 499
ovalis 7. 859
Cassis
Aenaeae 2. 163; 3. 604
affinis 9. 125
Archiaci 3. 604
bicatenata 7. 236
Calantica 3. 370; 6. 739
Deshayesi 1. 764; 3. 604; 7. 229
Hodgei 6. 753
incrassata 3. 75
Cassis
Megapolitana 3. 38
Nilotica 1. 764; 7. 229
Rondeleti 7. 236
saburon 2. 43; 7. 783
subtesticulum 3. 75
sulcosa 9. 839
texta 3. 75; 7. 236
Thesei 3. 604
variabilis 6. 93, 739
spp. 2. 978; 4. 626; 6. 479
Castagnea sp. 8. 590
Castanea 0. 633
atavia 2. 894; 3. 227; 4. 627, 632; 9. 374, 502
compressa 1. 635; 3. 383
Hausmanni 6. 640
Kubinyi 3. 384; 4. 491; 9. 873
palaeo-pumila 6. 252
salinarum 1. 635; 3. 383
Castellien (étage) 9. 470
Castellinia
gen. 4. 253!; 7. 777
ambigua 4. 251
pedunculata 4. 251
Castelnaudit (-nauit) 3. 598
Castillard (Gestein) 4. 721
Castillot (Gestein) 4. 721
Castor
Atticus 4. 638; 5. 375; 7. 235, 370, 759
Cuvieri 9. 100
fiber 2. 998; 4. 860; 5. 113, 224, 371, 625
Issidorensis 5. 224, 371
Sansaniensis 5. 224
sigmodus 1. 492, 493; 2. 998; 5. 224, 371
spelaeus 5. 624; 9. 862
subpyrenaicus 5. 224
tortus 9. 247!
Trogontherium 9. 862
Viciacensis 5. 224, 371
spp. 2. 360; 8. 510
Castoroides gen. 5. 371
Ohioensis 4. 860!; 5. 113
Castoromys
sigmodus 5. 371
Casuarinia
Haidingeri 4. 378; 6. 505
strumphioides 7. 778
Sotzkiana 9. 374
Casuarinites
equisetiformis 5. 628
stellatus 5. 629; 6. 97
Cataglochis
Guettardi 5. 373
Catantostoma
clathratum 6. 610!, 372
Cataplodii, fam. 0. 866
Catawbarit 9. 747*
Catenaria gen. 4. 414!
Catenaridae (fam.) 4. 113!
Catenicella gen. 4. 114!, 115
Catenipora 2. 120
distans 8. 594
escharoides 3. 344; 8. 265, 855
exilis 5. 853
labyrinthica 5. 854; 7. 386
spp. 5. 248
Cateniporen-Kalke 7. 729
Catillocrinites
Tennesseae 0. 376
Catillus Cuvieri 6. 217
Catopterus gracilis 3. 744; 7. 87, 88
macrurus 3. 744; 7. 88
Catopygus carinatus 1. 742; 7. 747
depressus 7. 748
Gresslyi 4. 647!
spp. 9. 123
Caturini, fam. 9. 766
Caturus gen. 3. 117*
spp. 4. 382; 9. 764
Caulerpites 0. 626
bipinnatus 2. 991
Brardi 2. 991
brevifolius 2. 991
Bucklandanus 2. 991
candelabrum 2. 991
colubrinus 2. 991
crenulatus 2. 991
dichotomus 2. 991
Diesingi 2. 991; 8. 640
distans 2. 991
elegans 2. 991
Eseri 2. 991
expansus 2. 991; 6. 254
filiformis 2. 991
frumentarius 2. 991
Goepperti 2. 991
heterophyllus 2. 991
hypnoides 2. 991
intermedius 2. 991
laxus 2. 991.
longirameus 2. 991

Caulerpites
lycopodioides 2. 991; 4. 743
Nilssonanus 2. 991
ocreatus 2. 991; 3. 242
Orbignyanus 2. 991
patens 2. 991
pectinatus 2. 991
Preslanus 2. 991
princeps 2. 991
pteroides 2. 991
pyramidalis 2. 991
Schlotheimi 2. 991
selaginoides 2. 991; 4. 743
sertularia 2. 991
sphaericus 2. 991
spicaeformis 2. 991
tenuis 8. 640
thujaeformis 2. 991
Cauliculata (Coralliaria) 2. 122*
Caulinites 0. 631
ambiguus 2. 993
articulatus 2. 993; 4. 378, 877
brevis 8. 333
Brongniarti 2. 993
calamoides 2. 894; 3. 225; 8. 332
Caluti 7. 776
Cymodoceites 2. 993
Desmaresti 2. 993
grandis 2. 993
herbaceus 2. 993
indeterminatus 1. 634; 2. 993
laevis 2. 894; 3. 225
loipopitys 7. 776
Michelini 2. 993
nodosus 2. 993
Parisiensis 2. 993
Radobojensis 2. 993; 5. 638
rhizoma 7. 776
zosteroides 2. 993
Caulomatites 0. 630
Caulopteris 0. 628
Cisti 5. 630
Freieslebeni 5. 630
macrodiscus 5. 630
longirameus 3. 242
Caulopteris peltigera 5. 630
spp. 9. 379, 381
Caunopora ramosa 2. 108
verticillata 2. 989
Cavaria gen. 2. 125, 126!
Cavernularia 2. 123
Cavolinit 3. 261
Ceanothus Bilinicus 9. 503
cinnamomoides 3. 228
ebuloides 2. 755. 3. 506
Javanicus 3. 435
lanceolatus 2. 755; 3. 504; 4. 252; 9. 375, 503
macrophyllus 8. 501
ovoideus 3. 228
polymorphus 0. 506; 1. 128, 635; 2. 628, 755, 761; 5. 546; 6. 333; 9. 503²
retusus 9. 503
subrotundus 0. 506; 2. 755; 3. 504; 4. 627; 9. 503?
tiliaefolius 3. 506
zizyphoides 1. 740; 2. 755; 3. 506; 4. 252, 380, 877; 6. 505; 9. 375
Cebochoerus anceps 5 228
lacustris 7. 250!
Cecidomyia
protogaea 6. 503
Cecidomyium
grandaevum 5. 747
Cedrela 0. 635
Faujasi 4. 252
Celaeno gen. 9. 368
arquata 9. 370
conica 9. 370!
Celastrineae fam. 9. 377
Celastrophyllum
andromedaefolium 3. 435; 4. 631
attenuatum 3. 435; 4. 631
myricoides 3. 435; 4. 631
oleaefolium 3. 435; 4. 631
Celastrus 0. 636
Acherontis 4. 379
acuminatus 4. 379
Aeoli 4. 380; 9. 375
Andromedae 2. 755; 4. 877; 9. 375
anthoides 6. 252
Bruckmanni 0. 506; 3. 506; 8. 712
Capellinii 9. 873
cassinaefolius 0. 506; 2. 761; 3. 506
crassifolius 0. 506; 2. 761; 3. 506
Celastrus
deperditus 4. 379
dubius 9. 375
elaenus 4. 491; 9. 375
Fromherzi 4. 142
Michelottii 9. 873
minutulus 0. 506; 2. 761; 3. 506
oreophilus 4. 379, 877; 9. 375²
oxyphyllus 3. 506; 9. 376
pachyphyllus 4. 380
paucinervis 8. 500
Pedemontana 9. 873
Persei 2. 755; 4. 380; 9. 375
Phlegetontis 3. 510
protogaeus 4. 379; 9. 375
pseudo-ilex 4. 379
pygmaeorum 9. 375
scandentifolius 2. 755
Sotzkianus 9. 375
trachyticus 3. 384
Cellaria gen. et spp. 4. 114!
affinis 7. 499
cerioides 4. 114
Smithi 5. 635
Cellaridae (fam.) 4. 113!
Cellastraea
irregularis 0. 765
Cellepora gen. 4. 115
accumulata 4. 116
asperella 7. 498
gracilis 7. 502
Heckeli 4. 116
hexagonalis 6. 245
impressa 4. 869
involuta 3. 609
irregularis 4. 869
Koninckl 3. 677!
orbiculata 5. 634
ornata 7. 232
prolifera 4. 116
pustulosa 6. 245
pteropora 4. 116
rectangula 7. 498
scutigera 4. 869
spp. 2. 125
Celleporaria gen. 4. 115!
Cellularia gen. 4. 114!
Cellulinea (tribus) 4. 113!
Cellulose
in Braun- u. Stein-Kohle 6. 95
Celmus spp. 4. 493; 6. 224
Celtis 0. 633
bignonioides 3. 227

Celtis
Japeti 3. 504; 4. 491
Rhenana 6. 505
rugosa 3. 227
salicifolia 2. 761, 762; 3. 504
trachytica 4. 491
Ungerana 4. 252
Noachina 3. 765
crucibuliformis 6. 480
Cenarrhenes Haueri 2. 750
Cenchrodus
Goepperti 6. 746;
Ottoi 6. 746
Cénomanien 1. 742! 2. 254; 4. 204, 508; 7. 480, 659, 788; 9. 107, 124, 607
Centemodon
sulcatus 7. 253!
Centetes antiquus 5. 374
Centrastraea gen. 0. 766; 2. 118
Centrifuginea
(tribus) 4. 113!
Centroclypus gen. 9. 378!
Centrocrinus gen. 6. 602, 115
Centrodus gen. McC. 7. 485
striatulus 6. 123
Centrodus
gen. Pand. 7. 485; 8. 112
convexus 8. 112
duplicatus 8. 112
lineatus 8. 112
simplex 8. 112
Centrolepis gen. 8. 237!
asper 8. 237
Centrolobium
giganteum 6. 633
Centronella gen. 9. 758!
sp. 9. 758
Centroniae (class.) 6. 761
Centropleura spp. 4. 493; 6. 223, 224;
Centropleuridae fam. 4. 493
Centropus antiquus 5. 231
Centropygus gen. 9 364!
Cephalaspidae, fam. 1. 493
Cephalaspis
gen. 8. 763*; 9. 491
Lewisi 8. 763
Lloydi 8. 763
Lyelli 8. 625; 9. 338
Murchisoni 8. 624*, 625
ornatus 8. 624*, 625
Salweyi 8. 624*
Schrenki 8. 112
Cephalaspis
verrucosus 8. 112, 594
-Schuppen 8. 503
Cephalocoris gen. 3. 875!
pilosus 3. 873
Cephalolithis sp. 5. 471
Cephalopoda
(class.) 4. 852! 5. 385*; 6. 747²; 7. 553; 8. 234, 617*; 9. 608
polythalamia 1. 540!
Cephalopoden
Englische 4. 852
silurische 4. 1
tertiäre 4. 852!
v. Hallstadt 0. 250
-Bett (in Engl.) 8. 355!
-Buch 2. 601
-Kalk 0. 305; 3. 571, 576; 5. 219
-Marmor 0. 733, 734, 738
Cer-Apatit 3. 466
Cerambycites sp. 3. 231
Ceramites gen. spp. 7. 777
Hisingeri 9. 804
Ceramocrinus
gen. 6. 234!, 633
Eifeliensis 6. 233
Ceramopora gen. 1. 767!
foliacea 1. 767
imbricata 1. 767
inconstans 1. 767
spp. 5. 248
Cerasus crassa 8. 499
Herbsti 8. 499
Ceratiocaris
gen. 1. 510!; 6. 613!
Bohemica 3. 342*
elliptica 1. 510; 6 115
inornata 6. 115
permiana 1. 510
solenoides 1. 510; 6. 115
umbonata 6. 115
sp. 4. 2
Ceratiten-Schichten 0. 484
Ceratites gen. 6. 316*
Americanus 7. 764
Buchi 8. 719
Cassianus 7. 615
cinctus 2. 910
dubius 1. 489
Luganensis 5. 480
modestes 0. 251
nodosus 0. 99; 2. 909, 910; 3. 19; 5. 255; 6. 214, 245; 8. 719; 9. 104, 144, 360
Ceratites
Robini 7. 613
Schimperi 4. 123.
semipartitus 2. 943
subcostatus 4. 548
spp. 5. 856; 9. 497
Ceratitidae, fam. 8. 617!
Cerâtocephala gen. 3. 487
Ceratodus gen. 3. 221
altus 3. 221
Anglicus 3. 221
cloacinus 9. 12
concinnus 3. 221
curvus 3. 221
daedaleus 3. 221
emarginatus 3. 221
gibbus 3. 221
Gulielmi 3. 221
heteromorphus 3. 221
Kaupi 3. 221
Kurri 3. 221
latissimus 3. 221
obtusus 3. 221
palmatus 3. 221
parvus 3. 221
Phillipsi 3. 221
planus 3. 221
serratus 3. 221*
trapezoidalis 3. 221
runcinatus 3. 221
Weismanni 3. 221
spp. 5. 234
Ceratoneis
fasciola 0. 473, 489
laminaris 0. 491
Ceratonia emarginata 0. 508; 2. 761; 3. 506
Septimontana 6. 506
Ceratopetalum
Haeringanum 4. 379; 9. 375
Ceratophyllites 0. 632
Ceratophyllum
caespitosum 9. 847
Ceratophytes
anceps 1. 489; 3. 129
Ceratopyge 6. 224
Ceratosolen
legumen 7. 510
Ceratospyris
radicata 6. 104
Ceratotrochus 2. 115*
exaratus 3. 606; 6. 740
Ceraurus
gen. 1. 508; 3. 487
clavifrons 6. 116
octolobatus 1. 508; 6. 116

Ceraurus
Williamsi 1. 508
Williamsoni 4. 501; 6. 116
spp. 5. 249
Cercis 0. 637
cyclophylla 0. 503; 3. 506
Cercomya gen. 6. 251
praecursor 6. 741; 9. 629
Cercopidium
Hahni 5. 747
Mimas 5. 747
Schaefferi 5. 747
Signoreti 5. 748
Telesphorus 5. 747
Cercopis
Charpentieri 3. 874
fasciata 3. 874
Haidingeri 3. 874
gigantea 3. 867, 874
lanceolata 3. 874
longicollis 3. 874
melaena 6. 620
Oeningensis 3. 874
pallida 3. 874
rectilinea 3. 874
Ungeri 3. 874
Ceriocava
radiciformis 5. 653
Sarthacensis 5. 653
Ceriopora gen. 2. 766!
angulosa 5. 635²
anomala 7. 502
anomalopora 2. 127
clavata 2. 126; 5. 635
compressa 2. 127
corymbosa 5. 635
dentiformis 6. 374
diadema 8. 873
dichotoma 8. 873
dumetosa 5. 635
formosa 2. 126
globosa 5. 635
globulus 3. 84
licheniformis 2. 126
Lorieri 5. 635
mammillaris 4. 538
micropora 8. 873
milleporacea 2. 128
Neptuni 5. 635
Ototara 1. 228
palmata 7. 502
pustulosa 5. 635
radiciformis 3. 84, 302; 5. 634²
Ceriopora
ramosa 2. 766
spongiosa 2. 766
stellata 2. 126
striata 5. 635; 8. 873
subcompressa 5. 635
tuberosa 0. 392; 2. 766
tubiporacea 2. 128
verrucosa 3. 759
vibicata 2. 127
spp. 2. 125
Cerit 5. 705!
Ceritella gen. 3. 236!
acuta 3. 234
conica 3. 234
gibbosa 3. 234
laevigata 7. 866
longiscata 3. 234
mitralis 3. 234
planata 3. 234
rissoides 3. 234
sculpta 2. 229
Sowerbyi 3. 234
tumidula 2. 229
unilineata 3. 234
Cerithien
-Kalk 3. 130, 435!, 482
-Mergel 4. 370
-Sand 7. 420
-Schichten 5. 173, 474; 9. 122, 470
Cerithium
acinosum 8 380
acuminatum 3. 635
acuticostatum 6. 495; 7. 210; 8. 643
adversum 3. 764
affine 3. 635; 4. 875
annulatum 3. 635; 4. 876
Archiaci 5. 475
Arduennense 7. 210
articulatum 3. 635; 7. 618
Barrandei 5. 593; 8. 380
Beani 3. 235
bicoronatum 8. 380;
bicoroniferum 8. 380
bidentatum 3. 74
bigranuliferum 8. 380
Bonnardi 5. 475
Bouchardi 8. 380
breve 3. 635; 4. 876; 7. 866
Buchi 3. 633, 634; 4. 873
Bulsonense 8. 380
Carolinum 1. 101; 7. 733
Cerithium
Castellinii 5. 475 ff.; 6. 740
Cattleyae 8. 875.
Chapuisium 8. 380
cinctum 1. 712; 2. 971
cingillatum 3. 635; 4. 876
cochleare 5. 476; 8. 875
coelatum 8. 380
cognatum 3. 635
combustum 5. 475
complanatum 3. 635; 4. 876
concavum 3. 189, 532; 8. 488
conforme 4. 850
conicum 3. 634
coniforme 8. 380
conjunctum 1. 752; 8. 587
conoidale 3. 327; 9. 138
conoideum 3. 634, 717
contractum 3. 604
conulus 5. 475
cornu-copiae 3. 370, 604; 6. 93, 739
costatum 6. 852
costigerum 8. 380
crenatum 3. 635
cribrarium 3. 764
cribriforme 3. 635; 4. 876
daedalaeum 3 635; 4. 876
debile 3. 635; 4. 876
dentatum 0. 862; 8. 585, 587
denticulatum 4. 573
depressum 4. 635; 4. 876
Desplanchesi 8. 380
Dewalquei 8. 380
diaboli 4. 357
dimorphum 1. 101
disjunctum 3. 635; 4. 876; 5. 591; 7. 421
Duboisi 9. 839
Dumonti 4. 850
echinatum 4. 370
elegans 0. 860, 862; 5. 475 ff.; 6. 740
elegantulum 8. 380
Esinense 9. 499
Etalense 7. 210
exiguum 3. 635; 4. 875
exornatum 3. 635; 4. 876

Cerithium
extensum 8. 380
fenestratum 3. 635; 4. 876
fibula 8. 380
flammuligerum 8. 380
fodicatum [?] 3. 604
formosum 3. 635; 4. 876
frequens 3. 635; 4. 876
funiculigerum 8. 380
furcatum 3. 635; 4. 875, 876
Gaea 1. 101
Galeottii 0. 860, 862; 3. 327, 751; 6. 535
gemmatum 3. 235
gibberosum 5. 475
giganteum 0. 736; 1. 101; 3. 189, 604; 5. 409*; 6. 251; 8. 874; 9. 844
Goldfussi 3. 635
granosum 3. 764
granuligerum 8. 380
gratum 6. 495; 7. 210
Haanni 8. 380
Haidingeri 3. 635; 4. 876
Haueri 9. 356
Hebertanum 1. 101
hemes 6. 218
hexagonum 1. 715
hispidum 3. 635; 4. 876
Hoeninghausi 3. 633, 635; 4. 875
humile 8. 380
Jobae 6. 495; 7. 210
incomptum 8. 380
inconstans 3. 75
incrassatum 3. 327
inornatum 8. 380
insculptum 8. 380
interjectum 3. 635
Kefersteini 3. 634
lamellosum 4. 573
Latreillei 4. 524, 526
Leithi 9. 750
Leymeriei 3. 604
lignitarum 9. 854
lima 0. 862; 9. 138
limaeforme 3. 234
Loryi 5. 475
lucidum 3. 635; 4. 876
Lujani 3. 617
magnum 3. 604
margaritaceum 0. 860, 862; 1. 177, 712; 2. 971; 3. 80 ff., 370, 439; 4. 526; 6. 93, 533, 534, 535, 633, 707, 739; 7. 502; 8. 515; 9. 839, 853, 854
margaritiferum 8. 380
megaspira 9. 356
melanoides 4. 524, 526
Meriani 2. 435, 587
metaxa 3. 764
millegranum 3. 635
minu[t]e-striatum 8. 380
multicostatum 8. 380
multiforme 8. 380; 9. 750
multiseriatum 4. 869
multistriatum 8. 380
multivolutum 8. 380
Münsteri 3. 633, 635; 4. 876
muricatum 3. 494; 6. 852
Murchisoni 8. 380
mutabile 3. 328; 8. 515
Nebrascense 7. 495; 8. 494
nitidum 3. 635
nodo-striatum 6. 763
nodosum 6. 480
Nysti 8. 380
Omaliusi 8. 380
opulentum 8. 380
ornatissimum 4. 876
ovale 8. 380
paludinare 6. 495; 7. 210
papaveraceum 3. 74
Partschi 3. 635; 4. 876
pentagonum 3. 234; 8. 380
peregrinum 4. 870
perpulchrum 3. 764
pictum 3. 75; 7. 421; 9. 854
pinguescens 8. 380
Pleurotoma 7. 210
pleurotomoides 3. 189
plicatum 0. 860, 862; 2. 435, 587; 3. 327, 370; 5. 473, 476, 594; 6. 93, 535, 739, 740; 7. 502, 845; 8. 451, 590, 714; 9. 839, 853, 854
portlandicum 8. 488
portuliferum 8. 380
porulosum 6. 495; 7. 310
problematicum 3. 635; 4. 876
Provinciale 3. 635; 870, 876
pseudo-carinatum 3. 635; 4. 876
pseudo-obeliscus 3. 74
punctulatum 3. 147
pustulosum 3. 635; 4. 876
quadricinctum 3. 234
quadrifasciatum 3 315!
quasi-nudum 8. 380
Quinetteum 7. 210
regale 8. 380
Rennense 5. 593
resectum 3. 75
reticosum 3. 635; 4. 876
Roissyi 3. 234
rotundatum 6. 495
rotundum 3. 635; 4. 876
rubiginosum 7. 421; 9. 854
Rumignyensie 8. 380
rupticostatum 8. 380
rusticum 3. 189
scabrum 3. 74
scaliforme 8. 380
sejunctum 3. 635; 4. 876
Semele 9. 455, 456
semicoronatum 0. 487
semi-undans 8. 380
sexangulare 4. 876
sexangulum 3. 635
sexcostatum 3. 234
Simonyi 3. 635; 4. 876
simplex 3. 633, 635
sociale 3. 635
solidum 3. 635; 4. 876
speciosum 3. 635; 4. 876
Stemassense 9. 847
Stoddardi 9. 750
strangulatum 3. 234
subampullosum 3. 74
subangulosum 3. 604
subcorrugatum 3. 74
subcurvicostatum 4. 850
subcylindraceum 9. 750
subgradatum 3. 635
subnudum 9. 456
subspiratum 3. 604; 5. 475 ff.
subturritella 4. 850; 6. 454, 494

Cerithium
suffarcinatum 3. 634
telescopium 2. 855*
Tennanti 3. 234
tenuiusculum 4. 869
terebrale 1. 712
Terquemi 7. 210
thiariforme 8. 380
Tombecki 9. 361
torosum 3. 635; 4. 876
torquatum 3. 635; 4. 876
trincinctum 3. 764; 7. 502
trifidum 3. 635
trilineatum 3. 764
trochleare 5. 473, 475; 6. 740; 9. 138
truncatum 8. 875
tuberculare 3. 764
tuberculatum 0. 155
tuberculigerum 8. 380
undans 8. 380
undulans 8. 380
uniplicatum 1. 101
Urania 1. 101
Vandenheckei 3. 604
variabile 3. 189
variculosum 0. 862; 3. 764
vellicatum 3. 604
ventricosum 1. 712
venustum 8. 380
verrucosum 6. 495; 7. 210
verticillatum 3. 635
Zelebori 9. 839
spp. nn. 2. 229; 5. 768
Cermatia
Illigeri 5. 121
Leachi 5. 121
Ceroid-Marmor 6. 216
Cerolith 6. 562
Ceromya gen. 3. 111, 112
Bajociana 8. 357
bifida 2. 161
concentrica 2.230; 4.621; 7. 743
conformis 4. 851
crassicornis 6. 857
elegans 6. 857; 8. 484
excentrica 0 869; 4.355; 5. 848; 6. 857; 8. 488
gregaria 4. 851; 6.857
inflata 6. 857
latior 4. 851; 6. 857
Ceromya
lunulata 4. 851
Neocomiensis 0. 393; 6. 857, 865
obovata 8. 488
orbicularis 6 818
plicata 6. 857; 7. 743; 8. 357
praelonga 6. 857
similis 7. 743
striato-punctata 3. 111, 112; 4. 851
Symondsi 7. 743
tenera 4. 766; 6. 857, 865; 7. 133
tenuistria 3. 111
truncata 4. 851
undulata 7. 743
Cervus gen. 7. 869
Alces 4. 862; 5. 227
ambiguus 5. 373
Americanus 5. 112
antiquus 5. 227
Ardeus 5. 227, 373
Arvernensis 5. 227, 373
Aurelianensis 5. 227
Australis 1. 492; 2. 998; 5. 227; 9. 100
Bertholdi 1. 502
Borbonicus 5. 227, 373
Canadensis 3 45; 5. 227
capreolus 2. 998; 3. 45, 534; 5. 227
var. Aureliana 2. 360
Cauvieri 2. 998; 5. 227
cladocerus 5. 373
coronatus 5. 227
Croizeti 5. 227
Cusanus 5. 227, 373
dama 3. 45; 5. 227, 373
Destremi 5. 227
dicranoceros 6. 491
dicrocerus 5. 227
Dumasi 5. 227
elaphus 1. 760; 2. 998; 3. 45, 766; 5. 227
Etueriarum 5. 227, 373
eurycerus 1. 728, 730; 8. 742
fossilis 5. 227
furcifer 5. 373
Gergovianus 5. 227
giganteus 5. 227
Cervus
Guettardi 1.501; 3. 534; 4. 609; 5. 227, 373
haplodon 1. 360
Hybernicus 5. 227
intermedius 5.227, 373; 9. 640
Irlandicus 5. 227
Issiodorensis 5. 227, 373
leptocerus 5. 373
Leufroyi 5. 227
lunatus 1. 76*; 9. 428
macroglochis 5. 373
Martialis 2. 998; 5.227; 9. 100
Matheroni 5. 227
megaceros 4. 473; 5. 227, 709; 6. 491; 8. 589, 863; 9. 100, 204
megaloceros 4. 862
Neschersensis 5. 227, 373
Pardinensis 5. 227, 373
parvus 5. 227
Perrieri 5. 227, 373
platyceros 5. 227, 373
polycladus 5. 227, 373
primigenius 5. 227
Privati 5. 227, 373
pseudovirginianus 2.998; 5. 227; 8. 598
pygmaeus 5. 227
ramosus 5. 227, 373
Rebouli 5. 227
Regardi 5, 227, 373
Roberti 5. 373
rusoides 5 373
Savinus 4. 862
Schotti 1. 501
Solilhacus 5. 227, 373
Somonensis 5. 227, 373
spelaeus 1. 680, 2. 306
tarandinus 5. 624
tarandoides 5. 227
tarandus 1. 501, 760; 3. 378, 534; 5. 227; 9. 427
Tolozani 2. 998; 5 227
Tournali 5. 227; 9. 100
Vialeti 5. 227, 373
Virginianus 6. 109
Warreni 9. 248!
spp. 1. 677; 3. 378; 5. 384
Cestracion
canaliculatus 5. 255

Cestracion
falcifer 7. 366!
imperialis vidr. Ostracion
spp. 3. 109; 7. 342
Cetacea
(fossilia) 3. 93!
Cethus gen. 3. 488
Cetiosaurus
brachyurus 3. 214*
brevis 3. 214*
spp. 0. 723
Chabasie
a. Neuschottland 0. 60!
Chabasit 1. 157*; 6. 11*
Chaetetes 2. 120*
angularis 2. 109
arcticus 9. 222
Bowerbanki 7. 104; 8. 754
capillaris 6. 113
capilliformis 5. 653
columnaris 7. 237
Dalei 7. 104
fibrosus 6. 255
Fletcheri 7. 104
frondosus 7. 104
globulus 2. 109
Gottlandicus 8. 264
hemisphaericus 8. 264
heterosolen 7. 104
lycoperdon 8. 855
mammillatus 7. 104
milleporaceus 9. 850², 851
Panderi 7. 104
Petropolitanus 1. 498; 2. 109, 981; 6. 803; 8. 264, 271
polyporus 5. 653
pulchellus 7. 104
pygmaeus 3. 84
radians 1. 608
ramosus 8. 264
Recubariensis 5. 316; 6. 245; 9. 359
rugosus 7. 104
sepicula 2. 109
septosus 6. 113
Torrubiae 2. 341; 7. 104
triasinus 9. 359
Trigeri 7. 104
undulatus 8. 754
spp. 1. 382; 2. 990; 5. 248
Chaetoceros boreale 9,225
furcillatum 9. 225
Chaetodon
pseudo-rhombus 5. 235
rostratus 6. 481
Chaetotyphla
saxipara 6. 103
Chailles 8. 486, 487
Chalcedon 0. 421; 2. 525; 3. 389 ff., 700*; 4. 219, 404; 5. 822; 6. 21; 7. 605; 8. 819*
-Hölzer 3. 433
-Kugeln 8. 655, 801
-Thierchen 8. 820
Chalchuites
Mineral 8. 561
Chalcites
debilis 6. 503
Chalcotrichit 4. 448
Chalicomys gen. 5. 224
Eseri 1. 76*, 503², 504; 5. 371; 9. 173
Jaegeri 1. 75, 502, 503, 677; 7. 110; 8. 204; 9. 428
minutus 9. 429
Nebrascensis 8. 877
sigmodus 1. 492, 493; 2. 998
Chalicotherium
gen. 7. 869
antiquum 1. 502
grande 5. 228
Chalilith 3. 711!; 7. 167!
Chalk 4. 508
Chama ammonia 9. 372
arcinella 2. 509; 6. 868
bicornis 6. 867
Brocchii 6. 868
calcarata 2. 168; 3. 605; 6. 868²; 9. 844
cor 4. 506
crenulata 6. 868
dissimilis 6. 868²
exogyra 6. 533
gigas 3. 605; 6. 868
granulosa 3. 605; 6. 868
gryphina 3. 74; 4. 505; 6. 868; 9. 839
gryphoides 4. 505; 6. 868
lamellosa 6. 868
laticostata 3. 605
minor 6. 868
Mississippiensis 6. 868
Münsteri 0. 172
oblonga 6. 865
papyracea 6. 868
Chama
Philippii 6. 868
plicatella 6. 868
ponderosa 6. 868
punctata 6. 868
rugosa 6. 868
rustica 6. 868
sinistra 6. 868
sinistrorsa 4. 505
squamosa 1. 715; 6. 868
subcalcarata 6. 868
sublamellosa 2. 43, 44; 3. 86
suborbiculata 6. 868
substriata 3. 369, 605; 6. 93, 739
sulcata 3. 605; 6. 868; 7. 229
supracretacea 1. 101
turgidula 3. 189; 6. 868
unicornaria 4. 505
unicornis 4. 505
spp. 6. 868; 9. 125
Chamaerops
Helvetica 4. 321; 5. 638
sp. 9. 505
Chamaecyparites 0. 632
Ehrlichi 2. 623!
Hardti 4. 378; 9. 374
minutulus 3. 746
obtusifolius 3. 746
sedifolius 3. 746
Chamites granulatus 4. 746
lineatus 3. 23
striatus 3. 23
Chamostrea gen. 6. 867
Champsodelphis
Bordae 5. 231; 7. 110
macrogenius 5. 231
Chantonnit 2. 615
Chara gen. 0. 626
Bernoullii 5. 637
Blassiana 5. 637
dubia 3. 502; 5 637
Escheri 3. 502; 5. 637
granulifera 5. 637
hispida 3. 322
inconspicua 5. 637
medicaginula 1. 713, 714
Meriana 2. 761; 3. 502; 5. 637; 8. 200
Rochettiana 5. 637
Rolleri 7. 636
Voltzi 4. 123
Zollerana 5. 637; 7. 556; 8. 847
Characeae fam. 5. 637

Charitodon
Tschudii 0. 246 !
Charitosaurus 0. 246
Charopota
Meissneri 1. 503
Charpentieria 0. 638
Chasmatopora
gen. 7. 633
Chasmops gen. 1. 507!
Odini 4. 501; 6. 116
Chatam-Series 9. 751
Châtel-Kalk 0. 830; 4. 356, 456; 8. 636
Chauliodes prisca 6. 622
Chaunopora
annulata 0. 243
ramosa 0. 243
Chazy-limestone 9. 635p
Cheilanthes
Laharpei 5. 637
Cheilanthites
acutilobus 6. 97
divaricatus 5. 629
Gravenhorsti 5. 629
linearis 6. 97
Cheirolepis
gen 8. 249
Cheiromachus
coriaceus 5. 124
Cheirotheroides
gen. 9. 868
pilulatus 9. 868
Cheirotherium etc.
vdr. Chirotherium
Cheirurus
gen. 0. 779 !, 785; 3. 488; 6. 224
aculeatus 9. 121, 864
articulatus 4. 501
bimucronatus 4. 501
cancrurus 4. 501
clavifrons 4. 501
exul 9. 121
gelasinosus 4. 501
gibbus 6. 370
insignis 3. 341
Marianus 6. 500
octolobatus 4. 501; 9. 121
ornatus 4. 501; 9. 864
planispinosus 4. 501
scutiger 9. 864
speciosus 4. 501
spinulosus 9. 121, 864
Sternbergi 4. 501
Tournemini 1. 68
cfr. Chirurus.
Chelaspodus
Jardinei 4. 859 !
Chelepteris 0. 628
Chelichnus
Duncani 3. 753
gigas 3. 753; 9. 868
ingens 7. 124!, 755 !
obliquus 4. 859 !
plancus 4. 859 !
Titan 7. 124
Wymananus 7. 253 !
spp. 9. 878
Chelignathus Kochi 5. 124
Chelifer
Ehrenbergi 5. 124
Hartmanni 5. 124
Hemprichi 5. 124
Kleemanni 5. 124
Wigandi 5. 124
Chelocrinus
gen 6. 28; 8. 762 !
acutangulus 6. 746; 8. 763; 9. 359
Carnalli 8. 762*
Schlotheimi 8. 762*
Chelodus spp. 7. 485
Chelone antiqua 2. 379
Benstedi 2. 381; 6. 483*
breviceps 2. 379
Camperi 2. 381
convexa 2. 379
crassicostata 2. 379
cuneiceps 2. 379
declivis 2. 379; 3. 109
Harwicensis 2. 379
Hoffmanni 5. 246
latiscutata 2. 379
longiceps 2. 379
Meyeri 5. 232, 743
ornata 8. 254 !
planimentum 2. 379
pulchriceps 2. 381
subcarinata 2. 379
subcristata 2. 379
trigoniceps 2. 379; 3. 108
Chelonia (fam.) 9. 868
(gen.) Cuvieri 5. 233
grandaeva 8. 253 !
Knorri 6. 362
Lunevillensis 5. 233
Meissneri 7. 624
Mayeri 2. 832
pulchriceps 2. 144, 167
radiata 0. 878
Valenginensis 9. 124
von Nebraska 5. 111
Chelonichnium
Vogesiacum 4. 123
Chelonichthys gen. 8. 249
Chelonii (ordo) 7. 623
Chelonochampsi (ordo) 5. 742
Chelonoides gen. 9. 868
incedens 9. 868
Chelotriton
paradoxus 5. 374
Cheltenham-
freestone 0. 156
Chelydra
Decheni 1. 678; 4. 49*; 6. 231, 487; 9. 724
Meilheuratiae 5. 374
Murchisoni 1. 678; 5. 622; 7. 624
spp. 6. 485
Chelyophorus
gen. 1. 494*; 8. 249, 251 !; 9. 491
concatenatus 8. 252
pustulatus 8. 252
Verneuili 3. 125; 8. 251
Cheliosaurii (fam.) 5. 745
Chemnitzia
acuminata 7. 374
acute-striata 9. 356
aequalis 8. 768
agilis 9. 356
Aldrovandi 8. 768
aliena 6. 494
altena [?] 4. 850
Altenburgensis 7. 638
Amorettii 8. 768
angulata 8. 768
antizonata 8. 768
attenuata 9. 506
Aurelia 8. 768
Beyrichi 3. 634; 7. 618
Breislacki 8. 768
Brocchii 8. 768
Cainalli 8. 768
circum-sulcata 8. 768
Clytia 4. 355
Collegnoi 8. 768
concava 9. 356
concavo-convexa 9. 356
conica 9. 357
contorta 8. 768
costaria 3. 764
costellata 5. 475 ff.; 6. 739, 740
curta 6. 218
curvicostata 3. 764
Davidsoni 4. 850

Chemnitzia
denticostata 3. 764
distans 9. 498
elegans 2. 229
elegantissima 3. 764
Escheri 6. 758²; 8. 383², 768³
evanescens 9. 356
exilis 9. 356
eximia 6. 384
filosa 3. 764
fimbriata 9. 356
formosa 6. 758²
fusiformis 8. 768
fusoides 8. 768
fusus 8. 768
geographica 9. 356
Ginannii 8. 768
gloriosa 0. 102
gracilis 2. 229; 9. 356
gradata 6. 738, 758; 8. 383, 768²
Hamptonensis 3. 234
Hauerana 8. 768
Haueri 6. 363, 366; 8 768
Heddingtonensis 6. 218; 8. 486, 873
Hehli 8. 768²
hybrida 9. 356
jaculum 9. 356
inrata 4. 850
internodula 3. 764
interrupta 9. 498
interzonata 8. 768
involuta 8. 768
lactea 4. 573; 5. 475
lanceolata 9. 356
Leckenbyi 3. 234
Lefeburei 7. 220
leprosa 8. 768
lictor 8. 768
lineata 6. 218
longissima 9. 356
Lonsdalei 3. 234
loxonematoides 6. 363; 7. 760
lunulata 4. 547!; 9. 499
maculata 8. 768
Maironi 8. 768²
mumia 9. 356
nana 8. 768
Nardoi 7. 595
nexilis 1. 664, 666
Nicensis 3. 604
nitida 2. 229
nitidissima 3. 764
Chemnitzia
Normanniana 6 218
nuda 4. 850; 6. 456; 9. 356
nymphoides 9. 356
obeliscus 8. 768
obliqua 9. 356
oblita 6. 363, 366; 7 761
peracuta 9. 356
perlonga 9 356
perspirata 9. 499
phasianoides 3. 234
Pinii 8. 768
princeps 8. 768
pulchella 9. 356
punctata 9. 356
pupoides 8. 768
quadricarinata 8. 768
Repeliana 6. 850
retrozonata 8. 768
Roessleri 7. 638; 8. 745, 746
Rosthorni 6. 384, 738; 7. 617
rufa 3. 764
rugifera 9. 847
salinaria 5. 501
scalata 5. 479; 6. 207
Scarburgensis 3. 235
Sebae 9. 499
semel-cincta 9. 499
semidecussata 5. 475 ff. 6. 740
similis 3. 764; 9. 356
simplex 3. 234
solidula 6. 454
Southerlandi 7. 369
Sphinx 9. 356
striato-punctata 9. 357
strigillata 9. 356
subcolumnaris 9. 356
subscalaris 9. 357
sulcellata 8. 768
tenui-lineata 6. 736
tenuis 5. 480; 9. 356
trochiformis 9. 356
trochoides 9. 356
tumida 6. 384, 738
turbinata 4. 850; 6. 494
turris 2. 229; 8. 768
umbilicata 8. 768
undulata 6. 456; 8. 226
unica 3. 764
uniformis 9. 356
variabilis 3. 234
varicula 3. 764
Chemnitzia
vetusta 3. 235
Viglezzii 5. 480
vittata 8. 482
Wetherelli 3. 234
Zenkeni 6. 454, 494; 7. 93
spp. 6. 750
Chemische
Analysen eruptiver Gesteine 1. 837! ff.
Prüfung der Gesteine 1. 365
Physiologie 6. 211!
Untersuchungs-Weise der Gesteine 3. 414 ff
Chemung-group 9. 343
-Gruppe 3. 815, 817; 6. 368
Chenopus
acutidactylus 6. 534
alatus 3. 96
Anglicus 3. 96
Burdigalensis 3. 75, 96
Grateloupi 3. 96
Margerini 0. 862
pes-carbonis 3. 96
pes-graculi 3. 96
pes-pelecani 3. 96
speciosus 6. 536
tridactylus 2. 435
spp. 6. 479
Chert 5. 237; 7. 727; 8. 391
Chesterlith 6. 555!
-Talk 4. 442!
Cheyletus
portentosus 5. 124
Chiastolith 2. 521
Chidostomum gen. 5. 755
Childrenit 4. 423!; 6. 35*;
Chilesische Hebungs-Systeme (3) 7. 731
Chilina spp. 1. 355
Chilodus tuberosus 8. 741
Chilolith 4. 188!
Chilopora Guernoni 5. 653
Chilostomella
gen. 1. 379!; 2. 356!; 5. 755
cylindroides 2. 253; 6. 756
Czjzeki 2. 255
ovoidea 2. 255
tenuis 6. 756
Chimaera
gen. Hitchc. 9. 868

Chimaera
Barratti 9. 868
Johnsoni 6. 494; 8. 643
Quenstedti 7. 366 !
spp. 9. 764
Chiracanthus
grandispinus 6. 123; 9. 491
lateralis 6. 123; 9. 491
microlepidotus 6. 123
minor 6. 123; 9. 491
Murchisoni 6. 123
pulverulentum 6. 123; 9. 491
Chirocentrites
gen. 2. 980 !; 3. 118*
Coroninii 2. 980
gracilis 2. 980
microdon 2. 980
vexillifer 6. 481
Chirocentrus gen. 3. 118*
Chirodus acutus 7. 626
pes-ranae 6. 122
Chirolepis
Cumingae 9. 491
curtus 6. 123; 9. 491
macrocephalus 6. 123; 9. 491
Trailli 6. 123; 9. 491
uragus 6. 123
velox 6. 123; 9. 491
spp. 1. 183
Chiropteris
gen. 8. 143; 9. 45
digitata 8. 143
Chirosaurus Barthi 8. 362
spp. 3. 16
-Fährten 2. 51
Chiroteuthis gen. 4. 853
Chirotherium 1. 512
Barthi 4. 569; 8. 362
subapenninum 5. 493
spp. 8. 363
-Fährten 0. 251
Chiruridae fam. 4. 493
Chirurus
gen. 1. 508 !; 6. 116
myops 6. 256
spp. 0. 99; 4. 493
Chitin 6. 845 !
Chiton
gen. 6. 480; 8. 750
antiquus 7. 599; 8. 751; 9. 510
carbonarius 9. 506
concentricus 8. 750
cordatus 9. 510
Chiton
cordifer 8. 750
cordiformis 8. 750
corrugatus 6. 372; 8. 750
Deshayesi 5. 255; 8. 751
distortus 9. 510
eocaenensis 6. 480
fasciatus 8. 750
fascicularis 3. 765; 8. 751
geminatus 8. 750
Grayanus 8. 750
Griffithi 8. 750
Grignonensis 8. 751
Hancockanus 9. 510
Howseanus 8. 745. 746; 9. 510
Koninckı 8. 751
laevigatus 6. 256; 8. 750
Loftusanus 4. 749; 7. 637; 8. 750; 9. 510
Mempiscus 8. 750
miocaenicus 8. 750
Nervicanus 8. 750
parvus 9. 506
priscus 8. 750²
Rissoi 3. 765; 8. 751
sagittalis 6. 372; 8. 750
Sandbergeranus 8. 750
Scaldeanus 3. 230
Siculus 8. 750
Sluseanus 3. 230
strigillatus 3. 765; 8. 751
subappenninus 8. 751
subcayetanus 8. 751
subgemmatus 8. 750
subgranosus 8. 750
Transenna 8. 751
tumidus 8. 750
Turnacianus 8. 750
Wrightanus 8. 751
Chitonellus
Barrandeanus 3. 230
Chiuchiu 5. 8.
Chiviatit 5. 835!
Chladnit 2. 615
Chlamydotherium
giganteum 4. 111
Humboldti 4. 111
Chlamyphorus gen. 4. 111
Chlidonia gen. 4. 114!
Chlor-Blei 2. 519
überbasisches 2. 795
-Kali 1. 604
-Metall in Bergkrystall 3. 54
-Natrium 5. 698
Chlor
-Opal 8. 569!; 0. 706!
Chlorastrolith 4. 423
Chlorit 0. 691!, 692!; 1. 328*, 395*, 396*, 400*, 556; 2. 523 ff., 849!; 3. 62*, 700, 844; 4. 257 ff., 697; 5. 9, 822; 6. 13*; 7. 171; 9. 424
-Glimmerschiefer 4. 789
-haltiger Kalkstein 7. 608
-Kalk 4. 739*; 7. 750p; 8. 594
-Kreide 5. 364
-Schiefer 0. 517, 531, 541, 730
Chlorite
ferrugineux 9. 653
Chloritic
Marl 4. 508
Chloritische Kreide 6. 358
Chloritoid 0. 338; 1. 590!; 2, 848!; 7. 170!
Chlorophäit 0. 705!; 3. 389 ff.; 4. 404; 6. 666
Chlorophänerit 5. 798!
Chlorophyllit 2. 522; 6. 348!
Choeroidii 0. 867
Choeromorus
mammillatus 5. 228; 7. 248*
Sansaniensis 5. 228
simplex 5. 228; 6. 638
Choeropotamus
(gen.) Cuv. 5. 228; 7. 869
affinis 5. 228
Americanus 8. 376
Cuvieri 5. 228
ferreo-jurassicus 1. 501, 502
gypsorum 5. 228
Meissneri 1. 502
Parisiensis 5 228
Choeropotamus
gen. Gray, 8. 232
larvatus 8. 232
penicillatus 8. 232
Choerotherium
Dupuyi 5. 228
Nouleti 5. 228
Sansaniensis 5. 228
spp. 8. 233
Choloepus gen. 4. 111
Chomatodus 6. 122

Chomatodus
cinctus 6. 122
clavatus 6. 122
denticulatus 6. 122
linearis 6. 122; 8. 123
obliquus 6. 122
obscurus 8. 123
truncatus 6. 122
venustus 8. 123
Chonaxis 2. 122*
Chondrites 0. 626
aequalis 0. 112; 3. 410; 6. 217; 8. 640[2]; 9. 470, 644
affinis 6. 217; 8. 640
antiquus 0. 731; 2. 890, 928, 939; 6. 375, 630; 9. 804
arbuscula 8. 640
Bollensis 0. 114; 8. 460[3]
Bosqueti 4. 229
brevirameus 8. 640
circinnatus 2. 890
clavus 7. 778
Dalmaticus 3. 510
difformis 6. 217
divaricatus 8. 640[2]
dubius 8. 640
expansus 8. 640
filiformis 8. 640
flabellatus 6. 105
flexilis 8. 640
furcatus 2. 298; 3. 412 ff.; 8. 637, 640[2]
furcellatus 8. 640
Goeppertanus 3. 121
Hechingensis 8. 640
inclinatus 8. 640
informis 6. 67
intricatus 0. 112; 3. 410 ff; 4. 537; 6. 217; 8. 637, 640[3]; 9. 644, 844
isidioides 7. 778
lanceolaris 2. 298; 8. 640
linearis 3. 311, 409!
longipes 8. 640
Nessigi 2. 890
obtusus 7. 777
patulus 8. 640
recurvus 8. 640
regularis 6. 67
Riemsdyki 4. 229
Salcedanus 4. 251
Schafhäutli 8. 640
subtilis 1. 608
taeniatus 8. 640
Chondrites
taeniola 1. 608
Targionii 0. 114, 602; 3. 422; 6. 217; 8. 637, 638, 640[2]; 9. 470, 643
tenellus 2. 890
tribulus 5. 854
virgatus 8. 503
spp. 7. 778; 9. 504
Chondrodit 2. 877, 880; 3. 176!; 6. 704*
Chondrophyllnm
gen. 5. 493; 8. 365
Chondrostei(Pisces) 3. 223!
Chondrosteus gen. 9. 506
Chondrostoma
bubalus 4. 623
Chondrus
Binneyi 4. 743
spp. 9. 114
Chonetes
gen. et spp. 3. 213!; 6. 118
armatus 6. 383
Boulangeyi 3. 103
Bretzi 6. 509
Burgenanus 8. 745
comoides 1. 65
concentricus 4. 504: 5. 873
crenulatus 6. 509
Dalmananus 5. 873
Davidsoni 7. 223
dilatatus 6. 374, 509; 7. 456
Fischeri 6. 383
Flemingi 6. 383; 8. 766
globosus 0. 243
granuliferus 6. 383; 9. 849, 850
hemisphaerica 5. 873
Koninckanus 5. 873; 6. 383
Kutorganus 5. 873
Laguesseanus 5. 873
latus 4. 85; 4. 504; 8. 715
Littoni 6. 383
Logani 6. 383
Mac-Coyanus 5. 873
Maclureus 6. 383
Martini 6. 383
mesolobus 6. 383; 9. 827, 850, 851
Michigani 9. 506
minutus 6. 374, 509
Chonetes
mucronatus 9. 869
nanus 6. 383, 626
ornatus 6. 736
Ottonis 5 873
papilionaceus 5. 873
parvus 6. 736
Pechoti 3. 103
perlatus 5. 873
plebejus 6. 509, 374
politus 3. 211
sarcinulatus 0. 243; 2. 269, 584, 925, 934; 4. 61, 504, 5. 875; 6. 209, 374, 383, 501[2]; 7. 220[2], 373, 374, 382, 389, 456; 9. 847
semicircularis 8. 753
Shumardanus 6. 383
Smithi 6. 383
striatellus 6. 500, 797, 812; 7. 387; 8. 269, 594, 753
subminimus 3. 211
tricornis 5. 873
Tuomeyi 6. 383
variolatus 3. 614; 5. 873, 875; 6. 383; 9. 850
Verneuilanus 6. 383
spp. 5. 252
Choneziphius gen. 3. 94!; 5. 231
planirostris 3. 94
Chonionotus
lithanthracis 3. 161; 4. 500
Choniopora
gen. 5. 498!
radiata 5. 498
Chonophyllum 2. 121*
cretaceum 0 117
perfoliatum 2. 115; 6. 225
spp. 4. 497; 7. 104
Chonostegites 2. 120*
Chorionopteris 0. 629
gleicheniodes 6. 98
Chonistites gen. 6. 117
Sowerbyi 6. 601
Choristopetala
(Vegetabilia) 2. 504!
Chrismatin 1. 353!
Christianit 0. 216!; 3. 258
Chrom
-Chlorit 2. 850!
-Chlorsilber 0. 444
-Erze 5. 533

Chrom
-eisen 1. 556; 6. 267
-eisen-Erze 5. 333
-eisenstein 7. 335
-saures Kali 2. 795
-sesquioxyd 1. 693*
Chromus gen. 0. 778!, 785
Chronotypen 1. 499
Chrysaora
angulosa 5. 635
clavata 5. 635
cervicornis 5. 635
damicornis 5. 635
echinata 5. 635
microphylla 5. 635
Normanniana 5. 635
radiata 5. 635
spinosa 5. 635²
spinosissima 7. 232
striata 5. 635
subtrigona 5. 635
Chrysalidina gen. 5. 755
Chrysoberyll
(künstlich) 0. 458; 1. 710*; 8. 569*, 579*
Chrysobothrys sp. 3. 105
Chrysolith 0. 452!, 458; 1. 204*, 695, 2. 521 ff.; 7. 325!
vom Ural 0. 59!
Chrysomela
Lyellina 6. 503
Chrysopa sp. 6. 251
Chrysophrys
Agassizi 2. 999; 8. 869
mitra 5. 235
Chrysophyllum
nervosissimum 2. 754
Chrysopras 0. 421
Chrysotil 1. 556; 9. 84
Chthamalus
Darwini 8. 620
Chthonoplastes 8. 633
Chunam (Gestein) 5. 855
Cicada
Aichhorni 3. 868, 871!, 874
Amathion 9. 377
bifasciata 3. 874
Emathion 3. 870, 874
Ungeri 3. 868, 870, 874
Cicadellites
Bruckmanni 3. 874
nigriventris 3. 874
oblongus 3. 874
obscurus 6. 503
pallidus 3. 874
Cicadellium
Dipsas 5. 747
Psocus 5. 747
Cicerchina (Gestein) 7. 599
Cidarichthys gen. 3. 165*
Cidaridae fam. 7. 767, 768 120!
Cidaris 7. 122
alata 6. 661; 7. 617
Anglo-Suevica 6. 852
Anhaltina 9. 125
arietis 6. 454; 8. 643
armata 5. 728
Bechei 6. 491; 7. 768
Blumenbachi 0. 169; 2. 349, 493; 7. 768; 8. 873; 9. 136
Boloniensis 7. 768
Bouchardi 6. 500; 7. 768; 8. 357
Bradfordensis 7. 768
clavigera 9 228
clunifera 4. 654; 8. 873
confluens 7. 768²
coronata 0. 170, 184; 1. 485; 2. 229, 349; 6. 57; 7. 768
crenata 6. 662
crenularis 1. 485; 2. 229; 7. 768
crinifera 6. 100
Desori 9. 629
Deucalionis 1. 608
diadema 7. 768
dorsata 6. 662; 7. 617; 8. 4, 125
Edwardsi 6. 100, 456; 7. 768
elegans 5. 613; 7. 768
elongata 7. 768; 8. 582²
Faujasi 7. 859
florigemma 0. 170; 7. 768; 8. 486, 487; 9. 136²
foliacea 7. 851
Forchhammeri 1. 102
Fowleri 7. 768; 8. 357
gemmifera 0. 226
glandifera 1. 146; 8. 873
grandaeva 2. 908, 909; 3. 26; 9. 359
hastata 7. 851
hirsuta 4. 651
Ilminsterensis 7. 768
interlineata 7. 859
intermedia 7. 747, 768
Keyserlingi 4. 119, 489, 745
laevispina 6. 374
lanceolata 9. 359
Lorierei 7. 768
mammillana 7. 768,
mammillata 7. 859
maxima 3. 759; 7. 768
Melitensis 6. 101
monilifera 7. 768
Moraldina 7. 768
Neocomiensis 4. 654
Nerei 6. 637; 7. 860
nobilis 2. 349
nummulitica 3. 606
olifex 6. 742
Orbignyana 6. 95
ornata 8. 4, 125
papillata 7. 747; 7. 768
Parendieri 8. 486
prionata 7. 859
prismatica 4. 653
propinqua 7. 768
pseudodiadema 7. 768
punctata 4. 651! ff.
pustulosa 4. 653
ramifera 4. 653
Ramondi 7. 859
regalis 3. 759
remus 7. 851
Rossica 1. 608; 7. 472; 9. 847
sceptrifera 0. 291
scrobiculata 6. 374
scutigera 7. 747
semiaspera 7. 859
similis 7. 617
Smithi 7. 768; 8. 486
Sorigneti 7. 787
spathulata 7. 851
spinosa 7. 768
striato-granosa 7. 859
subangularis 1. 414, 419, 485; 2. 229; 3. 318; 6. 95
subcylindrica 7. 859
subnobilis 6. 95
subnodosa 6. 363, 746
subprionata 7. 859
subserrata 7. 859
subularis 7. 859
Tennesseae 0. 376
transversa 6. 746; 9. 359

Cidaris
tripterygia 6. 95
tuberosa 4. 653
vagans 7. 768
variabilis 2. 188; 4. 651
variolaris 0. 291
venulosa 1. 102
vesiculosa 0. 291; 2. 462; 4. 651, 840; 7. 786; 8. 873
Websterana 4. 761
Wrighti 7. 768; 8. 357
spp. 7. 851
cfr. Cidaris.
Cimicidium
Dallasi 5. 747
Cimolichthys
Lewesiensis 8. 253
Cimoliornis
gen. 7. 634
Diomedaeus 3. 106; 5. 233, 376
Cimolit 0. 59!, 449; 2. 534; 4. 699!; 6. 183
Cinchona 0. 634
Cinchonidium 0. 634
Cinder-bed 1. 355
Cinnamomum
gen. 9. 503
Buchi 9. 503, 505, 754, 872, 873
crassipes 9. 505, 754
Heeri 9 505, 754
lanceolatum 6. 502; 8. 586, 587, 712; 9. 374, 503
polymorphum 8. 200; 9. 374, 503
retusum 9. 503
Rossmaessleri 9. 137; 503, 505, 754
Scheuchzeri 9. 117; 374, 503, 872, 873
spectabile 9. 503
subrotundum 9. 503
transversum 9. 503
Cinulia decurtata 4. 874
Cionacineti (ordo) 6. 761
Cionella spp. 9. 114
Cipolin 5. 364
Circe minima 4. 506
triangularis 4. 506
Circophyllia
gen. 0. 758!; 2. 117*
truncata 0. 759
Cirrhidae (ordo) 3. 239!
Cirripathes 2. 122*
Cirripedes (ordo) 8. 620
Cirroteuthis gen. 4. 852
Cirrus fistula 9. 499
nodosus 2. 228; 8. 356
rotundatus 2. 108
spinosus 6. 372
superbus 5. 501
Cissus Heeri 9. 375
platanifolia 2. 628; 9. 502
Styriaca 9. 375
Cistudo
Morloti 7. 624; 8. 747
Razoumowskyi 7. 624; 8. 747
Cistus Beckeranus 9. 122
lanceolatus 9. 122
Cixius fraternus 6. 620
gracilis 6. 620
insignis 6. 620
loculatus 6. 620
longirostris 6. 620
Sieboldti 6. 620
succineus 6. 620
testudinarius 6. 620
vitreus 6. 620
Cladangia 2. 118*
Cladochonus 2. 120
bacillaris 6. 113
brevicollis 6. 113
crassus 6. 113
Cladocora 2. 117*
articulata 7. 502
caespitosa 0. 762
cariosa 0. 767
granulosa 0. 762
humilis 0. 762
laevigata 0. 762
manipulata 4. 868; 7. 502
multicaulis 0. 762
Prevostana 0. 762
Simonyi 4. 868
tenuis 4. 868; 7. 618
Cladocrinites
brevidactylus 6 762
pentagonus 6. 762
Cladocrinus
gen. 3. 238*; 6. 602
Cladocyclus
occidentalis 7. 858!; 8. 376
Cladodus
acuminatus 7. 626
laevis 6. 122
marginatus 6. 122
mirabilis 6. 122
Cladodus
striatus 6. 122; 7. 57
Cladograpsus
gen. 2. 374!; 4. 125 8. 764*, 765
linearis 9. 875
Nereitarum 4. 125*
serrulatus 8. 594
Cladonia
divaricata 3. 745
furcata 3. 745
Cladophlebris
Defrancei 7. 766
Cladopora gen. 1. 766!
caespitosa 1. 766
cervicornis 1. 766
fibrosa 1. 766
macropora 1. 766
multipora 1. 766
reticulata 1. 766
seriata 1. 766
spp. 5. 248
Cladophora spp. 8. 590
Cladophyllia 2. 117*
spp. 2. 758
Cladoxyleae
fam. 5. 240; 6. 629
Cladoxylon gen. 6 629
centrale 5. 240; 6. 627
dubium 5. 240; 6. 627
mirabile 5. 240; 6. 627
Cladyodon gen. 5 757
Claiborne-Gruppe 6. 229
Clasteria gen. 1. 383!
Clathraria 0. 631
anomala 2. 887
Lyelli 0. 112; 2. 887, 992
Clathropora gen. 1. 767!
alcicornis 1. 767
frondosa 1. 767
spp. 5. 248
Clathropteris 0. 628
mesicoides 6. 496
rectiusculus [?] 7. 237
spp. 7. 87
Clausastraea
gen. 0. 763!, 766; 2. 116*, 118*
Savignyi 0. 766
tessellata 0. 766
spp. 2 758
Clausilia biplicata 0. 869
grandis 4. 249; 5. 768
mastodontophila 2. 988
parvula 4. 832
striatula 4. 864

Clausilia
Terveri 5. 746
spp. 3. 512; 9. 114
Clausulus indicator 8. 243
Clavagella bacillaris 6. 857
bacillum 5. 795
Brocchii 6. 857
Brongniarti 6. 858
coronata 1. 715, 716; 3. 231; 6. 857; 9. 844
cristata 6. 857
echinata 6. 857
grandis 1. 765; 7. 229
humerosa 6. 230
Melitensis 5. 795
Mississippiensis 6. 230
tibialis 3. 231; 6. 857
varicosa 6. 230
spp. 7. 632
Clavatula
Boothi 3. 763
brachystoma 3. 763
Californica 7. 242
cancellata 3. 763
castanea 3. 763
concinnata 3. 763
costata 3. 763
laevigata 3. 763
linearis 3. 763
mitrula 3. 763
nebula 3. 763
perpulchra 3. 763
Philberti 3. 763
plicifera 3. 763
Travelliana 3. 763
turricula 3. 763
Clavilithes gen. 6. 230
Clavularia 2. 122
Clavulina gen. 5. 755
communis 2. 253
Cleidophorus
v. Clidophorus
Cleidothaerus gen. 6. 867
Cleiothyris gen. 4. 63
pectinifera 4. 119, 747
Clematis
Oeningensis 2. 761; 3. 505
sp. 0. 506
Clemmys
Bravardi 5. 232
protogaea 2. 305
Cleobis
gen spp. 1. 382, 383!
Cleodora
infundibulum 3. 765
Cleodora
pyramidata 3. 564
Cleonus asperulus 6. 503
Leucosiae 6. 503
sexsulcatus 6. 503
Clepsydropsis gen. 6. 628!
antiqua 5. 240; 6. 626, 630
composita 5. 240; 6. 626
robusta 5 240; 6. 626
Clepsisaurus
Carolinensis 8. 358
Leai 8. 358; 9. 751
Pennsylvanicus 5. 499; 7. 343; 8. 358
Clethra 0. 634
arborea 6. 244
Clidophorus gen. 6. 645
alpinus 9. 629
costatus 6. 119
Goldfussi 7. 223, 760; 9. 9, 359
ovalis 6. 119
planulatus 6. 119, 645
pleurophoriformis 7. 223
sp. 1. 253
Cliff-Formation
Amerikas 0. 224
Climaxodus
brevis 7. 626
imbricatus 6. 122
Clinochlor 5. 9!
Clinton-group 8. 594; 9. 235
Clintonit 2. 848; 7. 171!
Cliona gen. 3. 758
sp. 5. 376
Clionites
Conybearei 3. 758
glomeratus 3 758
Clisia (Verrucidae fam.)
verrucosa 7. 117
Clisiophyllum 2. 122*
Austini 9. 222
bipartitum 6. 114
Keyserlingi 6. 114
multiplex 6. 114
Omaliusi 7. 220
prolapsum 6. 114
turbinatum 6. 114
vortex 6. 114
spp. 2. 990
cfr. Clysiophyllum
Closterocrinus gen. 5. 249!
elongatus 5. 248, 249
spp. 9. 235
Clotho
unguiformis 6. 864
Clubiona
attenuata 5. 122
lanata 5. 122
latifrons 5. 123
microphthalma 5. 122
parvula 5. 123
pilosa 5. 122
pubescens 5. 122
sericata 5. 122
tomentosa 5. 122
Clupea
antiqua 8. 381; 9. 372
breviceps 3. 683; 4. 734
brevissima 3. 108
gracilis 1. 80*
Guestphalica 9. 494*
Haidingeri 2. 980
humilis 1. 80*; 7. 858!; 8. 376
lata 3. 108
laticauda 3. 108
macrophthalma 3. 632
minima 3. 108
sardinoides 3. 108
Voironensis 8. 381; 9. 372
Clya gen. 5. 120
lugubris 5. 122
Clyde-beds 4. 505p.; 7 506
Clymenia
gen. spp. 3. 513!; 4. 849, 853; 5. 259; 6. 316*
angustisepta 6. 625
arientina 3. 518!
binodosa 3. 518!
bisulcata 6. 122, 625
brevicostata 6. 625
campanulata 6. 625
compressa 3. 517!
laevigata 0. 731; 1. 331; 3. 519!; 6. 122
linearis 7. 220
Morrisi 0. 603
Münsteri 6. 122
Pattisoni 3. 111; 6. 122
plurisepta 6. 625
pseudo-goniatites 3. 522!
quadrifera 3. 111; 6. 122
sagittalis 6. 625
striata 3. 520!; 6. 256
subarmata 6. 625
subnautilina 5. 321; 6. 371
undulata 3. 519!; 6. 122; 7. 448; 9. 604
ziczac 4. 854
-limestone 3. 97; 6. 112

Clymenien-Kalke 1. 331; 3. 614, 622, 817; 4, 46
-Schiefer 6. 255
-Schichten 2. 56; 6. 368, 369
Clymeniidae fam. 8. 617!
Clypeaster
altus 6. 101, 242; 7. 502, 773, 859
conoideus 0. 223; 7. 862
cuneatus 6. 672
diversicostatus 7. 502
Duboisi 8. 874
folium 6. 101
laganoides 6. 93*, 739
marginatus 6. 101; 7. 859
oviformis 1. 102
Reidi 6. 101
scutellatus 5. 594
Tarbellianus 7. 859
Clypeasteridae fam. 7. 767
Clypeus Agassizi 8. 357
altus 8. 357
Davoustanus 7. 852
clunicularis 4. 621; 7. 747
conoideus 7. 862
emarginatus 0. 170
Hugii 9. 135
orbicularis 4. 621
patella 9. 133
Sarthacensis 7. 852
sinuatus 0. 157; 4. 621
testudinarius 2. 152, 168, 170
Clysiophyllum
Austini 4. 86
turbinatum 3. 238
cfr. Clisiophyllum
Clytia
aglaiaefolia 6. 505
Leachi 4. 625; 6. 483
Mandelslohi 0. 167
Clythia gen. 5. 120
alma 5. 122
funesta 5. 122
gracilenta 5. 122
leptocarina 5. 122
lineata 5. 122
Cnemidium
fungiforme 7. 233
striato-punctatum 2. 349
Coak 9. 183
natürlicher 8. 386
Coal measurus 7. 729; 8. 98
Cobitis gen. 3. 118*
brevis 7. 555!
centrochis 2. 999; 5. 622
cephalotes 5. 622
longiceps 7. 555
exilis 5. 374
Coblenzien (terrain) 1. 105; 7. 219
Coccocrinus gen. 6. 234!
rosaceus 6. 233
Coccodus gen. 3. 108!
armatus 3. 108
Coccolepis 3. 744
spp. 9. 764
Cocconeis angusta 4. 613
elongata 4. 613
limbata 0. 473
lineata 4. 613
placentula 0. 491
praetexta 4. 613
striata 0. 473; 4. 613
Cocconema
asperum 0. 95
cymbiforme 0. 473
lanceolatum 0. 491; 4. 613
leptoceros 4. 613
lunula 4. 613
Coccopeltis gen. 8. 112
Asmusi 8. 112
Coccosteus gen. 1. 494; 8. 250; 9. 491
cuspidatus 8. 251
decipiens 8. 251; 9. 491
Hercynius 2. 57
latus 6. 124; 8. 251
maximus 8. 251
microspondylus 6. 124; 9. 491
Milleri 9. 491
minor 9. 491
oblongus 6. 124; 8. 251
pusillus 6. 124; 9. 491
trigonaspis 6. 124; 9. 491
Coccoteuthis
gen. 9. 368, 370
hastiformis 9. 370
latipinnis 5. 607!
spp. 9. 370
Cochlea
gen. Hitchc. 9. 869
Archimedea 9. 869
Cochlichnus gen. 9. 869
anguineus 9. 869
Cochliodus
acutus 6. 122
contortus 6. 122
latus 8. 122
magnus 6. 123
nitidus 8. 122
oblongus 6. 123
occidentalis 8. 122
striatus 6. 123
Cochlodesma
complanatum 7. 507
praetenerum 7. 507
Cocites
Faujasi 0. 116
Cocos
Burtini 0. 114; 2. 995; 7. 154
Faujasi 2. 995
Codaster gen. 1. 748!
acutus 1. 748; 6. 115
trilobatus 1. 748; 6. 115
s. Codonaster 2. 745
Codechinus
gen. 7. 122; 9. 255
Tallavignesi 7 859
Codiopsis 7. 122
Codites 0. 626
Codonaster gen. 2. 745!
acutus 2. 745*
trilobatus 2. 745
spp. 8. 751
cfr. Codaster
Codonocrinites
gracilis 0. 376
Codonophora gen.
discophora 7. 778
turbinata 7. 778
Coelacanthi
(trib.) 9. 382*, 766
Coelacanthus
gen. 3. 116*, 118*
caudalis 4. 751
elegans 7. 626
granulatus 4. 751
granulosus 3. 116*; 4. 751
ornatus 7. 626
robustus 7. 626
Coelaster
constellatus 7. 220
latiscutatus 6. 374
Mandelslohi 6. 852
Cölestin 0. 338; 1. 451; 2. 220!, 223; 5. 172
-Schicht (des Muschel-Kalkes 3. 11, 614
Coelocochlea
gen. 2. 125, 126!

Coelodon
gen. 4. 111, 5. 225
Coelodus gen. 5. 486!
Achilles 5. 486
angustatus 5. 486
Itieri 4. 586
Mantelli 5. 486
mesorhachis 5. 486
Muralti 5. 486
oblongus 5. 486
pyrrhurus 5. 486
rhombus 5. 486
Rosthorni 5. 486
Saturnus 5. 486
Sauvanausi 5. 486
suillus 5. 486
Coelogenys paca 5. 113
Coelolepides (fam.) 8. 113
Coelolepis gen. 8. 113
carinatus 8. 113
laevis 8. 113
Goebeli 8. 113
Schmidti 8. 113
Coelophyma
gen. spp. 2. 125, 128!
Coelopleurus 7. 122
Agassizi 7. 859
coronalis 7. 859
Wetherilli 4. 761
Coeloria
gen. 0. 761!; 2. 117*
Coelorhynchus
rectus 5. 235
sinuosus 2. 145, 167
sp. 0. 746; 8. 253
Coelosiphitae (fam.) 6. 126
Coelosmilia 2. 116*
cupuliformis 6. 95
galeriformis 6. 95
Sacheri 6. 95
sp. 1. 627
Coenites 2. 121*
intertextus 6. 113
laciniatus 5. 865
strigatus 6. 113
spp. 7. 104
Coenocyathus 2. 115*
Coenopsammia 2. 119
Coenosphaera spp. 4. 611
Coenotherium
collotarsis 3. 755*
commune 3. 754*
elegans 3. 754*
gracile 3. 754*
laticurvatum 3. 754*
metopias 3. 754*
murinum 3. 755*
Coke 8. 96 (s. Coak)
Coleoceras gen. 4. 853
Coleoprion gracile 2. 927, 930; 6. 372
Coleoptera (class.) 6. 765
Colliguaja gen. 4. 622*
protogaea 4. 380
Collodactyli (fam.) 0. 867
Collyritidae (fam.) 7. 767
Collyrites gen. 9. 378*, 379
analis 9. 378
bicordatus 7. 852; 8. 486
granulosus 6. 95
Nivernensis 9. 378
ovalis 7. 852
ringens 7. 748
Colobodus
Hugardi 5. 234; 6. 745
scutatus 5. 234
varius 0. 246; 4. 840; 8. 622
spp. 3. 165
Cololithes 9. 106
Colonie'n
anachronische 2. 306!; 4. 617, 621
Colorados (Erz-Gänge) 1. 611, 615
Colossochelys Atlas 8. 297
mira 8. 297!
Colpolithis
irregularis 6. 104
Colpophyllia gen. 0. 758!, 760; 2. 117*
Colpopleura gen. 5. 755
Coluber atavus 9. 724
fossilis 5. 374
Gervaisi 5. 374
Kargi 5. 336
Oweni 5. 337, 622
papyraceus 9. 237!
Sansaniensis 5. 233
Columbella 0. 751!
Bellardii 2. 978
Borsoni 0. 751
compta 0. 751
columbelloides 3. 75
corrugata 0. 751
curta 0. 751
discors 0. 751
elongata 0. 751
erythrostoma 0. 751
filosa 4. 760
marginata 0. 751
mercatoria 2. 509
nassoides 0. 751
Columbella
scabra 0. 751
scripta 0. 751
semicaudata 0. 751
subulata 0. 751
sulcata 3. 763
terebralis 3. 604
thiara 0. 751.
turgidula 0. 751
spp. 2. 978; 4. 626; 6. 479, 750
Columbit 2. 215!, 862! 3. 367!; 7. 581*
Columnaria
(gen. 2—3) 0. 627; 2. 121*, 122
antiqua 8. 754
basaltiformis 1. 225, 409, 419
laxa 6. 114
oblonga 0. 174
sulcata 2. 121; 7. 232
Sutherlandi 4. 86; 9. 222
spp. 5. 248
Columnastraea gen. 0. 768!
Brignolensis 0. 768
Prevostana 0. 768
similis 0. 768
striata 0. 768; 3. 582; 4. 867
Colus arctatus 7. 242
Colutea
edwardsiaefolia 6. 506
Colymbetes arcuatus 2. 984
Comatula Browni 4. 762; 9. 366
pennata 5. 613
Ransomi 4. 762; 9. 366
tenella 5. 613
Woodwardi 4. 762; 9. 360
Combophyllum 2. 121*
Leonense 6. 501
Marianum 6. 501
Combretum
Europaeum 2. 755; 3. 505
Comophyllia 2. 117
Comoseris 2. 119*
irradians 2. 378; 8. 873
maeandrinoides 2. 378
vermicellaris 2. 378
vermiculata 2. 758
spp. 2. 758
Complexastraea 2. 118
Compsacanthus
gen. 7. 626.

Compsacanthus
laevis 7. 626
Compsemys gen. 8. 255!
victus 8. 255, 376
gen. 7. 853.
Compsosaurus gen. 7. 855!
priscus 7. 855!, 857
Compteroneura
cretacea 0. 117
paradoxa 0. 117
Comptonia 0. 633
acutiloba 2. 750
brevifolia 2. 750; 9. 503
dryandraefolia 2. 750; 3. 504; 9. 503
dryandroides 2. 750; 9. 374
Gaudini 9. 501
grandifolia 2. 751
laciniata 2. 751; 3. 503; 5. 241; 9. 501
Laharpei 9. 501
Meneghinii 2. 750
obtusiloba 9. 501
Oeningensis 0. 503; 2. 750; 3. 503; 9. 501
ulmifolia 9. 502
Vindobonensis 9. 501
Comptonit 3. 257; 5. 707!
Comptonites 0. 633
antiquus 2. 751
Conchae
cloacinae 6. 741; 9. 527
Conchites anomius 4. 764
Conchodus gen. 9. 491
ostreiformis 6. 123
Conchorhynchus
avirostris 0. 99; 3. 13, 19; 6. 746
Conchula gen. 6. 372
Conchiosaurus
clavatus 5. 367; 6. 760
Conchyliologie 6. 855
Concretionen-Bildung 4. 475
Condylopyge 3. 488
Conescharellina
gen. 4. 116!
Conferva callosa 9. 122
debilis 3. 502
Erebi 4. 611
geniculata 8. 498
incrustata 9. 122
Naegelii 3. 502
Conferva
spongiacea 4. 611
vermiculata 9. 122
Confervaceae (fam.) 5. 637
Conferven-artige
Bildungen 8. 801
Confervites 0. 626
acicularis 2. 276, 890; 6. 375
Bilinicus 3. 502
bryopsis 4. 251.
capillaris 8. 640
capilliformis 4. 378, 877
debilis 5. 637
fissus 2. 886
Naegelii 5. 637
Oeningensis 5. 637
setaceus 2. 886
Sternberganus 4. 743
spp. 1. 382
Confusastraea
gen. 2. 118*; 4. 868
Congeria gen. 6. 862
amygdaloides 6. 239
Basteroti 6. 862
Brardi 6. 862
diluvii 8. 738
Partschi 1. 127!, 361
polymorpha 6. 862. 7. 500
spathulata 1. 362; 2. 627, 765; 6. 239
Styriaca 8. 585, 587
subglobosa 1. 362; 2. 627; 6. 239
triangularis 6. 239; 7. 181; 8. 586
spp. 6. 862
Congerien-Schicht 1. 360
Coniastra 8. 634
Coniferae
fossiles 3. 128, 623!
Coniferites
verticillatus 4. 847.
Coniorhaphides (fam.) 8. 634
Coniorhaphis 9. 464
Coniortes
timidus 6. 622, 623
Coniosaurus gen. 2. 382!
crassidens 2. 381; 3. 109
Coniostylus
reticulatus 4. 739
Coniston Flags 6. 112
Grits 6. 112
Limestone 6. 112
Conistonit 5. 837
Conites armatus 8. 627
Bucklandi 2. 992
cernuus 8. 627
Rossmaessleri 0. 116
Connecticut-Sandstein 7. 87, 877; 9. 509
Conocardium 6. 865
aequilaterale 7. 863
alatum 6. 120
aliforme 2. 933; 6. 866
Bruguierei 6. 866
carinatum 7. 863
catastomum 7. 863
clathratum 2. 340.
cuneatum 7. 863
eduliforme 6. 866
Hibernicum 6. 866
inflatum 6. 866
Koninckii 6. 866
Meekanum 7. 863
minax 6. 866
Prattenanum 7. 863
reflexum 8. 745
rostratum 6. 120, 866
securiforme 6. 256; 7. 628
strangulatum 6. 866
trigonale 6. 866
Uralicum 6. 866; 7. 374
vau 8. 745.
spp. 9. 825
Conocephalites
gen. 0. 779, 785; 3. 486; 6. 223; 9. 504
Conocephalus 3. 486
antiquatus 3. 338
coronatus 9. 721
striatus 3. 338
Sulzeri 9. 721
spp. 4. 493
Conoceras
gen. 6. 126!; 7. 252
Conoclypus
anachoreta 3. 606; 4. 120
Bordai 8. 859
Bouei 4. 120, 121; 7. 862
conoideus 0. 468; 1. 41; 4. 120; 7. 859, 861!; 8. 874; 9. 844
costellatus 7. 862; 9. 844
Jamaicensis 8. 612
Leskei 8. 744; 9. 177
Leymerieanus 7. 859
microporus 4. 120
Osiris 1. 765; 7. 230
plagiosomus 6. 101

Conoclypus
Pyrenaicus 7. 859
ovum 7. 859
subcylindricus 2. 151, 167, 170
Conocoenia 2. 117*
Conocoryphe 3. 486
spp. 4. 493; 6. 223
Conocoryphidae (fam.) 4. 493
Conocrinites Leai 0. 377
tuberculosus 0. 377
Conocyathus
sulcatus 2. 115*
Conodontae (Pisces) 8. 111!, 630
Conoparia gen. 3. 487
Conophyllia 2. 117*
Conophyllum
gen. 1. 766!
Niagarense 1. 766
spp. 5. 248
Conopea ovata 7. 117
Conopsoides gen. 9. 869
larvalis 9. 869
Conosaurus gen. 2. 764!
Bowmani 2. 764*
Conospermum
macrophyllum 2. 750; 9. 374
Sotzkianum 2. 750; 9. 374
Conoteuthis gen. 4. 853
Dupinanus 6. 610
spp. 6. 610
Conotubularia
gen. 5. 385; 6. 126!
Conovulus
bidentatus 0. 869
denticulatus 0. 869.
myosotis 3. 763
pyramidalis 3. 763
Constanzer Petrefakten-Sammlung 5. 621
Constellaria 2. 120*
Terquemi 5. 635
Contact-Metamorphismus 8. 385
Conularia gen. spp. 1. 383
anomala 5. 389
Bohemica 5. 388
cancellata 6. 120, 732
consobrina 5. 389
convexa 1. 491
deflexicosta 6. 372
elongata 1. 491
fecunda 5. 388
Conularia
Gervillei 1. 67; 3. 102; 6372
grandis 4. 2
Hollebeni 4. 865
inclinata 0. 243
Mayeri 3. 102
Niagarensis 3. 343
Nobleti 3. 102
Proteica 4. 2
quadrisulcata 2. 581, 585; 6. 120
subparallela 2. 926, 931; 6. 372
subtilis 6. 120
subulata 7. 863
tubericosta 6. 120
spp. 5. 248; 7. 639
Conulina gen. 5. 755
Conulus
albogalerus 7. 748
Hawkinsi 7. 747
Conurus
uncinatus 9. 510
Conus Allionii 7. 635
acutangulus 0. 223
antediluvianus 0. 223; 2. 358; 7. 51, 635; 9. 125
betulinoides 2. 43; 3. 75
Berghausi 3. 76
brevis 2. 164
catenatus 3. 75
cingulatus 7. 635
concinnus 7. 635, 636
corculum 7. 636
crenulatus 3. 604
deperditus 3. 604; 7. 635
diadema 7. 635
diversiformis 3. 604; 7. 635
dormitor 1. 715; 7. 636
Lamarcki 7. 635
lineatus 1. 716; 7. 636
maculosus 3. 76
Mercati 2. 43; 3. 75
Noae 2. 164, 169; 3. 75
ponderosus 3. 75
procerus 9. 125
Puschi 3. 75
pyramidalis 2. 164, 169; 3. 315
pyriformis 7. 635
pyrula 5. 595
Russeggeri 0. 223
scabriculus 1. 716; 7. 636
Conus
subacutangulus 3. 75
Tarbellianus 3. 75
tortilis 6. 229, 230
turricula 2. 163, 169; 3. 315
turritellus 2. 44.
velatus 7. 635
ventricosus 3. 75
spp. 3. 627
Convexastraea 2. 117*
portlandica 8. 591
spp. 2. 758
Convolvulus
Moenanus 9. 122
Cooks Coal 9. 849
Copalin 0. 338
Copeza gen. 9. 869
triremis 9. 869
Copiapit 2. 71; 7. 583!
Coprolithus
Mantelli 5. 622
Coptosoma
gen. 7. 122; 9. 255
Ataticum 7. 859
Coracit 8. 683*
Coral-rag 0. 170!, 185; 5. 613p; 7. 469; 8. 486, 582
Corallien (terrain) 4. 353!; 6. 763; 8. 488, 582
Coralline
Crag 4. 505p, 507p
Oolite 0. 170!; 3. 233p
Corallinen
vgl. Korallinen 2. 997
Corallinites 0. 626
sp. 3. 47
Coralliolithes
columnaris 4. 744
Coralliophaga
alpina 5. 475
carditoidea 6. 864
cyprinoides 4. 506
Corallium 2. 123*
nobile 2. 855*
Corax
appendiculatus 5. 234; 9. 361
falcatus 1. 183; 5. 728; 8. 382; 9. 124, 361
heterodon 0. 102; 2. 463; 9. 361
Kaupi 9. 361
Pedemontanus 2. 999
pristodontus 9. 361

Corax spp. 3. 109
Corbicella gen. 7. 744!
Bathonica 7. 743
Corbicula ingens 9. 750
Corbis gen. 6. 864
Aglaurae 6. 864
aspera 2. 230; 4. 766
Austriaca 9. 844
Bathonica 7. 743
Buvignieri 6. 864
corrugata 1. 738; 6. 864
decussata 7. 155
depressa 6. 864
Dionysia 7. 155
elliptica 9. 750
laevigata 2. 230
laevis 6. 864
Lajoiei 4. 766
lamellosa 3. 605; 6. 251, 864
Madridi 4. 766
Mellingi 8. 125
multilamellosa 1. 101
ovalis 2. 230; 6. 864
pectunculus 6. 864
rotundata 1. 743; 6. 864
sublaevis 6. 864
sublamellosa 1. 101
unioniformis 6. 864
ventricosa 6. 659
spp. 2. 977; 6. 599, 659
Corbula gen. 6. 858
aequivalvis 3. 231; 6. 869
alata 3. 606; 6. 229, 858; 8. 847
alpina 9. 629
angulata 3. 605; 6. 858
Arnouldi 0. 861
bicarinata 6. 230
Binghami 6. 858
cardioides 6. 863
cardissoides 0. 146
carinata 6. 858
caudata 6. 480, 858
complanata 0. 861; 2. 43; 6. 858; 7. 507
costata 6. 858
curtansata 1 486; 6. 858; 7. 743
cuspidata 1. 712, 715; 7. 507
densata 6. 230
depressa 1. 486; 6. 858; 7. 743
Deshayesi 3. 74
Diegoana 7. 241
donaciformis 7. 507
Corbula
dubia 1. 415, 419; 6. 858; 7. 760
exarata 1. 715; 4. 573; 7. 229
Gallica 3. 605; 6. 858
Galloprovincialis 6. 858
Genyi 3. 605
gibba 1. 741; 2. 43; 6. 858; 8. 584
globosa 1. 716
Goldfussi 0. 297
granulata 7. 507
gregaria 7. 492, 760; 8. 377, 495; 9. 360
Henahi 6. 646, 858
Heukeliusana 0. 862
imbricata 2. 230
incrassata 7. 760
inflata 6. 372, 646
inornata 8. 497
involuta 1. 486; 2. 230; 6. 858; 7. 743; 8. 497
laevigata 6. 861
laevis 3. 605
lanceolata 6. 858
limosa 6. 646, 858
longirostrata 1. 715
longirostris 6. 858
Ludovicae 6. 495
Macneilli 0. 722; 8. 484
mactriformis 7. 494; 8. 495
Mediterranea 6. 858
minor 3. 605
Moreauensis 7. 492; 8. 495
nuciformis 6. 858; 7. 760
nucleus 1. 741; 3. 605, 756, 757; 4. 514; 6. 858; 7. 760; 9. 854
obscura 6. 858
Oldhami 9. 750
ovata 6. 646, 870
parva 6. 646
perundata 7. 494; 8. 495
pisum 0. 862; 1. 716; 6. 534
pyxidata 3. 605
revoluta 1. 716
Rosthorni 0. 733; 8. 2, 124
rotundata 1. 741; 6 858; 7. 507
rugosa 3. 605; 6. 858²
Corbula
Schlotheimi 3. 126; 4. 749
semicostata 3. 605
senilis 6. 646
similis 6. 858
striata 0. 861; 1. 486, 716; 2. 230; 6. 858²; 7. 507, 743
striatula 5. 592; 6. 646, 652
subrostrata 7. 507
substriatula 5. 592
subtrigonalis 7. 494
sulcata 7. 507
sulcifera 9. 750
triasina 7. 760
trigonalis 8. 495
umbonata 6. 858
Valdensis 5. 475
ventricosa 7. 492; 8. 495
spp. 7. 632
Corbulamella
gen. 8. 377!
gregaria 8. 377
Corbulomya
complanata 7. 507
triangula 0. 861
spp. 7. 632
Corburella 2. 230
curtansata 2. 230!
Cordaites 0. 629
borassifolius 3. 121; 5. 631, 712; 6. 98
principalis 5. 631; 8. 503
spp. 9. 380
Cordia tiliaefolia 0. 506; 2. 761; 9. 502
Cordieria gen. 1. 753!
Cordierit 2. 848; 3. 602; 6. 349; 9. 586
Cordieroid 2. 851
Cordylodon
Haslachensis 9. 173!
Cordylodus gen. 8. 112
angulatus 8. 112
rotundatus 8. 112
Coreites crassus 3. 873
oblongus 3. 873
redemtus 3. 873
Corethrium
pertinax 5. 747
Coriaria 0. 635
myrtifolia 4. 627
Corimya gen. 6. 246, 250!
elongata 6. 858
Gnidia 6. 250

Corimya
lata 6. 858
pinguis 6. 250, 858
Studeri 4. 355; 7. 743
Taurica 8. 874
truncata 6. 858
Coriocella gen. 3. 765
Corisa
fasciolata 3. 874
Corizus Bojeri 3. 872
Cormophyta (class.) 0. 626!
Cornbrash 0. 164, 183; 3. 233p; 4. 620!; 7. 207; 8. 482, 583
Corne rouge (Gebirgsart) um Lyon 0. 74*
Cornicularia Ach.)
aculeata 3. 745
ochracea 3. 745
subpubescens 3. 745
Cornicula
succinea 3. 225, 745
Cornstone 1. 104
Cornubianit 6. 596; 9. 577
Cornularia 2. 122
Cornulites gen 5. 253!
epithonius 5. 384
flexuosus 5. 248, 253
scalaris 4. 634
serpularius 2. 375; 6. 115; 8. 715, 753
tenuis 4. 634
Cornus 0. 635
acuminata 2. 754
ambigua 4 627
apiculata 2. 894; 3. 227
Benthamioides 3. 435
Büchii 3. 505
Deikei 3. 505
dubia 2. 761; 3. 506
orbifera 3. 505
rhamnifolia 2. 754; 3. 505
Studeri 3. 505
sp. 0. 506
Cornuspira
Reussi 6. 756
rugulosa 7. 497
spp. 9. 865
Cornuspirida (fam.) 5. 754! ff.
Cornutella
clathrata 5. 471; 7. 111
Corolliflora (Vegetabilia) 2. 504!
Coronocrinus gen. 9. 236!
spp. 9. 236
Coronula barbara 7. 117
Coronulites diadema 7. 117
Corregonus gen. 3. 118*
Corsira ambigua 5. 371
antiqua 5. 371
exilis 5. 371
fossilis 5. 371
Corticaria
melanophthalma 6. 503
Corundellith 2. 848
Corvipes
lacertoideus 9. 868
Corydocephalus
gen. 3. 487; 6. 116
Corylus 0. 633
australis 6. 244; 9. 253
bulbiformis 8. 499
Goepperti 3. 227
grossidentata 3. 503; 9. 501
inflata 8. 499
insignis 3. 503; 8. 740; 9. 501
Rhenana 6. 505
spp. 0. 503; 9. 348
Corynexochus 4. 493; 6. 224
spp. 9. 504
Corynexoccidae 4. 493
Corynitis spinosa 5. 121
undulata 5. 121
Coryphodon
gen. 7. 488!, 869
anthracoideus 0. 879; 5. 581; 7. 489!, 490
eocaenus 5. 226; 7. 489!, 490
Oweni 7. 490!
Corystes
Stockesi 4. 201; 7. 659
Coryza femorata 8. 227
mercenaria 8. 227
Coscinaraea
gen. 2. 119*; 3. 876
Coscinium
dubium 3. 128; 4. 119, 744; 5 498
Coscinodiscus Argus 6. 103
borealis 9. 225
centralis 6. 103
crassus 9. 225
excentricus 0. 473; 6. 103
fasciatus 6. 103
flavicans 6. 103
gigas 6. 103
lineatus 6. 1033
marginatus 6. 103
minor 0. 473; 6. 103
oculus-viridis 9. 225
patina 0. 473; 6. 103
perforatus 6. 103
polycora 6. 103
profundus 5. 471
radiatus 0. 473; 4. 739
radiolatus 6. 103
subtilis 0. 473; 6. 103
Coscinodus 8. 113
Agassizi 8. 113
Coscinopora
macropora 0. 243.
Coscinospira
gen. 5. 751; 755
Cosmacanthus gen. 8. 249
Cosmaria
margaritacea 1. 229
Cosmolepis gen. 8. 237!
Egertoni 8. 237
Costarites undulatus 0. 116
Costaten-Thone 6. 742
Cotoneaster 0. 637
Cottaea 0. 628.
Cottaites 0. 638
Cottaldia gen. 7. 122; 8. 510; 9. 255
Nivernensis 8. 511
spp. 7. 852
Cottus brevis 5. 622, 808
Cotunnit 1. 604; 9. 77
Coturnix 7. 765
Cotylederma gen. 7. 816
Cotylops speciosa 5. 114; 8. 376
Couche de ciment de Vassy 0. 152, 181
Couches à Cardinia 0. 180
à Cymbium 0. 180
Couenne um Lyon 0. 73*
Couzeranit 1. 444; 2. 522; 4. 600!; 6. 46*
Covellin 5. 349!; 9. 624
Crag 1. 477; 741 p.; 2. 882, 1003; 3. 104 p., 625; 4. 89, 505 p., 507 p., 761 p.; 7. 503 p., 506 p.; 9. 747
mit Knochen 0. 90
- Mollusken 2. 1003; 3. 762; 4. 505! 507
Craie chloritée 3. 716
tuffeau 5. 592; 6. 460; 9. 466
Cranchia gen. 4. 852

Crangon Magnevillei 0. 125
Crania
gen. 0. 373; 3. 256!
anomala 4. 504
antiqua 7. 116
antiquior 3. 210; 8. 482
antiquissima 3. 216
Brattenbergensis 4. 61, 504
Bredai 5. 239
cassis 8. 745
Cenomanensis 7. 482
comosa 5. 239
complanata 7. 116
costata 4. 504; 7. 116; 9. 228
Egnabergensis 4. 508
(cfr. „Ignabergensis")
Gümbeli 7. 693!
Ignabergensis 7. 482
Kirkbyi 9. 761
Moorei 3. 210
obsoleta 5. 384; 6. 509
ovalis 4. 508
Parisiensis 4. 508; 7. 482
Ponsorti 5. 509
proavia 6. 509
Sedgwicki 3. 216
spinulosa 4. 508
tuberculata 4. 538, 556
spp. 6. 227
Craniadae 4. 61; 6. 116
Craniidae fam. 3. 256!
Craspedodiscus spp. 6. 103
Craspedopoma gen. 4. 865
Elisabethae 4. 865
spp. 3. 30
Craspedosoma
aculeatum 5. 121
affine 5. 121
angulatum 5. 121
armatum 5. 121
cylindricum 5. 121
obtusangulum 5. 121
setosum 5. 121
Crassatella gen. 6. 868
acutangula 3. 605
alta 6. 229, 868; 7. 242
angusta 6. 868
arcacea 0. 293, 727, 728
Archiaci 3. 605
Bellovacina 6. 868
compressa 6. 868
concentrica 6. 868
concinna 6. 868
Carcarensis 8. 515
Crassatella
dissita 6. 868
Evansi 7. 864, 8. 495
flexura 6. 230
gibba 6. 868
gibbosula 6. 868
Hellica 1. 101.
impressa 6. 868
lamellosa 2. 160; 6. 868
Marotana 6. 868
minutissmia 4. 505
Mississippiensis 6. 229
Nysti 6. 868
Parisiensis 8. 516
pisolithica 1. 101
plicata 1. 715; 6. 868
plumbea 6. 868
Podolica 6. 868
ponderosa 6. 868
regularis 0. 727
Ripleyana 9. 498
Robinaldina 6. 250
rostralis 6. 868
scutata 6. 868
scutellaria 3. 369; 6. 93; 6. 739, 868
semicostata 3. 605
sinuosa 8. 516
subrotunda 3. 605
subtumida 3. 605
sulcata 1. 716; 3. 605. 6. 868²
tenuistria 3. 605
tenuistriata 6. 868²
trapezoidalis 6. 868
triangularis 3. 605
trigonata 6. 868²
tumida 0. 714; 1. 101, 401, 740; 4. 627; 6. 868; 8. 587, 874
Uvasana 7. 242
Vendinensis 1. 743
spp. 2. 977; 6. 868; 7. 623
Crassina gen. 6. 868
bipartita 4. 505
Gairensis 4. 505
incrassata 4. 505
minima 4. 505
nitida 4. 505
Omaliusi 4. 505
triangularis 4. 505
Crataegus 0. 637
incisus 2. 755
Credneria gen. 0. 633; 5. 493!; 8. 365!
acuminata 5. 493; 8. 364
Credneria
Beckerana 2. 894; 8. 365
biloba 8. 364
cuneifolia 5. 493; 8. 365
denticulata 5. 493; 8. 364
expansa 8. 365
Geinitzana 8. 365
grandidentata 5. 493; 8. 365
integerrima 5. 493; 8. 364
Reichi 8. 365
reticulata 5. 624; 8. 365
Schneiderana 8. 365
spatulata 5. 624; 8. 365
Sternbergi 5. 493; 8. 365
subserrata 5. 493; 8. 364
subtriloba 5. 493; 8. 364
tremulaefolia 8. 365
triacuminata 5. 493; 8. 364
venulosa 5. 493; 8. 365
spp. 0. 117; 6. 640; 8. 87
Crematophus 0. 627
spp. 9. 379, 380
Crenaster
Montalionis 7. 605
gammae 9. 22
Crenea spp. 8. 507
Crenidelphinus
gen. spp. 5. 231
Crepicocephalus 3. 336*
Minnesotensis 3. 336
spp. 9. 504
Crepidula cochleare 3. 74
lyrata 6. 229
ovata 7. 639
princeps 7. 242
unguiformis 1. 741.
unguis 3. 74.
spp. 1. 382; 6. 750
Crepidulidae (fam.) 6. 120
Crescis
complicata 5. 653
primaeva 6. 122, 124
Sedgwicki 6. 122
ventricosa 6. 122
spp. 5. 98
Creusia gen. 5. 126
Strömia 7. 117
verrucosa 1. 117
Cricetodon
medius 5. 225
minor 5. 225
Sansaniensis 5. 225

Cricetus
frumentarius 3. 377
musculus 5. 371
vulgaris 5. 225
Cricodus incurvus 8. 509
Cricopora
abbreviata 5. 634
caespitosa 5. 634
capillaris 5. 634
elegans 5. 634
straminea 5. 634
subverticillata 5. 634
tubiformis 6. 245
verticillata 5. 634
Tessoni 5. 634
tetragona 5. 635
spp. 2. 125
Cricosaurus gen. 9. 109!
elegans 9. 110!
grandis 9. 109!
medius 9. 109!
Crinoidea (ordo) 3. 238*; 4. 229!; 6. 115, 601!, 631, 761!; 7. 860; 8. 628; 9. 635, 758
Crioceras
gen. 4. 853; 6. 316*
Conradi 6. 480
cristatum 1. 416; 2. 284, 288; 3. 311, 312, 319
Duvali 0. 415, 482, 735; 2. 455; 4. 364; 5. 623; 6. 847
ellipticum 8. 373
Emmerici 0. 394; 2. 455; 5. 324; 7. 659, 675*
gigas 0. 391
Lewyanum 5. 382*
Puzosanum 1. 416; 2. 284, 288; 3. 319
semicinctum 7. 659, 676
Woronzowi 1. 491
sp. 9. 629
Crioceratites
Parkinsoni 0. 165
-Kalkmergel 3. 192
Criserpia
pyriformis 4. 117
Crisina 2. 128
Cristellaria
gen. 5. 755; 7. 377
angusta 4. 867
antiquata 9. 371
arcuata 7. 296!, 309!; 7. 497
Cristellaria
arquata 7. 497
auricula 7. 497
convergens 6. 756
echinata 1. 378
elegans 7. 497
elliptica 6. 756
eurythalama 7. 750
excisa 6. 756
galeata 2. 253; 6. 756
geniculata 9. 371
gladius 7. 497
Gosa[va]e 4. 867
incerta 7. 296!
incisa 9. 371
intermedia 4. 672
Jugleri 2. 253
Landgrebeana 7. 497
lenticula 2. 254
matutina 9. 371
maxima 6. 756
mirabilis 7. 497
mysteriosa 7. 633
Nauckana 7. 497
orbicula 4. 867
ornata 6. 496; 9. 371
Osnabrugensis 7. 497
ovalis 7. 497
polita 7. 497
prima 9. 371
rhomboidea 1. 378
rotulata 1. 228; 4. 866, 867
rustica 9. 371
simplex 7. 296!, 309
speciosa 9. 371
stellifera 1. 378
striolata 1. 378
subalata 4. 867
subcostata 7. 497
Terquemi 9. 371
triangularis 4. 867
tetraedra 6. 756
variabilis 2. 254; 7. 497
vetusta 9. 371
spp. 2. 511*
Cristellarida (fam.) 5. 754!ff.
Cristiceps gen. 3. 123*
Crocidura
prisca 5. 371
Crocodile de la craie de Meudon 9. 361
de Sheppey 2. 380
Crocodiloidea (ordo) 9. 867
Crocodilus
basi-fissus 0. 255!
basi-truncatus 0. 255!
Crocodilus
Becquereli 5. 232
biporcatus 2. 303
Blavieri 5. 232
Brongniarti 5. 232, 233, 744; 9. 361
Bütikonensis 4. 579!; 6. 109; 9. 428
coelorhinus 5. 232
champsoideus 2. 380; 4. 580
clavirostris 2. 763, 765
communis 5. 232
Cuvieri 5. 232
Deluci 5. 232
depressifrons 5. 232, 743
Doduni 5. 232
Elaverensis 5. 232; 7. 538
fossilis 8. 869
Hastingsiae 1. 78*, 713, 714; 2. 380; 4. 580; 6. 33, 599; 7. 57, 625; 9. 753
heterodus 5. 232, 743
humilis 7. 114; 8. 376
indeterminatus 5. 232
isorhynchus 5. 232
macrorhynchus 2. 763, 764; 5. 232
maximus 4. 538
obtusidens 5. 232, 743
Parisiensis 5. 232
plenidens 7. 58
priscus 5. 107; 9. 109
Provincialis 5. 232
Rahti 1. 78*; 4. 580 7. 537
Rateli 5. 232, 743; 7. 538
Rollinati 5. 232, 743; 6. 760
Spenceri 2. 380; 4. 580
temporalis 5. 233, 743
Toliapicus 2. 380;,5. 580
Trimmeri 5. 232
Ungeri 4. 580
spp. 1. 254, 379; 2. 765; 5. 232
Crocotta gen. spp. 5. 230
Cromiodendron
Radnicense 6. 98
Cromus gen. 3. 488, 489!; 6. 224
arcticus 9. 222²
Cromyodendron
Radnicense 5. 506

Cronstedit 0. 706!
Crossognathus gen. 8. 381!
Sabaudianus 8. 381!; 9. 372
Crossopodia gen. 3. 380!; 7. 754
lata 3. 380; 6. 115
Scotica 3. 380; 6. 67, 115; 7. 754*
fodiens 5. 224
fossilis 5. 371
Crossotoma
gen. 3. 237!
Pratti 3. 234
Crotalocephalus
articulatus 4. 501
Crotalocrinus gen. 4. 242!
rugosus 4. 242; 6. 115
Crotalurus gen. 9. 358!
Barrandei 9. 358!
Crucibulum
spinosum 7. 242
spp. 6. 753
Crucilith 6. 693*
Crumenacrinites
ovalis 0. 377
Crustacea (class.) 1. 505
Cruziana
Deslongchampsi 8. 621
(furcifera) 4. 221
spp. 9. 504
Cryphaeus
gen. 1. 508!; 3. 488
calliteles 1. 66; 2. 340
Sedgwicki 1. 508
Cryptabacia 2. 118*, 376
Cryptangia
gen. 0. 767; 2. 118*
parasita 0. 767
Woodi 0. 767
sp. 1. 627
Cryptina
Raiblana 0. 733; 2. 301; 6. 737; 7. 616, 621, 622; 8. 2, 125, 345
Cryptoceras
gen. 8. 617, 618*
spp. 8. 618
Cryptocoenia 2. 117*
Criptocrinites
cerasus 4. 235ff.
Cryptodon
ferruginosus 2. 1004
sinuosus 2. 1004; 7. 510
Cryptohelia 2. 116*, 249!, 250
Cryptolithidae (fam.) 4. 493
Cryptolithus
gen. 3. 487; 6. 116
Caractaci 4. 502
fimbriatus 4. 502
spp. 4. 493
Cryptomeria
primaeva 0. 94
Cryptomya
ovalis 7. 853
Cryptonymus
gen. 3. 487; 6. 510
obtusus 9. 864
parallelus 5. 872
punctatus 5. 872
Wörthi 5. 872
spp. 2. 242; 4. 493
Cryptosaurus
gen. 6. 760
Cryptostegia
(tribus) 2. 255!
Cryptostoma
perspectiva 6. 753
Ctenacanthus
abnormis 8. 753
crenatus 6. 123
denticulatus 6. 123
distans 6. 123
heterogyrus 6. 123
hybodoides 5. 255
nodosus 5. 255
Ctenicerium
Blissus 5. 747
Hylastes 5. 747
Ctenis angusta 6. 617
inconstans 6. 617
Ctenocephalus
gen. 3. 486
Ctenocrinus
gen. 7. 861!; 8. 371
decadactylus 2. 927, 938; 6. 233, 374
stellaris 6. 233; 8. 371
typus 1. 224; 2. 927, 937; 3. 238; 6. 233
spp. 6. 501
Ctenodipterus
gen. pisc. 3. 125
Ctenodonta gen. 9. 635*
Ctenodus gen. 6. 123
radiatus 1. 607
serratus 1. 607
sp. 3. 125
Ctenognathus gen. 8. 112
Keyserlingi 8. 112
obliquus 8. 112
Murchisoni 8. 112
Verneuili 8. 112
Ctenoides
acutilineata 9. 49
Ctenophyllia 2. 116*
Ctenopoma gen. 6. 481!
Jemelkai 6. 481!
Ctenoptychius
apicalis 6. 123
digitatus 8. 123
Hercyniae 8. 753
serratus 6. 123
Ctenopygius gen. 8. 249
Cucubalites 0. 638
Goldfussi 2. 755
Cucullaea gen. 6. 874
acutangula 6. 875
Adolphaei 6. 875
amoena 2. 230
angusta 7. 874
antiqua 6. 874, 875
Aspasia 6. 875
Beyrichi 3. 25, 30
bipartita 2. 230; 6. 875
cancellata 1. 348; 4. 370; 7. 743; 9. 32, 34
capax 9. 498
Caravantesi 6. 500
carinata 6. 874, 875²
Cawdori 6. 874
concinna 2. 352; 4. 765; 6. 875
cordata 7. 492; 8. 495
cucullata 1. 486; 4. 765; 6. 874
densegranulata 2. 230
dilatata 0. 480
elegans 6. 875
elongata 0. 871; 1. 486; 2. 230; 4. 765; 6. 875²
exigua 8. 495
fibrosa 6. 874
Fischeri 6. 875
formosissima 6. 875
funiculosa 1. 486; 2. 230
glabra 2. 157, 168; 6. 874
Goldfussi 4. 765; 6. 875
Hardingei 3. 815; 6. 874
Hecate 6. 874
Hirsonensis 0. 871; 2. 230; 4. 765
Janira 6. 875
inaequivalvis 9. 29
inornata 8. 496, 497; 9. 824
Keyserlingi 6. 875
lineata 6. 874, 875

Cucullaea
longirostris 5. 848; 6. 874, 875
Lycetti 6. 875
Mac-Coyana 6. 875
Matheronana 6. 875
minuta 4. 765
minutissima 6. 874
nana 2. 109, 230
Nebrascensis 8. 495
nuculiformis 3. 25; 7. 760
obliqua 2. 230; 7. 743
obliquata 6. 874
oblonga 1. 486; 6. 874, 875²; 9. 34
ovalis 6. 874
ovata 2. 581, 585; 6. 874, 875
parvula 6. 874, 875
Passyana 6. 875
patruelis 6. 875
pectinata 6. 874, 875
Phillipsana 6. 875
rotundata 6. 875
rudis 0. 871; 4. 765
Schlotheimi 4. 749; 6. 643
Schmidi 3. 25, 30; 9. 360
Shumardi 7. 492; 8. 495
Sowerbyi 6. 875
striata 6. 875
subantiquata 6. 875
subconcinna 6. 875
subelegans 6. 875
subglabra 6. 875
sublaevigata 4. 765
sublineata 6. 875
subovata 6. 875
subparvula 6. 875²
sulcata 4. 748
tenuistria 6. 875
texta 4. 355; 6. 875²
Tippahana 9. 498
trapezium 3. 815
triangularis 2. 230; 6. 874; 8. 128
triasina 6. 875
ungula 6. 481
unilateralis 6. 500
ventricosa 0. 99; 3. 26; 9. 360
Vogulica 0. 227
vulgaris 8. 360
spp. 1. 253; 6. 874
Cucumites 3. 835
Cuica (-Gestein) 4. 726!
Culica 2. 118
Culicia D. 0. 758
Culicocrinus
gen. 6. 233!
nodosus 6. 233
Culm 5. 49 ff.; 6. 475, 476; 7. 345
-Schichten 3. 813; 4. 46; 6. 79, 255
Cucullella
antiquata 6. 120
coarctata 6. 120
cultrata 6. 373
obliqua 8. 715
ovata 6. 120
tenuiarata 6. 373
Culmites 0. 630
ambiguus 2. 628, 993; 3. 120, 190; 8. 500
anomalus 1. 635; 5. 638
arenaceus 2. 628
arundinaceus 3. 120; 4. 491; 5. 638
bambusioides 9. 374
cretaceus 4. 229
dubius 3. 503; 5. 638
Goepperti 0. 116; 5. 638
nodosus 2. 993
oblongus 3. 503; 5. 638
priscus 2. 887
tuberosus 2. 760; 3. 503
Cultellus
cultellatus 7. 506
tenuis 7. 506
spp. 7. 632
Cultridens gen. 5. 230
Cumbrien 1. 104
Cumingia
tellinoides 6. 859
Cummingtonit 6. 183!
Cuneolina gen. 5. 755
Cunicularius gen. 9. 869
retrahens 9. 869
Cunninghamites 0. 632
Cunoidea 9. 867
Cupania
juglandina 9. 375
Cupanoides 0. 636
anomalus 6. 252
miocaenicus 2. 628
Cupellaecrinites
Buchi 0. 377
corrugatus 0. 377
inflatus 0. 377
laevis 0. 377
magnificus 0. 377
Cupellaecrinites
pentagonalis 0. 377
rosaeformis 0. 377
stellatus 0. 377
sriatus 0. 377
Verneuili 0. 377
Cupressineae(fam.) 5. 638
Cupressinium
gen. 7. 363
Breverni 7. 363
Cupressinoxylon gen. 7. 363
vid. Cupressinoxylum
Cupressinoxylum
aequale 2 894, 986; 3. 226
Aleuticum 7. 363
Breverni 7. 363
distichum 7. 363
durum 2. 753
erraticum 7. 363
fissum 2. 894, 986; 3. 226
Fritscheanum 7. 363
granulosum 2. 753, 987
Kiprijanovi 7. 363
leptotichum 2. 894, 986; 3. 226
multiradiatum 2. 894, 986; 3. 226
nodosum 2. 894; 3. 226
opacum 2. 894, 986; 3. 226
pachyderma 2. 753, 894, 986, 987; 3. 226
ponderosum 8. 333
Retinoxylon 7. 363
sangnincum 7. 363
Sequoianum 7. 363
Severzovi 7. 363
subaequale 2. 894, 986; 3. 226
sylvestre 7. 363; 9. 847
tenerrimum 2. 753
Thuioxylon 7. 363
Ucranicum 4. 229
uniradiatum 2. 753
Wolgicum 7. 363
sp. 2. 962
Cupressites 0. 632
Brongniarti 2. 753
freneloides 6. 535
Goepperti 4. 378
gracilis 2. 753
Linkanus 3. 226, 746
racemosus 2. 753, 984; 3. 226; 5. 638

Cupressocrinus
gen. 4. 231; 6. 633
calyx 1. 748; 6. 115,602
impressus 1. 748; 6. 115, 602
nodosus 6. 375
Cupressus gen. 7. 363!
disticha
geologisch. Alter 5. 221!
vgl. Taxodium distich.
latifolia 4. 855
liasina 2. 983
Ullmanni 3. 124
Cuprit 2. 519 ff. 4. 448
Cupularia gen. 4. 117!
Cuvieri 3. 74
Curculionites
liasinus 2. 985
lividus 6. 503
morosus 6. 503
parvulus 6. 503
prodromus 4. 204
Curculium
Syrichthus 5. 747
Curlew Coal 9. 849
Cuvieri-Schichten 7. 787
Cyamium
eximium 2. 1004
Cyan-Metalle 8. 852
-Titan, künstlich 2. 703!
Cyanit 5. 181, 315
Cyathaxonia 2. 121*
cornu 6. 114
costata 6. 114
Dalmani 8. 266
Hercynica 6. 255
Siluriensis 6. 114
spp. 2. 990; 7. 104
Cyatheites 0. 628
aequalis 5. 630
arborescens 0. 671; 1. 476; 5. 630; 6. 98; 7. 630; 8. 201, 503; 9. 149
argutus 5. 630
asper 2. 890; 5. 243; 9. 131
Candolleanus 0. 671; 1. 476; 5. 630
decurrens 6. 253
dentatus 5. 630
lepidorhachis 1. 476
Miltoni 1. 476; 5. 630; 8. 201; 9. 149
Oreopteridis 1. 476; 5. 630; 6. 98
platyrrhachis 0. 671
Cyatheites
polymorphus 0. 671
Schlotheimi 0. 662, 670; 1. 476; 5. 630
setosus 6. 98
undulatus 6. 98
unitus 5. 630
villosus 5 630
Cyath[ohe]lia 2. 249!, 250
Cyathina 2. 115*
Nauckana 7. 499
salinaria 3. 382
sp. 1. 627
Cyathocrinites
planus 4. 745
Cyathocrinus
gen. 3. 238!
conglobatus 0 377
corrugatus 0. 377
crateriformis 0. 377
decaphyllus 6. 625
depressus 0. 377
dubius 6. 625
geometricus 6. 115; 7. 860
globosus 0. 377
gracilis 0. 377
inflatus 0. 377
Loganensis 8. 371
macrodactylus 3. 238
mammillaris 6. 602
pentagonus 7. 387; 8. 268
planus 0. 377; 4. 745; 6. 762
pinnatus 0. 731; 2. 192; 3. 238; 6. 374
pulcher 4. 241
quinquangularis 0. 243
ramosus 3. 126, 128, 778; 4. 119, 745, 489; 7. 374; 8. 766
Rhenanus 2. 927, 937; 3. 238; 6. 374 8. 370
robustus 0. 377
rugosus 4. 242; 7. 387; 8. 268
sculptus 0. 377
stellatus 0. 377
Tennesseae 0. 377
tiariformis 0. 379
tuberculatus 3. 238; 6. 374; 8. 370
Cyathohelia 2. 116*
Cyathophora 2. 117*
spp. 2. 758
Cyathophyllidae
fam. 1. 488; 4. 497; 6. 114
Cyathophyllum 2. 121*, 758
ananas 2. 341
arietinum 9. 847
articulatum 8. 266; 9. 222
caespitosum 0. 238, 243, 731; 2. 108, 193; 6. 113, 225; 9. 159; 222
ceratites 0. 277; 1. 413!; 419; 2. 193, 275, 287; 3. 318; 6. 113, 375; 7. 387; 9. 629
compositum 0. 765
confluens 0. 759
corniculum 9. 847
dianthus 2. 340
dianthoides 6. 113
excentricum 2. 108
explanatum 0. 731
flexuosum 2. 121
fungites 9. 827
gracile 0. 759
granulatum 0. 759
helianthoides 2. 193; 9. 222
hexagonum 0. 731; 6. 375
humile 6. 255
ilicinum 9. 847
mactra 1. 413, 419
Michelini 2. 340; 7. 220
Murchisoni 6. 501
paracida 6. 113
parasiticum 6. 255
perfoliatum 2. 121
plicatum 2. 115
primaevum 2. 926, 938
profundum 4. 119, 744; 7. 374
proliferum 6. 255
pseudo-vermiculare 6. 113
quadrigeminum 2. 108, 193; 6. 209
radiciforme 1. 141
reticulatum 7. 386
rugosnm 2. 109
Sedgwicki 6. 255
turbinatum 0. 238, 731; 4. 497; 5. 853, 854; 6. 375
undulatum 8. 754

Cyathophyllum
vermiculare 1. 141; 3. 318; 6. 255; 7. 220; 9. 629
spp. 2. 990; 4. 497; 7. 104
Cyathopsis 2. 121
cornu-bovis 6. 114
cornu-copiae 6. 114
eruca 3. 238; 6. 114
fungites 6. 114
gigas 6. 255
Cyathoseris 2. 119*
Haidingeri 4. 868
infundibuliformis 2. 377
raristella 4. 868
Valmondoisiaca 2. 377
Cyathula-Schicht 0. 860
Cybele gen. 1.509; 6.224
punctata 1.255; 4.501
rugosa 6. 116
sexcostata 4. 501
variolaris 1. 255
spp. 4. 493; 5. 248
Partschi 2. 627
speciosum 5. 380
spp. 9. 640
Cybota gen. 9. 498
lintea 9. 498
Cycadeae (fam.) 5. 637
Cycadeoidea gen. 0. 630
cylindrica 6. 496
megalophylla 6. 617
megaphylla 2. 887
microphylla 2.887; 6.617
n. sp. 6. 496
Cycadites
gen. 0. 630; 6. 616!
angustifolius 2. 995; 6. 616
Brongniarti 2.887; 6.616
Bucklandi 2. 992
Escheri 3. 502; 5.637
giganteus 6. 616
Morrisanus 6. 616
Nilssonanus 6. 616
pectinatus 6. 616
platyrhachis 4. 34
salicifolius 2.995; 6.616
Schmidti 8. 503
Cycadophyllum
gen. 6. 618!
elegans 6. 618
Cycadopsideae(fam)0.117!
Cycadopsis n. g. 0. 117!
Aquisgranensis 0. 94, 117, 118
Cycadopsis
araucarina 0. 117, 118
cryptomerioides 4. 229
Foersteri 0. 117, 118
Monheimi 0. 117. 118
thujoides 0. 117,
Cycadopteris gen. 4. 34!
gracilis 4. 34
ornata 4. 34
Ungeri 4. 34
Cyclas gen. 6. 863
amnica 6. 863
angulata 6. 862
calyculata 6. 863
carinata 6. 862
concentrica 6.863; 9.116
cornea 1. 760; 2.1004; 9. 842
exigua 1. 712, 713
fasciata 6. 862
fontinalis 4. 832
formosa 7. 494; 8. 495
fragilis 7. 494; 8. 495
keuperana 9. 383
lacustris 6. 863
majuscula 6. 862
media 7. 99.
Normandi 5. 746
orbicularis 6. 862
palustris 9. 475
postera 9. 13
rivalis 2. 194f.; 3. 554, 564;
rivicola 2 1004; 6. 863
rivularis 7. 729
rugosa 6. 495
Sirena 6. 93
subelliptica 7. 494; 8. 495
tetrica 7. 853
spp. 1. 122; 6. 752, 863; 8. 616
Cyclaster gen. 7. 860!
Bigsbyi 9. 636
declivis 7. 859
Cyclina Woodi 6. 862
Cyclobatys
oligodactylus 3. 108
Cyclocarpum gen 8. 627!
nummularium 8. 628
Cycloceras 6. 126!
annulatum 6. 122
arcuolyratum 6. 122
bilineatum 6. 122
Flemingi 3.760; 6.122
ibex 6. 122
rugosum 6. 122
Cycloceras
striatulum 6. 122
subannulatum 6. 122
tenuiannulatum 6. 122
tracheale 6. 222
tubicinella 6. 122
undulatum 6. 122
sp. 1. 253
Cyclocladia major 5. 628
ornata 5. 868
Cycloclypeus
gen. spp. 8. 244!, 247
Cyclocoenia 2. 117*
Cyclocriniten-Kalk 5. 854
Cyclocrinites 2. 122*
Spaski 8. 594
Cyclocyathus 1. 627
Fittoni 2 115*
Cyclocystoides
gen. 9. 636!
Cyclognathus
gen. 5. 228, 373²; 6. 638
laticurvatus 5. 373
Cyclolina
gen. 5.640, 755; 7.228
Dufrenoyi 5 592
impressa 7. 304!
Cyclolites s. Cyclolithes
Cyclolithas 2. 376
Cyclolithes 2. 119*
alaceus 2. 378
Alpinus 5. 475
Altavillensis 2 376
Andianensis 2. 377
Borsoni 2. 376, 377
cancellatus 2. 376
Carcarensis 2. 378
complanatus 2. 376
Corbieriacus 2. 376
coronula 2. 376
cristatus 0. 760; 2. 378
cupularius 2. 376
deformis 2. 378
depressus 4. 868
Deshayesi 2. 376
discoideus 2. 376; 4. 868
ellipticus 2.376; 3.582; 4. 868; 6. 206; 7. 232
excavatus 2. 378
Eudesi 2. 378
giganteus 2. 376
Guerangeri 2. 376
Guettardi 2. 376
Haueranus 2. 376
Haueri 4. 868

Cyclolithes
hemisphaericus 2. 376; 3. 582; 4. 868
laevis 2. 376
lenticularis 2. 376
Ligeriensis 2 376
macrostoma 3, 582; 4. 868
mactra 7. 130
Niciensis 2. 377
numismalis 2. 376, 377
nummulitoides 2. 378
nummulus 4. 868
orbitolites 2. 378
orbulites 2. 376
placenta 4. 868
polymorphus 2. 376
porpita 2. 376
praeacutus 2. 377
rugosus 2. 376
scutellum 4. 868
semiglobosus 2. 376, 377
semiradiatus 2. 376
stelliferus 2. 376
titiculatus 2. 376
undulatus 2. 376; 3. 582; 4. 868; 7. 232
variolatus 2. 376
Vicaryi 2. 376
spp. 5. 248
Cyclonema gen. 5. 253!
cancellatum 5. 253; 8. 855
spp. 5. 248, 353
Cyclophthalmus
senior 8. 93
Cyclophyllia 0. 700; 2. 117
Cyclophyllum 2. 377
Cyclopit 5. 832!
Cyclopteris 0. 627
amplexicaulis 5. 243
auriculata 6. 97
Bockschi 2. 890; 5. 630
crassinervis 5. 630
digitata 2. 886; 6. 253²
dissecta 2. 890; 5. 240; 6. 626
Dunkeri 2. 886
elegans 5. 240; 6 626
flabellata 2. 890
frondosa 2. 890
Germari 5. 630; 6. 97
Hibernica 7. 57
Huttoni 6. 253
inaequalis 5. 630
Mantelli 2. 886
oblata 5. 630
Cyclopteris
obliqua 5. 630; 7. 113
orbicularis 1. 476; 5. 630; 6. 97
recurvata 5. 630
reniformis 0. 670
Richteri 5. 240; 6. 626
rhomboidea 3. 121
squamata 2. 886
Sternbergi 5. 630
tenera 3. 121
tenuifolia 2. 890; 5. 243; 9. 131
terminalis 5. 630
Thuringiaca 6. 626
trichomanoides 1. 476; 5. 630
trifoliata 5. 240; 6. 626
varians 5. 630
spp. 9. 379, 380
Cyclopterus
lumpus 7. 248
Cyclopyge gen. 3. 487
spp. 4. 493
Cycloseris 2. 119*
Andianensis 2. 377
Cenomanensis 2. 377
filamentosa 2. 377
lenticularis 2. 376
Niciensis 2. 377; 3. 606
Perezi 2. 377; 3. 606
Provincialis 2. 377
semiglobosa 2. 377
Cyclosiphon gen. 5. 618!
sp. 6. 609
Cyclosmilia 2. 116*
Cyclostoma
bisulcatum 1. 676; 3. 532; 4. 249; 9. 141
conicum 4. 249
crassiusculum 1. 676
elegans 3. 763; 4. 473; 5. 746
formosum 9. 749
glabrum 2. 637, 765
Koechlinanum 1. 122*; 8. 200, 589; 9. 137
maculatum 1. 676
obtusum 5. 746
plicatum 0. 860
reticulatum 8. 875
sulcatum 1. 676
spp 8. 507
Cyclotella
ligustica 0. 473
operculata 0. 473
rotula 0. 473
Cyclotella
Scotica 0. 473
Cyclothurus gen. 4. 111
Cyclotus gen. 4. 865
cinctus 4. 865
nudus 4. 865
Cyclurus
gen. 3. 118*, 224*
macrocephalus 3. 224; 7. 584*
minor 7. 554*
Valenciennesi 5. 374
Cydnopsis
gen. 3. 866, 875!
atavina 3. 873
brevicollis 3. 873
coleopteroides 3. 873
delata 3. 873
exilis 3. 873
Haidingeri 3. 866, 873
pygmaea 3. 873
sagittifera 3. 873
scutellaris 3. 873
tertiaria 3, 866, 873
Cydnus Oeningensis 3. 873
Cygnus sp. 7. 634
Cylica 2. 118*
Cylicosmilia 2. 116*
Cylindracanthus
ornatus 6. 609!; 8. 253!
Cylindraspis gen. 6. 376
latispinosa 2. 279; 6. 370, 626
macrophthalmus 6. 370
Cylindricodon gen. 6. 760
Cylindrites
gen. 0. 870!, 626; 3. 237!
acutus 3. 235
altus 3. 235
angulatus 3. 235
arteriaeformis 8. 640
attenuatus 2. 229
brevis 3. 235
bulbiformis 2. 229
bullatus 3. 235
compressus 8. 640
convolutus 8. 640
cretaceus 4. 229
cuspidatus 3. 235
cylindricus 3. 235
Daedalaeus 8. 640
excavatus 3. 235
gradus 2. 229
mammillaris 2. 229
pyriformis 3. 235
spongioides 2. 896; 6. 640

Cylindrites
tabulatus 2. 229
Thorenti 3. 235
sp. 0. 728
Cyllonium
Boisduvalanum 5. 747
Hewitsonanum 5. 747
Cymbalopora
gen. sp. 2. 125, 128!
Cymbella
Finnica 2. 196
gastroides 0. 473
obtusiuscula 0. 473
Cymbium-Schicht 9. 23
Cymophan 8. 579*
Cynchramus
miliarius 7. 634
Cynichnoides gen. 9. 867
marsupialoideus 9. 867
Cynodictis martides 5. 372
palustris 5. 372
Velaunus 5. 372
sp. 0. 499
Cynodon lacustris 5. 229
palustris 5. 229, 372
Velaunus 5. 229, 372
Cynoidea (fam.) 9. 867
Cyotherium gen. 5. 229
Cyphaspis
gen. 0. 780, 785!; 3. 487; 6. 224
ceratophthalma 6. 370
elegantula 4. 501; 9. 864
Gaulthieri 3. 102
Girardeauensis 6. 735
hydrocephala 6. 256; 8. 753
megalops 4. 501
pygmaea 4. 501
truncata 6. 256
spp 4. 493
Cyphastraea
gen. 0. 763, 764!; 2. 118
Cyphoderia gen. 5. 755
Cyphoniscus gen. 4. 502!
socialis 4. 502
Cyphosoma
paucituberculatum 4. 653
spp. 7. 852
Cyperaceae (fam.) 5. 638
Cyperites 0. 630
alternans 5. 638
angustior 3. 503; 5. 638
angustissimus 3. 503; 5. 638
bicarinatus 1. 609; 2. 992
Cyperites
canaliculatus 5. 638; 7. 502; 9. 122
caricinus 2. 992
confertus 5. 638
Custeri 5. 638
Deucalionis 3. 503; 5. 638; 7. 502
dubius 5. 638
elegans 9. 873
Guthnicki 5. 638
latior 3. 503
margarum 5. 638
Montalionis 9. 117
multinervosus 5. 638
paucinervis 5. 638
plicatus 3. 503; 5. 638
Rechsteineri 5. 638
reticulatus 5. 638
scirpoides 2. 992
senarius 5. 638
sulcatulus 5. 638
tenuistriatus 5. 638
tertiarius 2. 628, 992; 3. 384, 503; 4. 491; 5. 638; 6. 256
tuberosus 6. 105
typhoides 2. 992
Zollikoferi 5. 638
Cyperus
Chavannesi 5. 638; 8. 586
Morloti 5. 638
Sirenum 5. 638
vetustus 5. 638
spp. 0. 503
Cypraea
affinis 3. 763
Angliae 3. 763
angystoma 3. 370, 604; 6. 93. 739
avellana 3. 763
Bartoniensis 1. 715; 7. 635
Bowerbanki 7. 635
Brocchii 3. 75
bullaria 2. 164, 170
Coombi 7. 635
corbuloides 3. 604
Deshayesi 7. 635
elegans 3. 604; 6. 229
Europaea 3. 763
fenestralis 6. 229², 230
Genyi 3. 604
gibbosa 6. 739
globosa 8. 635
globularis 7. 635
inflata 3. 604; 6. 93, 739; 7. 635
Cypraea inflexa 3. 370
leporina 9. 839
Levesquei 1. 764; 3. 604; 7. 229
media 3. 604
oviformis 7. 635³
pediculus 3. 75; 7. 635
pinguis 6. 230
praelonga 3. 604
Prestwichi 7. 635
pyrum 9. 839
retusa 3. 763
rostrata 3. 634
subannularia 3. 75
subleporina 3. 75
sublyncoides 3. 75
tuberculosa 7. 635
tumida 3. 75
Wetherelli 7. 635
spp. 3. 627; 6. 479
Cypraeacites
bullarius 4. 874
Cypredia
fenestralis 6. 230
Cyprella gen. 3. 101!
Edwardsana 3. 100
Koninckana 5. 126
ovulata 5. 126
Cypressen
v. New-Orleans 5. 221
Cypricardella
gen. 7. 863!
nucleata 7. 863
oblonga 7. 863
plicata 7. 863
subelliptica 7. 863
Cypricardia gen. 6. 864
acuta 6. 372
affinis 6. 865
alata 6. 642
amygdalina 6. 642
antiqua 7. 615; 8. 2, 345
arata 6. 865
arcuata 6. 642
bathonica 4. 766
Beyrensis 5. 98; 6. 500
bicarinata 4. 749; 5. 875; 6. 865
Breoni 9. 455
brevicarinata 6. 643
brevis 8. 357
Calceolae 6. 256
caudata 6. 456
cingulata 6. 648
compressa 6. 495
concinna 6. 643

Cypricardia
Conradi 6. 864
contracta 6. 643
coralliophaga 6. 865
Cordieri 3. 102
cordiformis 1. 486; 2. 230; 6. 865; 8. 357
crenistria 6. 372
cuneata 6. 643
Cyclopea 6. 865
cymbaeformis 6. 864
cylindrica 6. 643
Davidsoni 3. 102
deltoidea 6. 647
Deshayesana 6. 864
elongata 6. 372
gregaria 6. 865
Hessi 6. 372
impressa 6. 642, 864; 9. 847
inclusa 6. 495
Indianensis 7. 863
inflata 6. 864
laevigata 6. 495
lamellosa 6. 372
Ludovicana 3. 102
Marcignyana 9. 455
Mariana 3. 102
Mediterranea 6. 865
modiolaris 6. 643, 864, 868
Murchisoni 4. 749; 6. 865
Neptuni 6. 865
nuculiformis 4. 766
obliqua 6. 868
oblonga 6. 643, 865²
obsoleta 6. 642
orbiculata 3. 231; 6. 865
parallela 6. 648, 864
Parisiensis 6. 865
pectinifera 6. 865
pelagica 6. 646
Pomona 6. 647
quadrata 6. 643
retusa 6. 642
rhombea 6. 864²
rostrata 4. 766; 8. 482
semisulcata 6. 643, 865
siliqua 2. 230
sinuata 6. 643
socialis 6. 643
squamifera 6. 372, 864
striata 6. 864
subplana 7. 863
Suevica 7. 93, 94; 9. 452 ff.
terea [?] 6. 865
Cypricardia
tetragona 9. 456
Texana 0. 102
transversa 6. 644
triangularis 6. 495
trigona 6. 869
tumida 3. 605; 6. 643
undata 6. 642
undulata 6. 864, 865
vetusta 6. 646, 864
spp. 1. 382; 6. 495, 864; 8. 616
Cypricardites
gen. Conr. 9. 755
Cypridea gen. 7. 505!
Cyprideis
torosa 7. 503
Cypridina
gen. 3. 99; 5. 109, 110
alata 5. 126
Althi 5. 126
angulata 1. 361
auricularis 5. 126
Balthica 5. 853, 865; 7. 746
Buprestis 1. 664!
calcarata 6. 626
canaliculata 8. 428
cicatricosa 8. 425
cornuta 3. 100
corrugata 8. 430
daedalaea 8. 429
echinata 4. 672
elegans 5. 126
elliptica 6. 256
Favrodana 5. 126
Foersterana 5. 126
fusiformis 5 126
galeata 1. 361
globulus 6. 626
gyrata 6. 626
hastata 8. 428
hemisphaerica 6. 370
hieroglyphica 5. 126
interrupta 5. 111
Koninckana 5. 126
Kostelensis 7. 504; 8. 425
laticosta 7. 504
leioptycha 5. 126; 9. 494
marginata 7. 746
minuta 5. 865
muricata 5. 126
nitida 1. 664
oculata 6. 256
opaca 1. 361
ornata 5. 126
plicata 7. 504
Cypridina
plicatula 8. 432
pulchella 5. 126
punctata 7. 504; 8. 424
punctatella 7. 504
reniformis 1. 361
Roemerana 3. 100; 5. 126
serrato-striata 1. 225, 663; 2. 57, 275ff.; 3. 159, 523, 812, 817; 4. 46, 454; 5. 323; 6. 79, 210, 370, 626
serrulata 5. 111, 126
subfusiformis 1. 664; 6. 370
subglobosa 2. 279
subglobularis 2. 279
taeniata 6. 626
truncata 8. 430
vespertilio 8. 437
Cypridinen
-Schiefer 1. 225, 662; 2. 56; 3. 159*, 523, 614, 622, 812; 4. 46, 454, 634; 5. 50, 239p; 6. 255, 368, 369!
Cyprina gen. 6. 862
aequalis 4. 506; 6. 862²
angulata 4. 506; 6. 862²
arenaria 8. 377
Bernensis 6. 862
Boissyi 5 593
Bronni 6. 862
Caillaudi 3. 605
Cancrinana 6. 862
cingulata 9. 499
complanata 3. 605
compressa 8. 377
cordata 8. 377
cornuta 5. 848; 8. 488
Defrancei 4. 506; 6. 862
depressiuscula 7. 743
dolabra 7. 743
elongata 6. 862
Ervyensis 6. 862
Escheri 6. 363
Fergusoni 9. 228
Georgii 8. 875
gigantea 6. 861
gibbosa 3. 165
Helmersenana 6. 862
incerta 6. 862
Islandica 1. 621, 483, 484, 506; 5. 103; 6. 465, 862, 7. 53

Cyprina
islandicoides 4. 506; 6. 861, 862
jurensis 7. 743
laevigata 7. 510
Lajonkairei 4. 506; 6. 862
Ligeriensis 0. 294; 1. 743; 6. 862
Loweana 7. 743
maxima 4. 506; 6. 862
minima 4. 506
Morrisi 4. 517; 6. 862
naviculata 8. 875
nuciformis 7. 743
Nysti 0. 861; 3. 605; 6. 862
orbicularis 6. 862
ovata 8. 377
Pallasi 8. 875
Pedemontana 6. 861
planata 6. 862
propinqua 7. 510
regularis 6. 862
rostrata 1. 744; 6. 862
rotundata 6. 533
rustica 3. 605; 4. 506; 6. 862; 7. 229
scutellaria 0. 861; 1. 764; 6. 862
strigillata 6. 869
subtumida 8. 377
trapeziformis 7. 743
triangulata 8. 875
tridacnoides 6. 861
tumida 1. 764; 4. 506; 6. 862
umbonaria 6. 861
vetusta 6. 864, 870; 7. 628
vulgaris 6. 862
spp. 2. 977; 6. 599; 6. 862; 8. 616
Cyprinus
papyraceus 3. 144
priscus 1. 80; 5. 808; 7. 110
spp. 4. 581
Cypris gen. 3. 101!; 7. 505
angusta 6 333
biplicata 3. 768; 7. 503
bistrigata 7. 503
Browneana 3. 768; 7. 503
candida 7. 503
concinna 5. 768
elongata 5. 768
faba 3. 99; 8. 200
gibba 3. 768; 7. 503
Leidyi 8. 494
liasica 6. 496; 8. 643
lucens 6. 496; 7. 503
minuta 7. 503
Numida 3. 768
orum 7. 503
pantherina 7. 503
pellucida 7. 503
reptana 7. 503
setifera 3. 768
setigera 7. 503
similis 5. 768
sinuata 7. 503
spinigera 7. 99
tuberculata 7. 99
tumida 3. 768
Valdensis 7. 99²
vulgaris 7. 503
Cyrena gen. 6. 862
aequalis 6. 862
alpina 5. 475
antiqua 6. 862
Arvernensis 6. 862
Bouilleti 6 862
Britannica 6. 862
Brongniarti 3. 74, 369; 6. 863
Carolinensis 6. 863
compressa 6. 862²
consobrina 2. 1004
convexa 5. 473, 476; 6. 739, 740
cuneiformis 3. 80, 189; 5. 581; 6. 862
Cunninghami 2. 352
cycladiformis 1. 712, 714
deperdita 6. 862
Duchasteli 6. 863
elongata 6. 862
Faujasi 2. 432 ff.; 3. 138; 6. 863; 8. 607
fossulata 6. 862
Gemmellaroi 6. 863
Gravesi 6. 862
Jamesoni 2. 352
intermedia 7. 494; 8. 495
laevigata 6. 863
lucinoides 6. 864
Maccullochi 2. 352
Moreauensis 7. 494; 8. 495
nuculiformis 4. 766
obovata 1. 712, 714; 8. 515
Cyrena obtusa 8. 515
occidentalis 7. 494; 8. 495
pisum 6. 862²
polita 6. 863
pulchra 1. 712
semistriata 0. 860, 861; 6. 862
subarata 1. 177; 2. 435, 587, 971; 3. 134, 327; 4. 524, 526; 6. 167, 535, 707; 8. 200, 451; 9. 137, 140
tenuistriata 3. 751
trigona 3. 80; 6. 862
trigonula 1. 760; 6. 863
truncata 6. 863
undata 7. 502
spp. 2. 351; 6. 862; 8. 616
Cyrenen-Kalkschiefer 8. 590
Mergel 6. 535; 9. 122
Schichten 3. 482; 8. 717
Cyrtia gen. 6. 117
acutirostris 6. 736
exporrecta 4. 60
heteroclita 6. 117
Murchisonana 5. 384
trapezoidalis 4. 504; 6. 117
Cyrtoceras gen. 4. 853; 5. 258, 385 ff.; 6. 126!, 316*; 8. 235!
acuticostatum 6. 371
annulatum 8. 617
applanatum 6. 371
bdellalites 6. 122
bilineatum 6. 371
Brückneri 8. 236
breve 6. 371
compressum 5. 404*
cornucopiae 6. 371
depressum 5. 404*
dorsatum 8. 766
dubium 9. 847
Eifeliense 2. 192; 6. 371; 7. 253
Fahrenkohli 1. 491
falcatum 8. 236
heteroclytum 4. 10*
hospes 8. 236
lamellosum 6. 371
Lujani 6. 500
multicameratum 6. 122
plano-excavatum 6. 371

Cyrtoceras
reticulatum 6. 122
subconicum 6. 371
subornatum 3. 111; 6. 122
Trettoanum 9. 360
ventrali-sinuatum 6. 371
spp. 4. 3; 5. 248
Cyrtoceratidae (fam.) 8. 617!, 618
Cyrtoceratites
depressus 2. 107
ornatus 2. 107
Cyrtodonta gen. 9. 755
Cyrtolithes
gen. 1. 662; 6. 121; 7. 761
ornatus 6. 121
Cyrtholithus
Boblayei 3. 102
Cyrtometopus
spp. 4. 492; 6. 224
Cyrtopora
gen. 2. 125, 126!
elegans 2. 126
Cystidea (subordo) 2. 59; 4. 233; 6. 115; 9. 58, 635!
Cystiphyllidae (fam.) 4. 497
Cystiphyllum 2. 122
brevilamellatum 6. 114
Damnoniense 6. 114
vesiculosum 2. 341; 6. 375, 114
spp. 4. 497; 7. 104
Cystopteris
fumariacea 6. 505
Cystoseirites 0. 626
communis 3. 47
dubius 1. 740
filiformis 6. 251, 252
flagelliformis 6. 252
Partschi 4. 491; 6. 251, 252
spp. 1. 382; 7. 778
Cystosira communis 5. 637
Cythere gen. 3. 101; 5. 108, 126; 7. 505!
accedens 8. 420!, 441
aculeata 3. 100
acuta 4. 745
acuticosta 8. 435!, 441
angulatipora 3. 99; 7. 504
angusta 7. 498
angusticostata 3. 100
approximata 3. 100
Cythere
arachnoidea 3. 100
attenuata 7. 504
Bairdana 5. 111
Bartonensis 7. 504
Beyrichana 7. 504
bidentata 3. 99
biornata 6. 757
biplicata 4. 745
bituberculata 4. 489, 490
Bowerbankana 7. 504
brevicula 7. 498
calcarata 3. 100
canaliculata 8. 428!, 441
carbonaria 7. 863
ceratopora 3. 100
ceratoptera 7. 504
cicatricosa 8. 425!, 441
cicatricula 3. 100
Colwellensis 7. 504
compressa 7. 504
concinna 7. 504
confluens 7. 498
consobrina 7. 504
contracta 7. 504
Cornuelana 3. 100
cornuta 3. 100; 7. 498; 504; 8. 438!, 441
coronata 8. 439!, 441
corrugata 8. 430!, 441
costellata 3. 99; 7. 504
curta 4. 745
Cyclas 7. 374
debilis 7. 504
deformis 3. 100
Deshayesana 3. 100
dictyosigma 7. 504
dispar 8. 622
divaricata 8. 420!, 441
draco 8. 437!, 441
Dumontana 3. 100
echinata 6. 757
Edwardsi 3. 100
elongata 4. 745
erinaceus 6. 757
faba 5. 111
faboides 3. 99
favosa 3. 99
fenestrata 3. 100
flavida 7. 504
Forbesana 3. 100
formosa 3. 100
Francqueana 3. 100
galeata 3. 100
Geinitzana 4. 745
gibberula 7. 498
Cythere
gracilis 4. 745
gradata 3. 100
grapta 7. 374
Grateloupana 3. 100
Haidingeri 3. 100
Haimeana 3. 99
harpa 5. 126
hastata 8. 428!, 441
Hebertana 3. 100
hilseana 5. 111, 126; 7. 504
hoplites 8. 434!, 441
horrescens 3. 100; 7. 504
incompta 4. 869
inornata 3. 99; 4. 745
intermedia 7. 504
Jonesana 3. 99
Jugleri 7. 498
Jurinei 3 99; 7. 498; 8. 418!
Koninckana 4. 869
Kostelensis 7. 504; 8. 425!, 441
Kutorgana 4. 745
lacunosa 7. 504
Lamarckana 3. 99
laqueata 7. 504
latidentata 6. 757; 7. 504
lichenophora 3. 100
limbata 3. 100
Londinensis 7. 504
Lyellana 3. 100
lyrata 7. 498
lyriformis 8. 436!, 441
macrophthalma 5. 126
macropora 3. 100; 7. 504
manubrium 8. 435!, 441
megaphyma 4. 869
Michelinana 3. 100
modiolaris 7. 498
monilifera 3. 100
monoceros 7. 498
Morrisana 4. 745
multicostata 3. 99
Mülleri 7. 504
Münsteri 7. 504
nebulosa 3. 100
neglecta 4. 869
Neptuni 8. 431!, 441
nuciformis 4. 745
Nystana 3. 99
obliquata 7. 498
Orbignyana 3. 100
papilio 8. 436!, 441
pectinata 3. 100

Cythere
perforata 7. 504
pertusa 4. 869
pinguis 7. 504
plicata 3. 99; 7. 498, 504; 8. 421!, 441
plicatula 3. 100; 8. 432!, 441
punctata 7. 504; 8. 424!, 441
punctatella 3. 100
punctatula 3. 99
punctulata 5. 126; 5. 111
pusilla 3. 100
pygmaea 3. 100
Pyrrhae 7. 374
recta 7. 374
regularis 4. 489
ren 7. 504
reniformis 5. 126
retifastigiata 7. 504
Reussana 3. 100
Roessleri 4. 489, 490; 6. 504
sagittula 3. 100;
scabra 3. 100; 7. 498; 8. 423!, 441
scabro-papillosa 7. 504
Schrenki 7. 374
scrobiculata 3. 99; 7. 498, 504; 8. 422!, 441
sculpta 3. 100; 5. 126
senilis 7. 504
Sorbyana 7. 504
sphaerulo-lineata 7. 504
sphenoides 4. 869
sticta 7. 374
striato-punctata 3. 99; 7. 504; 8. 422!, 441
subangulata 8. 446!, 441
subdeltoidea 3. 675!; 7. 504
sublaevis 6. 735
subsagittula 8. 427!, 441
subscrobiculata 8. 423!, 441
tamarindus 7. 504
tenuimargo 7. 498
tessulata 3. 100
Thierensana 3. 100
trachypora 7. 504
triangularis 7. 504
tricornis 6. 757
trigonalis 3. 768; 7. 504
trigonula 7. 504
Cythere
truncata 3. 99, 100; 5. 126; 7. 504; 8. 430!, 441
tuberculata 7. 504
unicornis 7. 504
unisulcata 7. 504
varians 6. 757
variolata 8. 427!, 441
ventricosa 3. 100
vermiculata 3. 100
vespertilio 8. 437!, 441
Voltzi 3. 676!
Wetherilli 7. 504
Cytherea Bosq. (non Lmk.) } Crust.
gen. 5. 126
alata 5. 126
arenosa 5. 126
celleporacea 5. 126
cerebralis 5. 126
complanata 5. 126
concentrica 5. 126
cristata 5. 126
elegans 5. 126
elegantula 5. 126
fusiformis 5. 126
gibberula 5. 126
Hagenowi 5. 126
hieroglyphica 5. 126
horridula 5. 126
interrupta 5. 126
Koninckana 5. 126
labyrinthica 5. 126
laticristata 5. 126
lepida 5. 126
longispina 5. 126
macrophthalma 5. 126
macroptera 5. 126
minuta 5. 126
multilamella 5. 126
orchidea 5. 126
ornata 5. 126
ornatissima 5. 126
phylloptera 5. 126
pulchella 5. 126
puncturata 5. 126
quadridentata 5. 126
radiosa 5. 126
sagittata 5. 126
semicancellata 5. 126
serrulata 5. 126
spinosa 5. 876
strangulata 5. 126
subtetragona 5. 126
trigonoptera 5. 126
umbonella 5. 126
Cythere
variolata 5. 126
vesiculosa 5. 126
Cytherea Mollusc.
gen. Lmk. 6. 861
aequorea 6. 752
affinis 6. 861
albaria 6. 752
albina 6. 862
analoga 6. 861
apicalis 4. 50; 6. 861
aptychus 6. 870
astartaeformis 6. 752
Bonellii 6. 862
Boryi 6. 862
Bosqueti 6. 862, 80
Brauni 6. 862
Bronni 2. 43
Burdigalensis 6. 861
caperata 6. 861
Carolinensis 6. 752
Chione 3. 756; 4. 506, 514; 6. 861², 862
chionoides 6. 862
cincta 6. 862
cornea 6. 861
corrugata 6. 861
cuneata 1. 491; 6. 861²
cuneiformis 6. 861
Custugensis 6. 861
cycladiformis 4. 506; 6. 862
Cyrilli 6. 861
decipiens 6. 861
decisa 7. 242
deltoidea 6. 861²
Deweyi 7. 492; 8. 495
discoidalis 6. 752
dolabra 6. 861; 7. 743
Domeykoana 7. 404
Duboisi 6. 861
elegans 1. 716; 6. 861
elevata 6. 752
elliptica 9. 750
Erycina 6. 861; 9. 838, 839, 854
erycinoides 3. 74, 370; 6. 739, 861²; 7. 502
euglypha 5. 126
eversa 6. 752
excavata 6. 753, 861
Favrodana 5. 126
filosa 4. 506; 6. 862
Fittoni 6. 861
Floridana 6. 752
fragilis 6. 862
furcifera 5. 126

Cytherea
gigantea 6. 862
Heberti 6. 861
Herzogi 1. 384; 6. 861
Hunteri 9. 750
Jerdoni 9. 750
imitabilis 6. 752
incrassata 0. 860, 861; 1. 712; 5. 475 ff.; 8. 714; 9. 138, 212
inflata 2. 43
intermedia 6. 861
islandicoides 3. 74
Italica 6. 862
laevigata 0. 861; 6. 861, 862; 7. 845
laevis 4. 506; 6. 862
Lamarcki 3. 74; 4. 514; 6. 861
lamellosa 4. 506; 6. 870
leonina 6. 862
lenticula 4. 506; 6. 862
lenticularis 6. 752, 753
liasina 6. 861
liciata 6. 752
lincta 4. 506; 6. 862
lineolata 6. 861
lucinia 6. 861
Marylandica 6. 752
mesastriata 6. 752
minima 6. 861
Mississipiensis 6. 752
Missouriana 8. 495
Mortoni 6. 752
multilamella 2. 43. 359; 6. 861
Nebrascensis 7. 492; 8. 495
nitens 4. 506; 6. 861
nitidula 6. 861[1]; 8. 740; 9. 866
Nuttalli 6. 752
obliqua 1. 101, 712, 715; 6. 861
obovata 6. 752
orbicularis 9. 750
orbiculata 7. 864; 8. 495
ovata 6. 752
Owenana 8. 495
pandata 6. 752
Parisiensis 6. 861
parva 6. 861, 862
pectunculus 6. 862
Pedemontana 3. 74; 6. 861
pellucida 8. 495
perbrevis 6. 752
Cytherea
perovata 6. 752
picta 2. 230
plana 6. 861
polita 6. 861[2]
propinqua 5. 126
puella 6. 862
Puschi 6. 861
pusilla 6. 861
pyga 6. 752
Poulsoni 6. 752
Rabica 6. 861
Rawesi 9. 750
reposta 6. 752
rotundata 1. 715
rudis 2. 43; 4. 506; 6. 862
rugosa 6. 861, 869
rustica 8. 740; 9. 866
Sayana 6. 752
scutellaria 6. 862
semipunctata 6. 752
sobrina 6. 752
Solanderi 6. 861
splendida 6. 534, 861; 9. 137, 138
striato-costata 5. 126
superba 6. 861
suberycinoides 1. 716; 6. 861[3]
subimpressa 6. 752
subnasuta 6. 752
subrotunda 6. 861
semisulcata 6. 861
sulcata 4. 506; 6. 861
sulcataria 0. 861; 6. 861[3]
sulcifera 6. 861
tellinaria 1. 716; 6. 861
tenuis 7. 864; 8. 495, 496
tenuistria 6. 861
tigerina 6. 864
transversa 1. 715; 6. 861
trigona 3. 99; 4. 506; 6. 862
trigonellaris 6. 861
truncata 6. 862
undata 6. 861[2]
uni[oni]formis 6. 861
Venetiana 4. 506; 6. 862
Verneuili 6. 861
vetusta 6 861
Villanovae 5. 473, 476; 6. 740
Wapsharei 9. 750
Wilsoni 9. 750
Cytherea
spp. 6. 861; 8. 616
Cythereis
gen. 5. 109!; 7. 505!
alata 5. 111; 7. 504
angulato-pora 7. 504
biplicata 7. 745
Bowerbankana 7. 504
ceratopteris 7. 504
ciliata 5. 111
cornuta 5. 111; 7. 504
drupacea 6. 504
galtina 1. 228
gaultina 5. 111
gibba 1. 228
horrescens 7. 504
interrupta 1. 228; 5. 111
Lonsdaleana 5. 111
macrophthalma 5. 111
quadrilatera 5. 111
senilis 7. 504
triplicata 5. 111
Cytherella
gen. 3. 101!; 5. 110!; 7. 505!
appendiculata 5. 111
auricularis 5. 126
Beyrichana 7. 504
Beyrichi 6. 757
Bosqueti 5. 111
complanata 4. 869
compressa 3. 99; 7. 498, 504[1]; 8. 404!, 441
denticulata 5. 126
fabacea 6. 757
hieroglyphica 3. 99
inflexa 8. 404!, 441
inornata 4. 745; 6. 504
intermedia 6. 757; 7. 504
Jonesana 3. 99; 8. 404!, 441
Leopolitana 4. 869
Londinensis 7. 504
Mantellana 5. 111
Münsteri 3. 99; 5. 126; 7. 498, 504[2]
nuciformis 4. 489, 490, 745; 6. 504
ovata 5. 111, 126
parallela 4. 869
tenuistriata 3. 676!
truncata 5. 111
Williamsonana 5. 111, 126
Cytheridea
gen. 3. 101!; 7. 505!; 8. 413!

Cytheridea
clypeus 8. 416!, 441
debilis 7. 504
Harrisana 5. 126
heteropora 8.413!,441
heterostigma 7. 498; 8. 416! 441
incrassata 3. 99
Jonesana 4.869; 5.126; 7. 504
Mülleri 3.99,676!,678; 6. 535; 7.498,504; 8. 416!, 441
ovata 5. 126
papillosa 3. 99
perforata 7. 504
pinguis 7. 504
punctatella 6. 757
reversa 8. 413! 441
rhombus 8. 415!, 441
Sorbyana 7. 504
subovata 8. 417!, 441
tumida 8. 414!, 441
Williamsonana 3. 99
Cytherideis gen. 7. 505!
Bartonensis 7. 504
Colwellensis 7. 504
flavida 7. 504
ren 7. 504
tamarindus 7. 504
trigonalis 7. 504
tuberculata 7. 504
unicornis 7. 504
unisulcata 7. 504
Cytherina
gen. 1. 510; 5. 110, 111, 126
abscissa 1. 361
aciculata 3. 99
acuminata 5. 126
Cytherina alta 7. 745
Althi 9. 494
arcuata 9. 494
asperula 9. 494
attenuata 4.869; 9.494
auriculata 1. 361
Baltica 6.813; 7.387, 745²; 8. 270
Beyrichi 2. 254; 6.757
ciliata 5. 126; 9. 494
complanata 4.869; 5.126
concentrica 3. 100
cornuta 5. 126; 7. 504; 9. 494
echinata 2. 254
echinulata 5. 126
elongata 5. 126
exilis 8. 409
faba 9. 494
fabulites 7. 745
hemisphaerica 6. 625
heterostigma 1. 361
imbricata 4. 546
insignis 9. 494
intermedia 7. 504
laevigata 9. 494
laevis 5. 126
leioptycha 9. 494
Leopolitana 4. 869; 5. 126
lucida 8. 407
lunata 5. 126
modesta 5. 126
mytiloides 7. 498
neglecta 8. 405
ornatissima 9. 494
ovata 9. 494
parallela 3. 99; 4. 672, 869; 5. 126; 7. 504; 9. 494
Cytherina pedata 5. 126
pertusa 3. 99
phaseolus 7. 745; 8.270
plicata 7. 504
prunella 7. 638
pulchella 5. 126
punctata 7. 504; 8. 424
pustulosa 3. 99
quadrilatera 5. 126
recta 1. 361
semicircularis 1. 361
seminulum 1. 361
striatula 6. 370, 625
strigulosa 1. 361
subdeltoidea 9. 494
subovata 8. 417
subteres 1. 361
tenuis 2. 627
Tippahana 9. 498
trigona 5. 126; 7. 504
tumida 8. 415
unguiculus 1. 361
spp. 3. 623; 5. 249; 9. 504
-Cytheropsis
gen. 1. 510!; 8. 757!
Aldensis 3 216; 6.115
concinna 8. 756; 9. 636
rugosa 8. 756; 9. 636
siliqua 8. 756; 9. 636
Cytisus 0. 637
cretaceus 6. 640
Dionysii 3 47
Lavateri 0.508; 2. 761; 3. 506
Oeningensis 0. 508; 2. 761, 762; 3. 47, 506
reniculus 8. 499
Scheitlini 3. 506

D.

Dachschiefer 8. 281; 1. 663; 4. 708!
Dachstein-Bivalve 1. 137; 2. 459; 3. 167! 4. 88, 204; 8. 1 ff.
Dachstein-Kalke 4.88, 456, 830; 6. 361, 747 p.; 8. 646
Dachstein
-Schichten 5. 219; 6. 847, 849; 7. 615², 616, 619, 621; 8. 1 ff.
Dactylacis 2. 120.
Dactylaraea 2. 117*
Dactylastraea
gen. 0. 765; 2. 119
Dactylopteris gen. 2. 892!
Stiehlerana 2. 890
remota 6. 626
Dactylosmilia 2. 117*
Dadocrinus
gen. 6. 28; 8. 762!
gracilis 1. 80; 6. 245, 746; 8. 763
spp. 8. 762
Dadoxylon 0. 632
Brandlingi 8. 871
keuperianum 5. 577
stigmolithus 5.576; 8 503
Daedalus gen. 4. 222; 7. 239!
Koninckı 4. 221
Newtoni 4. 221
Daemonocrinites
cornutus 0. 377
Dagestan 1. 357 g.
Dalbergia
aenigmatica 6. 252
eocaenica 9. 375
Haeringana 4. 380
podocarpa 3. 506; 6. 506; 9. 375
primaeva 3.510; 9. 375, 376

Dalbergia
reticulata 4. 491
Dalle nacrée 0. 164, 355; 8. 726
Dalmania (Emmr.)
gen. 0. 779!, 785; 3. 487; 6. 116
affinis 7. 380
caudata 7. 380
Hausmanni 3. 341
incerta 3. 102
limulurus 3. 341
mucronata 4. 501
punctata 4. 46; 6. 625
tridentifera 6. 735
tuberculata 9. 753
Vetilardi 3. 102
cfr. Dalmanites
Dalmanites
gen. 3. 487; 6. 224
atavus 7. 638
Downingiae 6. 500
Dujardini 6. 500
laciniatus 6. 500
Phillipsi 6. 500
socialis 6. 225, 500
stellifer 6. 500
sublaciniatus 6. 500
cfr. Dalmania
Dama spp. foss. 5. 227
Dammarites 0. 632
Fittoni 2, 888
Dammerde 8. 215!
Damourit 0. 693!; 1. 347; 2. 848; 9. 567
Dämpfe, vulkanische 1. 589; 2. 503
Danaeites 0. 629
Danaia (Danaea)
multiseptosa 8. 754
Danait 3. 459*
Danburit 3. 700; 7. 174
Danbury-Feldspathe 5. 449!
Dania 2. 120*
Danien 1. 100; 9. 107
Dapedius
gen. 3. 117*; 6. 755
Egertoni 4. 640
Fischeri 3. 759
olifex 6. 742
Daphaenus vetus 8. 376
Daphne
Oeningensis 0. 505; 3. 504; 9. 503
oreodaphnoides 6. 505
persooniaeformis 6. 505
Daphnia primaeva 1. 506
Daphnogene 0. 633
apiculata 3. 504; 9. 503
Buchi 3. 504; 9. 503
cinnamomifolia 1. 103; 2. 754, 987; 3. 72, 504, 510, 631; 4. 252, 379, 627; 9. 503²
cuneifolia 2. 761
elliptica 2. 754
grandifolia 3. 510; 4. 379; 9. 374
Haeringana 4. 379
Javanica 3. 434
intermedia 3. 434
lanceolata 2. 754; 3. 504, 510; 4. 379; 5. 241!; 9. 374, 503
Lalages 3. 510
latifolia 2. 754; 6. 505
melastomacea 3. 504; 9 376; 9. 503²
Paradisiaca 2. 754; 3. 504; 4. 252, 627; 9. 374
platyphylla 3. 227
polymorpha 2. 628; 3. 120, 384, 504, 510; 4. 379, 6. 638; 7. 776, 9. 374, 503²
retusa 3. 504; 9. 503
spectabilis 3. 504
subrotunda 3. 504
Ungeri 3. 504; 9. 503
Dartmouth-Slate 3. 97; 6. 112
Dasmia spp. 1. 627; 2. 116*
Dasyceps gen. 9. 496!
Dasylepis gen. 8. 112
Keyserlingi 8. 112
Dasyphyllia
gen. 0 758; 2. 117*
Taurinensis 0. 758; 6. 740
Dasypus gen. 4. 111
sexcinctus 6. 232; 7. 225
Datolith 1. 558; 2. 526; 4. 423; 5. 73!; 6. 349; 9. 653
Daucina gen. 5. 859!
Ermanana 5. 859
Davallia
Canariensis 8. 757; 9. 253
Haidingeri 9. 374
Davidsonia
gen. 0. 754; 3. 41!
Bouchardana 4. 504; 6. 508
Verneuili 0. 754; 3. 45; 4. 61, 504; 6. 508
spp. 6. 374
Davidsonidae 4. 61, 504
Davidsonit 8. 74!
Davoei-Bett 6. 456
Davyn [Davyit] 3. 261
Deanea gen. 7. 634
Debeyia gen. 4. 229!
serrata 4. 229
Decacoenia 2. 117*
Dechenia 0. 629
euphorbioides 2. 891
Roemerana 2. 891
Dechenit 2. 214!
Decticus (Glir.)
gen. 4. 831
Defrancia clypeata 5. 635
prolifera 3. 84
spp. 2. 125
Dekayia 2. 120*
Deinictis felina 7. 115, 247!; 8. 376
Deinodon horridus 7. 114!
Deiphon gen. 6. 224²; 0. 779, 785; 3. 488, 489
spp. 4. 493; 807
Deiphon-Gestein 6. 807
Delessertites 0. 626
antiquus 2. 890
Escheri 8. 640
Hampeanus 8. 364
sphaerococcoides 4. 877
Thierensi 4. 229
Deless[e]it 1. 557; 5. 798; 9. 653
Delphinoides
Grateloupi 5. 231
Delphinopsis
Freyeri 3. 627! p.; 5. 500
Delphinorhynchus
micropterus 3. 94
Delphinosaurus 5. 622!
Kiprijanoffi 5. 623!
Delphinula alata 3. 234
aculeata 3. 634
acuta 3. 634; 4. 874
Buckmani 3. 234
calcar 3. 604
callifera 0. 861
coronata 3. 234
discoidea 3. 234
funata 1. 486, 2. 228

Delphinula
grandis 3. 634
granulata 3. 634; 4. 874
heliciformis 3. 234
lineata 2. 228
infrastriata 3. 220
muricata 3. 634; 4. 874
Pratti 3. 234
quadricingillata 2. 228
radiata 3. 634; 4. 874
scobina 6. 739
spinosa 3. 634
subarmata 6. 372
sulcifera 5. 501
spp. 6. 750
Delphinus acutidens 8. 174!
Bordae 5. 231; 7. 110
brevidens 1. 493; 2. 998; 5. 231; 7. 110
Calvertensis 5. 112
canaliculatus 3. 163!; 6 330, 331; 7. 110²
Conradi 5. 112
crassidens 7. 110
Dationum 5. 231; 7. 110
delphis 5. 231
densirostris 4. 848
Desmaresti 4. 848
edentatus 3. 93
Karsteni 7. 110
longirostris 5. 231
macrogenius 5. 231
micropterus 4. 848
Phillipsi 3. 93; 8. 448
pseudodelphis 1. 493; 2. 998; 5. 231, 621; 7. 110
Renoui 5. 231
sulcatus 5. 621; 7. 110
tursio 3. 163
Vermontanus 0. 747; 5. 131
spp. 1. 254, 501
Delta: der Tiber 3. 615!
Delthyris gen. 6. 117
biloba 1. 499
crispa 1. 499
flabelliformis 6. 730
fragilis 3. 21, 30
granulosa 4. 764
Hartmanni 4. 764
lynx 3. 340
macroptera 1. 499
microptera 1. 499
Niagarensis 1. 499
octoplicata 1. 499
rostrata 3. 764
Delthyris 0. 633
sulcata 8. 269
Deltocyathus 2. 115
Delvauxit 4. 687!
Demidovit 7. 443!; 8. 818!
Dendracis 2. 119*
Gervillei 6. 245
Dendraraea
gen. 2. 119; 3. 876
racemosa 3. 876
Dendrerpeton
Acadianum 3. 512!
Dendriten 8. 309
Dendritina
gen. 5. 751, 755; 7. 377
elegans 7. 497
Dendrocoenia 2. 117*
Dendrocrinus gen. 5. 250!
longidactylus 5. 250
spp. 9. 236
Dendrodus laevis 8. 753
latus 6. 123
sigmoideus 8. 509
Dendrogyra 2. 116*
Dendrophyllia 2. 119
Arkansensis 6. 480
impura 7. 233
inaequalis 7. 233
Maraschinii 7. 233
spp. 1. 627
Dendropora 2. 121*
megastoma 6. 113
Dendrosmilia 2. 116*
Dentalina
gen. 5. 755; 7. 377
abbreviata 7. 378
acuticauda 2. 253; 6. 756
acuticosta 2. 254; 6. 756
Adolphina 7. 378
annulata 4. 867
baccata 9. 371
Badenensis 7. 378
Beyrichana 7. 378
bifurcata 2. 254; 6. 756; 7. 497
Bouéana 7. 378
Buchi 2. 253; 6. 756
capitata 7. 497
carinata 7. 378
cingulata 1. 378
clavata 9. 371
conferta 7. 378
consobrina 2. 253; 6. 756; 7. 306! 309, 378
crebricosta 7. 378
Dentalina
dispar 2. 253; 6. 756; 7. 378
Ehrenbergana 7. 378
elegans 2. 253; 6. 756; 7. 378
emaciata 6. 756
emarciata 2. 253
emeciata [?] 5. 435
Ferstlana 1. 378
filipendula 9. 371
fragilis 9. 371
Geinitzana 7. 378
Girardana 7. 497
globulifera 7. 378, 497
Haidingeri 7. 378
Haueri 7. 378
Hörnesi 7. 378
inermis 1. 378
inornata 7. 378
intermittens 7. 497
Kingi 4. 743
Kochi 4. 672
Lamarcki 7. 378
lateralis 9. 371
matutina 9. 371
Metensis 9. 371
mucronata 7. 378
multi-lineata 6. 756
Münsteri 7. 497
oblique-striata 2. 253; 6. 756; 7. 378
obscura 9. 371
Orbignyana 7. 378
ornata 7. 378; 9. 371
Partschi 7. 378
paupercula 7. 378
pauperata 6. 756
permiana 4. 743; 6. 504
perscripta 7. 306!
perversa 7. 372
Phillipsi 2. 253
Philippii 6. 756; 7. 497
primaeva 9. 371
pseudomonile 9. 371
pungens 2. 253; 6. 756; 7. 378
pygmaea 7. 378
pyriformis 9. 371
quadrilatera 9. 371
Reussi 7. 378
Roemeri 7. 378
Sandbergeri 7. 497
scabra 2. 254; 7 378
Scharbergana 7. 378
seminuda 2. 254

Dentalina
simplex 9. 371
soluta 2. 253; 6. 756
spinescens 2. 253; 6. 756
spinigera 7. 378
subcanaliculata 7. 378
subnodosa 9. 371
subspinosa 7. 378
subtilis 7. 378
subulata 7. 378
sulcata 2. 512
tecta 9. 371
tenuis 7. 378
Terquemi 9. 371
torta 9. 371
trichostoma 2. 254; 7. 378
unicostata 9. 371
Verneuili 6. 756
vetusta 9. 371
vetustissima 9. 371
spp. 2. 511*; 9. 865
Dentalites
cingulatus 3. 231
Dentalium
acuminatum 1. 716
acutum 0. 861
alternans 3. 230
Andleri 8. 643
annulatum 6. 372
antiquum 3. 230
arctum 7. 695!
arenarium 6. 256
Badense 8. 866
bicostale 3. 230
bifissum 3. 765
Bouei 0. 223
Browni 3. 231
clava 3. 231
coelatum 9. 228
compressum 6. 495
costatum 3. 765
crassum 3. 231
decussatum 3. 230
deforme 1. 742; 3. 231
dentaloideum 3. 230; 6. 121
elephantinum 0. 223
ellipticum 3. 230
entale 1. 483; 3. 765
entalis 2. 358; 3. 74
entaloides 6. 852
filicauda 9. 34
fragile 7. 492; 8. 495
Geinitzanum 3. 230
giganteum 3. 20; 3. 319
gladiolus 0. 226
Dentalium
gracile 7. 864; 8. 495
grande 0. 861, 862; 3. 370, 605; 6. 93, 739; 8. 740; 9. 125, 866
Ibergense 6. 256
inaequale 3. 230
incertum 3. 74
ingens 3. 230; 6. 121
Kickxi 6 534
laeve 0. 99, 485, 2. 19 ff., 910, 943; 3. 20, 29; 6 245, 363; 7. 761; 9. 360
medium 3. 230
Michauxanum 3. 230
Mosae 3. 231
mutabile 9. 125
Navicanum 3. 230
Nicense 3. 605
nitens 1. 716
nudum 3. 635
oolithicum 7. 866
ornatum 3. 230
perarmatum 3. 230
planicostatum 9. 361
priscum 3. 230
pseudo-entalis 3. 74
Reussanum 3. 230
septemcostatum 9. 866
Sorbyi 4. 119
Speyeri 4. 119, 489
striatum 1. 716; 3. 230
subcanaliculatum 6. 372
subcarinatum 3. 231
sulcatum 7. 52, 53
taeniolatum 6. 372
torosum 3. 20
torquatum 0. 485; 1. 647; 2. 943; 3. 20
Tournali 6. 93
spp. 6. 750
Dentex microdon 5. 380
Denticella aurita 4. 739
pusilla 6. 103
tridens 6. 103²
Depazea
increscens 5. 637
picta 5. 637
Smilacis 5. 637
Depazites
Rabenhorsti 5. 628
Depressen-Schicht 6. 742
Dercetis linguifer 3. 108
tenuis 3. 108
triqueter 3. 108
Dermantin 1. 204*
Dermatin 3. 176
Dermatolithis
granulatus 8. 630
punctulatus 4. 742; 8. 630
subtilis 8. 630
Dermatonyx Jenensis 8. 373
Dermatophyllites 0. 634
acutifolius 3. 747
azaleoides 3. 747
azaloides 3. 227
attenuatus 3. 227, 747
dentatus 3. 227; 3. 747
hispidulus 3. 747
kalmiodes 3. 227
kalmioides 3. 747
lanceolatus 3. 747
latipes 3. 227, 747
minutulus 3. 227, 747
oblongus 3. 747
obovatus 3. 747
porosus 3. 227
repandus 3. 747
revolutus 3. 227, 747
stelligerus 3. 227; 747
subalatus 3. 747
Dermatopora gen. 4. 117
spp. 2. 125
Dermochelys (Dermatoch.)
pseudostracion 1. 493
Desolvizit 4. 347!
Deshayesia
cochlearia 5. 475 ff.; 6. 740
Parisiensis 0. 860
Deslongchampsia
gen. 3. 237!
Eugènei 3. 235
Desmeopora
gen. 3. 109
Desmin 9. 77!
Desmodophyllum 0. 637
Desmophyllum 2. 116*
Desorella gen. 6. 228!
Drogiaca 6. 228
elata 6. 228
Icaunensis 6. 228
incisa 6. 228
Orbignyana 6. 228
Deuteroprisma 6. 153
Deuteropyramide 6. 152
Deuterosaurus
gen. 7. 539
Biarmicus 0. 876
Devillien
(terrain) 1. 105; 7. 219

Devon-Flora 4. 496; 5. 239; 6. 626!
-Formation 3. 614; 5. 358; 6. 79, 209, 355, 368!, 470, 499, 507 p.; 7. 325, 455; 8. 248 p., 335, 350, 594, 603, 745 p.; 9. 63, 221 g., 232, 235 p. 341, 467, 845 p., 846
in China 5. 384
der Eisel 5. 321!
Mährens 5. 53
zu Smolensk 4. 465*
Westphalens 5. 49, 81
-Gebirge 2. 192 p.
Mans 1. 65
Englands 3. 811!
Parallel-Gliederung 3. 817
-Kalk 8. 467!
-Schichten 2. 920 p.
-System 0. 731; 1. 103; 3. 193; 6. 735; 9. 825
Devonian
Series of Strata 6. 112
Devonien 7. 219
Devonische
Diluvial-Blöcke 8 508
Fische 3. 125
Korallen 4. 497
Organismen 2. 339
Deweylith 1. 204*
Dexiospira gen. 8. 632*
hexarchaea 8. 632
triarchaea 8. 632
Diabas 1. 150*; 4 300!; 302, 454*; 6. 204, 368; 7. 357*
-Schiefer 9. 740
Diachaenites
Heeri 3. 505
Diadema 7. 122
aequale 7. 768
Antissiodorense 2. 1001
Bakerae 7. 768
Beckei 6. 491; 7. 768
Blanggiarum 4. 120, 121
Bourgueti 4. 651! ff.
corona 4. 653
Davidsoni 6. 100
depressum 4. 621; 8. 357
Grasi 4. 653
Heberti 1. 102
hemisphaericum 7. 768
Lamarcki 7. 768
Diadema
Lusseri 4. 499
macrostoma 4. 654
mammillanum 7. 768
mammillatum 7. 768
Michelini 786
Moorei 6. 100; 7. 768
pentagonum 7. 768
Picteti 4. 654
pseudodiadema 7. 768
Repellini 4. 653
rotulare 4. 650! ff.
seriale 6. 491, 496
spinosum 7. 768
subangulare 1. 414!; 6. 95; 7. 768
Texanum 0. 101
transversum 7. 786
uniforme 4. 653
vagans 7. 768
versipora 7. 768
Diademadae fam. 7. 767, 768
Diademopsis
gen. 7. 122; 9. 255
Moorei 7. 768
Diadochit 6. 83
Diadora
crucibuliformis 6. 480
Diaklasit 2. 976
Diallag 0. 678; 1. 556
-Spilit 7. 600, 604
-Syenit 7. 357*
Diallagon 8. 684
-Serpentin 7. 599
Dialypetala
(Vegetabilia) 2. 504!
Diamant 0. 847; 1. 351. 571, 588*, 694; 2. 499; 3. 474, 697, 710*; 4. 72*, 342*, 345; 5. 827; 6. 841; 7. 64, 328!; 9. 192
mit Einschlüssen 5. 571
-führender Sand 3. 597m: 8. 818*
-Gruben im Ural 0. 237
-Sandstein 5. 734; 9. 749
-Spath 4. 453
-Wäschereien 3. 597
-Verbreitung 4. 345
Diamagnetische
Krystalle 1. 704
Diamesopora
gen. 5. 249!
dichotoma 5. 248, 249
Dianulites 2. 120
Diaperidium Mithrax 5. 747
Diaseris 2. 119*
distorta 2. 377
Diaspor 1. 590*; 3. 598!
künstlich 2. 216
Diastoma
costellata 8. 586
Diastopora sp. 2. 125
cervicornis 5. 634
Davidsoni 5. 634
dilatata 5. 634
diluviana 5. 634
Eudesana 5. 634
flabellum 5. 634
foliacea 5. 634⁴
gemmifera 7. 502
incrustans 5. 634
labiata 7. 374
lamellosa 5. 634
Lamourouxi 5. 634
latifolia 5. 634
laxata 5. 634
Lucensis 5. 634
macropora 5. 634
Mettensis 5. 634
Michelini 5. 634
microphylla 5. 634
micropora 5. 634
ramosissima 5. 634
retiformis 5. 634
scobinula 5. 634
Terquemi 5. 634
undulata 5. 634
verrucosa 5. 634
Waltoni 5. 634
Wrighti 5. 634
Diatoma
pectinale 0. 473
vulgare 0. 473
Diatomaceen
(silurische) 6. 82
-Erden 6. 354; 9. 225
Diatomeen = Diatomaceen
Fels-bildend 0. 472
Diblasus
gen. Anthoz. 3. 109
Dibranchiata
(ordo) 4. 852; 9. 368!
Diceras gen. 6. 867
arietinum 0. 172, 184, 735; 5. 364; 6. 867, 868, 763; 7. 86, 155; 8. 486
Boblayei 6. 868
cylindricum 6. 817
Deluci 6. 868
Luci 6. 763; 7. 155
minus 6. 868

Diceras
ovatum 2. 168, 171
sinistrum 6. 868
speciosum 6. 868
sublamellosum 2. 157, 168, 170; 6. 868
spp. 4. 249; 6. 867
-Kalk 3. 166; 7. 469
Dicerca
Taschei 2. 467; 6. 757
Dichela
Berendti 5. 124
Dichelodus gen. 7. 483!
acutus 7. 485
Dichobune
gen. 7. 869; 8. 236!
Campichei 5. 615
cervinum 5. 227, 615
leporinum 1.502; 2. 305; 5. 228
minus 5. 228
ovinum 8. 236
Robertanum 5. 228; 7. 490
suillum 5. 228; 7. 490
Dichocoenia 2. 117*
distans 0. 757
Dichocrinus gen. 6. 604!
cornigerus 8. 628
elegans 6. 602
expansus 6. 602
fusiformis 6. 602, 761
granulosus 6. 602
intermedius 6. 602
irregularis 6. 602
multiradiatus 8. 628
radiatus 6. 602, 761
sculptus 6. 602
sexlobatus 8. 628
simplex 8. 628
Dichodii (fam.) 0. 867
Dichodon
gen. 2. 1000²!; 7. 869
cervinum 5. 227
cuspidatus 2. 759, 1001²; 3. 250; 6. 760
dorcas 2. 1001
Fronstettensis 2. 831
Dichroit 1. 329; 3. 470
in Wacke 0. 67*
-Gneiss 3. 443
Dichte der Erde 3. 617; 5. 365
Dichte-Wechsel der Mineralien beim Schmelzen u. Krystallisiren 5. 454
Dickhäuter fossile 2. 979
Dicotyles
gen. 7. 867, 869
compressus 7. 483
costatus 5. 112; 7. 483
depressifrons 5. 112; 7. 483
torquatus 5. 112; 7. 483
spp. 8. 122, 233
Dicranogmus gen. 3. 487
Dicranopeltis gen. 3. 487
Dicranum simplex 3. 746
fuscescens 3. 746
subflagellare 3. 746
subpellucidum 3. 746
subscoparium 3. 746
Dicrenodus gen. 4. 876!
Okensis 4. 877; 7. 485; 8. 741
Dicrocerus
crassus 3. 755; 5. 227; 7. 248; 8. 204
elegans 7. 119; 8. 204
magnus 2. 227
Dictyocaulus
striatus 8. 358
Dictyocephalus
gen. 7. 857!
elegans 7. 857!; 9. 751
Dictyocha
gracilis 0. 472, 473
megapora 6. 104
navicula 6. 103
pons 6. 103
quadratum 6. 103
speculum 6. 103
stella 6. 104
triommata 6. 103
tripyla 6. 103
Dictyolepis gen. 8. 112
Bronni 8. 112
Dictyolites spp. 5. 248
Dictyolithis
megapora 4. 739; 6. 104
micropora 4. 739; 5. 471; 6. 104
Dictyonema
gen. 1. 767; 8. 765*
flabelliforme 8. 594
gracile 1. 767
Hisingeri 9. 804
retiforme 1. 767
spp. 5. 248; 9. 504
Dictyoneura
gen. 6. 108!; 8. 374
anthracophila 6. 108; 8. 375
Dictyoneura
Humboldtiana 6. 108; 8. 375
libelluloides 6. 108
Dictyophimus sp. 6. 104
Dictyophorites
tingitinus 3. 868, 874
Dictyophyllia 2. 117
reticulosa 0. 761
Dictyophyllum 0. 629
Dictyopteris 0. 628
Brongniarti 5. 630
neuropteroides 5. 630
spp. 9. 390
Dictyopyge
gen. 3. 744; 7. 88
Dictyopyxis
cruciata 4. 739; 6. 103
cylindrus 6. 103
lens 6. 103
subtilis 6. 103
Dictyospyris gen. 6. 127*
Dicynodon
gen. 6. 105; 7. 90
Murrayi 9. 495!
tigriceps 6. 105!
Dicynodontae (fam.) 5. 745
Didelphys
affinis 5. 230
antiqua 5. 230, 374
Arvernensis 5. 230, 373
Bertrandi 5. 230, 373
Blainvillei 5. 230, 374
crassa 5. 230, 374
Cuvieri 5. 230
elegans 5. 230, 373
Laurillardi 5. 230
Lemanensis 5. 374
minuta 5. 230. 374
parva 5. 230
Prevosti 0. 162
Didus
ineptus 5. 489!; 6. 482
Nazarenus 5. 491!
solitarius 5. 491!
Didymodon
capillaceus 4. 108
Didymograpsus
geminus 9. 339
Moffatensis 9. 875
ramosus 9. 875
sextans 9. 875
Didymophyllum 0. 629
Schottini 2. 891
Didymosorus
comptoniaefolius 0. 116
varians 0. 116

Didymene gen. 0. 780!, 785
Dielacata superba 5. 123
Diestien 2. 882; 3. 482, 625; 7. 503 p.
Dièves (Mergel) 1. 618
Difflugia
gen. 5. 750, 753, 755
areolata 0. 250
seminulum 0. 250
Digitaria
macellum 5. 638
Diglena catillus 9. 510
Digona-Bett 8. 482
Dihexagonal
-Prisma 6. 153
-Pyramide 6. 149
Dikelocephalus gen. 3. 336
spp. 3. 447; 9. 504
Dikotyledonen 9. 602
geologische
-Entwicklungs-Folge 2. 420
Vollkommenheits
-Stufen 2. 420
Dillnit 9. 561!
Diluvial
der Vogesen 1. 728
-Bildungen 0. 641; 5. 223; 8. 834
-Blöcke 0. 646; 8. 451; 9. 307
-Erscheinungen 2. 717!
-Fauna 4. 609; 6. 111; 8. 61
-Flora 4. 631*
-Formation 8. 589 p.
-Gebirge
v. Gorinchem 4. 196
-Geschiebe 7. 385; 9. 605
devonische 8. 508
-Kohle 8. 659; 9. 273
-Mergel 8. 94
-Sandsteine 0. 645
-Säugthiere 6. 489
-Schlamm 9. 413!
-Schrammen 4. 158
-Terrassen 0. 856
-Zeit 9. 316
Diluvialisten 5. 83
Diluvium 3. 78*; 5. 99; 6. 572; 7. 214, 462; 8. 334, 602
alpinisches 1. 470
Dimagnetit 3. 602*
Dimorphastraea 2. 118*
fungiformis 4. 868
glomerata 4. 868
Dimorphastraea
Haueri 4. 868
sulcosa 4. 868
Dimorphe Körper 1. 693
Mineralien von gleichzeitiger Biidung 6. 188
Dimorphie 1. 589
Dimorphina
gen. 5. 755; 7. 377
saxipara 7. 750
Dimorphismus 1. 693; 2. 224, 294, 619; 9. 620*, 816
Dimorphodon gen. 9. 638!
? macronyx 9. 495, 638
Dimya
gen. 1. 753! 6. 857!
Dimyaires 6. 855
Dindymene
gen. 3. 488; 6. 224
Dingo 7. 700
-Hund 8. 197
Dinit 7. 606
Dinobatrachi (fam.) 5. 745
Dinodon horridus 8. 376
Dinornis gen. 8. 618*
casuarinus 0. 125; 1. 229, 250
crassus 1. 250
curtus 0. 125; 1. 229
didiformis 0. 125; 1. 229
dromioides 1. 250
elephantopus 7. 108
giganteus 0. 125; 1. 229, 250, 375
gracilis 8. 618*
rheides 1. 373
robustus 1. 250
struthioides 1. 250; 8. 618*
Dinosauria (fam.) 7. 105!
Dinosaurus gen. 7. 539
Gresslyi 7. 152*
Dinotherium
gen. 1. 680; 7. 869
Bavaricum 1. 502
Cuvieri 1. 502; 5. 225, 372; 8. 869
giganteum 3. 164, 378; 4. 838; 5. 54, 225, 372, 869; 7. 235, 370, 759, 248, 375, 845
intermeduim 4. 732; 5. 225
spp. 1. 360; 2. 360; 3. 251
Dintenfische 9. 368!
Diodon spp. Sow. 3. 94
vetus 7. 116
Diomedea
chlororhyncha 1. 251
spp. 7. 634
Dion tertiarius 5. 637
Dione = Dionide
spp. 2. 242
gen. (Barr.) 3. 487
Dionide = Dione
gen. 3. 487 6. 224²;
euglypta 6. 225
formosa 6. 225
Dionides gen. 0. 780!, 785
Dioonites gen. 6. 617
abietinus 6. 617
Dunkeranus 6. 617
Feneonis 6. 617
Goeppertanus 6. 617
Humboldtanus 6. 617
Kirchneranus 6. 617
Lyellanus 6. 617
plumula 6. 617
taxinus 6. 617
Dioplodon gen. 4. 848
Becani 5. 231; 6. 491
Sowerbyi 3. 94
Diopsid 1. 695; 3. 468, 657; 5. 186!, 822; 6. 48*; 7. 716; 8. 43, 54, 684, 700²*, 826!
künstlich 5. 215
als Hüttenproduct 2. 333
Diorite 0. 227, 422!; 2. 357; 4. 217; 5. 78; 6. 387 ff.; 711; 7. 82, 357*, 361!, 601, 737*, 741, 847; 9. 445!
um Lyon 0. 75*
im Kija-Gebirge 0. 87
-Porphyr 5. 585
Diospyros 0. 634
anceps 9. 873
brachysepala 0. 505; 1. 128; 3. 503; 9. 505
dubia 3. 435
Haeringana 4. 379
lanceifolia 2. 760
lancifolia 0. 505; 9. 505
longifolia 2. 760; 3. 505
myosotis 2. 754; 4. 252; 5. 241; 9. 376
Pannonica 2. 628; 4. 627

Diphanit 2. 848
Diphya-Kalk 0. 734, 738
Diphyphyllum gen. 2. 122
gracile 3. 238; 6. 113
lateseptatum 6. 113
minus 6. 255
Diplacanthus
crassispinus 6. 123
gibbus 6. 123; 9. 491
longispinus 6. 123
perarmatus 6. 123; 9. 491
striatus 6. 123; 7. 509
Diplacites 0. 627
cristatus 5. 630
longifolius 1. 476; 5. 97
Diplastraea gen. 5. 865!
confluens 5. 865
diffluens 5. 865
Dipleura gen. 3. 487; 6. 116
Dekayi 1. 665; 3. 581
Diploctenium 2. 116*
conjungens 4. 867
contortum 4. 867
ferrum-equinum 4. 867
Haidingeri 4. 867
lunatum 4. 867
pavoninum 4. 867
Diploceras gen. 7. 253
gen. Salter (non Conr.) 9. 507
Diplocidaris
gen. 7. 122! 9. 255
Desori 7. 768
Wrighti 7. 768
Diplocynodon gen. 7. 538
Diplocynodus (-don.)
gen. 5. 232
Rateli 5. 374, 743
Diplodictyum 0. 628
Diplodus gen. 8. 743
Diplodon cfr. Dioplodon
Becanii 6. 491
Sowerbyi 3. 94
Diplodonta gen. 9. 126!
acclinis 9. 234
astartea 2. 1004
dilatata 2. 1004
elevata 9. 234
fragilis 6. 533
inflata 9. 234
nitens 9. 234
rotundata 2. 1004; 6. 864
ungulina 9. 234
spp. 9. 125
Diplodus
compressus 7. 626
gibbosus 5. 374
gracilis 7. 626
latus 7. 626
Diplograpsus 2. 245 f.
teretiusculus 4. 126; 9. 875
tricornis 9. 875
Diplohelia 2. 249! 250
multistellata 2. 250
papillosa 2. 250
raristella 2. 250
Taurinensis 2. 250
Diploit 1. 442*; 4. 598!
Diplonychus
rotundatus 3. 866, 874
Diplophacelus 0. 628
arboreus 6. 98
Diplophyllum gen. 1. 766!
caespitosum 1. 766
spp. 5. 248
Diplopodia Malbosi 7. 859
pentagona 7. 768
Roissyi 7. 786
subangularis 7. 768
Diploporitae (fam.) 4. 238!
Diplopterax v. Diplopterus
gen. 6. 123; 9. 491
affinis 6. 123
Agassizi 6. 123
gracilis 6. 123
macrolepidotus 6. 123
Diplopterus v. Diploptera
gen. (Ag.) 6. 123
Agassizi 9. 491
gracilis 9. 491
macrocephalus 9. 491
macrolepidotus 9. 491
Diplograpsus gen. 2. 374!, 408; 4. 126!; 8. 764*
bicornis 9. 875
birastrites 4. 126
cometa 4. 125, 126
dentatus 4. 126
Esthonus 8. 594
foliaceus 9. 875
folium 2. 373; 4. 126; 9. 875; 6. 113
mucronatus 9. 875
nodosus 9. 875
ovatus 2. 409!; 4. 126
palmeus 2. 409; 4. 126
parallele-costatus 2. 409, 410
pennatus 9. 875
pristis 4. 126; 6. 113
Diplograpsus
ramosus 6. 113
rectangularis 3. 637; 9. 875
teretiusculus 2. 373; 3241;
Diplorhina 3. 488
triplicata 1. 510; 6. 116
Diploria
gen. 0. 761! 2. 117*
crasse-lamellosa 0. 761
Diplotegiaceae (fam.) 6. 98
Diplotegium 0. 629
Brownanum 6. 98
spp. 9. 381
Diploxylon 0. 629
cycadeoideum 6. 99
elegans 1. 476!; 6. 99
Dipoides 2. 360
spp. 1. 502
Dippoldiswalde 2. 895
Dipriacanthus
Stockesi 6. 123
Diprion gen. 1. 124!; 2. 246, 374, 408; 3. 637
foliaceus 3. 637
folium 3. 637
nodosus 2. 246; 3. 637
ovatus 1. 125; 2. 246; 4. 126
palmeus 1. 125; 4. 126
pennatus 2. 246
rectangularis 3. 637
Diprotodon gen. 9. 243
Australis 9. 246
Dipsastraea
Burgundiae 0. 764
confluens 0. 765
muricata 3 876
Diptera (class.) 6. 765
Dipteronotus 5. 861!
cyphus 5. 861
Dipterospermum
bignonioides 6. 505
Dipterus
brachypygopterus 6. 123; 9. 491
macropygopterus 6. 123; 9. 491
Valenciennesi 6. 123; 9. 491
-Flags 3. 97!; 6. 112
Dipus dipoides 2. 360
Dirt-bed 1. 354; 5. 237
Disaster ovalis 7. 135
Discina acuticosta 6. 374
Bischofi 7. 754

Discina
bulla 3. 211; 6. 117
Cellensis 4. 764
Cumingi 4. 504
Koninckı 7. 637
lamellosa 4. 61, 504
latissima 8. 488
marginata 6. 374
Morrisi 6. 116
nitida 6. 117
Norwegica 4. 507
reversa 8. 754
rugata 6. 117; 8. 753
speluncaria 4. 119, 745; 7. 382, 637
striata 4. 504; 6. 117
spp. 9. 504
Discinidae fam. 4. 61!, 504
Disciten-Schichten 0. 484
Discites gen. spp. 6. 122
complanatus 6. 122
discus 6. 122
pusillus 4. 747
quadratus 6. 122
sulcatus 6. 122
trochlea 6. 122
Discocyathus 2. 115*
spp. 2. 758
Discoflustrellaria
gen. 4. 117!
Discohelix gen. 5. 501
albogalerus 7. 748
cylindrica 1. 311; 3. 329; 7. 747, 786
depressa 0. 722; 4. 826; 7. 134
hemisphaerica 7. 747
macropyga 4. 650; 8. 873
marginalis 7. 747
rotula 3. 329
rotularis 7. 747
subuculus 0. 292; 7. 747, 785, 786²; 9. 228
spp. 9. 123
Discolithes gen. 8. 243
Discophyllum gen. 6. 114
lenticulatum 2. 377
Leonense 2. 340
praeacutum 2. 377
Discoplea
atmosphaerica 4. 613
compta 4. 613
Oregonica 0. 95
phrygia 0. 491
picta 6. 103
Discoplea
Simbirsciana 6. 103
spp. 4. 739; 6. 354
Discopora gen. 4. 115!
hexagonalis 2. 145, 167, 170
spp. 2. 125
Discoporella gen. 4. 116!
Discopsammia 2. 119
Discorbis gen. 5. 755
Discors spp. 9. 125
Discosorus gen. 5. 253!
conoideus 5. 248, 253
Discotrochus 2. 116*
Dislokationen 4. 385 ff.; 5. 291! ff., 641 ff., 769 ff.; 9. 531
Dislokations 1. 100
-Linien 5. 356
Dispotaea constricta 6. 753
costata 6. 753
dumosa 6. 753
grandis 6. 753
multilineata 6. 753
ramosa 6. 753
Distanseschareella
gen. 4. 116!
Disteginopora gen. 4. 117!
Disteichia gen. 5. 98!
reticulata 5. 98
Disterrit 7. 170!; 8. 692
Disthen 1. 389*, 406*; 2. 251ff., 524; 5. 215, 840!; 6. 37, 187, 194! 8. 569
Disticholepis spp. 4. 382
Distichopora 2. 122*
Distortrix spp. 6. 753
Ditaxia
gen. spp. 2. 125, 126!
Dithalamia gen. 6. 862
Dithyrocaris
gen. 1. 506; 3. 342*; 6. 613
aptychoides 3. 241
glypta 4. 745
Jaschei 6. 256
lateralis 6. 116
longicauda 5. 98
permiana 4. 745; 9. 761
spp. 3. 623
Dithyrosternum
gen. sp. 7. 625; 8. 118
Valdense 7. 625
Ditremaria gen 3. 237, 494
Ditrigonal-Prisma 6. 164
Ditrupa vdr. Ditrypa
Ditrypa carbonifera 3. 231
Ciplyana 3. 231
clava 3. 231
cretacea 9. 361
deformis 3. 231
devonica 3. 231
strangulata 5. 361
Dodonaea prisca 2. 754
Salicites 4. 379
Sotzkiana 9. 375
Dogger 2. 54; 3. 494; 8. 483!, 552, 583; 9. 95
Dolabra sp. 1. 253
angusta 6. 119
Damnoniensis 6. 119
depressa 6. 119
elliptica 6. 119
Hardingi 6. 119; 7. 220
Lusitanica 5. 98
obtusa 6. 119
securiformis 6. 643; 7. 220
unilateralis 6. 119
Dolatocrinus lacus 9. 635
Dolerit 1. 558; 2. 486; 3. 705; 707; 5. 199; 6. 423; 7. 357*, 361!, 460, 737*; 8. 606; 9. 657, 832
-Laven 7. 361!, 737*
Dolichites 0. 637
Dolichometopus 6. 224
spp. 4. 493; 9. 504
Dolichopus sp. 9. 115
Dolichosaurus
gen. 2. 382!; 3. 109
longicollis 2. 382
Dolium
spp. 1. 382; 2. 978
Dolomie-moellon 2. 737
Dolomit 0. 484, 485; 1. 473!, 556, 695, 709!; 2. 93, 516, 521; 3. 701; 4. 448!, 478!*, 549* 5. 479²p, 736*; 7. 89, 689ff, 712; 8. 574! 591; 9. 183!, 412!
der Alpen 7. 617
im Fassa-Thal 0. 130
in Obersteyer 0. 96*
in Tyrol 2. 355!
des Zechsteins 3. 776
-Bildung 4. 710; 8. 58, 85, 387; 9. 155
künstliche 3. 702

Dolomit-Bildung durch Dämpfe
Talkerde-haltige2.328!
-Bildungs-Geschichte 2. 854!
-Bildungs-Weise 4.483!
(Entstehung) 0. 717
-Kalk 5. 852 ff.
-Kalksteine 2. 856*
-Mergel des Muschelkalks 3. 11
-Schiefer 5. 468
-Sinter 3. 260
-Thone 7. 325!
Dolomitisation der Kalksteine 5. 471
Dolomitisirung 3. 784
Domanit
-Schiefer 0.731; 6.624; 7. 457
Dombeyopsis 0. 635
aequalifolia 2. 894; 3. 227; 6. 633
arcinervis 3. 505
crenata 1. 634; 3.505
Decheni 2.754; 3.505
dentata 4. 379
grandidentata 8. 500
grandifolia 1.634, 636; 2.894; 3. 120, 227; 4. 877; 6. 633; 9. 502
helicteroides 8. 500
ingens 3. 227
Oeynhausenana 2.754; 3. 505
parvifolia 3. 505
pentagonalis 2. 754
Philyrae 3. 510
Stitzenbergeri 3. 505; 9. 502
tiliaefolia 1. 634, 636; 2. 754, 761, 894; 3. 227, 505; 4.491; 9. 375, 502
vitifolia 4. 252
Domit 2. 86!; 7. 354!, 357*
Domopora 2. 127
Donacia sericea 9. 348
Donacites
spp. Brgn 6. 249
costatus 4. 766
Donacicrinites
simplex 0. 377
Donarium
(neues Metall) 2. 76
Donau-Wasser 3. 722
Donax affinis 6. 860
Alduini 0.158, 183, 402
anatinum 5.595; 6.860; 7. 506
complanatus 6. 860; 7. 506
costata 3. 25
deltoideus 6. 872
difficilis 6. 861
elongata 3. 74; 6. 860
exilis 6. 860
Goepperti 5. 638
irregularis 6. 861
Irus 4. 506
longus 7. 506
Oeningensis 0. 503; 2. 760, 992
politus 7. 506
primigenius 6.646, 653, 860
securiformis 4. 636; 6. 495, 860
semistriatus 6. 860
sulcatus 6. 646
striatellus 7. 506
tellinella 6. 859
transversa 3. 74
transversus 6. 860
triangularis 3. 74
trunculus 6. 860; 7. 506
variegatus 6. 860
venustus 6. 860
vittatus 7. 506
spp. 1. 382; 6. 860; 8. 616
Doppelspath 1. 699 ff.
Dopplerit 1.194!; 8.278!
Dorcatherium
Evansi 8. 877
Guntianum 1. 677; 6. 330
Naui 1. 502; 2. 360; 7. 110, 375; 8. 586
Vindobonense 0. 202; 8. 61, 204
Dorsocavati (Ammonitae) 7. 544
Dorsomya
dorsata 3. 231
Dorudon gen. 3. 95
serratus 3. 245*
Dorycrinus
gen. 4. 253!; 6. 602
Mississippiensis 4. 254
Doryphora
amphiceros 0. 473
Dosinia gen. 6. 860, 862
acetabulum 6. 862, 753
Adansoni 6.862; 9.839
alta 7. 242, 853
densata 9. 498
exoleta 6. 862
fasciata 4. 506; 6. 861
imbricata 4. 506
lincta 6. 862
lupinus 6. 862
longula 7. 853
orbicularis 6. 862
turgida 4. 506
spp. 6. 753, 862
Downton
Sandstones 8. 715
Dracaena
Benstedi 2. 992
Dracaenosaurus
Croizeti 5. 233, 374
Draconosaurus
gen. sp. 5. 233
Bronni 5. 233; 6. 760
Drassus
oblongus 5. 123
Drehungsachse der Erde 2. 726
Dreissena [-senia]
gen. 6. 238*, 862
sp. 6. 862
acutirostris 6. 239
Africana 6. 239
Americana 6. 239
amygdaloides 6. 239
aperta 6. 239
Balatonica 6. 239
Basteroti 3.74; 4.524; 6. 239, 862
Brardi 0. 800; 2. 43; 4. 515; 6. 239; 8. 607; 9. 871
carinata 6. 239
Chemnitzi 6. 239
clavaeformis 2. 765; 6. 239
cochleata 6. 239
Cumingana 6. 239
decipiens 7. 623
diluvii 8. 737
Domingensis 6. 239
gracilis 6. 239
Gundlachi 6. 239
inaequivalvis 6. 239; 8. 874

Dreissenia
Küsteri 6. 239
lunularis 2. 229
Mörchana 6. 239
Partschi 6. 239
Pfeifferi 6. 239
plebeja 6. 239
polymorpha 6. 239, 593, 862
Riisei 6. 239
Rossmaessleri 6. 239
rostriformis 6. 239; 8. 874
Sallei 6. 239
spathulata 4. 526; 6. 239
subcarinata 6. 239
subglobosa 6. 239
Tippahana 9. 498
triangularis 6. 239
ungula-caprae 6. 239
Dreisseniadae (fam.) 6. 238
Dremotherium
Feignouxi 5. 227
traguloides 5. 373
Drepanocarpus
Bolcensis 6. 633
Drepanodus
gen. 5. 230, 372; 8. 112
acutus 8. 112
arcuatus 8. 112
flexuosus 8. 112
impar 7. 856
inflexus 8. 112
obtusus 8. 112
primaevus 8. 877
Drepanophycus
gen. 2. 891!
spinaeformis 2. 890; 6. 375
Drift 2. 623, 718!, 882; 3. 495, 496; 4. 505p; 7. 506p
-series 8. 350
Drillia
novemcostata 9. 498
Tippahana 9. 498
Dritte Fauna 6. 226
Dromatherium
sylvestre 8. 359; 9. 511
Dromi[o]lithes
Ubaghsi 8. 231
Dromiopsis
elegans 9. 640
rugosa 9. 640
Dronte 6. 482
Druck sein Einfluss
auf plutonische Gesteine wirkend 1. 739
metamorphisch wirkend 8. 733, 851
auf Mineral-Bildung wirkend 3. 367, 453
Drusen-Bildungen 0. 847
Dryandra
acutiloba 2. 750
antiqua 2. 751
Bilinica 2. 750
Brongniarti 2. 750; 4. 379; 6. 505; 9. 503
macroloba 6. 505
Meneghinii 2. 750
Oeningensis 2. 750; 9. 501
pteroides 2. 750
Sagoriana 2. 750
Schranki 3. 504; 9. 503
Ungeri 2. 750; 8. 740; 9. 374
Vindobonensis 2. 628, 750; 9. 501
Dryandroides 0. 634
acuminata 2. 751; 8. 712; 9. 503
angustifolia 6. 505; 7. 776; 9. 503
arguta 9. 122, 503
banksiaefolia 9. 122, 123, 503
brevifolia 2. 751; 4 379
elegans 2. 751
grandifolia 2. 751
grandis 2. 750; 9. 374
hakeaefolia 2. 751; 3. 510; 4. 379; 8. 587; 9. 503
laciniata 2. 751; 9. 501
laevigata 9. 503
lignitum 2. 751; 4. 379; 6. 252; 8. 587; 9. 503
linearis 9. 503
Tusca 9. 117
Dryopithecus gen. 7. 119!
Fontani 7. 119
Dryopteris gen. 3. 761
Dryoxylon Jenense 3. 28!
Dudley limestone 1. 104
Dufrenoyit 5. 703; 8. 592*; 9. 83!
Dumont's Eintheilung der BelgischenGebirge 1. 105
Dünen 9. 484
-Bildung 0. 80*
Dunkelmeer 5. 760
Dunstervillia 7. 766
Durchlöcherung
von Jurakalken 0. 726
der Gesteine durch Thiere 4. 733
Dyadin 7. 459g
Dyas 9. 750!
Dye-stones 8. 350
Dykes 1. 473, 477; 2. 352; 8. 229ff
Dysaster
anasteroides 4. 653; 6. 95
carinatus 8. 486
cordatus 8. 873
Eudesi 7. 748
granulosus 6. 95
ovulum 4. 646! ff.
ringens 7. 748
subringens 7. 748
suprajurensis 6. 95
Dysdera
glabrata 5. 123
hippopodium 5. 123
scrobiculata 5. 123
tenera 5. 123
tersa 5. 123
Dyslytit 1. 697; 2. 214, 615
Dysodil 3. 145!; 8. 556
Dysplanus
gen. 1. 508!; 3. 487; 6. 224
centrotus 6. 116
spp. 4. 493
Dysterrit 2. 848
Dysyntribit 4. 708!, 821!, 825!; 5. 701!; 9. 565!, 586
Dyticus Ungeri 8. 587

E.

Eburna areolata 2. 44
flavida 2. 44
glabrata 2. 44
spirata 2. 43
Eccoptochile gen. 1. 508; 3. 488
Sedgwicki 6. 116
Ecculiomphalus
Scoticus 2. 232
Eccyliomphalus
aequalis 6. 121
cristatus 6. 121
Scoticus 6 121
Echidnocephalus
gen. 9. 493!
tenuicauda 9. 493
Troscheli 9. 493
Echimys breviceps 5 225
curvistriatus 5. 381
Echinarachnius
Woodi 4. 762
Echinastraea gen. 0. 768; 2. 118
Echinencrinus
angulosus 4. 233 ff.
striatus 4. 234 ff.
cfr. Echinoencrinus
Echiniden 4. 499
Echinidae
(fam.) 7. 767; 9. 254
Echiniscus testudo 0. 250
Echinites subuculus 7. 747
Echinobrissidae
(fam.) 7. 767
Echinobrissus
clunicularis 7. 852
Deshayesi 7. 852
dimidiatus 8. 486
micraulus 8. 486
pulvinatus 7. 852
scutatus 8. 486
Echiochloa
rostrata 5. 638
Echinocidaris 7. 122
Helvetiana 4. 120, 121
Echinoclypeus
conoideus 7. 862
Echinoconidae
(fam.) 7. 767
Echinoconus gen. 9. 255
albo-galerus 7. 859
gigas 7. 859
Echinocorydae
(fam.) 7. 767
Echinocorys
vulgaris 7. 859
Echinocrinites
fenestratus 0. 376
Echinocrinus gen. 6. 637
Rossicus 7. 373, 374[2]
Echinocyamus
alpinus 4. 120, 121
angulosus 4. 761
Biarritzensis 7. 859
hispidulus 4. 761
oviformis 4. 761
piriformis 3. 73
planulatus 7. 859
pusillus 4. 761, 763
Suffolciensis 4. 761
Tarentinus 4. 761
Echinodermata
(class.) 6. 100, 101, 233; 7. 746, 767, 860; 8. 370 p.; 9. 365
tertiäre 4. 761
Echinodermen:
im Crag 3. 104
paläozosiche 1. 748
-Schicht 5. 592
Echinoencrinus
granatum 4. 237
cfr. Echinencrinus
Echinogale gracilis 5. 371
Laurillardi 5. 224, 371
macroscelis 5. 224
Echinoidea 4. 120, 650; 6. 93; 7. 746, 851, 858; 9. 254!
spp. 2. 757
Echinolampas
affinis 4. 120
Agassizi 7. 862
amygdala 3. 606
Beaumonti 1. 765; 3. 606; 7. 230
Blainvillei 1. 765; 7. 230
Bouei 2. 152, 167, 170; 3. 86 ff.
brevis 4. 120, 121
Brongniarti 2. 152, 167; 3. 86
complanatus 7. 502
coniformis 2. 168
conoideus 0. 222, 736; 2. 151, 167; 3. 86 ff.; 7. 862
corniglobus 7. 862
Echinolampas
Deshayesi 6. 101
dilatatus 4. 120
ellipsoidalis 3. 606; 7. 859; 9. 844
ellipticus 0. 222; 2 152, 167; 3. 86
Escheri 4. 120
Francei 1. 102; 3. 606
hemisphaericus 7. 859
Hoffmanni 1. 765; 7 230
Kleini 1. 765; 6. 101; 7. 230
Laurillardi 3. 369; 6. 93[2], 101, 739
politus 3. 606
pulvinatus 4. 499
pyramidalis 7. 502
Richardi 6. 101
semiglobus 7. 859
Studeri 4. 120
subacutus 4. 499
subcylindricus 4. 120, 499
subsimilis 0. 222, 736, 859; 9. 844
Echinolampidae
(fam.) 7. 767
Echinometra 7. 122
Echinomys
sulcidens 4. 864
Echinoneidae (fam.) 7. 767
Echinoneus
albogalerus 7. 748
Echinopora 2. 118*
astroides 0. 768
Echinopsis 7. 122
arenata 7. 859
Bechei 7. 768
depressa 6. 206
Edwardsi 4. 761
Leymeriei 7. 859
Nattheimensis 6. 491
Echinorhynchus
Blakei 7. 242!
Collegnoi 7. 859
cordiformis 7. 859
Leymerieanus 7. 859
aranea 4. 237; 8. 594
aurantium 4. 233 ff.; 8. 594
granatum 4. 236
Murchisoni 6. 500

Echinosphaerites
testudinarius 4. 237
Echinostachys 0. 631
cylindrica 2. 994
oblonga 2. 994, 8. 228
thyrsoidea 2. 994
Echinus 7. 122
albogalerus 7. 748
areolatus 7. 747
Benettae 7. 747
bigranularis 0. 482; 8. 357
Buchi 6. 637
Charlesworthi 4. 761
conoideus 7. 862²
cor-anguinum 7. 748
cordatus 4. 762
denudatus 4. 653
diademoides 0. 482
Dixonanus 4. 761
Duciei 6. 101
germinans 0. 170; 1. 485; 2. 229; 8. 357
granulosus 7. 747
Lamarcki 4. 761
lineatus 5. 613
lividus 6. 128
Lusseri 4. 120, 121
Lyelli 4. 761
marinus 7. 861
melo 4. 761, 763
minutus 4. 761; 6. 100
nodulosus 6. 100
petaliferus 7. 747
purpureus 4. 762
pusillus 3. 104
sphaera 3. 104
subuculus 7. 747
Echitonium 0. 634
Sophiae 2. 754; 3. 505
Eckebergit 4. 441!
Eckling 4. 769
Ecklings-Achsen 4 769
Eclogit 9. 556
cfr. Eklogit
Ectocarpus spp. 8. 590
Edaphodon
mirificus 7. 856!
Edelsteine 5. 926
Edentata 4. 111!
Edestus
vorax 7. 367!; 8. 252!
Edgehill-Sandstone 0. 181
Edingtonit 4. 440; 6. 38!; 9. 187*
Edler Opal 5. 827;
Edmondia gen. 6. 644
Calhauni 8. 349
compressa 6. 644
elongata 4. 748; 7. 637
gibbosa 8. 766
Josepha 6. 644
Murchisonana 4. 119, 748
Murchisonia 8. 716
Otoensis 8. 766
rudis 3. 760
scalaris 6. 644, 648
semiorbiculata 8. 766
sulcata 6. 644, 651
unioniformis 6. 644, 863
ventricosa 6. 865
spp. 6. 865; 9. 755
Edrioaster
gen. 9. 636, 637
Bigsbyi 9. 636
Edrioasteridae
(fam.) 9. 637
Edriocrinus gen. 9. 236!
spp. 9. 236
Edwardsia
compressa 6. 119
Egertoni 6. 119
Josepha 6. 119
Murchisonana 6. 119
oblonga 6. 119
phaseolina 6. 119
rudis 6. 119
scalaris 6. 119
sulcata 6. 119
unioniformis 6. 119
Edwardsocrinus
ornatus 6. 602
Egeran 5. 451!
Egeran-Schiefer 8. 473
Ehlit 6. 195; 8. 191!
Ehrenbergina
gen. 2. 255!; 5. 755
serrata 2. 254
Eichhorn-artiger
Nager 7. 870!
Eidotea gen. 1. 506
Eifler-Kalk 2. 107 p.; 6. 209, 233 p., 631 p., 636 p.; 7. 458, 860 p.; 8. 370 p.
Eifelien 7. 219
Eigenschwere 9. 820
Eindrücke in Geschieben 2. 46, 827; 3. 707; 4. 836; 5. 82; 8. 106; 9. 154, 813
Einfluss des Druckes auf die chemische Natur plutonischer Gesteine 1. 220
Einführung fremder Fosstil-Reste 9. 747
Eingeschlossene Mineralien in andern 6. 22
Eingliederiger
Feldspath 5. 832!
Einschlüsse
in Basalt 3. 659; 5. 179
von Gesteins Stücken in Granit 4. 217
in Krystallen 4. 189, 190, 819
Eis 1. 455!
physikalische Eigenschaften 0. 236
-Felder 5. 708
-Höhle 2. 350
-Krystallform 3. 844
-Zeit 5. 850; 3. 496
-spath 6. 43!
Eisen 5. 692*; 6. 264
Gediegen 8. 69
gestrickte Gestalten 4. 187
-Ausbeute im J 1854 7. 352!
-Dolomit 4. 478 ff.
-Erbsenstein 6. 573
-Erze 4. 92, 724, 732!; 5. 463; 7. 64, 586; 8. 329, 783!
(alluviale) 4. 732
(Bildung) 5. 856
des Mosel-Dpts. 2. 706!
in verschiedenen Formationen 2. 708!
kohlensaure 3. 840
(Lagerstätten) 0. 97; 2. 97, 337; 3. 67; 5. 529; 8. 327, 344; 9. 184*
-Gruben 5. 213
-haltige Quellen 6. 345
-Kalk 8. 583
-Oolithe 0. 164!, 182; 8. 582, 583
-Quellen 6. 143; 8. 696
-Rogenstein 1. 818
-Rosen 1. 571; 4. 26*
-Säuerlinge 9. 199
-Sandsteine 5. 622² p.; 6. 758; 9. 183!, 364 p.

Eisen-Schlacke 0. 702!
-Silkate 0. 705!, 6. 581
-Sinter 0. 350!, 4. 219; 5. 74!; 8. 693!
Eisenalaun 9. 84
Eisenanhydrit 5. 158
Eisenapatit 9. 191!
Eisenbitterkalk 4. 478
Eisenblau 6. 686*
Eisenblüthe 9. 204
Eisenchlorit 9. 653
Eisenchrysolith: künstlich 3. 178!
Eisenglanz 0. 451; 1. 401*, 694; 2. 528 ff., 698, 875, 880; 3. 696; 4. 27, 259, 453; 5. 181, 195; 8. 218; 9. 731!
-Krystalle als Sublimation 2. 502
Eisenglimmer 3. 261; 5. 823
Eisenhydroxyd 1. 557, 559
Eisenkarbonat 1. 596
Eisenkies 0. 429, 430, 451, 1. 330, 390*, 399*, 556, 707, 820*; 2. 489!, 875, 879; 3. 262, 389 ff., 837; 4. 187, 404, 823*, 827; 5. 823; 6. 182, 442; 7. 67; 8. 77, 78; 9. 82
-Druse 2. 489*
Eisenkobaltkies 5. 561!
Eisenlasur 6. 559!; 7. 715;
Eisenmagnesia-Olivin 4. 451!
Eisenmangan-Olivin 4. 451
Turmalin 8. 699!
Wagnerit 9. 191!
Eisennatrolith 4. 73!
Eisenolivin 4. 451!
Eisenoxyd 1. 397*; 4. 453
-hydrat 3. 475; 4. 93, 418; 5. 432; 6. 581
-silikat-Krystalle, künstlich 5. 145
Eisenoxydul 3. 696; 1. 557, 707; 8. 579*
-Bildung 5. 430
-Fels 7. 741
-Silikate 6. 581
künstlich 3. 178
Eisenoxydulkarbonat 4. 259
Eisenpech-Erz 4. 403, 404
Eisenperundprotoxyd-Aluminosilikat 0. 444
Eisenphosphate 6. 582
Eisenresin 4. 219
Eisenspath 1. 557, 707, 709!; 2. 844!; 3. 840!; 5. 76, 821; 6. 48; 7. 66, 719!; 8. 472²!
-Lager 5. 447
Eisenstein 2. 134 ff.; 4. 476!
(Lagerstätten) 2. 337; 5. 715; 8. 858
(Vorkommen) 3. 324, 727
Eisensulphuret 2. 211
Eisentalk-Hornblende 8. 701*
Eisenturmalin 1. 596; 8. 699!
Eisenvitriol 4. 416; 5. 152, 821*
Eisenzinkspath 1. 449, 705
Eiserne Bomben: fossil 7. 453
Eiserner-Hut 1. 611
Eklogit 5. 584; 8. 222; 9. 478, 556
vidr. Eclogit
Elaeacrinus gen. 2. 744!; 4. 230
Verneuili 2. 745
Elaeagnus acuminatus 2. 754; 3. 505; 9. 503, 506
inaequalis 9. 506
Elaeodendron cassinioides 9. 375
degener 9. 375
dubium 4. 380
Haeringanum 4. 380
myricaeforme 9. 375
Fontanesium 1. 128; 6. 252
lanceolatum 2. 754
Eläolith 3. 464
Elaioides (Elaeoides) 0. 634
Elaphis 0. 868
Elaphotherium gen. 5. 373
Elaphus gen. spp. foss. 5. 227
Elasmocoenia 2. 117*
Elasmopora gen. 1. 489!
Elasmopora Beanana 1. 490
Elasmoporidae (fam.) 1. 489
Elasmotherium gen. 4. 248, 757; 7. 869
Fischeri 9. 100
spp. 2. 360
Elate geanthracis 2. 894
Elaterium Barypus 5. 747
Pronaeus 5. 747
Triopas 5. 747
Elea Calloviensis 5. 634
cervicornis 5. 634
ramosissima 5. 634
Ranvilleana 5. 634
Electra gen. 4. 113!
Electrina gen. 4. 113!
Electrinidae (fam.) 4. 113
Elektrisches Verhalten der Krystalle 1. 698
Elektrizitäts-Wirkung auf Kohlenstoff 1. 481
Eledone gen. 4. 852
Elementar-Stoff, neuer, im Gold 5. 69
Elenn 9. 757
Elephas gen. 7. 869; 8. 378
Adamiticus 8. 309
Africanus 9. 234
Americanus 5. 112
antiquus 8. 379; 9. 116, 118, 234, 348, 349, 640, 870, 871
Asiaticus 4. 610
imperator 9. 252!
meridionalis 1. 492; 4. 609, 610; 5. 372; 8. 379; 9. 116, 234, 349. 870
primigenius 0. 88, 836; 1. 78, 484, 492, 502, 504, 505, 678, 728, 730, 760; 2. 998; 3. 122, 158, 211*, 378, 496, 534; 4. 122, 609, 610, 732; 5. 112, 225, 537, 624, 721; 6. 111, 574; 7. 155, 556; 8. 61, 202, 234, 309, 379, 869; 9. 100, 118, 316, 348, 349, 355. 640, 853

Elephas
priscus 5. 372; 8. 379; 9. 234, 870
spp. 0. 747; 2. 631; 4. 637; 8. 510, 757
Verbreitung 3. 878
Eleutherocrinus
gen. 7. 101!
Cassedayi 7. 102
Ellagit 8. 313
Ellipsocephalus
gen. 0.779!, 785; 1.507; 3. 487; 6. 224
asaphoides 5. 593
Pradoanus 6. 500
spp. 9. 504
Ellipsocoenia 2. 118
Ellipsosmilia 2. 116
Meudonensis 1. 102
supracretacea 1. 102
Elocyon
martides 5. 229, 372
Eloditae 9. 366
Elonichthys
peltigerus 7. 626
Elomys (Glir.) gen. 4.831
Elopopsis
gen. 6. 481!
dentex 6. 481!
Fenzli 6. 481!
Heckeli 8. 751
microdon 6. 481
Elops gen. 3. 118*
Elotherium gen. 8. 876
Aymardi 5. 228, 373
ingens 8- 876
magnum 0. 756
Mortoni 8. 876
Ronzoni 5. 373
Elyx spp. 6. 223
Emanationen 5. 722
Emarginula
abnormis 9. 499
alta 2. 228
carbonifera 3. 230
cellulosa 3. 230
clathrataeformis 7. 421
crassa 4. 765
cretacea 1. 101
fissura 3. 765
flexuosa 3. 230
galericulus 3. 230
gibbosula 3. 230
Goldfussi 3. 230
granulata 2. 228
gravida 3. 230
impressa 3. 230
Emarginula
Leckhamptonensis 2. 228
liasina 6. 495
loculata 3. 230
Münsterana 3. 230
Naissanti 9. 361
nuda 3. 230
puncticephala 3. 230
planicostula 1. 486; 2. 228
scalaris 1. 486; 2.228; 3. 235
seminulum 3. 230
stenosoma 3. 230
supracretacea 3. 230
tricarinata 1. 486
spp. 6. 750
Emarine
Hebungs-Systeme 5.643
Embia antiqua 6. 621
Embla
Koreni 6. 651; 7. 507
Embolit 0. 444
Embothrites 0. 634
borealis 2. 750; 9. 374
leptospermus 2. 750; 4. 379
macropterus 2. 750
Embothrium
salicinum 9. 503
Embotrytes
borealis 4. 252
vgl. Embothrites
Emerilith 1.590!; 2.848; 4. 819!
Emergirte
Hebungs-Systeme 5.643
Emersions-Systeme 5.647
Emmonsia 2. 120*
cylindrica 2. 115
hemisphaerica 2. 115
spp. 4. 497
Empheria gen. 6. 623!
reticulata 6. 621
Empis carbonum 1. 677
Emporhebung
Skandinaviens 1. 175
Emporsteigen
der Küsten 6. 730
Emys bicarinata 2. 380
Benstedi 2. 381
Brongniarti 5. 232
Bullocki 5. 232
Camperi 1. 79*
Charpentieri 7. 624; 8. 747
Emys
Comptoni 1. 79; 2. 380
Cordieri 7. 624
crassa 1.713; 2.205, 380
Culbertsoni 5. 116
Cuvieri 5. 232
de Fonte 7. 624
Delabechei 2. 380
Dumerilana 5. 232
Elaverensis 5. 232
Etalloni 8. 119; 9. 366
Fleischeri 7. 624
firma 8. 254!
Gaudini 4. 640; 7.624; 8. 747
Gessneri 1.77!; 2.205; 7. 624
Hamiltoni 4. 578
hemisphaerica 5. 415; 8. 376
laevis 1. 79; 2. 380; 9. 366
Laharpei 7.624; 8.747
Lorettana 6. 485*
Nicoleti 7. 624
obscura 8. 255!, 376
Oweni 5. 116
Parisiensis 5. 232
Parkinsoui 2. 379
prava 8. 254!
protogaea 2. 305
Sansaniensis 5. 232
de Sheppey 2. 379
scutella 1. 79; 5. 622
scutellata 7. 624
testudiniformis 2. 379
Turnauensis 7. 110
Wyttenbachi 7. 624
spp. 7. 624; 8. 747
Emysaurus
Meilheuratiae 5. 232
Enaliosauri (fam.) 8.867
Enallocoenia 2. 117*
Enallohelia 2.116*, 249!, 250
compressa 2. 250
elegans 2. 250
regularis 1. 102
Enanthioplastus 0. 635
viscoides 3. 227, 748
Enanthiophyllites 0. 638
Sendeli 3. 748
Enargit 2. 67!
Encephalartos
Bucklandi 2. 992
Encheizyphius
gen. 8. 240!

Eucheizyphius
teretirostris 8. 240!
Enchodus ferox 7. 116
halocyon 5. 235; 9. 361
Lewesiensis 9. 361
Shumardi 7. 858; 8. 376
Encrinital
Limestone 6. 735
Encrinites
caryophyllites 5. 670
crassus 6. 602. 762
dubius 6. 602
gracilis 0. 587
granulatus 6. 602, 761
granulosus 1. 367; 2. 299
laevis 6. 602
liliiformis 3. 167
loricatus 6. 602
planus 4. 745
polydactylus 6. 602
ramosus 4. 744, 745; 5. 498
striatus 6. 761
Encrinus gen. 8. 762!
aculeatus 6. 746; 8. 762*
Brahli 8. 762!
Carnalli 8. 762*
dubius 2. 19 ff., 943: 3. 614
gracilis 6. 730; 8. 762*; 9. 359
granulosus 3. 299; 8. 763; 9. 753
liliiformis 0. 484, 485, 535! 2. 19 ff., 536, 909, 943; 3. 13, 27, 29, 223, 529, 614; 4. 204, 479; 5. 479; 6. 28, 214, 218, 245, 363, 737, 818; 7. 617, 621; 8. 720, 762*; 9. 104, 144, 359, 753
moniliformis 6. 218; 7. 617; 8. 762*
pentactinus 6. 28, 245; 8. 762*; 9. 359
radiatus 9. 359
Schlotheimi 8. 762*
Encrinuridae (fam.) 4. 493
Encrinurus
gen. 0. 778, 785; 3. 488
deltoideus 6. 735
laevis 4. 85, 86; 9. 222
multisegmentatus 4. 501; 8. 594; 9. 121
obtusus 9. 864
Encrinurus
punctatus 0. 373; 3. 341; 4. 501; 5. 872; 6. 116; 8. 270, 594; 9. 66, 121
sexcostatus 4. 501; 9. 121
Stockesi 4. 501
variolaris 4. 501
spp. 4. 493; 5. 248
Encoelites 0. 626
Endactis gen. 8. 237!
Agassizi 8. 237
Endictya
Oceanica 6. 103
Endoceras
gen. 5. 274, 285*, 385; 6. 126!, 8. 617, 618*
approximatum 5. 267
gemelliparum 5. 267*
magniventre 5. 267*
Endocyclica
(Echinoidea) 7. 767
Endogene
Erhebungen 5. 306 ff.
Gebirgsarten 4. 474; 9. 468
Gebirgs-Spalten 5. 787ff.
Mineralien 8. 76!
Endogenites 0. 631
asterolithus 5. 505, 506
bacillaris 5. 639
didymosolen 0. 253; 2. 995
echinatus 2. 995
Helmintholithus 5. 505, 506
Helveticus 2. 995; 5. 639
Palmacites 0. 253; 2. 995
Psarolithus 5. 505
striatus 2. 995
Endogramma gen. 3. 487
Endohelia 2. 116*, 249!, 550
Endolepis 0. 638
communis 3. 28
elegans 3. 28
Endopachys 2. 119
alticostata 6. 230
expansa 6. 230
triangularis 6. 230
Endosiphonites
gen. 4. 849!; 6. 122
carinatus 4. 849
Endosiphonites
minutus 4. 849
Münsteri 4. 849
Endophyllum 2. 121*
spp. 4. 497
Endopsammia 2. 119
Engelhardtia
Sotzkiana 9. 375
Englische Fossil-Reste (tertiäre) 4. 852, 864
Engraulis
brevipinnis 4. 734; 5. 380
longipinnis 4. 734; 5. 380
Engyommasaurus
gen. 5. 106
Brongniarti 5. 107, 495, 496; 6. 760
Enkriniten-Kalk 2. 25
-Marmor 3. 304
Enneacnemis gen. 3. 487
Enneodon gen. 5. 381!
echinus 5. 380
Enocephalus gen. 6. 239
Enoploclytia n. g. 0. 123!
brevimana 0. 123!
Imagei 0. 124!
Leachi 0. 124!; 4. 625
Enoploteuthis gen. 4. 853
Ensis
complanatus 7. 507
Enstatit 7. 437, 441!
Entalium
rugosum 3. 231
Entalophora 5. 635
abbreviata 5. 634
Bajocensis 5. 635
Bajocina 5. 635
caespitosa 5. 634
cellarioides 5. 635
straminea 5. 634
subirregularis 5. 635
Tessoni 5. 634
tetragona 5. 635
Entelodon
ingens 7. 855!; 8. 376, 876
magnus 5. 228, 373
Mortoni 8. 376
robustus 5. 115
Ronzoni 5. 373
Enteromorpha
stagnalis 5. 637
Entobia
gen. 3. 758
Entomolithus
paradoxus 4. 501

Entomostraca
(ordo) 3. 98; 5. 108!; 6. 755; 7. 503, 745; 8. 622, 756; 9. 636, 761
Entomostracites
caudatus 4. 501
costatus 4. 501
punctatus 1. 255; 5. 872
Entrochiten 3. 27
Entrochus
dubius 8. 763*
Silesiacus 8. 763*
Entstehungs-Folge
der Mineralien 4. 93, 402ff
Entwickelung
des jetzigen Zustandes der Erde 2. 739
der Organischen Welt 8. 635!
Entwickelungs-Folge
der Dikotyledonen 2. 420
der Floren 2. 885
der Mollusken 6. 641
Entwickelungs-Gang
der organischen Schöpfung 4. 606
der Thier-Welt 5. 762
Eocän 2. 882
-Fauna 2. 758; 4. 639; 5. 223!
v. England 7. 635
v. Paris 7. 631
-Flora 0. 114!; 3. 47; 4. 494, 631*
-Flysch 5. 178
-Formation 0. 713, 736, 738, 854; 1. 752p; 2. 345!; 3. 806, 625; 5. 104, 586, 849, 856; 6. 480p, 576; 7. 241; 8. 586, 587, 714!, 874p; 9. 228, 470, 748, 838, 843
von Cairo 0. 222
von Cilly 1. 740
Englands 4. 507p
in N.Amerika 6. 229
in Österreich 3. 331
der Schweitz 4. 83
von Häring 4. 377
von Steier 1. 232
Ungarns 4. 572
-Versteinerungen 3. 229
Eocäne
Säugethier-Fauna 0. 498, 878
Eocäne
Wirbelthier-Fanua 5. 615
Eocidaris
gen. 7. 122; 9. 255
Eotherium
Americanum 7. 247; 8. 376
Epeira oogena 5. 121
Epeiridium
femoratum 5. 121
Epactocrinus
gen. 6. 234!
virgularis 6. 233
irregularis 6. 633
Ephedra
Johnana 3. 747
Ephedrites 0. 632
Johnanus 3. 226
Sotzkianus 5. 638; 6. 252; 9. 374
Ephesit 1. 590!
Ephippus
longipennis 5. 380
oblongus 5. 380
Epiaster gen. 9. 762!
Aquitanicus 7. 859
crassissimus 9. 762
distinctus 9. 762
Guerangeri 7. 853
Köchlinanus 9. 762
trigonalis 9. 762
tumidus 9. 762
Varusensis 9. 762
spp. 9. 123
Epichlorit 0. 215!
Epicrétacé 0. 470
Epicyon gen. 9. 247!
Haydeni 9. 247!
Epidosit 7. 601
Epidot 1. 155*, 557; 2. 69, 78!, 879; 3. 182!, 259; 4. 176; 5. 74, 184, 186, 822; 8. 33, 49, 54, 393; 9. 204!
-Fels 3. 365
Epigene
Mineralien 8. 76!
Epigenese
der Mineralien 4. 189
Epigenie'n 4. 815; 6. 725
Epiglaubit 8. 694*
Epicretaceisch 7. 858
Epiphaxum gen. 3. 109
auloporoides 4. 868
spp. 3. 582
Epistilbit 5. 448; 6. 442!
Epithemia sorex 0. 473
spp. 6. 354
Epithyris
elongata 4. 119, 747; 7. 381
sufflata 4. 119, 747; 7. 381, 637
Epoque fucoidienne 8. 636
Equisetaceae (fam.) 5. 637
Equiseten
-Sandstein 9. 3
Equisetites 0. 627
arenaceus 3. 222
Brauni 4. 378
columnaris 0. 588; 3. 222, 508; 4. 204; 6. 218; 7. 344; 8. 741
crassinodis 4. 34
elongatus 4. 34
Erbreichi 3. 510
Hoefleanus 0. 733
infundibuliformis 5. 628
lateralis 6. 253, 254
lingulatus 1. 476
Lyelli 2. 886
Münsteri 3. 222
Phillipsi 2. 886
priscus 5. 628
radiatus 2. 890
Veronensis 4. 34
zeaeformis 1. 476
Equisetum
arenaceum 9. 318
Brauni 2. 760; 3. 502; 5. 637
Brodiei 4. 855
Brongniarti 7. 778
columnare 8. 358²
costatum 3. 222
infundibuliforme 5. 628
limosellum 5. 637
rude 0. 502; 2. 760
tunicatum 5. 637
Blüthen-Kolben 5. 220
Equus gen. 3. 378; 7. 869
Adamiticus 4. 473; 5. 373; 6. 357, 574
Americanus 0. 746; 3. 123; 5. 112; 6. 109; 9. 253
asinus 5. 226; 9. 862
Burchardi 2. 886
caballus 1. 728, 730; 2 998; 3. 378, 766; 5. 113, 226; 8. 869; 9. 496, 853

Equus
complicatus 9. 253
curvidens 0. 746; 5. 113
excelsus 9. 250!
fossilis 4. 473; 6. 111
fraternus 9 252
macrognathus 3 752
major 5. 113
minutus 5. 226
perditus 9. 250!
Piscenensis 2. 998; 5. 226
plicidens 1. 491; 9. 253
primigenius 1. 502; 3. 107; 9. 252
pygmaeus 9. 862
robustus 5. 373
spp. 8. 121, 8. 510
Erato laevis 3. 763
Maugeriae 3. 763
subcypraeola 3. 75
spp. 2. 630; 6. 479
Erbsensteine,
Karlsbader 2. 857
Erde 2. 240, 343; 4. 108
äussre Temperatur 3. 743; 7. 188!
Erd-Achse (Änderung) 5. 291 ff., 641, 769 ff.
-Bildung 4. 108
-Dichte 3. 617
-Fälle 1. 800; 8. 600
-Geschichte 8. 341
-Gestalt 2. 435; 4. 362, 474
-Kugel 7. 84
-Löcher 3. 742
-Magnetismus 1. 110!
-Periode: 21,000jährige 2. 445, 594
-Rinde 4. 385 ff.; 5. 291! ff., 641, 769 ff.; 7. 791
-Temperatur (innere) 5. 104, 851; 6. 846
-Wärme (innere) 2. 343
Erdbeben 1. 464; 2. 85, 241, 738; 3. 371!; 5. 87, 212, 807; 6. 51*, 573; 7. 95, 449, 842, 8. 101, 321, 546, 508, 726; 9. 198, 471, 857
-Chronik 3. 740
-Vertheilung in der Zeit 5. 732
Erdharz 1. 353!
Erdmannit 2. 80; 6. 35!
Erdöl 0. 339; 5. 824
Erdpech 5. 824; 6. 56*; 7. 440
Ereptodon gen. 6. 240!
priscus 5. 113; 6. 240
Eresus
curtipes 5. 123
monachus 5. 123
Erhebung
der Gebirge 2. 176!, 781!
des Landes 1. 724
Erhebungs-
Kratere 0. 233; 2. 486, 497; 4. 96; 9. 460!
Systeme 4. 385 ff.; 5. 289! ff., 641, 769! ff.
-Wogen 2. 718
Erica arborea 6. 244; 8. 757; 9. 253
Buckmani 2. 760; 3. 505
nitidula 2. 760; 3. 505
spp. 0. 505
Eridophyllum 2. 122*
rugosum 8. 267
Erigone
stigmatosa 5. 122
Erinaceus
Arvernensis 5 224, 371
dubius 5. 223
major 5. 224, 371
nanus 5. 223, 371
Sansaniensis 5. 223
soricinoides 5. 224, 371
Erineum
Friesi 2. 760; 3. 502; 5. 637
Kunzei 2. 760; 3. 502; 5. 637
protogaeum 0. 501; 2. 760; 5. 637
Erismacanthus
Jonesi 6. 123
Erismatolithus
floriformis 2. 122
radiatus 2. 122
Erithus
applanatus 5. 123
Erlan 8. 828!
Ero coronata 5. 122
exsculpta 5. 122
quadripunctata 5. 122
Ero setulosa 5. 122
sphaerica 5. 122
Erosion 1. 293!; 3. 805; 6. 668! 9. 527
Erosions-
-Terrassen 5. 462
Erratische
Bildungen 1. 803
Blöcke 2. 959, 965; 5. 77; 6. 216; 8. 275; 9. 605
vgl. Wanderblöcke
Erscheinungen 2. 719; 3. 495; 8. 346
Formation 1. 728
Gebirge 0. 863; 2. 623
Vorgänge 8. 82
Errina 2. 122*
Ersbyit 8. 313!, 698!
Erstarrungs-Temperatur:
plutonischer Gesteine 1. 739
Eruptionen: plutonischer Gesteine 2. 966
vulkanische am Rhein 3. 535
Eruptions-Kegel 4. 96 ff.
Eruptiv-Gesteine 0. 72, 87, 310; 1. 837; 2. 356; 3. 263; 4. 215, 217; 5. 205; 7. 461; 8. 83, 348, 473, 607, 654 ff., 759; 9. 458, 459, 485, 630
vgl. Ausbruchgesteine
ihre Altersfolge 4. 301; 9. 833
metamorphisch wirkend 6. 222
-Gneiss 1. 524
Ervum
dilatatum 8. 499
Germanicum 8. 499
Erycina gen. 6. 863
corbuloides 6. 863
Geoffroyi 6. 863
glabra 6. 648
inflata 6. 863
ovata 7. 506
pygmaea 6. 648
Renieri 7. 506
suborbicularis 6. 863
striata 6. 648
trigona 6. 858; 7. 507
spp. 6, 863; 9. 125

Erycinella ovalis 4. 505
Eryon arctiformis 4. 51
Barrovensis 0. 122*; 9. 860
Hartmanni 4. 370; 9. 863
longipes 5. 614
propinquus 5. 614
Raiblanus 8. 206; 9. 39, 860
Redenbacheri 6. 366
Schuberti 4. 51
speciosus 4. 51; 5. 614
spinimanus 4. 51*; 6. 366
Erythraeus
hirsutus 5. 124
lagopus 5. 124
proavus 5. 124
raripilus 5. 124
Erythrina 0. 637
Eryx (Trilobit. g.) 2. 242!
Erz-Adel 9. 841
-führende Kalke 7. 692
-Führung 4. 315
krystallinischer Gesteine 0. 567
vom Nebengestein abhängig 3. 726
-Gänge 1. 214, 362, 611; 2. 300! 3. 475, 479; 4. 192, 365, 415, 663, 832, 841; 5. 81, 204, 418 ff., 574, 705, 716, 735, 843; 6. 82, 460, 472, 569, 586, 710, 717; 8. 729, 734; 9. 210, 216, 450, 841
im Feldsteinporphyr (Theorie) 0. 428, 432
Verhalten zum Nebengestein 0. 100
-Lagerstätten 0. 716; 1. 596, 611; 2. 736, 769, 868!; 3. 720, 725. 726, 838; 4. 92, 466, 843; 5. 359, 846²; 6. 1, 63, 75, 85, 460, 472, 568, 582, 586!, 717, 725!; 7. 346, 347, 350, 352. 450; 8. 100, 327², 330, 344, 473, 734, 831, 844, 858, 861; 9. 62, 88, 96, 216, 318*, 469, 835, 841
Erz-Lagerstätten
im Muschelkalkgebirge 2. 93
-Reichthum
in Carolina 4. 663
in Moncayo 2. 964
der Gänge nach der Teufe 2. 869
-Seifen 2. 499
Erzeugungs-Art
von Krystallen 8. 578!
Eschara gen. 4. 115!
biserialis 4. 869
celleporoides 7. 232
coscinophora 4. 116
cyclostomoides 5. 853
digitata 8. 360
filigrana 4. 116
foliacea 2. 855*
macrocheila 4. 116
Manganottiana 8. 232
oblita 3. 609
Proteus 7. 499
pustulosa 2. 145, 167, 170
stigmatophora 8. 873
spp. 2. 123
Escharella gen. 4. 116!
Escharellidae (fam.) 4. 115!
Escharellina gen. 4. 116!
Escharellinidae (fam.) 4. 115!
Escharidae (fam.) 4. 114; 6. 114
Escharifora gen. 4. 116
Escharina gen. 4. 115!
crenulata 4. 117
inflata 4. 116
Oceani 4. 116
perforata 4. 117
pustulosa 2. 145, 167, 170
radiata 4. 116
spp. 2. 125
Escharinella gen. 4. 116!
Escharinellidae (fam.) 4. 115!
Escharipora gen. 4. 116!
Eschariporidae (fam.) 4. 115!
Escharites
retiformis 4. 744
spp. 2. 125
Escharoides gen. 4. 115!
spp. 2. 125
Escheria 0. 27*
insignis 4. 120, 499
Esmarkit 9. 567
Esox gen. 3. 118*
lepidotus 5. 622
Lewesiensis 9. 361
papyraceus 4. 623
Waltschanus 4. 164, 623!
Essbare
Gesteine 7. 843
Estheria
minuta 7. 117!; 8. 228
spp. 7. 117
Etage anthraxifère 2. 968
Bajocien 0. 156, 158!
Bathonien 0. 160!
Castellien 9. 470
Igualadien 9. 470
liasien 0. 148
Manrésien 9. 470
Montserrien 9. 470
Parisien 9. 470
Rhodanien 5. 473, 474
Rubien 9. 470
Sénonien 1. 102
Sinémurien 0. 145, 181
Toarsien 0. 152
Valanginien 5. 845
Etages 7. 467
Etrurisches
Gebirgs-System 1. 722
Ettingshausenia
gen. 5. 493!; 8. 365!
cuneifolia 8. 365
expansa 8. 365
Geinitzana 8. 365
grandidentata 8. 365
reticulata 8. 365
spatulata 8. 365
Sternbergi 8. 365
tremulaefolia 8. 365
venulosa 8. 365
Eubradys antiquus 5. 113
Eucalyptocrinus
conicus 0. 377
decorus 6. 115; 9. 635
extensus 0. 377
gibbosus 0. 377
Goldfussi 0. 377
laevis 0. 377
Nashvillae 0. 377
ovalis 0. 377
Phillipsi 0. 377
polydactylus 1. 748, 6. 115
splendidus 0. 377
spp. 5. 248; 9. 236
Eucalyptus
daphnoides 6. 505

Eucalyptus
eocaenica 5. 241
Haeringana 4. 380
Oceanica 3. 510; 4. 380; 6, 252, 505; 7. 776; 8. 587, 712; 9. 375, 376
polyanthoides 6. 505
Eucastor gen. 9. 247!
tortus 9. 247!
Euchoerus
macrops 5. 112; 7. 483
Euchroma
liasina 2. 984
Eucrotaphus
gen. 5. 117!
auritus 5. 115, 117; 8. 376
Jacksoni 5. 115, 117; 8. 376
Eucyrtidium
gen. 6. 127*
irregulare 6. 104
lineatum 6. 104
Simbirscianum 6. 104
Eudialyt 7. 833!
Eudnophit 0. 703!; 9. 623!
Euelephas
gen. 8. 378
antiquus 8. 379; 9. 116
Columbi 8. 379
imperator 9. 252!
primigenius 8. 379
Eugenia 0. 637
Aizoon 9. 375
Apollinis 3. 510; 4. 380; 8. 587; 9. 375
Haeringana 3. 505; 4. 380, 532
Eugeniacrinus
caryophyllatus 5. 669!; 8. 486
compressus 5. 673
hexagonus 6. 602
liasinus 7. 210
liasicus 6. 496
nutans 8. 486
quinquangularis 5. 670
Euglypha
gen. 5. 750, 755
Eugnathus gen. 3. 117*
spp. 4. 382; 9. 764
Euhelia 2. 116*, 249', 250
gemmata 2. 250
Euklas 4. 447!; 8. 215!, 685
Euklas (künstlich) 5. 215!
Eukolit 0 56! 1. 179; 4. 824! 7. 833!
-Titanit 4. 825!
Eulima aequalis 8. 768
Amorettii 8. 768
Aurelia 8. 768
Cainalli 8. 768
communis 3. 234
conica 3. 634; 4. 873
De-Cristophoris 9. 356
exilis 9. 356
fusus 8. 768
glabella 3. 764
gracilis 9. 356
longissima 9. 356
Olivii 9. 357
parvula 2. 229
pendula 3. 764
polita 3. 764
pygmaea 3. 234
Requienana 3. 634; 4. 873
Schlotheimi 7. 760
subglobosa 3. 234
subula 3. 74
subulata 3. 764
symmetrica 4. 750; 7. 637
tabulata 3. 634; 4. 873
Texana 0. 102
turris 8. 768
turrita 3. 634
umbilicata 8. 768
vagans 3. 234
spp. 0. 99; 6. 750
Euloma 6. 224
spp. 4. 493
Eulysit 3. 704
Eumorphia
socialis 1. 511
Eumorphocorystes
gen. 8. 231!
sculptus 8. 231
Eumünsteria
flagellaris 8. 640
Eumys
elegans 7. 115, 246!; 8. 376
Eunomia
gen. 0. 758!; 2. 117*
articulata 0. 759
laevis 0. 759
radiata 0. 759
sublaevis 0. 759
Eunotia
amphioxys 0. 249, 250, 473, 491; 4. 613
Eunotia
Dianae 4. 613
gibba 4. 613
gibberula 0. 491; 4. 613
granulata 0. 491; 4. 613
librile 4. 613
longicornis 0. 491
ocellata 1. 229
phrygia 0. 491
Sancti-Antonii 9. 510
serra 1. 366
sphaerula 4. 613
tetraodon 1. 366
Westermanni 0. 95
zebra 4. 613
zebrina 0. 491; 4. 613
spp. 4. 737
Eunotogramma
amphioxys 6. 103
elongatum 6. 103
novemloculatum 6. 103
octonum 6. 103
quinqueloculatum 6. 103
septemloculatum 6. 103
triloculatum 6. 103
Weissei 6. 103
Euomphalus
acuticosta 6. 372
aequalis 7. 220
annulatus 6. 372
biconcavus 4. 547!
Cadomensis 0. 151
canaliculatns 4. 869
carbonarius 9. 827
centrifugus 6. 121
compressus 9. 847
Corndensis 4. 634
decusstatus 6 372
discors 6. 121
funatus 6. 121
furcatus 1. 636
Goldfussi 2. 108, 192
Gualteriatus 5. 852; 7. 608; 8. 594
inversus 8. 634
Labadyei 2. 108
laevis 6. 372
lyratus 3. 232; 6. 121
minutulus 9. 27
nanus 8. 634
orbis 5. 501
pentangulatus 2. 108; 7. 374
permianus 4. 119, 489, 750; 7. 638²
planispira 7. 863
polygyratus 0. 103

Euomphalus
quadrivalvis 7. 863
retrorsus 1.225; 6.372
rota 5. 501; 6. 372
rotundatus 4. 547!
rugosus 6. 121
Sancti-Sabae 0. 103
Schnuri 6. 372
sculptus 6. 121
serpula 6. 272
serpuloides 6. 625
Spergenensis 7. 863
spinatus 6. 821
tricinctus 6. 121
triporcatus 3. 232; 6.121
Voronejensis 9. 847
spp. 1. 636; 5. 248
Euophrys
gibberula 5. 123
Eupatagus
angustatus 4. 120, 121
brissoides 7. 859
DeKoninckі 6. 101
elongatus 1.765; 3.606; 4. 120; 5. 473; 7. 230
Hastingsae 4. 761
minimus 3. 606
navicella 3. 606
ornatus 3. 606; 7. 859
Euphorbiaceae(fam.)4.621!
Euphorbioides
prisca 6. 505
Euphorbiophyllum
crassinerve 8. 501
Druidum 4. 877
lanceolatum 4. 380
omalanthoides 4. 380
stillingioides 4. 380
Styriae 8. 501
subrotundum 4. 380
Euphorbiopsis
Berica 9. 502
Euphotid 0. 675!; 5. 47; 7. 357*, 361!, 600, 737*
Euphyllia 2. 116*
sinuosa 4. 867
Euphyllit 2. 848; 5. 75
Eupodiscus
subtilis 6. 103
Ungeri 6. 626
Eupsammia 2. 119
Eupyrchroit 3. 698!
Eurit 4. 300!, 303, 476; 7. 357*, 360!, 606, 737*
Eurit
um Lyon 0. 74*
-Porphyr 2. 716
Eurotium
elegans 3. 745
Euryalae (ordo) 6. 115
Euryarthra spp. 9. 764
Eurycare
spp. 4. 493; 6. 223
Eurycormus
gen. 9. 764, 767
speciosus 9. 767
Eurydema
arcuata 3. 873
brevicollis 3. 873
effossa 3. 873
impudica 3. 870, 873, 871
Eurydesma gen. 1. 383!
spp. 6. 864
Eurymanthisches
Hebungs-System 7. 92, 371
Eurynotus spp. 3. 744
Euryodon
latidens 4. 111
Euryopus
gracilipes 5. 122
Eurypholis
Boissieri 3. 108
longidens 3. 108
sulcidens 3. 108
Eurypteren
-Kalksteine 5. 865
Eurypteridae (fam.) 9. 760
Eurypterus
gen. 1. 506; 6. 611!; 7. 241
cephalaspis 6. 116; 9. 761
clavipes 9. 507
Fischeri 9. 761
granosus 3. 161; 4. 500; 6. 483!
leptodactylus 6. 116
pygmaeus 8. 625, 716; 9. 761
remipes 5. 866!; 9. 57, 63, 64, 66, 759!
spinipes 9. 507
tetragonophthalmus 5. 865; 9. 761
spp. 4. 1
Eurytherium
latipes 5. 228
Eusarcoris
pinguis 3. 873
Eusarcoris
prodromus 3. 873
Eusmilia 2. 116*
Eusmilinae (fam.)
fossiles 0. 756
Euspira gen. 3. 236!
canaliculata 3. 234
cincta 3. 235
gregaria 6. 245
Eustoma gen. 7. 372!, 846!
tuberculosum 7. 373, 846
Eusynchit 5. 570!
Eutermes
antiquus 6. 621
Eutermopsis
gen. 6. 108!; 8. 374!
affinis 6. 108
Decheni 6. 108
formosa 6. 108
Heeri 6. 108
spp. 8. 374
Eutomit 2. 701
Euxenit 0. 56!; 1. 180; 2. 862!; 5. 514; 8. 320!
Euzonus
collulum 5. 121
Evagoras
impressus 3. 865, 874
Everglades 8. 107!
Evonyminium
gen. 7. 363!
Auerbachi 7. 363
Evonymus 0. 636
Aegipanos 4. 380
Europaeus 4. 627
Haidingeri 8. 500
Pythiae 9. 376
Exapinurus gen. 9. 865!
Schrenki 9. 864
Excipulites 0. 626
Neesi 5. 628
Exhalationen 2. 501; 9. 836
Existenz-Bedingungen der Organismen 1. 633
Exocampe gen. 9. 868
arcta 9. 868
ornata 9. 868
Exocyclica
(Echinoidea) 7. 767
Exogena
(Vegetabilia) 2. 504!
Exogene
Erhebungen 5. 306ff.
Gebirge 4. 473

Exogene
Mineralien 8. 75!
Spalten des Gebirgs 5. 787
Exogyra gen. 7. 383
angustata 2. 154
aquila 0. 230; 1. 738; 2. 154; 5. 159
arietina 0. 101
auricularis 9. 847
auriformis 4. 765
Boussingaulti 0. 480
Bruntrutana 0. 173; 4. 354, 355
canaliculata 4. 869
columba 0. 136, 171, 397, 727; 1. 168; 2. 55, 186, 451; 5. 27, 592; 6. 356; 7. 481; 8. 474, 739, 874; 9. 202
conica 1. 140; 2. 154, 168; 4. 167; 8. 874
costata 0. 101; 8. 360², 361; 9. 498
costulata 1. 496
Exogyra
Couloni 0. 230, 231; 1. 139, 140; 2 154, 168, 171; 3. 166, 329; 4. 80, 653; 5. 159, 160, 162; 6. 818; 7. 674; 8. 874
falciformis 0. 230
fimbriata 6. 480
flabellata 3. 617
fragosa 6. 480
haliotoidea 0. 291; 1. 357, 744; 2. 451; 3. 608; 8. 474, 874
imbricata 1. 384; 4. 82
interrupta 9. 498
laciniata 1. 357, 744
laeviuscula 0. 101
lateralis 3. 608; 5. 324; 8. 874
minima 8. 874
nana 8. 488
Pellicoi 3. 617
Pitcheri 4. 81
polygona 4. 80
ponderosa 0. 101
Exogyra
recurvata 2. 154, 168, 171, 296
sinuata 0. 230, 390 ff., 487; 1. 577; 2. 189;
spiralis 5. 160; 8. 582²
Texana 0. 101; 7. 458
Tombeckana 5. 160
virgula 0. 174, 184, 185, 404; 2. 154, 168; 3. 816; 4. 355; 7. 207; 8. 488, 582³
vgl. Ostrea
Explanaria 2. 119
arachnoides 9. 629
astroites 0. 764
complanata 7. 232
cyathiformis 3. 74
flexuosa 0. 766; 2. 287, 288; 3. 318
Extracrinus
gen. 6. 762!; 8. 876
Briareus 6. 762
lepidotus 6. 762
Eier, fossile 9. 863!
von Vögeln 5. 232

F.

Faboidea 0. 638
Crepini 3. 506
Fabularia gen. 5. 755
Fächer-Stellung
der Schichten 7. 619
-Struktur
der Gesteine 0. 534
Fagites gypsaceus 2. 894
Fagus 0. 634
Antipofi 8. 740
Atlantica 2. 753; 3. 47, 504; 9. 502
attenuata 9. 873
castaneifolia 2. 628; 3. 226; 4. 252; 9. 117
dentata 2. 894; 4. 252; 9. 117
Deucalionis 4. 627; 6. 505; 7. 614; 8. 501; 9. 117
Faujasi 4. 627
Feroniae 4. 491; 8. 500
ferruginea 9. 506
gypsacea 3. 227
horrida 9. 122
humata 3. 747
Fagus
succinea 3. 747
sylvatica 9. 117, 872
Vivianii 4. 627
Fahlerz 0. 71!, 692!; 1. 331, 386*, 391*; 2. 532; 3. 180, 478!; 4. 176!, 824!; 5. 198, 561!, 824; 6. 36!, 48, 185, 335!, 442, 557; 7. 67!; 8. 832*
Quecksilber-haltiges 0. 337!
Fahlunit 2. 522; 9. 567
Fährten 1. 512; 2. 981, 989; 3. 753; 4. 569; 5. 862, 871, 875; 6. 125, 237, 488; 8. 362, 363, 620; 9. 867!, 875
am Isterberge 3. 150
in Buntsandstein 4. 858
von Annulaten 7. 238, 239, 240, 753, 754
von Reptilien 0. 251
Fährten
von Schildkröten 3. 107
von Vierfüssern 2. 383; 7. 754
von Wirbel-losen Thieren 7. 878!
Failles 2. 198
Falten-Bildung
der Gebirgsschichten 7. 792
-Erhebungen 1. 818
-Gebirge 4. 214
-Thäler 5. 291 ff., 641 ff., 769ff.
Faltungs-Thäler 1. 798
Falun 1. 742; 4. 841; 5. 223p., 374p.; 7. 503
de la Loire 2. 882
de la Touraine 3. 77
jaune à Coquilles detruites 4. 108
Falunien 3. 73, 76p; 6. 477; 9. 748
Färbung
des Flussspathes 4. 192
der Gesteine 1. 364; 6. 580

Färbung
der fossilen Konchylien 6. 125
Farcimia gen. 4. 114
Farnen-Kohle 5. 626
-Wurzeln 8. 363
Farringdon
Sponge gravel 7. 482
Fasciculipora 2. 126
Waltoni 5. 635
Fasciculites 0. 631
anomalus 0. 253: 2.995
Antigoensis 0. 253; 2. 995
astrocaryoides 2. 995
carbonigenus 0. 253; 2. 995; 6. 99
Cottae 0. 253; 2. 995
densus 2. 995
didymosolen 0. 253; 2. 995
dubius 0. 254
Fladungi 0. 254; 2.995
fragilis 0. 254; 2. 995: 9. 238
geanthracis 0. 253; 2. 995
Hartigi 0. 253; 2. 753, 995; 5. 639
Helveticus 3. 503; 5. 639
intricatus 2. 995
lacunosus 2. 995
leptoxylon 0. 253; 2.995; 6. 99
Palmacites 0.253; 2. 995
Partschi 0. 253; 2. 995
perfossus 0.253; 2. 995
Sardus 0. 254; 2. 995
stellatus 2. 995
varians 2. 995
Withami 0.253; 2.995
Zeylanicus 2. 995
Fasciolaria
Bellardii 4. 760
buccinoides 7.492; 8.494
Burdigalensis 3. 75
cretacea 7. 492; 8. 494
elongata 3. 635
ficulnea 3. 807
gracilis 3. 635; 4. 875
nitida 3. 635; 4. 875
nuda 7. 866
prima 1. 101
spinosa 3. 635; 4. 875
supracretacea 1. 101
spp. 4. 760; 6. 479
Faser-Aragon 9. 204
Faser
-Kalk 4. 416*
-Quarz 9. 293
-Schwefel 3. 275
Fassa-Dolomit 0. 305
Fassait 2. 525; 8. 692
Faulerde 4. 343
Faujasina 5. 751
Faujasit 0. 190, 345!; 3. 174
Fauna
der Grauwacke 0. 275
der Kreide-Mergel Lemburgs 1. 480
der lithographischen Schiefer 3. 749
der Trias 8. 1, 124
der Vorwelt 5. 366!; 6. 329, 764!
des Kressenbergs 2. 144!
der Wirbelthiere 1. 492
paläolithische 6. 111
permische 4. 742
tertiäre 2. 757
Faune Lemanienne 5.370
Faunen
geographische 0. 509
Faunula
des Loire Beckens 5.370
von Nebrasca 5. 112
Faux-pliocène 5. 223!
Favistella 2. 121
Franklini 9. 222²
reticulata 4. 86
spp. 5. 248
Favosites 2. 120*
alveolaris 2. 120, 341; 6. 113, 255; 9. 222
asper 6. 113; 8. 264
cervicornis 6. 375, 501
cornigerus 2. 341
crassus 6. 113
cristatus 8. 264
dubius 6. 375
favosus 8. 855
fibrosus 2. 115, 938; 5. 98; 6. 255
Franklini 4. 86
Goldfussi 2. 341
Gothlandicus 2. 200; 4. 86; 6. 113; 9. 222²
gracilis 6. 375
helianthoides 0. 765
hemisphaericus 2. 115, 341
Hisingeri 2. 115; 8. 264
Favosites
lycoperdon 1. 498
Massalongoi 7. 233
minor 6. 255
obovatus 6. 99
oculatus 6. 113
Orbignyanus 2. 341
Petropolitanus 7. 104
polymorphus 2. 108; 341, 926,938; 4.86; 6. 113
radiatus 0. 759
ramosus 0. 243
reticulatus 6. 375
tubiporaceus 7. 233
spp. 2. 990; 4. 497; 5. 248; 7. 104
Favularia
tessellata 5. 631
Faxöe-Kalk 1.792!; 2.856!
Fayalit 0. 453!, 705!; 7. 174!
Federerz 2. 534; 5. 824
Federn
fossile 5. 622; 9. 725
Fegonium 0. 633
salinarum 1 635; 3. 383
vasculosum 1. 635; 3. 383; 8. 336
Feijao (Mineral) 3. 597!; 8. 819!
Feldspath 0. 6 ff., 422; 1. 393*, 422!, 441!, 585*, 592!; 2.515ff, 521; 4. 303!, 344, 448; 5. 449!, 703!; 6. 38, 49*, 268, 440; 7. 71, 437!; 8. 577!, 855; 9. 447!, 587 ff.
eingliedriger 5. 832!
glasiger 3.259; 6.563!
-Kalk-haltiger 1. 358
künstlicher 5. 215
pseudomorpher 0. 43!
wasserhaltiger 2. 326, 327
Zersetzungs-Prozess 2. 324
-Bildung 8. 729
-Familie 1.441!: 4.593!; 8. 698!
-Gesteine 2. 322, 326; 4. 257*
-Granit 7. 354! 357*
-Porphyr 7. 357*
-reicher Trachyt 7. 7 13

Feldspathisirte
Gesteine 6. 359!
Feldstein-Porphyr 0. 424; 1. 1!, 422!; 2. 601; 4. 303!, 348!
Felis antediluviana 5. 372
antiqua 2 698; 5. 230, 372, 624
aphanista 9. 271
Arvernensis 5. 230, 371
atrox 4. 120; 5. 113
Attica 7. 234, 759
brachyrhyncha 5. 371
brevirostris 5. 230, 372
catus 2. 998; 5. 230, 624; 6. 574; 9. 100
Christoli 1. 493; 2. 998; 5. 230
cultridens 5 230, 372; 9. 272
elata 5. 230
Engiholensis 5. 372, 624
gigantea 5. 375; 7. 370
hyaenoides 5. 230, 372
incerta 5. 372
intrepida 9. 247
Issiodorensis 5. 230, 372
leopardus 5. 372
leptorhina 5. 230
leptorhyncha 5. 372
leo 5. 624
lyncina 5. 624
lyncoides 5. 372
maritima 1. 380; 2. 998; 5. 230
media 5. 230
meganthereon 4. 609; 5 230, 372
minuta 5. 372, 624
ogygia 1. 502; 5. 372
palmidens 5. 372
Pardinensis 5. 230, 371
pardoides 6. 491
pardus 5. 372
Perrieri 5. 372
prisca 5. 372, 624
protopanther 9. 100
pygmaea 5. 230
quadridentata 5. 230, 372
serval 2. 998; 5. 230, 372, 624
servaloides 5. 372;
spelaea 1. 760; 2. 998; 3. 122; 4. 609; 5. 230, 372, 624, 625; 9. 861
tetrodon 5. 230
tigris 1. 505; 5. 625
spp. 1. 493; 3. 377; 8. 510
Fels-bildende
Polygastern 6. 101
Polythalamien 6. 101; 7. 749!
Thiere 9. 510
Felsblöke, wandernde 6. 731
Fels-bohrende
Thiere 3. 98; 4. 733; 6. 128
Felsen-Streifung 2. 718
-Sturz 0. 624; 1. 107; 2. 84, 972
Felsarten 1. 462
auf sekundärer Lagerstätte 8. 508
mit Kugelgefüge 3. 619
Wärmeleitungsfähigkeit 2. 623!
Felsit 4. 598!, 601
-Familie 4. 593, 597!
-Gesteine 3. 385!; 4. 401*; 5. 798
-Porphyr 4. 218, 220, 303!; 6. 204; 8. 651; 9. 215
-Schiefer 5. 317
-Tuff 9. 534! ff., 570, 681
Felsöbanyit 4. 823*; 7. 711!
Fenestella
gen. 6. 114; 8. 616
anceps 3. 126, 128, 774, 776, 778; 4. 119, 745
antiqua 1. 489; 4, 119, 744; 5. 853; 6. 114
Bischofi 6. 256; 8. 754
carinata 6. 111; 7. 373
dichotoma 6. 256
dubia 4. 744, 745
Ehrenbergi 3. 126, 128, 774; 4. 119, 744
exilis 5. 865
flabellata 8. 766
flustracea 4. 744
formosa 6. 114
Geinitzana 4. 489
infundibuliformis 2. 193; 4. 489
membranacea 6. 114
micropora 6. 256
Milleri 6. 114
patula 6. 114
permiana 1. 489; 4. 774
plebeja 6. 114
polyporata 6. 114
prisca 5. 853; 6. 114
ramosa 4. 744
retiformis 3. 128, 774, 776, 778; 4. 119, 489, 744; 6. 114
rigidula 6. 114
striolata 5. 865
subantiquata 6. 114
undulata 6. 115
Veneris 7. 373
virgulacea 4. 744
spp. 1. 382; 5. 248
vdr. Fenestrella
Fenestellidae (fam.) 1. 488!
Fenestrella 6. 374
aculeata 6. 374
subrectangularis 6. 374
vdr. Fenestella
Fergusonit 2. 862!; 9. 305*, 732
Ferrosilicate of Manganese 0. 447
Ferussacia spp. 8. 507
Ferula-Erze 9. 184
Festiniog-group 3. 97; 6. 112
Festland-Flächen: unter dem Meerspiegel 8. 81
Fettquarz 9. 817
Feuer
-Ausbrüche 9. 213
-Gesteine 1. 477; 2. 366; 7. 353!, 592, 734!, 741; 9. 459
-Kugeln 2. 343; 4. 485
-Meteore 3. 844!
-Quellen 5. 94
Feuerberge 1. 70; 4. 96!
s. Vulkane
Feuersteine 2. 767; 4. 207; 6. 358; 7. 89; 9. 227
Fibula
gen. Piette 8. 380!
Roissyi 8. 380
undiformis 8. 380
undulosa 8. 380
Fibularia
alpina 4. 120
angulosa 4. 761
Suffolciensis 4. 761
Tarentina 4. 761
Fichtelites 0. 638
Ficinit 6. 686!

Ficus 0. 633
Andreoliana 4. 252
apocynoides 9. 374
apocynophylla 6. 505
appendiculata 9. 502
arcinervis 3. 504; 9. 502
Bolcensis 7. 778
Brauni 9. 502
caricoides 9. 375
Dalmatica 3. 510
Decandolleana 9. 502
Decheni 6. 505
degener 4. 252; 9. 376
Desori 9. 502
dubia 3. 434
elegans 2. 753
Fussi 6. 252
flexuosa 3. 434
Heeri 9. 374
hydrarchos 9. 374
infernalis 4. 252
Joannis 8. 500
Jynx 3. 504, 510; 4. 378; 9. 374, 502
lanceolata 9. 502
laurogene 9. 374
Lereschi 9. 502
Morloti 3. 510; 9. 374, 376, 502
multinervis 9. 502, 754
Noeggerathi 6. 505
obtusata 9. 502
octolyratus 9 498
Orsbergensis 6. 505
pachymischos 4. 252
Pannonica 4. 491
Poniana 7. 778
populina 8. 740; 9. 502, 505
pseudo-capensis 4. 252
pseudo-elastica 4. 252
Sarzanellana 9. 871, 873
scabriuscula 9. 502
tiliaefolia 8. 500, 501; 9. 117, 502, 872
Filicava gen. 5. 653
Filicites 0. 628
adiantoides 6. 97
affinis 5. 630
aquilinus 5. 630
arborescens 5. 630
conchaceus 5. 630; 6. 97
crispus 5. 629
cyatheus 5. 630
Filicites
foeminaeformis 5. 630
fragilis 5. 629
gracilis 6 736
lacidiformis 6. 97
linguarius 5. 630; 6. 97
muricatus 6. 97
oreopteridis 5. 630
Pluckeneti 5. 630
plumosus 5. 630
tenuifolius 5. 630
Filiflustra gen. 4. 117!
Filiflustrella gen. 4. 117!
Filiflustrellaria gen. 4. 117!
Filiflustrina gen. 4. 117!
Filigrana
filiformis 3. 231
permiana 4. 745
Filograna scr. Filigrana
Filoni impastati 7. 605
Fimbria spp. 9 125
-Schicht 0. 870; 8. 355
Finbo-Tantalit 2. 863!
Fische 2. 980; 3. 108, 125; 6. 481, 486; 7. 242; 8. 380; 9. 364, 378, 381, 491², 763, 862
der Kohlen-Formation 7. 341, 342, 367
des Muschelkalks 0. 246
devonische 8. 117, 248, 624
eocäne 5. 379
mesolithische 8. 237
silurische 8. 112
durch Schwefelwasserstoff getödtet 3. 105
todt, Bänke bildend 6. 89
-Schiefer 6. 362; 8. 1 ff.
-Reptilien 8 760!
Fischerit 4. 453
Fissurella
acuta 1. 487; 2. 228; 3. 235
Brodiei 2. 228
Cantraineana 3. 230
crenulata 7. 242
graeca 3. 765
Leodica 3. 230
Nystana 3. 230
Recquana 3. 230
spp. 6. 750
Fissurina
gen. 2. 255!; 5. 755
alata 2. 253; 6. 756
globosa 6. 756
Fissurina
laevigata 2. 254
obtusa 7. 270!
spp. 9. 865
Fissurirostra 0. 244
elegans 4. 508
pectiniformis 9. 120
recurva 4. 508
Fistulana
amphisbaena 3. 229; 3. 231
contorta 4. 525!
cylindrica 9. 847
Essenensis 3. 231
personata 6. 857
pyrum 6. 857
Royanensis 3. 231
Tornacensis 3. 231
spp. 7. 632
Fistularia
(pisc.) Koenigi 9. 862
Fistulipora 2. 120*
decipiens 7. 105; 6. 113
minor 6. 113
porosa 6. 256
spp. 2. 990
Flabellaria 0. 631
Antigoensis 2. 994
Bilinica 2. 994
borassifolia 5. 631; 7. 766; 9. 849
Brocchiana 7. 776
chamaeropifolia 2. 994
crassipes 2. 994; 4. 532
gigantea 5. 639
gigantum 4. 251; 5. 639
Haeringiana 2. 994; 4. 532; 5. 638; 9. 374
Lamanonis 2. 994; 5. 364, 638
latiloba 5. 639
Latania 2. 994; 3. 72, 510, 631
licualaefolia 4. 630
licualaeformis 3. 434
longirachis 2. 994; 3. 633; 5. 87
major 2. 994; 4. 378, 532; 5. 639; 7. 776²
Martii 2. 994; 4. 532
maxima 1. 735; 2. 753, 994; 4. 123; 5. 639
minor 3. 212
oxyrhachis 2. 994; 4. 532; 6. 633
Parisiensis 2. 994
Parlatorei 4. 627; 5. 639

Flabellaria
plicata 1. 102
principalis 1 477; 2.994; 5. 631
raphifolia 2.994; 3. 47; 3. 212, 503, 510; 4. 321, 378, 532, 627; 5. 638, 639; 7. 776²
Rümineana 5. 639
Sagorana 2. 994
Satania 7. 776
Saviana 4. 627
spathulata 4. 627
Sternbergi 6. 99
verrucosa 2.994; 3.212; 4. 378, 532
Vincentina 4. 251; 5. 638
Flabellina gen. 5. 755
cordata 4. 867
cuneata 7. 497
ensiformis 7. 497
obliqua 7. 497
oblonga 7. 497
rugosa 4. 867
striata 9. 497
spp. 2. 511*
Flabellopora gen. 4. 116!
Flabellum 2. 116*
appendiculatum 7. 232
Bellardi 3. 606
bisinuatum 5. 867
costatum 3. 369, 606; 6. 93², 740
ocellanum 7. 232
subappenninum 7. 232
subcarinatum 4. 867
Wailesi 6. 230
Flagstone 6. 598
Flammenmergel 0. 398; 1. 63, 309!; 3. 495; 4. 201, 643; 5. 326, 457; 6. 818; 7. 473!, 659
Flaser-Kalke 2. 56
Fleckenmergel 3. 417; 4.551, 552; 6. 747p
Flegia gen. 5. 120
longimana 5. 122
Fletcheria 2. 121*
Flieg-Saurier 8. 366
Fliegen 0. 22*
Fliesen-Kalkstein 7. 608
Flint 1. 792
-slate 8. 391
Flinz 3. 570; 6. 79
Florideae (fam.) 5. 637
Flora 4. 631
fossile 0. 105!, 625; 2. 503!, 505!
Entwickelungs-Folge 2. 504!, 505!
Geschichte u. Geographie 0. 755
paläolithische 6. 111; 9. 804
älteste terrestre 6.626!
untersilurische 5. 362
devonische 4. 496
des Cypridinen-Schiefers 5. 239
des Übergangs-Gebirges 0. 257; 2. 888; 5. 548
der Steinkohlen-Formation 0. 873; 1. 475; 5. 625, 867; 9. 379
der Zechstein-Formation 3. 124; 5. 548; 8. 758
der Trias 8. 128
der Anthrazite Savoyens 0. 119!, 656
der Lias-Periode 2. 885
der Jura-Periode 2.885
der Oolithe Venetiens 6. 171
der lithographischen Schiefer 3. 749!
der Wealden-Periode 2. 885
der Kreide-Periode 2. 885
des Quadergebirges 6. 895
tertiäre 2. 627, 635; 3. 225, 433; 4.138, 490, 494, 626; 5.241 9. 870
der Schweitz 3. 497; 5. 637
im Bernstein 3. 745
Italiens 9. 870
Florula (Steinkohlen)
von Radnitz 6. 96
von Stradonitz 3.120
(triasische)
von Raibl 8. 128
(liasische)
von Steierdorf 6.253
Florula
(jurassische)
v. Nusplingen 6.105
(Kreide-)
v. Blankenburg 6.640
des Harzes 8. 364
v. Aachen u. Mastricht 8. 619
v. Herzogenbusch 4. 228
tertiäre
(Europäische)
vom Albis 3. 497
des Arno-Thals 8. 501
v. Breslau 2. 634!
v. Delsberg 3. 497
v. Eritz 3. 498
v. Häring 4. 376
v. Heiligenkreutz 3. 383
v. hohen Rohnen 3.497
v. Holzhausen 9. 122
Italiens 3. 46
v. Köflach 8. 499
v. Lausanne 3. 498; 6. 450
v. Mainz 9. 121
v. Massa maritima 8. 501
v. Montajone 8. 501
des Monte Promina 3. 509; 5. 369
des Niederrheins 2. 751; 6. 504
v. Öningen 2. 759!; 3. 499
Österreichs 1. 634; 2. 627
der Ostalpen 8. 586
v. Prevali 6. 633
v. Schossnitz 5. 368
v. Siena 8. 501
v. Sotzka 9. 373
v. St. Gallen 3. 497
v. Steyermark 7. 636
v. Szakadat 6. 251
v. Tockay 4. 490
v. Toskana 9. 115, 118
der Wetterau 8.498; 9. 121
v. Wieliczka 3.382; 383
v. Wildshut 3. 120
v. Madeira 6. 241; 8. 757; 9. 253
(ausser-Europäische)

Florula, tertiäre
der Kirgisensteppe 8. 739
des Taurus 5. 241
Javas 4. 628
v. Bellingsam-Bay 9. 505
v. Vancouvers-Insel 9. 505
jetzige,
ihr Arten-Reichthum 9. 383
Florulen 2. 627
tertiäre
der Schweitz 9. 500
Floscularia 2. 121
Flossenfüsser,
silurische 4. 1
Flötz
-Formation 6.207; 8.334, 493, 496
-Gebirge 7. 612, 614, 769; 8. 348
in NW.-Deutschland 3. 31
Italiens 8. 88
-Gebirgs-Folge
der Sardischen Alpen 4. 205
subhercynische 4.201
im Vorarlberg 3.167; 4. 204
-Gebirgs-Gliederung
bei Goslar 3. 494
-Gebirgs-Profil
des Meurthe-Dpt's. 4. 212
-leere Sandsteine 1.226; 8. 158ff
Fluochlor 2. 209!, 862!
Fluolith 6. 193!
Fluor-Metall 6.44; 7.578
in Meerwasser 0. 61*
Fluss-Geschiebe 1. 471
-Schlamm 5. 702!
des Nils 7. 168
Flüssigkeiten
in Krystallen 6. 43
in Mineralien 4. 820
Flussspath 0.451; 1.393*, 397*, 571, 820*; 2. 517, 525ff, 875; 3. 259; 4. 72, 192, 348*; 5 180, 184, 413 ff, 574*, 821; 6. 35, 36, 39, 44, 481; 7. 439;
Flussspath 8. 310, 447, 549, 660, 788; 9.186*, 301*, 424*, 451*, 553*, 799, 803
-Versteinerungen 9. 718
Flustra lanceolata 8. 267
Flustella gen. 4. 117!
concentrica 5. 471; 6. 104
spiralis 6. 104
spp. 9. 123
Flustrellaria gen. 4. 117!
dentata 9. 228
Flustrellaridae (fam.) 4. 115!
Flustrellidae (fam.) 4.115!
Flustridae (fam.) 4. 113
Flustrina gen. 4. 117!
Binkhorsti 9. 120
Flustrinidae (fam.) 4. 115!
Flysch 0. 305, 742!, 830; 2. 42*; 4. 357; 5. 175*ff.; 6. 91; 7. 481; 8. 636*ff.
Folliculites
gen. 0. 638; 6. 236!
Kaltennordheimensis 6.167; 6. 420; 7.58; 8. 498
minutulus 6. 235 ff.; 8. 224
Fontainebleau
-Sandstein (Flora) 0.114
Foralites gen. 4. 223!
Pomeli 4. 221
spp. 9. 106
Foraminifera (class.) 1. 378!, 379, 380; 2. 254!, 510!, 630; 3. 582, 670; 5. 751!; 6. 755; 7. 266, 376, 497, 633; 9.370, 384, 865
Foraminiferen
Fels-bildend 0. 473
-Gesteine 8. 630
-Kalk 1. 71
Foraminites
serpuloides 4. 745
Forbesia
gen. 1. 508!; 6. 224; 8. 704!
Chastelli 8. 515
concinna 8. 704
latifrons 6. 116
Stockesi 6. 116
spp. 4. 493
Forbesiocrinus
gen. 6. 603!; 9. 343
nobilis 6. 602
Forbicina
acuminata 5. 124
Forellenstein 6. 702!
Forest
marble 0. 160! ff., 183; 7. 207, 8. 482
Forficula spp. 6. 620
Form-Änderungen
der Mineralien durch Molekular-Bewegungen 5. 688
(s. Pseudomorphose)
Formica
capito 6. 503
demersa 3. 871
fuliginosa 3. 863
Heraclea 3. 871
immersa 3. 871
macrocephala 0. 854
minutula 0. 854; 6. 503
lignitum 3. 871
longaeva 0. 854
occultata 0. 854; 3. 863
oculata 6. 503
ophthalmica 0. 854
primitiva 3. 871
primordialis 3. 871
procera 3. 871
Redtenbacheri 0. 854
Ungeri 0. 854
Forsterit 3. 262
Fortbildungen
im Mineral-Reiche 4.415
Fortes Toises
(Mergel) 1. 618
Fossarus
clathratus 3. 764; 7.509
sulcatus 3. 764; 7. 509
spp. 6. 750
Fossil
-Reste auf sekundärer Lagerstätte 3. 608; 8. 234, 257; 9. 747
devonische 2. 339
-Zustand der Hölzer 0.257
Fossile Korallen,
Britische 4. 497
Fossilien,
tertiäre 0. 860
Fowlerit 0. 447!; 3. 62*, 176!; 5. 202; 6. 40; 8. 684, 701!
Fraena
gen. 4. 221!; 8. 621

Fraena Bronni 4. 221
Cordieri 4. 221
furcifera 4. 221
Goldfussi 4. 221
Lyelli 4. 221
Prevosti 4. 221
Sti-Hilairei 4. 221
Fragilaria acuta 0. 473
amphiceros 6. 103
capucina 0. 473
constricta 0. 473
paradoxa 0. 491
pinnata 6. 103
rhabdosoma 4. 613
ventralis 0. 491
ventricosa 4. 613
Fragilia fragilis 6. 859
spp. 8. 616
Fraidronit 8. 609!
Franklinit 9. 84
künstlich 5. 215
Francolith 1. 590!; 2. 703!
Fraxinus 0. 634
excelsifolia 6. 505
excelsior 4. 832
grandifolia 9. 123
rhoefolia 2. 754
Scheuchzeri 9. 123
Freestone 0. 871; 1. 484; 2. 226; 4. 743; 8. 355
Freieslebenit 8. 818!
Fremde Fossil-Reste im Gestein 9. 747
Frenela
Europaea 9. 122
Ewaldana 9. 122
medullosa 9. 122
Frenelites 0. 632
Friedrichshaller-Kalkstein 8. 719
Friktions-Rinnen im Gestein 2. 826
Frondicularia
gen. 5. 755; 7. 377
Acknerana 7. 378
affinis 7. 378
angusta 4. 867
bicostata 9. 371
Bielzana 7. 378
Cordai 4. 867
cultrata 7. 378
digitalis 7. 378
diversicostata 7. 378
hexagona 9. 371
Hörnesi 7. 378
irregularis 7. 378
Frondicularia
lancea 7. 497
Lapugyensis 7. 378
linearis 7. 497
lingua 7. 497
Meyeri 7. 497
monacantha 2. 254; 7. 378
multilineata 4. 867
nitida 9. 371
pulchella 7. 378
pulchra 9. 371
rostrata 7. 378
Sedgwicki 4. 867
semicostata 7. 378
seminuda 2. 253; 6. 756
speciosa 7. 378
tenera 9. 371
tenuicostata 7. 378
Terquemi 9. 371
tricostata 7. 378
tricostula 2. 254
tricuspis 2. 254
venusta 7. 378
spp. 2. 511*, 631
Frondiculina
cuneata 7. 497
elongata 7. 497
ensiformis 7. 497
obliqua 7. 497
oblonga 7. 497
ovata 7. 497
striata 7. 497
Frondipora gen. 1. 490
reticulata 2. 855*
Fruchtschiefer 6. 596; 9. 577
Fruchtstein 9. 550*
Früchte 8. 625!
Frullania
dilatata 3. 745
Fraasia 0. 636
Fracastoria n. gen.
anguria 7. 777
citriformis 7. 777
lagenaria 7. 777, 813
megapepo 7. 777, 813
melo 7. 777
pedunculata 7. 777
pomiformis 7. 777
Fucaceae (fam.) 5. 637
Füchselia 0. 632
Fuchsit 0. 527
Fucoideae 8. 636*
Fucoides 0. 626
acutus 6. 97
auriformis 2. 890
Fucoides Bollensis 9. 26
crenatus 5. 629
crispus 5. 629; 6. 97
dentatus 2. 246; 4. 126; 5. 630
dichotomus 0. 286
dissimilis 1. 609
filiciformis 5. 629
filiformis 5. 629
flexuosus 5. 593
furcatus 6. 92
gracilis 6. 375
Harlani 9. 607
intricatus 3. 91; 5. 175, 176; 6. 92, 217, 720; 7. 481
linearis 5. 629
multifidus 4. 251
radians 5. 629
rigidus 5. 593
simplex 5. 593
Targionii 2. 347; 3. 91, 369; 5. 175, 176; 6. 91, 93; 217, 720, 740; 7. 481
Fucus
Alleghaniensis 5. 249
Brongniarti 5. 249
ceramoides 0. 352
-Thon 9. 260
Fukoiden
(untersilurische) 6. 67
-Formation 3. 90*
-Kalkstein 6 91
-Mergel 2. 175
-Sandstein 0. 113, 305; 6. 803 ff.; 8. 636; 9. 33
-Schiefer 8. 636* ff.
-Region 6. 222 ff.
Fukus-Mergel 1. 167
Fulgur
Araunum 6 753
canaliculatum 6. 753
contrarium 6. 753
coronarium 6. 753
excavatum 6. 753
fusiforme 6. 753
gibbosum 6. 753
incile 6. 753
maximum 6. 753
perversum 6. 753
rugosum 6. 753
tnberculatum 6. 753
Fullers-earth 0.158; 2.226; 7. 206; 8. 482
Fumacchi 0. 493

Fumarolen 1. 865; 2. 581; 7. 591
Fünfzehiger Typus der Hufethiere 5. 761
Fungella
gen. 2. 125, 126!; 5. 635
Fungia 2. 118
agariciformis 2. 373
agaricoides 2. 378
Berica 7. 232
cancellata 2. 376
centralis 3. 759
clathrata 2. 376, 378
clypeata 2. 378
complanata 2. 376
compressa 2. 378
coronula 0. 295; 2. 376, 378
discoidea 2. 376; 8. 873
distorta 2. 377
elegans 2. 378, 462
filamentosa 2. 377
heteroclyta 2. 376
Japheti 2. 378
laevis 2. 376
lenticularis 2. 377
mactra 2. 378
numismalis 2. 376
orbicularis 7. 232
orbulites 2. 376
patella 2. 375
polymorpha 2. 376; 5. 87
praecox 2. 378
radiata 0. 291; 2. 376, 378
rudis 9. 629
semilunata 2. 378
stellifera 2. 376
talpina 2. 376
titiculata 2. 376
undulata 2. 376
Funginella 2. 119*, 376
alpina 2. 376
assilina 2. 376
Brauni 2. 378
discoidea 2. 376
elegans 2. 376
Hauerana 2. 376
hemisphaerica 2. 376
Martiniana 2. 376
neocomiensis 2. 376
Niciensis 2. 377
numismalis 2. 376
Perezi 2. 377
semiglobosa 2. 377
infundibuliformis 2. 378
Funk[e]it 5. 569!; 6. 186!
Fuss-Eindrücke 7. 877
-Spuren 9. 867!, 875
Fusicellaria gen. 4. 114!
Fusimitra gen. 6. 230
Mellingtoni 6. 230
Fusulina
gen. 5. 755; 6. 608
concentrica 1. 608; 7. 633
cylindrica 0. 857; 1. 495; 7. 374, 472, 491; 8. 493; 9. 847, 849, 850, 851, 869
depressa 1. 495
sphaerica 8. 738
spp. 8. 727
Fusus
abbreviatus 3. 635; 6. 93
acuminatus 1. 716
Aegyptiacus 1. 764; 7. 229
amoenus 7. 866
antiquus 1. 621
asper 1. 716
australis 1. 229
baccatus 3. 635; 4. 875
Bamffius 7. 509
Barvicensis 7. 509
bellalyratus 9. 498
biformis 4. 869
bilineatus 3. 753
brevicauda 3. 45
Brianteus 7. 844
Brocchii 0. 751
bulbiformis 0. 737; 1. 715, 716; 8. 740; 9. 866
bulbus 5. 475 ff.
Burdigalensis 2. 43; 9. 839
carinatus 1. 487; 2. 229; 3. 236
carinella 1. 716
carino-crenatus 2. 229
cinereus 7. 509
cingulatus 3. 635; 5. 593
clavatus 1. 764; 3. 75; 7. 229
comptus 0. 751
conjunctus 3. 604; 8. 740; 9. 866
constrictus 7. 864
contortus 7. 492; 8. 494
coralliensis 3. 236
cornutus 3. 75
coronatus 3. 234
Fusus
costarius 6. 739
crassicostatus 8. 740; 9. 866
crispus 7. 51, 509
Culbertsoni 8. 494
curtus 7. 509
Dakotaensis 7. 492; 8. 494
distinctus 7. 51
Dumortieri 5. 593
Dupinanus 3. 635; 4. 875
elatior 9. 125
elongatus 0. 862; 3. 38
Enfauliensis 6. 480
errans 1. 716
eximius 7. 51
ficulneus 1. 716; 8. 874
flexicostatus 8. 494
flexuo-costatus 7. 492
Forbesi 7. 509
funiculatus 2. 43
Galpinanus 7. 492; 8. 494
gibbosus 3. 635; 7. 875
Gilbertsoni 7. 492
goniophorus 1. 764; 7. 229
gothicus 3 331
gregarius 9. 125
Haimei 5. 593
Hehli 7. 760; 8. 719
heptagonus 3. 604; 3. 635; 4. 875
Humberti 5. 593
Jauberti 3. 75
imbricatus 0. 834
inhabilis 7. 116
interruptus 1. 716
intertextus 8. 377
intortus 3. 604, 763; 8. 740; 9. 866
labiatus 1. 712
Lainei 3. 75
Leymeriei 5. 593
lineolatus 3. 635
longaevus 0. 737; 1. 716; 3. 604; 8. 740; 9. 866
Lüneburgensis 7. 51
maximus 3. 604; 4. 573
multicostatus 3. 234
multisulcatus 3. 58, 45; 9. 125
Murchisoni 3. 635; 4. 875

Fusus
nassoides 0.751; 3.236
Nereidis 3. 635; 4.870, 875
Newberryi 7. 492; 8. 494
nexilis 0. 861
Noae 3. 604, 807; 4. 573
nodosus 1. 229
nodulosus 3. 236
novemlyratus 9. 498
nudus 7. 866
obliquatus 2. 229
papillatus 6. 230
Pedernalis 0. 102
plicatulus 3. 45
politus 2. 358
polygonatus 5. 475
polygonus 2. 43; 4. 573
porrectus 1. 716; 3. 763
propinquus 7. 509
pulchellus 7. 866
quadratus 0. 294
Fusus
Ranella 3. 635; 4. 875
regularis 1. 716; 9. 866
Renauxanus 3. 635
reticulatus 3. 370; 6. 93, 739
Reussi 3. 635; 4. 875
Rollandi 5. 593
rugosus 3. 604, 763; 4. 573
ruralis 3. 45
Salsensis 6 593
Sandleri 4. 760
scalariformis 1. 621; 3. 45
scalaris 4. 573
Scarboroughi 8. 377
Schwarzi 3. 753
semiglaber 7. 51
semirugosus 3. 753
serratus 0. 352
Shumardi 7. 864; 8. 494
sinuatus 3. 635; 4. 875
subabbreviatus 3. 635
Fusus
subcarinatus 0. 714; 1. 740; 4. 573; 8. 587
subheptagonus 3. 635; 4. 875
sublavatus 3. 75
sublignarius 3. 75
subnodosus 3. 234
subrenauxanus 5. 593
subturritus 8. 377
tabulatus 3. 635; 4. 875
tenuilineatus 7.864; 8.494
tessellatus 3.635; 4.875
Thorenti 3. 236; 7. 865, 866
Tritonium 3. 635; 4. 875
Tschihatscheffi 5. 594
turbinatus 3. 635
turriculus 6. 480
Turtoni 7. 509
Vaughani 8. 377
Villanus 3. 45
spp. 1. 382! 3. 753; 6. 477, 479

G.

Gabbro 1. 30; 2. 238; 5. 47; 6. 700; 8. 827!
-rosso 5. 45; 7. 599, 600!
Gadolinit 1. 179; 5. 514
künstlich 5. 696
Gaea excursoria
Germanica 2. 81
Norwegica 1. 178, 256
von Saalfeld 3. 614
Gahnit 8. 579*
künstlich 5. 215
Gailthaler
-Schichten 7. 615², 619
-Schiefer 9. 313
Galaktit 6. 443!; 7. 324*; 9. 623!
Galatea audax 6. 367
Galaxea 2. 117*
Galaxias spp. 8. 507
Galecynus gen. 5. 372
spp. 4. 581
Galeocerdo
aduncus 0. 868; 4. 515; 5. 234; 6. 601; 7. 243!; 8. 869
contortus 0 868; 1. 254
Egertoni 0. 868; 4. 254
gibberulus 5. 728
Galeocerdo
latidens 0: 868; 5. 234; 8. 869
minor 0. 868; 1. 183
pristodontus 0.868; 9.361
priscus 3. 683; 4. 734
productus 7. 242!
rectus 1. 183
Galeodia
Petersoni 6. 229, 230
spp. 6. 753
Galeotherium
mollassicum 1. 501
Galeotherium gen. Wgnr. (= Ictitherium)
viverrinum 5.376; 7. 759
Galeospalax
mygaloides 5. 371
Galeriten-
Schichten 7. 786, 788
Galerites
albogalerus 6. 817; 7. 748, 786
canaliculatus 7. 747
castanea 5.710; 7. 748!; 9. 228
Chowaresmicus 9. 866
conicus 7. 787
coni-excentricus 7. 862
Galerites
conoideus 7. 862
cretosus 7. 748
cylindricus 7. 747
depressus 0. 164, 183; 4. 621
globulus 7. 787
Hawkinsi 7. 747
hemisphaericus 7. 747
laevis 7. 748
pygaeus 4. 648
Rhotomagensis 7. 748
rotularis 7. 747
subrotundus 7. 787
subuculus 7. 747²
vulgaris 6. 672, 7. 614
spp. 1. 382; 9. 123
Galerix gen. 5. 229
Galeropygus
gen. 7. 852; 9. 364!
agariciformis 7. 852; 9. 364
caudatus 9. 364
disculus 9. 364
Novoti 8. 364
Gallertartiger
Opal 8. 828!
Galestro 7. 597*
-Schiefer 7. 598; 8.89

Galethylax
Blainvillei 5. 230
Galeus
pristodontus 7. 625
Galium
sphenophylloides 5.629; 6. 97
spp. 8. 498
Gallinaceae
(ordo) 7. 765
Gallionella
apiculata 6. 103
coronata 6. 103
crenata 0. 95; 4. 613; 6 103
distans 4. 613; 6. 103
granulata 0. 95; 4. 613
laevis 4. 613, 739
lineata 4. 739
procera 4. 613
sulcata 0. 473; 4. 739; 6. 103
tenerrima 4. 613
Gallus
Bravardi 5. 232; 7. 634
Galmei 2. 517 ff.; 4. 93, 94, 418, 827; 8. 77; 9. 449!
dichter 1. 89!
rother 2. 97
weisser 2. 97
-Bergbau 2. 769
-Lager in Schlesien 0. 710
-Lagerstätten 2. 97; 907!
-Vorkommen zu Wiesloch 2. 49
-Züge 2. 772
Galvanismus
der Mineralien 3. 697!
Gampsonyx spp. 3. 161
fimbriatus 0.575; 4.500; 8. 201
Gamopetala
(Vegetabilia) 2. 504!
Gang-Bildung 1. 210! 4. 365; 5. 216, 418; 6. 473; 8. 35; 9. 836
-Gebirge
in Carolina 4. 663
-Gesteine 8. 33
-Stöcke 1. 528
-System
in Frankreich 8.705
-Züge 6. 569
Gänge 1. 362, 429, 611, 722; 2. 869; 6. 688, 717; 8. 338, 342, 348, 610², 705, 857, 861; 9. 210, 216, 632
-Altersfolge ihrer Mineralien 1. 368
Erzführung 5. 81
Mineralführuug 1. 567
(Theorie) 0 428, 429
Verwerfung 8. 219
Ganoidae (ordo) 3. 240*
Ganoidei (ordo) 3. 115!; 9. 382, 763
heterocerci 3. 744!
Ganoin 8. 763
Ganomatit 6. 83
Gänseköthigerz 0. 349
Gänzlingisch 4. 769
Gargas-Mergel 4. 643; 5. 164ff.: 7. 480
-Schichten 7. 659
Garnisch 2. 282!
Gas-Ausbruch 1. 464; 5. 731
-Ausströmungen 1. 865; 3. 742
-Exhalationen 9. 836
-Quellen 5. 94
Gasterocoma
antiqua 6. 633
Gasteronemus
gen. 3. 123*
oblongus 5. 380
Gastlosen-Kalk 0. 305
Gastornis gen. 7. 634
Parisiensis 5. 376, 763; 6. 501
Gastrana
laminosa 7. 506
Gastridiopsis
Elisae 4. 251
Gastridium
vetustum 6. 230
Gastrochaena
amphisbaena 3. 231; 4. 870
ampullaria 6. 857
annulata 9. 499
contorta 1. 716
dubia 5. 795; 6. 857; 7. 507
gigantea 5. 795; 6.857
infra-liasina 6. 495
modiolina 6.857; 7.507
Gastrochaena
obtusa 9. 499²
Royanensis 3. 231
socialis 5. 623
tortuosa 1. 486
spp. 7. 632
Gastromycetes
(fam.) 5. 637
Gastronemus
rhombus 5. 380
Gastropoden
glasige Ausfüllung der Schaalen 5. 386
Gastrosaccus gen. 7. 557!
Wetzleri 1 677!; 6.367; 7. 556
Gaudryina gen. 5. 755
Badenensis 2. 254
rugosa 7. 498
siphonella 2. 253; 6. 756
spp. 2. 54*
Gault 0.409, 410; 2.459; 3. 329, 633, 815; 4. 201!, 204, 508, 643, 740*; 5. 457; 6. 118; 7. 480, 481, 641!; 8. 382; 9. 124p
(Fossilien) 1. 309
-Grenze, untere 1.737
Gautieria
eocaenica 3. 510
lignitum 2. 754
Gaviale 4. 168; 9. 109
von Boll 5. 104!, 494
Gavialis
gen. 5. 421*, 494*; 7. 112
Dixoni 2. 380; 3. 109
longipes 0. 324
longirostris 5. 231
macrorhynchus 5. 232, 743
Mandelslohi 0. 319!, 324
Münsteri 0. 324
priscus 5. 425* ff.
Schmidti 0. 324
Tiedemanni 0. 324
Gaylussit 2. 515
Gea epeiroides 5. 121
obscura 5. 121
pubescens 5. 121
Gebia
obscura 6. 367
Gebirge: Entstehung 3.610

Gebirgsarten
Aalysen 2. 329!
Einfluss auf die Vegetation 0. 352
mit kugelförmigen Absonderungen 6.466
-Suiten 9. 276
Gebirgs-Bau, innerer 4. 214!
-Erhebungen 2. 176!; 294
-Gliederung in Portugal 5. 95
-Granit 7. 36
-Hebungen 0.717; 2.364, 867; 3.528; 4.205, 215, 217, 356, 362, 385ff., 461!; 7.198, 470, 731, 844; 8.736, 835; 9.203, 231, 513
in Constantine 5.365
im Ohm-Gebirge 2. 32
des Schwarzwaldes 2. 55
Gebirgshebungs-Systeme 7. 343
Gebirgshöhen in Chili 7. 732
Gebirgsketten
-Bildung 3. 619
-Richtung u. Vertheilung 3. 852
Gebirgsmassen
-Anziehungskraft 7. 98
Gebirgs-Profile
von Algerien 5. 710
bei Badenweiler 8.713
von Häring 4. 376
im Meurthe-Dept 4. 212
der NO.-Alpen 4.455
Ostindiens 5. 733
v. Vorarlberg 4. 203
-Reliefs, künstliche 8. 843
-Senkungen 2. 867; 4. 461; 9. 1, 513
-Systeme 3. 204!; 4. 385 ff.; 5. 289ff., 641, 769! ff.
in N.Amerika 5. 354
Rheinisches 2. 267 g.
ihre Richtungen 1.94!
vgl. System
-Züge: Form 3. 70
Gebrochene Krystalle 5.194
Gediegen-Antimon 1. 707
-Arsenik 1. 707
-Blei 1.707; 4. 69, 403, 404; 5. 837; 6. 40; 7. 68, 717*; 9.188, 191
-Eisen 2. 615; 4. 175; 8. 69!; 9.193*, 290!
-Gold 9. 190
-Kupfer 0.850!; 1.385*, 463; 3. 192, 701; 4. 72; 5. 349; 6.182; 7.314, 589; 8. 314!, 299; 9. 299, 623*
-Metalle 1. 596
-Silber 1. 707; 3. 174, 475, 843; 5. 349; 7. 314; 8. 566
-Wismuth 2. 880; 5. 79
-Zink 7. 312
Gedinien (terrain) 1. 105; 7. 219
Gefüge der Gesteine 8. 840
Gehlenit 1. 330; 2. 522; 3. 259; 4. 440
v. Monzoni 0. 68*
Gehobene Seemuschel-Schichten 7. 183
Geinitzia 0. 632
cretacea 0. 736; 2.896; 3. 633; 5. 87
Gelbbleierz 1. 348!; 5. 821
Gelbeisenstein 4. 21, 569
Gelber Keupersandstein 8. 353
Gemeinsame
Arten verschiedener Formationen 4. 620, 865, 866; 9. 381
Organismen in verschiedenen Formationen 9. 232, 496
Gemengtheile der Laven 2. 315!
Gemmellaria gen. 4.114!
Gemmicellaria gen. 4. 114
Gemmipora 2. 119
cyathiformis 3. 369; 6. 93
Gemmulina gen. 1. 755
Genabacia 2. 118*
Sancti-Mihieli 2. 376
stellifera 2. 376
Genessee
-Gruppe 6. 368
-Schiefer 3. 817
Genetta viverroides 5. 229
Genista brevisiliqua 8. 499
Genufracti (Goniatitae) 1. 546!
Geocoma
elegans 9. 365
Libanotica 9. 365
Geognosie 3.374!; 6.704
Bayerns 4. 164
der bayern'schen Alpen 9. 218
Böhmens 3.375; 8.718; 9. 485
des Böhmer Waldes 6. 72
Deutschlands 8. 97
der Donau-Hochebnen 9. 218
von Friedberg in der Wetterau 6. 578
von Hannover 6 449!
des Harzes 6. 203
Hessens 2. 433, 828
von Hohenzollern 8. 719
von Kärnthen 5. 583, 586
v. Langenbrücken 9. 1
von Oran 6. 450
von Pilsen 6. 577
des Thurgaus 6. 129
des Urals 9. 231
Geognostische Karte
von Belgien 2. 724; 4. 321
Braunschweigs 6. 816
von Coburg 4. 321
von Halle 1. 102
Hessens 2. 828
Kamtschatkas 7. 89
von St. Gallen 5. 578
Westphalens 4. 366
Geographie 3. 370!
physikalische 0. 622
der Alpen 5. 91
der Mineralien 8. 77
der Mollusken-Fauna 0. 748; 7. 222
der Thiere 0. 509
Geographische Verbreitung der See-Mollusken 3.757
Geolithe 4. 741 ff.
Geolithia 5. 759; 6. 104

Geologie 0. 622; 1. 322; 3. 373!; 4. 367; 5. 255; 6. 769; 7. 180; 8. 81, 341
allgemeine 1.181; 6.211!
(mechanische) 4. 385; 5. 288!, 641, 769ff.; 6. 511!
physikalische 0. 858
rationelle 8. 539
von Aachen u. Belgien 7. 454
von Algerien 5. 710; 8. 723
von Almaden 6. 469
der Alpen 4. 467!; 5. 91, 469, s. Alpen
von Andalusien 5. 457
von Appenzell 8. 850
des Aral-Sees 8. 739
der Ardennen 7. 218
der arktischen Gegenden 9. 221
von Armenien 7. 500; 8. 736
von Baden 6.333; 9.129
von Bains de Rennes 5 591g
des Banates 6. 357; 7. 444; 8. 347
des Bayern'schen Wald-Gebirges 3. 372
von Belgien 6. 209; 7. 470
der Black-Hills 8. 709
von Böhmen 4. 459; 8. 473
der Insel Bourbon 4.605
von Braunschweig 5. 843; 6. 816
von Britannien 4. 82
der Bukowina 5. 25
von Canada 8. 854
der Canarischen Inseln 8. 836
von Cartagena 6. 203
von Central-Europa 9. 625
von Chatillon sur Seine 7. 206
von Chili 1.354; 5.202; 6. 571
von Christiania 5. 467
des Comté-Beckens 0. 227
von Constantine 5.363
der Corbières-Kette 6. 355
von Creta 0. 475; 9.632
von Dagestan 1. 357
von Deutschland 8.478; 9. 107
des EgererKreises 6.708
von England 0. 858
des Erzgebirges 8.844
von Franken 7. 1
von Graubündten 8.337, 342; 9. 85, 97
der Griechen u. Römer 2. 865
des Grünten 7. 481
von Hannover 8. 199
des Harzes 8. 145, 808
von Hessen 2. 301
von Holland 9. 58
von Java 4. 95!; 5.601; 6. 68
von Idria (Kärnthen) 6. 465
von Iowa 3. 335, 480; 9. 340
von Iowa, Minnesota, Nebrasca und Wisconsin 5.488
von Italien 8. 87
von Kalifornien 0. 494; 7. 461
von Kalifornien u. Oregon 8. 103
von Kansas 8. 766
von Kansas u. Nebraska 9. 825
des Kap's 7. 350
von Karlsbad 8. 325
von Kärnthen 7. 214, 614, 615; 9. 476
des Kaukasus 7. 769; 8. 736
von Kentucky 7. 729
der Krim 8. 873p
von Livland 9. 63
der Lombardei 6. 215; 8. 747!
von Luxemburg 6. 492
von Madrid 4. 845
von Mähren 4. 477; 6. 854; 7. 350
von Majorca 6. 460
der Maurienne 6. 70
des Meurthe-Dpts. 6.202
von Minnesota 3. 335, 480
von Mississippi 4. 829; 6. 229; 8. 480
von Missouri 6. 734!
von Nassau 9. 627
von Neapel 9. 230
von Nebraska 3. 480; 7. 491, 493; 8. 493, 495
von Neugranada 4.362
von Neuschottland 8.333
von Neusüdwales 6. 69
des Neutraer Komitats 9. 203
von New-York 5. 247
der Niederlande 3. 371
von Nordamerika 6. 91, 353; 8. 477
von Nord-Carolina 8.358
der Norddeutschen Ebene 8. 608
von Nord-Persien 8.736
von Nossi-Bè (Madagascar) 7.348
von Oberschlesien 6.458
der Ostalpen 4. 455
von Österreich unter der Enns 7. 344
von Österreich 9. 837, 843
von Ostindien 5. 733, 855
von Paraguay 2. 361
von Paris 7. 465
des Pariser Beckens 5. 360!
von Portugal 0. 478; 5. 95
der Provinz Aconcagua 9. 467
von Recoaro 6. 213
der Rocky mountains 8. 709
von Russland 7. 472; 9. 845
von Savoyen 6. 66; 8. 481; 9. 349
von Schlesien 4. 477
von Schweden 6. 794; 9. 257*
der Schweitz 2. 231; 4. 355
der Seealpen 6. 575!
von Segovia 6. 205
der Gegend des Sinai 4. 724
der Sierra Morena 6.469

Geologie
von Spanien 4. 460; 5. 337; 9. 308
von Steyermark 6. 197
von Süd-Afrika 7. 90
von Süd-Alabama 0.724;
von Süd-Amerika 5.90; 7. 731; 8. 859
der Südseeländer 1.356
von Süd-Tyrol 2. 354!
des Sulzbachthals 7.337
von Sydney 8. 229
der Tarentaise 6. 70
von Tennessee 8. 350
von Teschen 7. 351
des Teutoburger Waldes 0.385; 6.721; 7.192
des Thüringer Walds 6.60
von Thüringen 7. 471
von Toledo 6. 469
von Toskana 4. 195; 7. 592!
von Tours 4. 840
von Troppau 8. 809
von Tyrol 7. 616, 619; 7. 689; 9. 306
der Tyroler Alpen 6 661
von Ungarn 9. 479
der United states exploring Expedition 1.356
des Unter-Engadins 9. 471
von Untersteyermark 1. 231
der Vereinten Staaten 8. 601
von Vorarlberg 4. 829
von Westphalen 9. 346
der Wetterau 8. 703
von Wicklow 0. 494
von Wildungen 6. 140
von Wisconsin 0 227; 3. 335, 480
von Zentral-Europa 9. 625
von Zentral-Italien 7.203
der Zips 9. 479
Geologische Arbeiten
in Österreich 0. 194
Bilder 3. 740
Entwicklungs-Gesetz der Muschelthiere 6. 641
Karte
des Erzbergs 5. 713
von Hessen 4. 421
von Kansas und Nebraska 9. 823
Geologische Karte
von den Niederlanden 3. 371
von Rheinland-Westphalen 9. 855
der Schweitz 0. 826
des Siebengabirgs 5. 87
von Südamerika 5.90
des Unterrhein-Depts. 3. 320
vom Ural 3. 328
Kommission
der Niederlande 3. 371; 4. 169
Preisaufgaben 3. 637
des Fürsten Demidoff 4. 254
der Pariser Akademie für 1856 4. 384
Harlemer Sozietät 4. 509
Theorie 4. 474
Verbreitung der Konchylien in der Oolith-Formation 0. 869
Verein des Mittelrheins 4. 459
Zeit-Rechnung 5. 221
Geonoma
Steigeri 5. 639
Geoponus gen. 5. 616*
borealis 0. 473
Zeuglodontis 7. 750
spp. 4. 737, 6. 609
Geoporites 2. 120
Geosaurus
gen. 9. 109
maximus 0. 128; 2. 346; 6. 604
Mitchilli 2. 764
Soemmeringi 6 750
Geoteuthis
gen. 4. 358; 9. 368, 370
Bollensis 9. 370
flexuosa 2. 642*; 9. 370
hastata 9. 370
lata 9. 370
obconica 9. 370
Orbignyana 9. 370
sagittata 9. 370
speciosa 9. 370
Geothermische
Tiefe-Stufen 3. 743
Geotrupes
proavus 1. 759
Geotrupes spp. 3. 105
Geotrypus
acutidentatus 5. 224
antiquus 5. 224, 371
Gerastos gen. 3. 487
laevigata 6. 375
Gergoviamys gen. 5. 225
Gerölle
-Ablagerungen 3. 196; 6. 668
-Bildungen 0. 641
mit Eindrücken 9. 154
Gerres
Massalongoi 3.683; 4.734
Gervillea
(plant. gen. err. typ.)
vid. Grevillea
Gervilleia
gen. 1. 641!; 4. 249; 8. 384
acuminata 6. 495; 7. 210; 8. 643
acuta 4. 765; 6. 852
Alberti 1. 654!; 6. 245, 363, 9. 168, 359
anceps 0. 392
angusta 9. 359
antiqua 4. 118, 489; 7. 374, 637
auricula 9. 506
aurita 2. 229
aviculoides 0. 225; 1. 491. 743; 8.486
Bathonica 4. 765
bipartita 6. 218; 8.125
ceratophaga 4.489, 748; 7. 637; 8. 608
cfr. keratophaga
complicata 2. 229
consobrina 6. 852
costata 1. 647!; 2. 943; 3. 13, 223; 6. 245, 363; 8.719; 9. 168, 359
costatula 1. 486; 2. 229; 4. 765
crassicosta 4. 765
dentata 1. 384; 4. 82
ensiformis 9. 498
Eseri 6. 850
exilis 7. 760
Faberi 9. 629
fornicata 8. 357
Gastrochaena 0. 159; 3. 305; 9. 629
Goldfussi 7. 760
gracilis 8. 643

Gervilleia
Hagenowi 6. 495
Hartmanni 3. 306; 4. 370; 6. 852; 8. 357
inconspicua 2. 107
inflata 1. 409; 2. 288; 3. 167, 306, 308, 319; 4. 204, 553, 555, 830; 5. 176, 178, 219; 7. 614, 617; 8. 1; 9. 476, 629
keratophaga 3. 126, 128; 3. 772, 775, 777; 4. 118, 748; 5. 875
cfr. ceratophaga
kimmeridgeana 8. 488
laevigata 2. 229
lanceolata 6. 454
lata 1. 486; 2. 229
modiolaeformis 6. 363
monotis 4. 765
ovata 2. 229; 4. 765
praecursor 6. 741; 7. 93, 94; 9. 452, 629
pernoides 3. 305, 306
polyodonta 1. 652!; 2. 943; 6. 363, 365, 810
radians 4. 765
socialis 1. 642!, 647; 2. 17 ff., 53, 943; 3. 11, 24, 29, 223; 4. 840; 5. 316; 6. 245, 363, 365, 819; 7. 760; 8. 622; 9. 144, 168*, 359, 383
solenoides 0. 294; 8. 874
subcylindrica 4. 765
subcostata 1. 650!
subglobosa 1. 646!; 2. 943; 6. 363, 365
substriata 1. 651!
subtortuosa 8. 495
striocurva 7. 94; 9. 7, 12, 629
tortuosa 0. 159, 591; 1. 137, 409, 486; 2. 92, 229, 285, 593; 3. 305, 306; 4. 88; 9. 31, 32
tumida 4. 748
spp. 4. 249; 8. 384
Gervilleia-Kalk 4. 88
-Schichten 0. 621, 590, 738; 2. 92, 458; 3. 191, 305; 4. 204, 456; 5. 177; 7. 617; 8. 4; 9. 628!
Gervillia (Aceph. gen.) vid. Gervilleia
Geschichte der Natur 0. 233
der Pflanzenwelt 2. 505!
der Verbreitung d. Organismen 5. 605
Geschiebe 1. 471; 7. 385
mit Eindrücken 4. 836; 5. 82; 6. 63; 7. 402; 8 106; 9. 154, 813
in Mollasse 3. 797
erratische 5. 77!
hohle 7. 187
nordische 5. 77!
scheinbare und wirkliche 9. 769
silurische 8. 234, 257
zerquetschte 6. 576
-Land des Rheinbeckens 1. 728
Geschliffene Felsen 2. 719; 3. 496
Gestade
-Bildungen 2. 91!
-Schichten 2. 350
Gestalt
der Erd-Rinde 2. 781!
Gesteine
nicht metamorphische 1. 837
von starker magnetischer Kraft 1. 555!
vulkanische 2. 486
Gesteins-Bildungsweise, vulkanische 1. 837
Gesteins-Bruchstücke in Porphyren 2. 605
Gestein-Einschlüsse in Granit 4. 217
-Gänge 1. 211
Gestrickte Gestalten des Silbers 3. 703
Getalodus Ohioensis 3. 762
Getonia 0. 636
antholithus 3. 47; 4. 380
Bolcensis 7. 778
grandis 3. 505; 9. 375
macroptera 9. 375, 376
Oeningensis 0. 508; 2. 755; 3. 505; 4. 627
Getonia
petraeaeformis 1. 740; 9. 375
spp. 4. 252
Gewebläufer (-Pflanzen) 4 376
Geyser
-Erscheinungen 9. 829
-Gesteine 4. 473!
Gezeiten: ihre geolog. Wirkungen 0. 78*
Gibbsit 7. 70
Gieseckit 4. 693; 9. 564!, 586
Gigandipus
caudatus 6. 125, 237!; 9. 867
Gigantogene Erhebungen 5 313, 650 ff.
Gigantolith 2. 522; 9. 565!, 586
Gigantotheruim
gen. 9. 867
caudatum 9. 867
minus 9. 868
Gilbertit 2. 848
Gilbertsocrinus gen. 6. 602
Americanus 0. 377
Gillingit 0. 705!; 2. 879
von Finnland 0. 64!
Giltstein 8. 73!
Gismondin 3. 183*, 257
Gitocranchon
granulatus 3. 615; 4. 46; 6. 625
Glacial-Bildung 1. 794
-Phänomene 9. 61
Glacialisten 5. 83
Gladiolites
gen. 1. 124; 2. 246 f., 402!; 4. 126; 8. 765*
Geinitzanus 1. 125; 3. 344
Glandina
antiqua 2. 637; 4. 249
eburnea 4. 249
spp. 4. 865; 9. 114
Glandulina gen. 5. 755; 7. 378
abbreviata 7. 377
candela 7. 304!
conica 7. 377
cylindrica 7. 377
discreta 2. 254; 7. 377
elegans 7. 377
elongata 6. 756
Haidingerana 7. 377

Glandulina
inaequalis 7. 305!
incisa 7. 377
inflata 6. 756
laevigata 2. 253; 6. 756; 7. 377
lagunculus 9. 371
major 9. 371
neglecta 7. 377
nitida 7. 377
nitidissima 7. 377
nodosa 7. 377
nucula 7. 377
ovalis 7. 377
punctata 7. 305!
Reussi 7. 377
rotundata 2. 254
tenuis 9. 371
vulgata 9. 371
spp. 2. 511*; 9. 865
Glanzeisenerz 4. 69; 5. 76; 6. 36
Glanzerz 1. 463
Glanzkobalt 2. 67!, 880
Glaphyra spp. 8. 507
Glaphyroptera (Coleopt. g.)
depressa 2. 985
Gehreti 2. 985
gracilis 2. 985
insignis 2. 984
Pterophylli 4. 204
spectabilis 2. 984
Glaphyrorhynchus
Aalensis 5. 494*
Glarner-Schiefer 3. 166
Glaserit 1. 453*, 604; 2. 219, 221!, 223!
Glas krystallinisch 3. 180
Glaskopf 4. 814
Glas-Platten
(des Muschelkalks) 3. 10
Glas-Quarz 7. 436!
Glasige Lava 7. 354!, 357*
Glasiger
Feldspath 3. 668, 696; 6. 563!
Glättung
der Gesteine 2. 350
Glaubapatit 8. 694!
Glauberit 1. 204!; 3. 188*; 5. 446
Glauconie (Glauk.) 7. 230p
crayeuse 4. 508
tertiäre 4. 377* ff.
Glauconitischer
Sand 3. 189
Glauconome
(Bryoz. gen.) 4. 115
disticha 6. 114
rhombiphora 7. 232
spp. 2. 125
Glauconome Gray
gen. spp. 6. 862
cfr. Glauconomya
Glauconomya gen. spp. 6. 862
Glaukodot 2. 711
aus Chile 0. 71!
Glaukolith 0. 700; 4. 440
Glaukonie (Glauc.) 1. 617
Glaukonitischer Kalk
(des Muschelkalks) 3. 10
Gleditschia 0. 637
Celtica 9. 376
gracillima 2. 755; 4. 252
podocarpa 0. 508; 2. 761; 3. 506
Wesseli 6. 506
spp. 9. 122
Gleichenites 0. 628
artemisiaefolius 6. 98
neuropteroides 6. 97
Gleichzeitige
Formationen 3. 611
Glessaria
rostrata 5. 125
Gletscher 0. 306; 2. 239!, 717, 824!; 3. 270; 5. 79, 680, 708, 721; 6. 452; 8. 273; 9. 61, 471
(ehemalige) 5. 216
des Ötzthals 3. 786
-Grundschutt 5. 721
-Land (Gebirge) 1. 729
-Randbildung 5. 721
-Schliffe 8. 342
-Spuren
in Neu-Granada 2. 962
alte 5. 216
-Schutt 5. 850
-Zeit 9. 316
Gliederung
des Lias 6. 454!
Gliederthiere [Entomozoa]
der Vorwelt 6. 764
Glimmer 0. 425, 427; 1. 9*, 330, 389*, 429, 430, 432, 585*; 2. 524, 879; 3. 54*, 261, 696, 711; 4. 129!; 5. 179, 822; 6. 37!, 195, 580, 688*;
Glimmer 7. 38, 71*, 172, 435!, 440; 8. 825!, 849; 9. 587 ff.
(Familie) 8. 699!
aus Hornblende 0. 61*
künstlich 5. 589
-Arten 2. 848!
-Basalt 7. 185
-Diorit 8. 473
-Gneis 9. 482
-Kupfer 1. 708!
-Letten 9. 693
-Porphyr 4. 185; 8. 190
-Sandstein 9. 697
Glimmerschiefer 0. 84, 517, 524, 538, 548, 552, 730; 1. 28, 515; 2. 731; 3. 363; 4. 43!, 194, 476, 789; 5. 26ff., 453!; 7. 89, 450; 9. 474
-Stücke in Basalt 5. 179
Glimmer-Thon 7. 51
Glimmertrapp 4. 40, 476; 8. 850; 9. 768
-Gänge 3. 561
Glinkit v. Ural 0. 59!, 67*
Glint (Gestein) 8. 594
Glisorex
Sansaniensis 5. 224
Globator
gigas 7. 859
Globiconcha
coniformis 0. 102
planata 0. 102
rotundata 0. 376; 1. 743
Globigerina
gen. 5. 755; 7. 377
bulloides 7. 280!, 309
concinna 2. 254
crassa 7. 750
diplostoma 2. 254; 7. 498
dubia 7. 280!
regularis 2. 254
spirata 6. 756
triloba 2. 254; 7. 280!, 309
trilobata 7. 498
spp. 2. 511*
Globulina
gen. 5. 755; 7. 377
acuta 7. 498
aequalis 2. 253; 6. 756
amplectens 2. 253; 6. 756
amygdaloides 2. 253; 6. 756; 7. 498

Globulina
angusta 7. 290!
costata 7. 290!
discreta 2. 255
gibba 2. 253; 7. 288!, 309, 498
granulosa 7. 290!
guttula 2. 253; 7. 498
inaequalis 2. 253
inflata 2. 253; 7. 498
minuta 2. 254; 7. 498
porosa 9. 371
Roemeri 7. 498
rugosa 7. 498
spinosa 7. 292!, 309
striata 7. 290!
tuberculata 7. 992!, 309
spp. 2. 511*
Globulodus gen. 6. 124
elegans 1. 761*
Glockeria 0. 629
Glomeris
denticulata 5. 121
Gloriosites
rostratus 5. 638
Glossopteris 0. 628
dubia 5. 631
spp. 1. 382, 727
Glossodus gen. 1. 184!
angustatus 1. 183; 5. 483, 484
spp. 7. 485
Glossophium gen.
proliferum 7. 777
Glossotherium
gen. 4. 111
Glossus
fibrosus 6. 230
spp. 6. 752; 9. 234
Glycimeris
angusta 7. 507
vagina 7. 507
spp. 6. 752
Glyphaea
Amalthei 1. 511
Glyphea
cretacea 5. 859
Leachi 4. 625
liasina 1. 511
ornati 1. 511; 3. 811; 7. 659, 672
pustulosa 0. 125
rostrata 0. 125
Veltheimi 5. 614
ventrosa 1. 511
verrucosa 5. 614
Glyphis
Desolgnei 8. 869
subulata 0. 868; 1. 254
Glyphiteuthis
ornata 6. 483
Glyphocyphus 7. 122
Glyptaster gen. 5. 250!
brachiatus 5. 248, 250
spp. 9. 236
Glypticus 7. 122
hieroglyphicus 8. 486; 9. 136
Glyptocephalus
radialis 7. 775
Glyptocrinus
basalis 6. 115
fimbriatus 6. 735
spp. 5. 248; 9. 235
Glyptocystites
gen. 9. 636
Forbesi 9. 636
Logani 9. 636
multiporus 9. 636
Glyptodon gen. 8. 120!
clavatum 6. 107
clavipes 4. 111; 6. 172
ornatus 4. 111
planus 8. 120
tuberculatus 4. 111; 6. 108
Glyptolepis gen. 2. 383; 3. 228
elegans 9. 490
leptopterus 6. 123
spp. 3. 125
Glyptopomus
minor 9. 491
Glyptosphaerites
gen. 4. 238!
Glyptosteus gen. 8. 249
Glyptostrobus
Europaeus 5. 638; 8. 333, 500, 501; 9. 117, 871, 873
Oeningensis 0. 502; 3. 502; 5. 638; 6. 638; 9. 754
Ungeri 3. 502; 5. 638
Glyzirrhiza 0. 637
deperdita 9. 376
Gnathodus gen. 8. 112
Mosquensis 8. 112
Gnathosaurus gen. 5. 426
subulatus 6. 760
Gnathopsis gen. 6. 240!
Oweni 6. 240
Gneiss 0. 84, 355, 525, 533, 538, 592, 828; 1. 28, 513!; 4. 39!; 5. 173, 180, 453!, 583; 6. 87, 577, 7. 619; 8. 221, 844; 9. 77!, 337, 472; 481, 556
-Einschlüsse
in Basalt 3. 666
-Gebirge 2. 730!
von Norwegen 1. 258, 281
der Vendée 2. 83
Gnetaceae (fam.) 5. 638
Gobio analis 5. 622
Gobius
conicus 1. 80
macrurus 3. 119*; 5. 380
spp. 7. 110
Goeppertia 0. 628
Gold 0. 444; 1. 351; 5. 68; 6. 67*; 9. 81
geographische Verbreitung 0. 359!, 497
(Gediegen) 0. 430; 5. 823, 826, 827, 847
in Masse-Gesteinen 0. 87
in Afrika 1. 363
in Californien 0. 336!
-Amalgam 4. 816!
-Ausbeute in Sibirien u. Ural 3. 72
-Bergbau 4. 368
-Felder 9. 822
-führender Sand 4. 68
-Gewinnung 1. 467
-Gruben 1. 600
-Gräbereien 1. 720
-Klumpen 4. 343*
grosser 5. 197; 6. 183
grösster 3. 72, 696; 5. 75
-Krystallisation 3. 460
-Lagerstätten 2. 55; 5. 716; 8. 860
Californiens 0. 496
-Reichthum
Österreichs 2. 83
-Seifen 0. 86; 4. 477; 5. 205, 702
in Australien 5. 826
in Siebenbürgen 4. 711!
-Verbreitung 2. 200, 365, 497, 725; 4. 94, 106, 204, 477

Gold
-Vorkommen 2. 77, 365, 499; 3. 724; 4. 15, 176, 319, 324, 672, 818, 822; 5. 300ff., 347, 360ff., 769ff.; 6. 554; 7. 90, 314, 461, 513 !, 698; 8. 230ff., 327, 340; 9. 190, 295
in Australien 6. 183, 188
Brasilien 8. 223
Californien 5. 716; 6. 188
Canada 3. 476
Neuholland 8. 196
Schottland 6. 192
Siebenbürgen 4. 711!
Venezuela 5. 564
-Wäschen 3. 72; 4. 15
im Uderei-Gebiete Russlands 0. 228
Goldius gen. 3. 488
spp. 4. 493
Golf-Strom 2. 722; 3. 375
Gomphoceras
gen. 4. 853; 5. 258*, 285*, 385ff.; 6. 126!, 316*
fusiforme 7. 220
rex 9. 846
rotundum 9. 846
subfusiforme 2. 192
subpyriforme 2. 192
sulcatulum 9. 846
Tanais 9. 846
spp. 4. 3 ff.; 5. 248; 8. 617
Gomphoceratidae (fam.) 8. 617!
Gomphocerites
Bucklandi 2. 985
Gomphodus gen. 8. 113
Sandelensis 8. 113
Gomphoides
occulta 6. 621
Gompholith 7. 604; 8. 88, 89
-Marcigno 7. 599
Gomphonema
augur 4. 613
clavatum 4. 613
dichotomum 0. 473
gracile 0. 95, 491; 4. 613
minutissimum 0. 95
Gomphonema
truncatum 3. 613
turris 4. 614
Goniastraea
gen. 0. 763!, 767; 2. 118*
Goniaster
Couloni 4. 654
Forbesi 9. 511
Fournivalli 9. 511
marginatus 4. 762; 7. 746; 9. 365
Mülleri 9. 365
porosus 4. 654
scrobiculatus 9. 365
Stockesi 4 762; 7. 746; 9. 365
tuberculatus 4. 762; 9. 365
spp. 3. 109
Goniatidae (fam.) 8. 617!
Goniatiten
-Kalk 0. 225; 1. 331, 664; 4. 846
-Schichten 6. 368
-Schiefer 1. 225; 5. 322; 6. 209, 255; 7. 457
Goniatites
gen. 1. 356!, 537!, 568!; 4. 853; 5. 259; 6. 316*
acutilateralis 6. 370
aequabilis 6. 370
affinis 6. 370
Ammon 6. 370
apertus 6. 625
auris 6. 370
bicanaliculatus 6. 370
bicostatus 1. 553
bifer 1. 541; 6. 370
bilanceolatus 1. 541; 6. 379
bisulcatus 6. 370
Bohemicus 4. 12*
Bronni 6. 625
Buchi 6 370
calculiformis 6. 370
carbonarius 6. 370
carinatus 1. 543; 2. 276; 3. 523; 6. 370
cinctus 1. 553; 6. 370
circumflexifer 6. 370
clavilobus 6. 370
compressus 1. 541; 2. 278; 6. 371
constrictus 1. 553; 6. 370
coronula 9. 256
Goniatites
costatus 6. 370
crenistria 1. 541; 2. 104ff., 277ff.; 6 370; 9. 827
cyclolobus 2. 278
delphinus 6. 370
divisus 6 370
dorsicosta 6. 370
Eifelensis 1. 553; 6. 370
evexus 6. 371
expansus 6. 371
forcipifer 6. 370
Gerolsteinensis 1. 553
globosus 1. 552; 6. 370
Hoeninghausi 6. 370
Jossae 1. 608
intermedius 6. 625
intumescens 3. 523, 816; 6. 370
Kinganus 1. 608
lamed 2. 276; 3. 523; 6. 37
lamellosus 6. 370
latiseptatus 3. 817; 6. 371
latistriatus 6. 371
lenticularis 6 625
linearis 1. 552; 6. 370
lunulicosta 6. 370
mammillifer 6. 370
mixilobus 2. 278 ff.; 6. 370
multiseptatus 6. 370
multilobatus 6. 370
d'Orbignyanus 1. 608
Ottonis 6. 218
ovatus 1. 552; 6. 370
ovoideus 1. 491
paucistriatus 6. 370
petraeos 6. 370
planilobus 6. 256
planorbiformis 6. 736; 9. 851
planorbis 6. 370
primordialis 6. 370
retrorsus 1. 587!; 2. 57, 278; 3. 523, 817; 5. 322; 6. 209, 370; 7. 457, 626
reticulatus 2. 106
restrictus 2. 109; 7. 626
sagittarius 2. 278; 6. 370
serratus 3. 523; 6. 370
sphaericus 2. 105; 6. 370; 7. 390
speciosus 6 625

Goniatites
strangulatus 1. 553; 6. 370
subinvolutus 6 370
sublaevis 1. 552; 6. 370
sublamellosus 6. 370
sublinearis 1. 552; 6. 370
subnautilinus 1. 225, 541; 2.278; 3.817; 6 371
subpartitus 6. 370
subsulcatus 1. 552; 6. 370
sulcatus 1. 552; 6. 370
tenuistriatus 6. 370
terebratus 6. 370
transitorius 6. 370
tridens 6. 370
tripartitus 6. 370
tuberculosus 6. 370
tuberculoso-costatus 1. 541; 6. 370
umbilicus 6. 256
undulosus 1.552; 6.370
Verneuili 6. 370
Wurmi 6. 370
spp. 4. 3 ff.; 5. 856; 6. 122
Goniatitidae (fam.) 6. 308!
Gonioceras gen. 6. 126!
Goniocidaris gen. 7. 122; 9. 255
Goniocoenia 2. 117*
Goniocora 2. 117*
spp. 2. 758
Goniodiscus
Forbesi 9. 511
Fournivalli 9. 511
Goniodromites gen. 9. 639!
bidentatus 9. 640
complanatus 9. 640
polyodon 9. 640
Goniodus 1. 657
Goniomya gen. 6. 247!
Americana 7. 492; 8. 495
angulifera 8.357; 9.32
hemicostata 7. 743
Knorri 6. 852
litterata 2. 230; 7. 743
proboscidea 6. 248; 8. 482
scalprum 7. 133ff.
Goniomya
trapezicosta 8. 484
V-scripta 7. 744
Goniopholis crassidens 5. 238*
Goniophorus 7. 122
Goniophyllum 2. 121*
spp. 7. 104
Goniopleura gen. 3. 487; 6. 224
spp. 4. 493
Goniopleuridae (fam.) 4. 493
Goniopora gen. 2. 119*; 3. 876
Goniopteris
gen. spp. 3. 761!
Brauni 4. 378
Buchi 3. 762
Dalmatica 3.510, 762; 5. 637
elegans 3. 762
Fischeri 5. 637
Helvetica 3. 502; 5. 637
Lethaea 3. 762
Oeningensis 0. 502; 2. 760; 3. 502, 762; 5. 637
polypodioides 3. 510
pulchella 5. 637
Styriaca 3. 502, 762; 5. 637
Goniopterites Styriacus 3. 762
Goniopygus 7. 122
peltatus 4. 653
perforatus 6. 491; 7. 768
Goniosaurus Binkhorsti 8. 206
Goniothecium
Cocconema 6. 103
cymbalum 6. 103
euryomphalum 6. 103
maris-mortui 0. 489
monodon 6. 103
urceolatum 6. 103
Gonoplax incisus 5. 384
Gonostoma spp. 8. 507
Gonyleptes nematostomoides 5.124
Gongylit 8. 313!
Goodallia
arenulata 4. 505
minutissima 4. 505
pygmaea 4. 505
Goodallia triangularis 4. 505
Gootin (Gestein) 5. 855
Gordia marina 5. 593; 6. 171
Gordius carbonarius 5. 243
Gorelia marina 5. 593; 6. 171
Gorgonia 2. 123
anceps 4. 744, 745
antiqua 4. 744
dubia 4. 744
Ehrenbergi 1. 489; 3. 126; 4. 744
furcata 5. 865
infundibuliformis 0.731; 2. 939; 4. 744
retiformis 4. 744
Gorgonidae (fam.) 6. 113
Gorgopis
fasciata 5. 123
frenata 5. 123
lynx 5. 123
marginata 5. 123
melanocephala 5. 123
torva 5. 123
Gossan (Lagerstätte) 1. 611
Gosau
-Formation 0.305, 735, 738; 3.652p.!, 713!, 719!; 6.724; 7.618
-Schichten 3. 582; 8. 505, 554
Götheit 1. 330; 2. 529ff.; 4. 814
Gottländische Geschiebe 8. 270
Gozo-Marmor 6. 101
Gouania 0. 636
Gouano (Guano) im Caspischen Meer 4. 466
Grallator gen. 9. 867
cuneatus 9. 867
cursorius 9. 867
formosus 9. 867
gracillimus 9. 867
tenuis 9. 867
Grammatit 4. 346; 8. 634, 684; 9. 84
Grammatophora
angulosa 0. 473
marina 0. 473
spp. 4. 739

Gramineae (fam.) 5. 638
Graminit 7. 397!, 721!
Grammobotrys gen. 5. 755
Grammopus gen. 9. 869
  erismatus 9. 869
  inordinatus 9. 869
Grammostomum
  angulatum 7. 750
  attenuatum 4. 738; 7. 750
  rhomboidale 4. 738
  Siculum 4. 738
  sigmoideum 6. 609
  spp. 4. 737
Grammysia
  gen. 6. 645, 868
  abbreviata 2. 933
  caudata 2. 933
  cingulata 6. 120
  extrasulcata 6. 120
  Hamiltonensis 1. 665, 2. 933; 6. 372, 500, 870; 7. 220
  ovata 6. 372;
  pes-anseris 2. 933; 6. 372
  rotundata 6. 120
Granat 1. 393*, 556, 572, 659, 695; 2. 516 ff., 873 ff.; 3. 260, 475, 476; 4. 21, 43, 180!; 5. 181, 186, 570*, 701!, 823, 827; 8. 33 ff., 54, 78, 213, 393, 470!, 789; 9. 53, 204!, 474
  schwarzer 5. 838!
  künstlicher 5. 215
  -ähnliches Mineral 3. 60!
Granatfels 8. 37 ff.
Granatoeder 5. 286
Granatocrinites
  cidariformis 0. 377
Grande
  oolithe 0. 160, 183!
Granit 0. 84, 355; 1. 6*, 769; 2. 367!; 495*, 731, 863, 873 ff.; 3. 363, 725, 736; 4. 185, 193!, 194, 303!, 420, 684; 5. 180, 203, 583; 6. 72; 7. 37, 345, 349, 360!, 593, 734* ff.; 8. 325, 332, 342, 841; 9. 130, 150, 458
Granit
  sein Alter 2. 975
  eruptiver 3. 363
  Gold-führender 0. 87
  grüner 0. 865
  metamorphisch wirkend 9. 222
  sphäroidischer 0. 313
  vulkanische Natur 3. 203
  des Harzes 2. 972!
  im Kija-Gebirge 0. 87
  um Lyon 0. 72*
  der Azoren 0. 5
  -bohrende Seeigel 6. 499
  -Einschlüsse in Basalt 3. 663
  -Eruptionen 2. 966
  -Formation 7. 847
  -Gänge 3. 443; 558; 4. 218
  -Gneiss 0. 514, 551, 553
  -Marmor 2. 133!, 295; 3. 304; 4. 529
  -Porphyr 3. 609; 7. 360!
  -Syenit 3. 364
  Porphyr-artiger 0. 865
  der Ballons 5. 82
  der Vogesen 5. 82
  opaloide 8. 828!
Granitello
  di Mosciano 7. 598
Granitifikation 4. 837
Granitische
  Gesteine 4. 837!
  Trachyte 7. 357*
Granitit 2. 973; 9. 457!
Granito
  di Prato 7. 600
Granito-trachytische
  Gesteins-Gruppe 7. 357!
Granitone 7. 600, 604
Granulit 1. 573; 6. 72*, 722
  um Lyon 0. 72*
  -Formation 7. 722
  -Gneiss 4. 41
Graphiocrinus gen. 6. 603!
  encrinoides 6. 602
Graphis scripta 3. 745
  succinea 3. 225
Graphit 0. 467; 1. 588, 694; 2. 520, 853*, 880; 3. 260, 271; 5. 822, 825!; 6. 267, 351; 7. 335; 8. 77, 95, 386; 9. 486, 815
  (künstlich) 6. 399!, 822
Graphit
  -Lager 1. 530; 3. 373; 5. 174
  -Schiefer 3. 363
  -Vorkommen 1. 600
  in Glatz 4. 724
Graphularia 2. 123*
  Wetherelli 9. 747
  spp. 1. 627
Graptolithen 4. 46; 5. 540
  von Böhmen 2. 245!
  in Schlesien 5. 717
  -Schichten 8. 236
  -Schiefer 3. 622, 628; 4. 846; 6. 807; 7. 839; 8. 236, 555; 9. 603
  mit Kalk
  -Geschieben 2. 306
Graptholithes 0. 640
  gen. 1. 223!; 2. 245!, 371!, 374!; 3. 628!; 6. 124, 170; 8. 764
  amplexicaule 2. 375
  armatus 2. 247, 415; 4. 126
  arundinaceus 2. 374
  Barrandei 2. 373, 415; 3. 241
  Becki 2. 247, 414*; 3. 636; 4. 126; 9. 875
  bicornis 2. 246
  Bohemicus 2. 246, 411*
  Clintonensis 0. 640; 2. 375
  colonus 2. 247, 413*
  convolutus 1. 65, 125, 127; 2. 247, 414*, 416; 4. 126, 127! 6. 113; 9. 875
  dentatus 2. 246, 4. 126
  distichus 1. 127
  dubius 2. 247, 413*
  falx 2. 247, 414*; 4. 127
  ferrugineus 2. 246, 412*
  Flemingi 3. 241
  foliaceus 1. 125; 2. 246; 3. 637
  folium 1. 127, 636; 2. 246, 373; 3. 628, 637; 4. 126
  fugax 2. 416
  geminus 1. 127; 2. 373
  Geinitzanus 2. 372
  gracilis 2. 374

Graptholithes
Griestonensis 2. 247
Hallanus 3. 374 126;
Halli 2. 416; 4·38
6. 500
incisus 3. 241; 637
laevis 2. 246, 412*
latus 2. 246; 6. 113
laxus 3. 241
Linnei 2. 416
lobiferus 3. 636;
6. 113; 9. 875
Ludensis 0.640; 1.125;
2. 246; 4. 126;
5. 98; 6. 113
millepeda 9. 875
millepora 6. 113
mucronatus 2.246, 406;
3. 628
Murchisoni 0. 98;
2. 373; 6. 113
Nicoli 3. 637; 9. 875
Nilssoni 2. 247, 414*;
3. 637; 4. 126;
9. 875
nuntius 2. 247
ovatus 2. 246
palmeus 2. 246, 375;
3. 637; 4. 126;
6. 500
peregrinus 2. 416;
4. 127
personatus 2. 373;
3. 241; 4. 126
priodon 2. 246*, 410*;
3. 628; 4. 125;
6. 500
pristis 1. 127, 636;
2. 246; 3. 628;
4. 126; 6. 225
Proteus 2. 247, 415;
4. 126, 127
ramosus 1. 636
Roemeri 2. 246
sagittarius 0.640; 1.65,
127; 2. 246; 3.241,
628; 4. 126; 6.113;
9. 875
scalaris 1. 127; 3. 628;
4. 126
secalinus 2. 246
Sedgwicki 2. 247,
375, 413*, 416;
3. 241, 636; 6. 113;
8. 594; 9. 875
serratus 2. 246*, 411!
sextans 1. 636
Graptholithes
spiralis 2. 247; 4. 126;
6. 500
taenia 1. 636; 2 247,
415*, 416; 3. 241
tectus 2. 416
tenuis 1. 136; 2. 247;
6. 118; 9. 873
teretiusculus 1. 127;
2.373; 3.241; 4.126
testis 2.246; 412*; 4.126
turriculatus 2. 247,
415; 4. 126
venosus 0. 640; 1. 127;
2. 375; 3. 344
virgulatus 3. 241
spp. 3. 628, 636;
5. 96, 248
Graptolithina
(fam.) 2. 374; 4. 124!
Graptolithus
vdr. Graptolithes.
Graptophyllia gen. 8.765*
Grateloupia
cuneata 6. 861
difficilis 6. 861
donaciformis 6. 861
Hydei 6. 229
mactropsis 7. 242
Moulinsi 6. 861
Graubraunstein 4. 20
Graue Gneisse 4. 39!, 44
Graue Porphyre 5. 584
Graue Schichten
silurisch-devonische
8. 715
Graue Schiefer
der Alpen 5. 181
Grauerz 5. 736
Grau-Kalk 3. 705
Grauwacke 0. 355;
1. 661 p., 662;
2. 109 g., 192 p.;
3. 2, 622, 628;
4. 728; 5. 585;
6. 209; 6. 359!;
7. 839; 8. 370 p.,
744 p.
metamorphische 4. 728
von Coblenz 5. 322
-Fauna 0. 275
-Flora 2. 56
-Formation 2. 373 p.;
6. 63; 7. 847
-Gebirge 5. 48, 852, 865
Rheinland-Westphalens 2. 98 ff., 106 ff.
Grauwacke
-Gliederung 3. 621 g. p.
in Thüringen 4. 46
-Gruppe Spaniens 1. 34
-Schiefer 0.522; 6.204;
7. 81*
Gravigradia (fam.) 6.240!
Gray-ash-coal 9. 380
Gray limestone 0. 163
Great Oolite 0. 161, 183!;
4. 764 p.; 8. 483
Greenockit 9. 188*
Greensand 4. 739* ff., 508
Grengesit 4. 697
Grenz-Schichten 7. 93
zw. Keuper u Lias
8. 550; 9. 628
Grès
Armoracien 3. 102 p.;
4. 221; 8. 621
de Beauchamps 2. 882
de Fontainebleau 2.882;
7. 503 p.
de Hettange 6. 455
de Martinsart 8. 353
de Rimogne 7. 208
de Virton 6. 455
supraliasique 0. 156!,
180, 181; 8. 355
verte 2. 977 p.
Gresslya
gen. 3.111, 112; 4.851;
6. 246, 249!, 642,
857
abducta 8. 357
carditaeformis 7. 743
concentrica 7. 744
conformis 8. 357
erycina 2. 744
gregaria 6. 857
lata 6. 857
lunulata 7. 133 ff.
peregrina 7. 743, 744
pinguis 6. 250
rostrata 6. 250; 7. 743
Saussurei 8. 582
securiformis 4. 620
striato-punctata 3.111;
6. 250
Gresslyosaurus
ingens 7. 152*
Grestener-
Schichten 4.456, 763;
6. 747; 8. 551
Grevillea gen. 2. 750
grandis 2. 750; 9. 374
Haeringiana 2.750; 4.379

Grevillea
lancifolia 9. 503
Reussi 2. 750
Griffelschiefer 4. 303!
Griffithides 0.780!, 785; 1. 508; 3. 487; 6. 225
calcaratus 9. 874
meso-tuberculatus 1.508 6. 116
Grimmia
subelongata 3. 746
Gritstone 2. 242
Grobkalk 3. 77, 289; 7. 490
Gromia gen. 5. 749, 755
Grossmogul (Diamant) 3. 697
Grossolith-Gliederung 3. 232p.; 7. 469, 742p.; 8. 726
Grossular 8. 77!
Grotten 2. 353
Groupe
corallien 0. 170!, 184; 7. 207
kimméridien 0. 185; 7. 207
nymphéen 1. 745
portlandien 0. 184
tritonien 1. 745
Gruben-Brand 2. 296
Grundgesetze der mechanischen Geologie 6. 769
Grund-Proben
aus dem atlandischen Ozean 3. 374
vom Meeresboden 7. 111
Grünerde 1.401*; 2.534; 5. 448!; 6. 348!
Grün-Erz 2. 708!
Grüne Schiefer 6. 190!
der Alpen 5. 183m.
Grünsand 2.977p.; 3.329; 4. 249p., 575, 624, 738* ff.; 5. 364; 7.115p., 480; 8.360, 594; 9. 227
bei Aachen 0. 92, 290
aus Polythalamien 5. 617ff.
-Bildung 1. 62, 63; 5. 469; 7. 91, 111, 749
-Entstehungs-Weise 4. 735
Grünsand-Formation
Reptilien 0. 255
-Mergel 8. 630, 632
Grünsandstein 5. 740p
-Formation 3. 313
Grünsteine 1. 477, 565; 4.300!, 302; 6.142, 699!
Gruppen
-Isomorphismus 4. 298
Gryllacris 0. 22*
lithanthracea 6. 108
spp. 0. 853; 2. 996
Gryllus
macrocercus 6. 620
Gryphaea
gen. 7. 383
angusta 2. 154; 3. 86
arcta 5. 501
arcuata 0. 145, 148, 180,403, 412; 2.343; 3. 530, 739; 6. 718, 818; 7. 8, 130, 142, 210, 211², 213, 469, 698; 8. 552, 583², 643; 9. 17ff., 94, 95, 345
aucella 0. 101
Broliensis 5. 878
Brongniarti 3. 90; 5.681!; 8. 638, 740
Buckmani 5. 878!
calceola 0. 157, 182; 8. 722; 9. 133, 134
cochlear 9. 839
columba 0. 364, 737; 1. 742, 743; 3. 90; 4. 202; 5. 878; 7. 789
convexa 8. 360²
cymbium 0. 146, 149; 1.484, 486; 2.737; 4. 80, 213; 5. 213, 878; 6. 456, 743, 818; 7. 10, 211, 212, 612; 8. 296, 583, 739; 9. 20, 22, 94, 143, 345
cymbula 7. 698²
Darwini 0. 481; 4. 82
dilatata 0. 166, 169, 170,183, 225; 1.496; 2. 352; 3. 41, 494; 7. 135; 8. 360, 484, 486, 582², 710, 739, 873; 9. 135
Gryphaea
Dufrenoyi 7. 384
gigantea 0. 150ff., 181
gigas 7. 612
incurva 5.878; 6.254; 7. 213²; 8. 873
inflata 1. 417! 194; 9. 629
intermedia 3. 86
laevigata 2. 153, 168
laeviuscula 7.213
liasina 7. 698
lima 9. 17
lituola 2. 153
Maccullochi 0. 181; 7. 213
minima 7. 743
mutabilis 8.360; 9.498
navicularis 4. 515
obliqua 6. 454, 456, 743; 8. 552
obliquata 0.723; 5.878; 7. 213
Pitcheri 0. 101, 482; 7.458; 8.360, 361². 709
plicata 1. 742
Tucumari 8. 360
vesicularis 0.365,366; 1. 139, 140, 420; 2. 154, 168, 170, 174, 296; 3. 314, 315, 603; 4. 869; 5. 86, 681; 8. 638
virgula 6. 254
vomer 8. 360
spp. 2. 931
Gryphiten
-Grit 1. 484; 5. 878
-Kalk 4. 370; 7. 213
Gryphites
aculeatus 4. 746
rugosus 4. 746
speluncarius 4. 747; 7. 637
Guajacites gen. 7. 778
enerve 7. 778
Heeri 7. 778
Guajakanit 9. 302!
Gualtieria gen. 9. 255
Guano-Lager (Gouano) 9. 823
Guarinit 8. 826!
Guayacanit 9. 621
Guettardia
infundibuliformis 2.766
stellata 6. 821

Gulielmites
gen. 8. 503!
clypeiformis 8. 503
permianus 8. 503
umbonatus 8. 503
Gulo arcticus 5. 229
diaphorus 5. 372
primigenius 4. 638; 5. 375
spelaeus 5. 624; 9. 100
Gurken-Kerne 9. 9
Gurnigel
-Sandstein 0. 305, 743!; 8. 636
Gurolith 2. 210!
Gutbieria
Carolinensis 8. 358
Guttensteiner
-Kalke 4. 456; 6. 663; 7. 691; 9. 313
-Schichten 5. 219; 6. 361; 7. 616²; 8. 4
Guttulina
gen. 5. 755; 7. 377
communis 7. 288!, 309, 498
cylindrica 6. 756
deformata 7. 498
deplanata 7. 498
dilatata 2. 255
dimorpha 6. 756
fracta 6. 756
globosa 6. 756
incurva 6. 756
lata 7. 288!
obtusa 6. 756
ovalis 6. 756
problema 7. 287!, 309; 7. 498
robusta 7. 498
rotundata 6. 756
semiplana 5. 435; 6. 756; 7. 498
semiplanata 2. 254
silurica 8. 632
turgida 7. 498
turrita 4. 739ff.; 7. 750
vitrea 6. 756
spp. 2. 511*; 4. 737ff.
Gryllidium
Oweni 5. 747
Gymnodium gen. 3. 761
Gymnogena
(Vegetabilia) 2. 504!
Gymnognatha (class.) 6. 765
Gymnognathen 0. 20*
Gymnit 1. 204*; 8. 312*; 9. 818
Gymnopus
Styriacus 6. 485*
Vindobonensis 6. 484!
Gymnosperma
(Vegetabilia) 2. 504!
Gymnospermae
(plantae) 0. 110
Gyps 0. 449, 485; 1. 389*, 699ff., 733; 2. 515, 525, 914; 3. 259! 4. 604; 5. 821*; 6. 540, 558; 7. 617
des Montmartre 5. 223p.
Pariser 9. 756
im Zechstein 3. 774!
-führender Mergel 7. 500
-Bildung 9. 837
-Gebirge
(Schichten) 6. 88
-Krystalle 2. 52
-Lager 1. 479; 2. 14; 5. 176, 257
Infusorien-haltiges 0. 491
-Lagerstätten 3. 614; 8. 219, 710; 9. 350ff.
-Mergel 4. 831
-Quellen 5. 33
-Schichten 6. 502p.
-Spath 1. 604; 4. 415*; 818; 5. 321
Gypsiferous
Series 7. 501p.
Gyracanthus
formosus 4. 750
obliquus 6. 123
Gyrineum spp. 6. 753
Gyrinites
troglodytes 2. 984
Gyroceras
gen. 4. 853; 5. 259; 6. 126!, 316*, 8. 617, 618
aratum 6. 371
binodosum 6. 371
costatum 6. 371
expansum 6. 126
Gyroceras mirum 4. 7*
ornatum 6. 371
quadrato-clathratum 6. 371
tenuisquamatum 6. 371
spp. 4. 3ff.
Gyroceratites
gracilis 6. 371
Gyrodus
gen. 3. 117; 5. 485!
circularis 5. 485
Cuvieri 5. 234, 485
frontatus 5. 485
hexagonus 5. 485
jurassicus 5. 485
macrophthalmus 4. 382; 5. 485
Picardi 8. 615
punctatus 5. 485
radiatus 5. 485
rhomboidalis 5. 485
rugosus 5. 485
rugulosus 5. 486
trigonus 5. 485
truncatus 5 485
umbilicus 5. 485
spp. 4. 382; 9. 124; 764
Gyrolepis
Albertii 3. 18, 29
Posnaniensis 8. 509
semistriatus 8. 352, 354
tenuistriatus 4. 840
spp. 2. 942; 3. 223, 744
Gyromyces
Ammonis 5. 628
Gyrolithen
-Sandsteine 0. 293, 295
Gyropteris 0. 628
crassa 6. 98
sinuosa 2. 890
Gyropristis
obliquus 4. 750
Gyroptychius
angustus 6. 123; 9. 491
diplopteroides 6. 123; 9. 491
Posnaniensis 8. 509
Gyroseris
patellaris 4. 868
Gyrosmilia 2. 116*
Edwardsi 4. 867

Haarkies 7. 331
Haarsalz 9. 305!
Hadogene
Erhebungen 5. 313, 650 ff.
Hadrodus gen. 9. 378
priscus 9. 378
Hadrophyllum 2. 121*
Hälbligkeit 4. 769; 5. 286
Hälleflinta 3. 67!
Hämatit 2. 526 ff., 707; 3. 475, 600, 696
Hämatiterz-Lager 4. 196
Haematopus? spp. 7. 634
Haematoxylum
coriaceum 6. 506
cuneatum 6. 506
Haemodoraceae (fam.) 6. 99
Haferkörnchen-Marmor 2. 295
Hafnefjordit 0. 62!; 1. 423; 2. 320!
Haidingeria 0. 632
pyriformis 1. 608
Schaurothi 7. 778
Haitorit 6. 563
Halbflächner 5. 542
Halbkalkdiallag 5. 575!
Halcyornis
Toliapicus 7. 634
Halesia dubia 8. 498
Halianassa
Collinii 1. 76; 5. 632
Studeri 1. 748; 8. 590
spp. 1. 501
Halibiolithe 7. 843
Halicore
gen. 7. 869; 8. 522*
Cuvieri 1. 492; 3. 107
media 1. 492; 8. 529
Halicyne plana 8. 622
Haliglossa 2. 118
Halimenites
gen. 0. 626; 4. 253!
Aglaophyllum 4. 251
Antoniae 4. 251
Dechenanus 0. 257
dubius 8. 640
Elisae 4. 251
flexuosus 8. 640
Grateloupia 4. 251
incrassatus 8. 640
linzoides 4. 251
Halimenites
minor 8. 640
rectus 8. 640
Sarniensis 4. 251
Schnitzleini 6. 105
secundus 6. 105
Haliomma gen. 6. 127!
radians 6. 104!
ovatum 6. 104
spp. 4. 738 ff.
Haliotidae (fam.) 6. 120
Haliotis
Philberti 7. 502, 773
Volhynica 9. 839
spp. 6. 750
Halirhoa
infundibuliformis 7. 233
quadricostata 7. 233
Haliserites 0. 626
Dechenanus 2. 890; 925. 939; 5. 240; 6. 375, 630
Schlotheimi 0. 116
trifidus 0. 116
Halitherium
gen. 5. 492!; 6. 19*; 7. 869; 8. 519*, 532*
Beaumonti 5. 231
Bronni 8. 530
Christoli 5. 493
Cordieri 8. 530
Cuvieri 1. 492; 5. 493
dubium 5. 231
fossile 5. 231
Kaupi 8. 528!
medium 8. 529*, 869
Guettardi 5. 231; 8. 528
Schinzi 5. 493; 8. 528*
Serresi 1. 492; 2. 998; 3. 107; 5. 231; 8. 529
subapenninum 5. 493; 8. 529
Hallesus retusus 6. 622
Hallia 2. 121*
spp. 4. 497
Halloysit 4. 587
Hallstätter
Kalk 7. 691
-Schichten 4. 88, 456; 5. 219, 500 p., 502 p.; 6. 361, 662, 757 p., 847; 7. 615, 616; 8. 4
Halobates spp. 6. 620
Halobia
Lommeli 0. 131; 3. 167; 4. 204, 456, 835; 5. 219, 480, 501; 6. 214, 218, 361, 662, 737, 738, 758; 7. 615, 617, 621, 622, 692, 760; 8. 4, 345, 383; 9. 477, 753
Moussoni 8. 383
salinarum 8. 4
Halobien-Kalk 7. 619
-Schichten 8. 4
-Schiefer 0. 733, 738; 6. 214
Halocharis gen. 4. 229!
cymodoceioides 2. 993
longifolia 4. 229
Halochloris 0. 631
Baruthina 3. 242
cymodoceoides 2. 993; 4. 252; 9. 376
Halomitra 2. 118
Halonia 0. 629
dichotoma 5. 868
irregularis 5. 631
punctata 5. 631
regularis 5. 868
tetrasticha 2. 891
tuberculata 1. 609; 5. 631, 868
tuberculosa 5. 243
Haloseris
(Agaricia crispa) 2. 377
Halotrichin 1. 589
Halys
Bruckmanni 3. 865, 873
Halysichnus gen. 9. 869
laqueatus 9. 869
tardigradus 9. 869
Halysites 2. 120*
catenularius 7. 386
catenulatus 4. 86; 6. 113; 9. 342
escharoides 7. 386; 8. 265
spp. 7. 104
Hakea
exulata 3. 504; 9. 123, 503
Gaudini 9. 503
Germari 3. 508

Hakea
lanceolata 6. 505
myrsinites 2. 750; 4. 379
plurinervia 2. 750; 4. 379
pseudo-nitida 2. 628, 750
stenocarpifolia 2. 750
Hamamelis
Wetteraviensis 8. 499
Hamilton-Gruppe 3. 817; 6. 368; 9. 343
Hamipes gen. 9. 868
didactylus 9. 869
Hamites
gen. 4. 853; 6. 316*
annulatus 8. 874
arcuatus 3. 759
armatus 2.28*; 7.476* ff, 659; 8. 874
attenuatus 3. 329
bifurcati 0. 164, 165
Carolinus 9. 361
Charpentieri 3. 329
cylindraceus 3. 505; 9. 313
ellipticus 7. 787
Evansi 1. 491
gigas 0. 391, 394, 415; 1. 63
Hampeanus 5. 86, 8. 505
intermedius 4. 201; 7. 659; 8. 874
larvatus 6. 480
maximus 4. 201
Michelii 7. 597
parallelus 8. 874
Parkinsoni 0. 160, 182, 183
plicatilis 7. 787
rotundatus 6. 480
rotundus 3. 329; 4. 201; 7. 476*, 659²; 9. 361
Saussureanus 3. 329; 7. 479
spiralis 3. 759
uncus 8. 497
Hammocks 4. 230
Hampshirit 0. 708; 1. 204*
Hamulina gen. 6. 316
fascicularis 9. 124
Handel
mit Mineralien 9. 276
mit Petrefakten 2. 939, 384
Haplocalamea
(fam.) 5. 240; 6. 626, 627!
Haplocalamus
gen. 6. 627!
Thuringiacus 5. 240; 6. 626
Haplocrinus
granulatus 0. 377
hemisphaericus 0. 377
maximus 0. 377
mespiliformis 6. 233
ovalis 0. 377
stellaris 6. 374
Harlania gen. 2. 801!
Halli 2. 890; 9. 607
Harlanus gen. 8. 233
Americanus 5. 112; 6. 109
Harleg-grits 3. 97; 6. 112
Harmodites 2. 120
distans 1. 608
parallelus 0. 243! 9. 847
Harmostites gen. 3. 875!
Oeningensis 3. 873
Harmotom 7. 582
Harnische 4. 606
Harpactor
Bruckmanni 3. 873
constrictus 3. 865, 873
gracilis 3. 873
longipes 3. 873
maculipes 3. 865, 871
obsoletus 3. 873
Harpago gen. 9. 498
Tippahanus 9. 498
Harpagodon
gen. 3. 251; 5. 229
spp. 1. 502
Harpagopus gen. 9. 868
dubius 9. 868
Hudsonius 9. 868
Harpalidium
Anactus 5. 747
Nothrus 5. 747
Harpedactylus gen. 9. 868
concameratus 9. 867
gracilis 9. 868
rectus 9. 867
Harpedinae
(fam.) 1. 509!; 6. 116
Harpes
gen. 0. 777, 785; 3. 486; 6. 224²
Bischofi 8. 753
elegans 1. 764; 7. 229
Harpes
gracilis 2. 275; 6. 370
megalops 1. 510; 4. 501
parvulus 3. 216; 6. 116
primus 7. 638
ungula 2. 275
spp. 4. 493
Harpidella 1. 509!
megalops 4. 501; 6. 118
Harpides
gen. 0. 780!, 785; 3. 487; 6. 224²
spp. 4. 493; 6. 223
Harringtonit 4. 176!; 6. 197!
Harrisit 9. 83!
Hartit 7. 580!
Harz
fossiles 5. 819; 7. 326!
Hastings-Sand 5. 746 p.
Hauera 0. 634
Haueria
Styriaca 8. 336
Hauerina gen. 5. 755
Hauerit 1. 597
Haupt-Andes-Hebungs-System 7. 731
Haupt-Dolomit 7. 692; 9. 753
-Oolith 8. 133
-Rogenstein 0. 160!
Hausmannia 0. 627
dichotoma 2. 886
Hausthier-Reste 2. 92
Haut-Knochen
der Schlangen 2. 465
Hautle 8. 227
Hauyn 3. 259, 681; 6. 185
Hawlea 0. 628
pulcherrima 5. 630
Hayesin 4. 449; 6. 563
Headon
serres 7. 503 p.
Hebungen 2. 176!; 3. 612; 5. 361
des Bodens 0. 221; 3. 196; 4. 461!; 6. 730; 7. 465; 8. 101, 346; 9. 464
der Gebirge 0. 560; 2. 867
vgl. Systemes d. montagnes
Skandinaviens 0. 477; 1. 175; 2. 87!
der Apenninen 3. 618!

Hebungen
der Neuholländischen Küste 8. 294
der Rhön 3. 441
des Urals 1. 610
der Westalpen 3. 334
durch Feldspath-Gesteine 7. 731
durch Syenit-Ausbrüche 7. 731
durch Trachyt Ausbrüche 7.731
Hebungs-Achsen 4. 463
-Systeme 3. 204!; 4. 385ff.; 5. 289 ff., 643ff., 769ff.; 6.571! 7. 92, 198, 343, 470; 8. 736
der Gebirge 8. 705
ihre Richtungen 1.94!
der Haupt-Andeskette 7. 731
des Belchens 1. 68
von Chili 7. 731
in Constantine 5.365
in N.Amerika 5.354
des Mont Seny 7.343
des Montserrat 7.343
(vgl. Systeme)
Hectecampe
gen. 9. 868
Hedenbergit 2. 879
Hedera
Kargi 2. 761; 3. 505
pentagona 8. 499
Strozzii 9. 117
spp. 0. 506
Heersien 2. 882; 4. 368
Heide-Brand 3. 550
Heisse Quellen 0. 306; 5. 195; 7. 589; 8. 724; 9. 102, 510
nähren Fische 0. 492
Helcion
gen. 3. 765; 4. 865
alveolus 7. 492; 8. 494
borealis 8. 494
carinatus 7.492; 8.495
cilicinus 3. 230
Ciplyanus 3. 230
discrepans 3. 230; 4. 850
Dunkeri 6. 495
Hebertanus 1. 101
heptaedralis 3. 230
humilis 3 230
infraliasinas 3.230; 4.850
Helcion
Koninckanus 3. 230
lateralis 3. 230
loxogonoides 3. 230
Normandanus 3. 230
patelliformis 7. 492; 8. 494
Schmidti 6. 495
sexsulcatus 7. 492;
subovatus 7.492; 8.494
cfr. Acmaea
Helcura gen. 9. 868
anguinea 9. 868
caudata 9. 868
litoralis 9. 868
surgens 9. 868
Helderberg
-Schichten 9. 235
Helemys gen. 9. 366*
Helenis
spatosus 8. 241
Helenopora [?]
abrotanoides 2. 855*
Helicerus gen 1. 383!
Helicia
Sotzkiana 9. 374
Helicina
compressa 6. 494
expansa 6. 494; 8. 583
heliciformis 6. 494
polita 6. 494
solarioides 6. 494
Helicites
delphinuloides 6. 371
turbilinus 3. 20, 39; 7. 761
Helioceras
gen. 4. 853; 6. 316*
cochleatum 8. 497
plicatile 7. 787
tenuicostatum 8. 497
tortum 8. 497
Helicoidea
(fam.) 5. 754!ff.
Helicophanta
brevipes 6. 545
Helicosoriea
(fam.) 5. 618!
Helicotrochina
(fam.) 5. 618!
Helictopoda
(classis) 4. 745, 751
Heliocidaris 7. 122
Heliolithe à étoiles 0.764
irregulier 0. 764
Heliolithes 2. 120*
Grayi 7. 105
Heliolithes
interstinctus 2. 115; 7. 386; 8. 263
megastomus 2. 115; 8. 594²; 9. 222
Murchisoni 2. 115
placenta 3. 816
porosus 6.375; 7.456; 9. 222
pyriformis 8. 594
spp. 4. 497; 5. 248; 7. 104
Heliopora
gen. 1. 765!; 2. 120*
crassa 1. 766
fragilis 1. 765
interstincta 0. 731; 2. 115
megastoma 2. 115
Murchisoni 2. 115
spp. 5. 248
Heliophyllum 2. 122*
spp. 4. 497
Heliornis spp. 7. 634
Helioseris 2. 119*
Helix
acieformis 2. 637
Amberti 5. 746
arbustorum 2. 55, 512; 3. 763; 8. 590
argillacea 6. 90
aspersa 0. 869
barbata 1. 676
Bestii 8. 875
bicarinata 5. 507
bifrons 5. 507
Bowdichana 5. 507
caespitum 9. 475
Canicalensis 5. 507
caperata 0. 869
carinulata 4. 249; 5. 768
cellaria 6. 575
Chaixi 5. 746
cheiranthicola 5. 507
coarctata 4. 249
Cocqui 7. 623
Collongeoni 5. 746
Croatica 2. 637
damnata 4. 627
deflexa 3. 532
delphinula 5. 507
depressa 5. 768
Duboisi 8. 875
Ehingensis 2. 765; 4. 249
ericetorum 0.869; 8.590

Helix
fruticum 2. 512; 6. 575; 7. 509; 9. 38
fulva 0. 869
fusca 0. 869
Giengensis 4. 249; 5. 768
globosa 4. 864
Gualinoi 5. 746
Godarti 5. 746
gyrorbis 4. 249
Headonensis 4. 864
hispida 2. 55; 3. 763; 9. 38
hortensis 0. 869; 2. 512
janthinoides 9. 749
Jasonis 7. 623
incarnata 7. 509
incrassata 4. 249
inflexa 4. 249; 5. 768; 6. 604; 7. 215; 8. 585, 586²
insignis 7. 30
involuta 4. 249
Kalamitana 3. 532
labyrinthica 4. 864, 865; 7. 509
labyrinthicula 5. 746
lactea 2. 988
lapicida 4. 473
Leidyi 7. 864; 8. 494
lenticula 3. 30
Moguntina 1. 676; 6. 332; 9. 853
Nayliesi 5. 746
nemoralis 0. 869; 4. 473; 9. 38
nitida 9. 38
nummulina 3. 532
occidentalis 8 377
occlusa 4. 864
omphalus 4. 864; 7. 509
orbicularis 4. 249; 5. 768
osculum 9. 137, 140
oxytropis 5. 507
pachystoma 4. 249
perpectiva 7. 508, 509
Petersi 1. 676
Pisana 3. 30
plicatella 5. 768; 8. 586
Potiezi 9. 749
psammophora 5. 507
pulchella 0. 869; 3. 532, 763; 8. 507; 9. 38
Ramondi 3. 532
Reinensis 5. 768
rotundata 6. 575; 9. 38
Helix
rubra 6. 333
rugulosa 2. 765; 9. 141
rysa 3. 763
Sotzkiana 2. 750
splendida 1. 676
Steinheimensis 7. 216; 8. 585, 586
stenotrypa 3. 532
stenospira 5. 768
striata 9. 475
striatella 4. 864; 7. 508, 509
subcarinata 2. 432f.
sublabyrinthica 4. 864
subnitens 4. 249
sylvana 4. 249
sylvestrina 2. 435; 4. 249; 6. 333; 9. 853
sylvestris 2. 44
thiarella 5. 507
Tournali 7. 623
tropifera 4. 864
Turonensis 9. 839
turricula 5. 507
undulata 5. 507
d'Urbani 4. 864
Vectiensis 4. 864
verticilloides 1. 676; 3. 532
verticillus 1. 676
Vialai 9. 749
virgata 0. 869
vitrinoides 8. 377
Zelli 6. 604
spp. 1. 122*; 6. 750; 8. 507, 847
Helminth 4. 271*ff.; 8. 399
Helminthites 7. 239
Helminthoidea 5. 175, 176
crassa 3. 413; 4. 558; 8. 638
irregularis 3. 413!
Helminthoiden 5. 43
Helmintholithus 5. 505
Helochelys
Danubina 4. 575!
Helodus gen. 6. 122
didymus 6. 123
gibbus 8. 122
laevissimus 1. 608; 6. 123
mammillaris 6. 123
planus 6. 123; 7. 485
rudis 6. 123
turgidus 6. 123; 7. 485
Helopidium
Neoridas 5. 747
Helopium
Agabus 5. 747
Helvin 2. 866; 3. 596; 5. 837
Hemerobius
moestus 6. 622
resinatus 6. 622
Hemiaster gen. 9. 255
Alarici 7. 859
Americanus 3. 165
Bowerbanki 4. 761
Branderanus 4. 761
bufo 7. 785
canaliculatus 7. 859
Cenomanensis 7. 853
complanatus 7. 859
constrictus 7. 859
Cotteaui 6. 101
cubicus 1. 765; 7. 230
Desori 5. 591, 593; 7. 859
Forbesi 7. 370
Fourneli 6. 206
foveatus 7. 859
Grateloupi 6. 101
Griepenkerli 7. 785
Humphreyanus 8. 377
nux 4. 499
obesus 1. 765; 3. 606; 7. 230. 859
Prestwichi 4. 761
punctatus 7. 859
Scillae 6. 101
spatangoides 4. 120, 121, 499
stellatus 8. 873
subglobosus 4. 120
Texanus 0. 101
Verneuili 7. 859
verticalis 7. 859; 9. 844
Hemiaulus
antarcticus 6. 103
Polycystinorum 6. 103
Hemicardium
Bartoniense 1. 715
spp. 9. 125
Hemicera gen. 8. 238!
angulatum 8. 238
compressum 8. 238
Hemicidaridae (fam.) 7. 767, 768
Hemicidaris 7. 122
alpina 7. 747, 768
angularis 0. 831
d'Archiaci 3. 606

Hemicidaris
Boloniensis 8. 488
Bravenderi 7. 768
confluens 7. 747, 768²
crenularis 7. 747, 768, 851; 8. 486
Davidsoni 7. 768
granulosa 7. 768
Hoffmanni 5. 858
Icaunensis 7. 747, 768
intermedia 7. 747², 768, 851; 8. 486
Luciensis 7. 768
minor 6. 100; 7. 768
patella 4. 312, 653
Purbeckensis 6. 95. 7. 747, 768
pustulosa 7. 747, 768
Ramsayi 7. 768
Stockesi 7. 768
stramonium 7. 747, 768
Thurmanni 4. 355
Wrighti 7. 768
Hemicosmiten-Kalk 5. 854
Hemicosmites gen. 4. 233ff.
porosus 5. 854
pyriformis 8. 594
Hemicrypturus
gen. 1. 507!
spp. 4. 493
Hemicyclodonta
gen. spp. 6. 856, 858
Hemicyclonosta
gen. 6. 856
Hemicyclostera
gen. 6. 856
Hemicyon
Sansaniensis 4. 752; 5. 229, 372
Hemicystites
gen. 5. 252!
parasiticus 5. 248, 252
spp. 9. 236
Hemidome
(der Krystalle) 5. 13
Hemieder 5. 542
Hemiedrie 4. 769; 5. 286; 6. 149
Hemidiadema 7. 122
Bakeri 7. 768
Hemilopas
Mentzeli 1. 81; 6. 745
Hemiotomys
antiquus 5. 371
robustus 5. 371
Hemipedina
gen. 6. 491!; 7. 122
Hemipedina
Bakeri 6. 491; 7. 768; 8. 357
Bechei 6. 491; 7. 768
Bouchardi 6. 491
Bouei 6. 491; 7. 357
Bowerbanki 6. 491; 7. 768
Cunningtoni 6. 491
Davidsoni 6. 491
Etheridgei 6. 491; 7. 768
Jardinei 6. 491; 7. 768
Marchamensis 6. 491
Morrisi 6. 491
Nattheimensis 6. 491
perforata 6. 491; 7. 768; 8. 357
Saemanni 6. 491
seriale 6. 491
tetragramma 6. 491; 7. 768; 8. 357
tuberculosa 6. 491
Waterhousei 6. 491; 7. 768; 8. 357
Woodwardi 6. 491²
spp. 7. 851
Hemipristis
heteropleurus 7. 243!
paucidens 5. 234, 728; 6. 601
plicatilis 6. 758
serra 0. 868; 1. 183, 254; 2. 999; 4. 515; 5. 234; 6. 601; 8. 869
Hemipatagus gen. 9. 255
Hemipneustes
radiatus 0. 364; 7. 859
striato-radiatus 7. 859
spp. 5. 364
Hemiptera (class.) 6. 619
Hemipyramidale
Krystalle 5. 13
Hemirhynchus
Deshayesi 5. 235
Hemitelites 0. 628
Trevirani 1. 476; 8. 401
Hemitoma
multiradiata 9. 750
Hemithrène 1. 433
Hemitrochiscus
gen. 5. 498!
paradoxus 5. 498
Hemitrypa
oculata 6. 374
Hemithyris
acuminata 6. 117
Hemithyris
angulata 6. 117
angustifrons 3. 216; 6. 117
crispata 6. 117
cuboides 6. 117
Davidsoni 3. 216; 6. 117
depressa 6. 117
didyma 6. 117
diodonta 6. 117
flexistria 6. 117
hemisphaerica 3. 211;
heteroptycha 6. 117; 6. 117
lacunosa 6. 117
Lewisi 6. 117
longa 3. 211; 6. 117
nasuta 3. 216; 6. 117
navicula 6. 117
nucula 6. 117
Paretoi 1. 66; 2. 340
pentagona 6. 117
pisum 6. 117
pleurodon 6. 117
protracta 6 117
psittacea 4. 507
reniformis 6. 117
rotunda 6. 117
sphaeroidalis 3. 216; 6. 117
Stricklandi 6. 117
subdentata 6. 117
subundata 3. 216; 6. 117
Wilsoni 6. 117
ypsilon 6. 117
Hempstead
series 7. 503p.
Heptanema gen. 8. 748!
spp. 8. 748
Hereford
-Sandstone 3. 97; 6. 112
Herpe[to]dactylus
rectus 5. 478
Herpestes
antiqua 5. 372
Lemanensis 5. 372
primaeva 5. 372
spp. 0. 878
Herpetichnus
Bucklandi 3 753
saurolepis 3. 753
spp. 4. 860!
Herpetholitha 2. 118*
Herpystezoum
Marshi 5. 864; 9. 869
minutum 5. 864; 9. 869
Herse gen. 3. 487

Herschelit 3. 174
Hersilia
miranda 5. 122
Hesbayen 2. 882; 3. 625
Hesperideae
(fam.) 7. 777
Hesperidophyllum
gen. 7. 777
citrinoides 7. 777
Ettinghauseni 7. 777
scalpellum 7. 777
Heterangium 0. 629
paradoxum 6. 99, 100
Heteraster
spp. 9. 123
Heteroaxe Struktur
der Krystalle 5. 696
Heteroceras gen. 6. 316*
Heterocoenia 2. 117*
conferta 0. 757
crasso-lamellata 0. 757
dendroides 3. 718;
4. 868
exigua 0. 757
grandis 4. 868
Provincialis 0. 757;
4. 868
verrucosa 4. 868
Heterocrinites
simplex 0. 376
Heterocrinus
pachydactylus 6. 375;
8. 371
Heterocyathus 2. 115*,
119*
Heterocystites
gen. 5, 251!
armatus 5. 248, 251
spp. 9. 236
Heterodon
diversidens 4. 111
Heterogaster
antiquus 3. 870, 873;
6. 503
pumilio 3. 873;
6. 503
Radobojanus 3. 873
redivivus 3. 873
troglodytes 3. 870, 873
Heterohyus
armatus 5. 228
Heteromerie 3. 843
Heteromerit 6. 181!
Heteromorphie 8. 702
Heteromorphismus 7. 586!
Heterophlebia 0. 20*
Brodiei 4. 122
Heterophlebia
dislocata 0. 119*;
4. 122
jucunda 9. 115
spp. 7. 555
Heterophyllia gen. 6. 114
grandis 6. 114
ornata 6. 114
spp. 2. 118*, 122*, 990
Heteropora
gen. 2. 766!
capilliformis 5. 635
compressa 5. 635
conifera 5. 635
corallina 5. 635
corymbosa 5. 635
crassa 5. 865
dichotoma 3. 84
Lorieri 5. 635
pustulosa 5. 635
radiciformis 5. 635
ramosa 0. 392; 2. 766;
5. 635
ramosissima 5. 635
Ranvillensis 5. 635
reticulata 5. 635
Sarthacensis 5. 635
tuberosa 2. 766
verrucosa 9. 122
spp. 2. 125
Heteropsammia 2. 119
Heterosaurus
Neocomiensis 2. 510*;
5. 233
Heteroseris 2. 119*
Heterosiphonidae
(fam.) 8. 617, 618!
Heterostegina
gen. 5. 751. 755;
7. 377; 8. 246!, 247
clathrata 7. 750
costata 8. 246
Javanica 5. 616*;
6. 608, 609
Heterosteus gen. 9. 491
Heterostius gen. spp. 8. 251!
Heterostrophus gen. 9. 767
latus 9. 764, 767
Hettangia
gen. 4. 112, 636!; 6. 496
Americana 8. 495
angusta 4. 636; 6. 495
Broliensis 4. 112, 636
compressa 4. 636
Deshayesia 4. 112, 636;
6. 495; 7. 210
Dionvillensis 4. 636
Hettangia
longiscata 4. 112, 636
lucida 4. 636
oblita 9. 32
ovata 4. 636, 851
Paulinea 4. 112, 636
securiformis 4. 636;
6. 495
tenera 4. 636; 6. 495
Terquemea 4. 112,
636
Heulandit 1. 158*; 2. 527;
5. 184, 822; 6. 11*,
562!; 9. 84
Hexacrinus gen. 6. 762!
brevis 6. 374
costatus 8. 372
depressus 6. 761
echinatus 6. 374
granulifer 6. 374
limbatus 6. 632!;
7. 860
lobatus 6. 632*; 7. 860
macrotatus 6. 761
melo 6. 761
pentangularis 6. 761
spinosus 6. 632!;
7. 860
ventricosus 6. 631!;
7. 860
Hexapoda (class.) 6. 765
in England 5. 746
Hexapodichnus
gen. 9. 869
horrens 9. 869
magnus 9. 869
Hiatella
interlineata 2. 229;
7. 743
sulcata 6. 644, 648, 650
Hierlatz-Schichten 4. 88,
456; 5. 487, 625;
6. 663, 747 p.; 8. 4
Hieroglyphen-Kalk 4. 357
Hierogramma gen. 6. 628!
mysticum 6. 626
Hightea 0. 635
Hilarites bellus 6. 503
Hils 5. 843
-Bildung 2. 60
-Formation 2. 187
-Konglomerat 3. 495;
4. 640 p.; 5. 159!,
325; 6. 818; 7. 659,
673
-Sandstein 0. 398, 416;
1. 62; 7. 696

Hils
-Thon 0. 410; 3. 811; 4. 643! 5. 159; 6. 818; 7. 673
Himanthalites
gen. 8. 639!
taeniatus 8. 640
Himantidium
arcus 4. 613
Himantopterus
gen. 6. 612!, 614!; 7. 118; 9. 760
acuminatus 6. 612
Banksi 6. 613; 8. 716
bilobus 6. 613
lanceolatus 6. 613
maximus 6. 613
perornatus 6. 613
Hindsia gen. 9. 126!
spp. 9. 125
Hinniphora
gen. 8. 505
Hinnites
abjectus 6. 852; 7. 743; 8. 357
comatus 9. 359
comptus 1. 486; 2. 229; 6. 363
Cortesii 2. 1004; 8. 584
liasicus 6. 496
d'Orbignyanus 6. 496
sepultus 2. 229
spondyloides 8. 486
tegulatus 4. 765
tuberculatus 2. 229
tuberculosus 8. 357
velatus 1. 486; 2. 229; 4. 765; 7. 132
spp. 4. 249; 8. 384
Hiobschiefer 9. 738!
Hippagus
verticordius 2. 1004
Hippalimus
proliferus 1. 102
Hipparion
gen. 0. 748; 1. 490; 3. 107; 5. 226, 761
diplostylus 1. 491!; 5. 226
gracilis 7. 370
mesostylus 1. 491!; 5. 226
occidentalis 7. 244!; 8. 376; 9. 251!
prostylus 1. 491!; 5. 226
Hipparion
speciosus 8. 255!, 376; 9. 251!
venustus 5. 112
spp. 3. 617; 4. 637; 8. 510
Hipparionyx
proximus 6. 508
Hipparitherium gen. 5. 761
Aurelianense 3. 107
spp. 0. 748, 878
Hippodon gen. 8. 255!
speciosus 8. 255!, 376
Hippohyus gen. 7. 869
Hipponyx gen. 7. 761
borealis 8. 494
cornucopiae 0. 860; 3. 604
dilatata 3. 605
squamiformis 1. 746
Hippopodium
Bajocense 6. 869; 7. 743
Luciense 6. 869; 7. 743
ponderosum 0. 148; 4. 213, 766; 6. 869; 9. 94, 345
Hippopotame
le petit 5. 231
Hippopotamus
gen. 7. 867, 869
amphibius 5. 223
dubius 5. 231, 491
major 1. 760; 2. 468, 998; 4. 609; 5. 228. 373; 7. 486; 8. 379; 9. 100, 116, 348, 149, 870, 871
medius 5. 231, 493
minor 1. 492
minutus 5. 228
Pentlandi 9. 640
Siculus 9. 640
spp. (in Torf.) 3. 45
Hipporhinus
Heeri 1. 759; 6. 503
Schaumi 6. 503
spp. 3. 105
Hippotherium
gen. 2. 360; 3. 107; 5. 226, 761; 7. 869
gracile 1. 360; 2. 627; 3. 378; 4. 638; 5. 375; 7. 759
occidentale 9. 251!
prostylium 4. 638
speciosum 9. 251!
Hippotherium
spp. 5. 384; 6. 595
Hippothoa gen. 4. 115!
cruciata 4. 869
Smithi 5. 635
tuberculosa 4. 117
Voigtana 8. 745!
Hippuriten
-Bänke 3. 568; 9. 202
-Kalk 0. 486, 713, 736, 738; 1. 41; 3. 166, 714, 718, 719; 4. 846; 5. 43; 8. 88, 89
Hippurites
(anim.) gen. 0. 627; 2. 454; 3. 239! 240; 6. 383!
arboreus 6. 59
bioculatus 4. 869; 5. 377*; 6. 59, 217
Chilensis 0. 482
colliciatus 5. 379
cornu-pastoris 0. 736; 1. 603; 5. 364
cornu-vaccinum 1. 603; 3. 715. 718!; 4. 869; 5. 377*; 7. 618; 9. 738
corrugatus 4. 379
costulatus 0. 366; 5. 87
dilatatus 7. 204
Hoeninghausi 8. 744
inaequistriatus 3. 715
Lapeyrousei 8. 744²; 9. 177
Loftusi 5. 379
organisans 3. 715, 718; 4. 869; 5. 364; 6. 59; 7. 204
radiosus 5. 377*; 6. 383; 8. 744; 9. 177
sulcatus 3. 715, 718; 4. 869; 6. 217; 7. 618
Texanus 0. 102;
Tomasanus 6. 59
Toucasanus 4. 869
vesiculosus 5. 379
spp. 6. 206
Hippurites (veget.) gen.
epuisetiformis 6. 97
longifolius 5. 628
spp. 4. 855
Hippuritidae
(fam.) 5. 376*, 377*

Hiraea 0. 635
borealis 4. 379
dombeyopsifolia 6. 252
Hermis 9. 375
Ungeri 9. 375
Hirnant-
limestone 3. 97; 6. 112
Hirsen-Eisenstein 2. 135!
Hisingeria gen. 6. 618
Hisingerit 0. 339!, 705!; 2. 880
Hislopit 9. 749
Histialosa gen. 6. 509!
Thiollierei 6. 509; 8. 380
Histionotus gen. 5. 870!
angularis 5. 870; 9. 381
Histioteuthis gen. 4. 853
Histiurus gen. 1. 184!
elatus 1. 183
Histologie der Gänge 8.36
Hitchcokia gen. 7. 634
Hitze
Einfluss auf Mineral-Bildung 3. 367
Einwirkung auf Gesteins-Bildung 3. 453
Höckerling 4. 769
Höckertimpling 4. 769
Hochgant
-Sandstein 3. 88
Hochgebirgs-Kalk 4. 456
Hochofen-Schlacke
krystallisirt 3. 59!
Hochwasser
geologische Wirkungen 0. 824
(d. Meeres) Wirkungen 0. 824; 1. 570
Höhen
-Bestimmungen 2. 594
barometrische 2. 436
in Chili 2. 941; 7. 732
in Dagestan und Transkaukasien 1. 205
Grossglockner 0. 744
des Harzes 8. 147
im Jordanthale 1. 488
in Kärnthen 3. 609
inNorwegen 1.257,279
im Ohm-Gebirge 2. 8
im Österreichischen Kaiserstaate 2. 362
-Systeme 4. 393 ff.
-Wechsel
des Bodens 5. 709
Höhen-Wechsel
des Landes 7. 216
der Länder, bedingt ihren Temperatur-Wechsel 4. 618
im stillen Meere 4. 460
des Serapis-Tempels 8. 223
-Zonen des meerischen Lebens 4. 610
Hohle Geschiebe 7. 187
Höhlen 1. 481, 482; 504; 2. 242, 350, 353, 864; 5. 465; 7. 724
Höhlenbär 9. 757
Holacanthodes
gracilis 6. 329; 7. 629
Holaster
aequalis 3. 380
bufo 6. 818
carinatus 6. 817; 7. 785, 786²
cinctus 3. 380
Greenoughi 3. 380
integer 7. 859
laevis 0. 392
l'Hardyi 4. 645!ff.
subglobosus 1. 311; 2. 189; 6. 817; 7. 786, 859
Holaraea spp. 1. 627
Holcodus gen. 2. 764!
acutidens 3. 764*
Holectypus
Cenomanensis 7. 852
corallinus 6. 95
depressus 4.621; 5.364; 6. 95
Desvauxanus 7. 747
hemisphaericus 7. 747
macropygus 4. 650! ff.
neglectus 4. 355
planatus 0. 101
planus 3. 165
striatus 8. 484
spp. 9. 123
Holocentrum
pygmaeum 5. 380
Holochondrus
spp. 4. 382
Holococcus
Panderi 8. 630, 632
Holocoenia
arachnoides 8. 591
dendroides 8. 591
explanata 8. 591
Holocystis 1.627; 2.121*
Holoeder 5. 543
Holoedrie 6. 151
Holometopus
gen. 4. 493; 6. 224
Holopea
Proutana 7. 863
Holopella
gen. 1. 253!; 5. 501; 6. 121
cancellata 6. 121
conica 6. 121
gracilior 6. 121
grandis 5. 501
gregaria 6. 121
intermedia 6. 121
monile 6. 121
obsoleta 6. 121
piligera 6. 372
subulata 6. 758
tenuicincta 3. 216; 6. 121
tenuicostata 6. 372
tenuisulcata 6. 372
tumida 6. 372
Holopleura gen. 7. 758!
Victoria 7.758!; 8.498
Holopneustes 7. 122
Holoptychius
Americanus 7. 368!
Andersoni 6. 123; 9. 491
Flemingi 9. 491
giganteus 6. 123
nobilissimus 6. 123; 7. 722; 9. 490
princeps 6.123; 9.491
Sedgwicki 9. 491
spp. 6. 370
Holostoma
Bryoz. gen. 3. 109
Holothuriae 8. 239, 624
Holz 8. 95
fossiles, der Kreide 0. 101
aus Sibirien 0. 126
versteinertes 9. 263!
im Meerwasser verändert 9. 311
-Kohle, mineralisirte 1. 735
-Stämme, versteinte 4. 862
Holzstein 2. 525
Homacanthus
macrodus 6. 123
microdus 6. 123

Homalonotus
gen. 0. 778!, 785; 1. 507!; 3. 487; 6. 224²
Ahrendi 6. 370
Barrandei 3. 102
bisulcatus 6. 116
Bohemicus 3. 128; 4. 1
Brongniarti 3. 102; 6. 500
crassicauda 6. 370
delphinocephalus 3. 341
Hausmanni 3. 102
Herscheli 2. 581, 585, 924, 928; 9. 121
Knighti 2. 581; 6. 116, 370
Lagraverendi 3. 102
latifrons 6. 256
Ludensis 6. 370
obtusus 2. 927, 928; 3. 581; 6. 370
platynotus 6. 808
Pradoanus 2. 340, 928; 6. 500
rarus 3. 128; 6. 500
rhinotropis 6. 812
rudis 6. 116
Schusteri 6. 256
spp. 1. 67, 661; 4. 493; 5. 249
Homarus
Latreillei 4. 375
spp. 9. 123
Homelys
minor 5. 622
Homichlin 9. 196!
Homo
diluvii testis 4. 168
Homoaxe
Struktur der Krystalle 5. 696
Homöomorphismus 1. 450; 2. 217!; 5. 153
Homöosaurier 9. 235!
Homoeosaurus
brevipes 5. 335!
neptunius 0. 198; 5. 336; 6. 827
macrodactylus 5. 336; 764
Maximiliani 5. 336!, 741
Homoeosolen
Bryoz. gen. 3. 109
Homocrinus
gen. 5. 249!
cylindricus 5. 248, 249
parvus 5. 248, 249
polydactylus 8. 628
spp. 9. 236
Homomya
gen. 6. 246, 248!
Alsatica 4. 851; 6. 248
gibbosa 4. 851; 6. 248; 7. 743
hortulana 4. 355
Koninckı 4. 851
obtusa 6. 248
Terquemi 4. 851; 6. 248
spp. 1. 382
Homonotus spp. 3. 109
Homostius
gen. spp. 8. 251!
Homothorax
gen. 1. 494, 495; 6. 124; 8. 249
Honigstein 3. 378; 9. 821
Hopeit 1. 449
Hoplichnus gen. 9. 868
equus 9. 868
poledrus 9. 868
quadrupedans 9. 868
Hoploceras gen. 6. 126!
Hoplocetus
crassidens 6. 491
curvidens 2. 998; 5. 231
Hoplomytilus gen. 6. 376!
crassus 6. 373
Hoploparia n. g. 0. 123!
Belli 0. 123
gammaroides 0. 123
longimana 0. 123*
prismatica 0. 123
Saxbyi 5. 859
Hoplophorus
euphractus 4. 111
Selloi 4. 111
Hoplopteryx
antiquus 9. 494
Horderley-Flags 4. 488
Hormoceras
Bayfieldi 7. 252
Hornblei 9. 188*
Hornbleierz 1. 200!
Hornblende 0. 423; 1. 399*, 426, 429, 658, 695; 2. 521ff., 851!, 868, 879; 3. 258, 652, 696; 4. 257; 5. 70!; 6. 183*, 352; 8. 683!; 9. 297*
mit Augit 0. 70*
Hornblende
-Augit-Gruppe 7. 357!
-Basalt 9. 803
-Gestein 0. 550; 1. 265; 2. 357, 962; 7. 345!
-Gneis 9. 482
-Porphyr 8. 787
-Schiefer 8. 222
Hornera
biseriata 7. 499
gracilis 7. 499
hippolithus 3. 84
ramosa 4. 744
subannulata 7. 499
spp. 2. 125; 5. 248
Hornsilber 1. 387*; 2. 519
Hornstein 2. 525; 3. 389ff.; 4. 219, 220, 404; 5. 351
-artiger Halbopal 0. 795
-Formation 9. 641
-Porphyr 4. 302!; 8. 651; 9. 215
Hornstone 8. 391
Hortolus
gen. 7. 126!; 8. 617
giganteus 6. 122
ibex 6. 122
Houghit 3. 176*; 5. 202*
Hudsonit 5. 828; 6. 687!
Hudsonriver-group 9. 342
Hufethiere 2. 979; 7. 867
Humatile Knochen 8. 862
Humboldtilith 3. 261; 4. 440
Humboldtit 6. 349!
Humilis gen. 4. 222!
Damouri 4. 221
Heberti 4. 221
Legalli 4. 221
Martinsi 4. 221
Viquesneli 4. 221
Humit 3. 177!, 263; 4. 76
Humphriesanus
-Bett 6. 852
Humus 2. 341!
aus der Kreidezeit 8. 365
Hunsrückien
(terrain) 1. 105
Hunterit 9. 749
Huronia
gen. 5. 504*ff.; 6. 126!; 9. 793
sphaeroidalis 5. 408*
vertebralis 5. 408*; 7. 684

Huttonia 0. 627
carinata 1. 476
spicata 6. 97; 8. 625
Hütten
-Erzeugnisse 3. 640; 5. 129! 6. 398
-Produkte 2.333; 4.314; 6. 666
Hyaegulus
collotarsus 3. 755*; 5. 228
marinus 3.755*; 5.228
Hyaemoschus
crassus 8. 204
Larteti 3. 755!; 5. 228
Hyaena
Arvernensis 4. 609; 5. 230, 372
brevirostris 4. 609; 5. 230, 372
dubia 5. 372
eximia 4. 638; 5. 736; 7. 234, 789
Hipparionum 1. 490; 5. 230
intermedia 2. 988; 5. 230, 624; 9. 100
Monspessulana 5. 230
prisca 2. 998; 5. 230; 9. 100
Perrieri 5. 230, 372
spelaea 3. 377, 534; 4. 50, 473, 609; 5. 230, 372, 624; 9. 100, 204, 862
Vialettei 5. 372
Hyaenarctos
gen. 4. 495, 751!; 5. 229
d'Alcoy 4. 753
Hemicyon 3. 617; 4.495, 752
insignis 4. 495, 753
Sivalensis 4. 495, 752
Hyaenodon
brachyrhynchus 5. 230, 374
crucians 8. 376
cruentus 8. 376
horridus 8. 376
leptorhynchus 5. 230, 374
Laurillardi 5. 374
minor 2. 1001; 5. 230, 374
Parisiensis 5. 230, 374
Hyaenodon
Requieni 0.498; 5.230, 374
spp. 2. 305; 3. 378
Hyalina spp. 8. 507
Hyalit 0. 418!; 3. 475
Hyalomit 7. 357*
Hyalophan 5.737!; 7.713; 8. 592*
Hyazinth 4. 21
-Granaten 1. 572
Hyboclypus
agariciformis 7. 852; 9. 364
caudatus 9. 364
disculus 9. 364
elatus 6. 228
gibberulus 7. 852; 9. 378
sandalinus 7. 852
Hybocrinus gen. 9. 635
pristinus 9. 635!
Hybodus
angustus 5. 234
cloacinus 9. 12
cuspidatus 9. 12
Eichwaldi 5. 622; 7. 383
grossiconus 5. 234
longiconus 6. 745
major 6. 745
minor 9. 12
Mougeoti 3. 17; 6. 745
obliquus 6. 745!; 8.615
Opatowitzanus 6. 745
plicatilis 4. 840; 5. 234; 6. 745; 8. 615
reticulatus 5. 234
simplex 6. 745
sublaevis 8. 354; 9 12
Tarnowitzanus 6. 745
tenuis 6. 745; 8. 615
Thuringiae 8. 615
spp. 2. 910
Hybothya 0. 632
Hydatica 0. 638
columnaris 5. 629
prostrata 5. 629
Hydnophora
gen. 0. 761!, 762; 2. 117*
Bronni 3. 606
Cuvieri 0. 766
maeandrinoides 0. 762
multilamellosa 4. 868
Sternbergi 1. 608
Styriana 0. 762; 4.868
Hydra (Polyp.) 2. 123
Hydrancylus
geniculatus 8. 640
hamatus 8. 640
Oosteri 8. 640
Hydrargillith 2. 705!; 4. 823*
Hydraulischer Kalk 3.410
Hydroapatit 8. 320
Hydrobia gen. 2. 352!
acuta 3. 751
angulifera 3. 751
conulus 2. 352
Ellioti 9. 750
pupa 3. 751
Schwarzenbergi 3. 751
Hydrobien-Schichten 9.121
Hydrobius
obsoletus 6. 503
veteranus 2. 984
Hydroboracit 8. 577*
Hydroborocalcit 0. 614!; 4. 449; 5. 835; 8. 827!
Hydrocephalus
gen. 0. 779!, 785; 3. 487; 6. 224
spp. 9. 504
Hydrocharideae (fam.) 5. 639
Hydrocharis
batrachodigma 4. 252
Hydrocharites
obcordatus 6. 505
Hydrochleis
perianthioidea 7. 778
Hydrochlor 2. 209!, 862!
Hydrochoerus
Aesopi 7 855!
spp. 3. 752
Hydrocyon
Sansaniensis 5. 229
Hydrodolomit 3. 260
Hydroida (fam.) 6. 113
Hydromagnesit 4. 193
Hydrometra spp. 6. 620
Hydronautia
labialis 6. 622
Hydrophan 8. 801
Hydrophilus
Acherontis 2 984
Hydrophit 1. 204*
Hydroplutonische Ausbrüche 7. 604
Hydropsyche
prisca 6. 622
Hydropterides(fam.) 0.629
Hydroptila spp. 6. 622

Hydrochestria
succinea 6. 622
Hygroskopität
der Gebirgsarten 0. 352
Hydrosteatit 0. 708!;
1. 204*
Hydrotalkit 0. 613!; 7. 832!
Hylaeosaurus
gen. 3. 215*
armatus 5. 233
Villae 6. 217
spp. 2. 1001
Hylesinus
facilis 6. 503
Hylobius
rugosus 9. 348
Hylosaurus
Mantelli 6. 759
Hymenocaris
gen. 6. 611, 613; 7. 241
vermicauda 5. 871
spp. 9. 504
Hymenophyllia 2. 117*
Haueri 4. 868
Hymenophyllites 0. 627
alatus 5. 629
dichotomus 5. 629
dissectus 1. 476; 2. 891
fasciculatus 8. 503
furcatus 5. 629
Gersdorfi 2. 891
Grandini 5. 629
Gützoldi 8. 503
Humboldti 5. 629
macrophyllus 0. 112
ovalis 5. 629
Partschi 6. 98
quercifolius 5. 243
semialatus 6. 666;
8. 503
semilatus 6. 544
stipulatus 5. 629
spp. 9. 379, 380
Hymenophyllum
Humboldti 8. 159
Hymenoptera
(class.) 6. 765
Hymenostomum
microstomum 3. 746
Hyolithes
gen. (= Theca) 8. 238!
spp. 8. 238; 9. 504
Hyopotamus
gen. 7. 869
Americanus 7. 244!;
8. 376
Borbonicus 5. 228
Hyopotamus
bovinus 5. 373
crispus 0. 498, 878;
5. 228, 373
porcinus 5. 228
Vectianus 5. 373
Velaunus 5. 228; 6. 638
Hyops gen. 0. 872!
depressifrons 0. 872;
5. 112; 7. 483
Hyotherium gen. 5. 228
medium 1. 76*; 3. 685;
4. 50; 9. 429*
Meissneri 1. 75*, 76,
503, 504; 9. 429
pygmaeum 1. 503, 504
Soemmeringi 2. 304
spp. 8. 233
Hypanthocrinus
gen. 6. 115
decorus 3. 344
Hypechinus gen. 7. 122;
9. 255
Hyperit 6. 368; 7. 357*,
737* 361!
Hyperoodon gen. 3. 93!
Baussardi 3. 93
Gervaisi 3. 93
Hypersthen 8. 684; 9. 818!
-Fels 5. 840; 7. 345;
8. 690!
-Syenit 7. 357*
Hypersthenit 6. 368, 700!
Hyphomycetes
(fam.) 5. 637
Hyphopus
Fieldi 9. 868
Hypnites
Haeringianus 4. 378
Hypnum
Heppi 5. 637
lycopodioides 6. 505
Oeningense 0. 502;
2. 760; 5. 637
mollassicum 3. 384
molluscum 4. 108
Schimperi 5. 637
squarrosum 3. 746
tamariscinum 5. 34, 41
Hypodiadema
gen. 7. 122; 9. 255
Etheridgei 7. 768
Hypogene
Mineralien 8. 76!
Hypohippus
gen. 9. 250!
affinis 9. 250!
Hyporyssus
telluris 3. 164; 5. 224
Hyposalenia gen. 9. 255
spp. 7. 122; 9. 123
Hyposaurus gen. 0. 256!
Hyposklerit 0. 849!; 1. 441!;
4. 597!, 600!
Hypothyris
psittacea 4. 507
Hypozoic
Groups of Strata 6. 112
Hypselonotus
Lavateri 3. 873
Hypsodon
Lewesiensis 5. 235;
9. 361
spp. 9. 640
Hypudaeus
amphibius 3. 377;
6. 489
arvalis 3. 377
Bucklandi 6. 489
minimus 6. 489
spelaeus 6. 489
terrestris 4. 196
von Sundwig 6. 489
spp. 7. 495
Hyracodon
gen. 7. 247!; 8. 376
Nebrascensis 7. 115,
247!
Hyracotherium
gen. 0. 879; 7. 869
leporinum 5. 228
siderolithicum 5. 615
de Passy 5. 226
Hyrax gen. 7. 867, 869
Hyreinocrinus
gen. 9. 758!
calyx 9. 759
globularis 9. 759
granulatus 9. 759
Mac-Coyanus 9. 759
Phillipsanus 9. 759
Scoticus 9. 759
Woodanus 9. 759
Hysterites 0. 626
Hysterium
decipiens 0. 502; 2. 760;
3. 502; 5. 637
deperditum 3. 502
opegraphoides 5. 637
protogaeum 3. 502;
5. 637
Hysterolithus
hystericus 6. 508
Hysterophyta (ordo) 0. 626!

Hystricops gen. 9. 247!
venusta 9. 247!
Hystricotherium gen. 5. 225
Hystrix cristata 5. 225
primigenia 7. 235, 370, 759
Hystrix refossa 5. 225
venustus 9. 247!
spp 5. 371

I. J.

Jacaranda
borealis 4. 379
Jackson-Gruppe 6. 229
Jacksonit 4. 423
Jalais (Gestein) 1. 743
Jamesoni-Bett 6. 456
Jamesonit 2. 534
Janeia
Biarmica 4. 748; 6. 645, 646
Phillipsana 4. 748; 6. 646
Jania gen. 6. 113
arcuata 6. 739
atava 0. 230; 3. 329; 5 160, 845
bella 7. 853
Burdigalensis 6. 739; 7. 204
flabelliformis 7. 204
Humphreysi 9. 234
Podolica 8. 874
Poulsoni 9. 234
quadricostata 7. 613
quinquecostata 4. 250; 7. 735
spp. 4. 249; 8. 384
Jaspis 5. 45 ff.; 7. 599; 8. 391!
Jassus immersus 6. 620
spinicornis 6. 620
Jaulingit 5. 819
Iberger
Kalke 3. 622, 817
Kalkstein 1. 225. 226
Schiefer 6. 255
Iberit 9. 567!, 586
Ibex spp. 5. 227
-Bett 5. 227
Cebennarum 6. 330
Ice-House-Coal 9. 849
Ichnologie 9. 508!, 866!
Ichnology
of Annandale 4. 858
Ichnolithae 9. 509
Ichnophycus
gen. 5. 249!
tridactylus 5. 248, 249
Ichthyocoprus 5. 628
Ichthyocrinus
gen. 5. 250!
laevis 5. 248, 250
spp. 9. 236
Ichthyodorulithes
spp. 3. 629, 630
Ichthyolithen 5. 862
Ichthyopodolithes
spp. 9. 868
Ichthorhachis 1. 489
Ichthyorhynchus
gen. 8. 749!
spp. 8. 748
Ichthyosarcolithes
gen. 3. 240!
cornutus 6. 481
Ichthyosauroides
gen. 8. 251
Ichthyosauridae
(fam.) 5. 745
Ichthyosauri (fam.) 6. 760
Ichthyosaurus
gen. 3. 630; 5. 421, 496; 7. 122; 8. 867*
actetus 6. 95
acutirostris 4. 371; 5. 496 ff.; 7. 106
biscissus 5. 429
campylodon 2. 381; 5. 427
communis 4. 371; 5. 497; 6. 454; 7. 106; 8. 867; 9. 18
chiroligostinus 5. 497
chiroparamegostinus 5. 497
chiropolyostinus 5. 497
chirostrongulostinus 5. 497
crassicostatus 4. 371, 373
giganteus 5. 497.
grandipes 5. 497
hexagonus 4. 371, 378
ingens 4. 371, 373
integer 5. 429, 496 ff.; 7. 106
intermedius 5. 497; 6. 454; 7. 106; 8. 867
Kurskensis 5. 623
Ichthyosaurus
latifrons 5. 498
latimanus 5. 497
leptospondylus 4. 624!; 5. 742
lonchiodon 5. 497
longirostris 7. 106!
loricatus 6. 481
Lunevillensis 5. 233
macrophthalmus 4. 371, 373
microdon 4. 371; 5. 496
Missouriensis 8. 376
piriformis 6. 115
planartus 4. 371, 373
platyodon 0. 152, 226, 734; 2. 622; 4. 371; 5. 497; 6. 454; 7. 106
posthumus 4. 624; 5. 427, 766
quadrangularis 6. 481
sphenodon 5. 496
tenuirostris 0. 152; 4. 371, 373; 5. 496; 6. 454, 824; 7 106; 8. 867
thyreospondylus 5. 498
trigonodon 4. 369; 5. 428, 496 ff.; 7. 106
trigonus 5. 498
spp. 5. 233; 6. 95
Ichthyoterus
gen. 4. 856
Fischeri 4. 857
Ictinocpehalus
gen. 9. 507
Ictitherium
viverrinum 4. 638; 5. 376; 7. 234, 759
Idiochelys
Fitzingeri 4. 577; 5. 741
Wagneri 4. 577; 5. 741
spp. 1. 79
Idmonea
triquetra 5. 634
spp. 2. 125
Idmonia
virginea 5. 124

Idokras 1. 659; 2. 524; 3. 260; 6. 181, 187, 435; 7. 167*; 9. 819!
künstlich 5. 215
Jeanpaulia 0. 629
nervosa 2. 887
Jeffersonit 1. 330, 447! 2. 529; 4. 604*
Jeffreysia
patula 7. 509
Jenkinsit 3. 463
Jerea lobata 7. 233
Jewed'che Schicht 8. 594
Igualadien
(étage) 9. 470
Iguanodon gen. 3. 214*; 9. 509
Mantelli 2. 382; 5. 233; 6. 759; 7. 105!
Ilex 0. 636
Aizoon 4. 380
cassinites 6. 505
dubia 2. 755; 6. 505
Hartungi 6. 244; 9. 253
Oreadum 4. 380. 491
Parschlugana 2. 755; 4. 252, 380, 491
rhombifolia 6. 505
sphenophylla 2. 755; 3. 506; 9. 376
stenophylla 2 760; 3. 506; 4. 627; 7. 614, 9. 873
theaefolia 9. 873
Vivianii 9. 873
Illaenidae (fam.) 4. 493
Illaenus 0. 779, 785!; 1. 508!; 3. 487; 6. 224²
Barryensis 3. 341; 7. 380; 9. 121
Bowmani 7. 380²
centrotus 9. 121
cornutus 9. 121
crassicauda 1. 68; 5. 852, 872; 6. 116, 803; 7. 380; 8. 594; 9. 121
Davisi 1. 636; 6. 116; 7. 380
Desmaresti 5. 987
giganteus 5. 98; 8. 870
Hispanicus 6. 500
Katzeri 7. 638
latus 6. 116
Lusitanicus 0. 99; 5. 98
Murchisoni 7. 380
Illaenus
ocularis 7. 380
perovalis 7. 380; 9. 121
Rosenbergi 6. 116; 7. 380; 9. 121
Sanchezi 6. 500
Schmidti 9. 121
tauricornis 0. 373
spp. 4. 493
Ilmenit 0. 338; 2. 53; 4. 453
Ilotes
rotalitatus 8. 241
Imatra
-Stein 0. 35; 8. 859
Imhoffia 0. 25*
Immigration
von Mineralbestandtheilen 5. 730
Inachus Lamarcki 0. 121
Indianit 1. 442; 4. 598!
Individuen-Leben 3. 381
Industrie-Ausstellung
zu Paris 6. 171
Inferior
Oolite 0. 156!; 158!; 6. 852
Infraneocomien-
Gebirge 4. 310!
Infulaster spp. 7. 787
Infundibulum
Ciplyanum 3. 230
depressum 3. 74
obliquum 1. 716
muricatum 3. 74
suplacretaceum 1. 101
Tornacense 3 230
trochiforme 1. 716
Infusorien 7. 125!
-Erde 1. 227, 229
-Lager 0. 491, 720
in Oregon 0. 95
Inga Europaea 4. 380
Inocaulis gen. 1. 767!
plumulosa 1. 768
spp. 5. 248
Inocellia erigena 6. 622
Inoceramen-Kalk 2. 621
Inoceramus
amygdaloides 4. 765; 9. 263
annulatus 0. 728
arctus 5. 501
argentatus 9. 498
Barabini 6. 481; 8. 361, 495
biformis 6. 481
Inoceramus
Brachowi 1. 496
Brongniarti 0. 727; 6. 80, 817; 7. 786²; 9. 228, 847
concentricus 0. 292; 1. 357; 3. 329; 7. 476*, 481, 659; 9. 313, 847
confertim-annulatus 0. 102
Conradi 7. 864; 8. 495
convexus 7. 864; 8. 495
Coquandanus 3. 329
costellatus 9. 498
Cripsi 0. 101, 292, 294; 4. 869; 5. 86; 6. 217; 8. 709; 9. 847
Cuvieri 2. 29; 4. 869; 5. 86, 728; 6. 817; 7. 786, 787; 8. 874
depressus 1. 419
dubius 6. 850; 7. 390; 8. 583²
expansus 7. 370
Faberi 6. 454
Falgeri 4. 204
Fittoni 4. 765
fragilis 7. 864; 8. 361, 495
gibbus 6. 481
gryphaeoides 9. 403
gryphoides 3. 530; 9. 25, 263
incurvus 8. 495
inflatus 6. 481
inversus 0. 731
Lamarcki 2. 189! 6. 217; 7. 597; 8. 637
latus 0. 102; 1. 744; 6. 817; 7. 471, 787; 9. 847
lobatus 1. 496; 9. 847
mytiloides 0. 101, 294, 386; 1. 63; 4. 869; 6. 80; 7. 786; 8. 361
Nebrascensis 8. 495
Neocomiensis 4. 540
obliquus 4. 765
oblongus 2. 156, 168, 171
obovatus 6. 625
orbicularis 2. 29
pernoides 8. 226
pertenuis 8. 495

Inoceramus
plicatus 0. 480; 4. 80
polyplocus 8. 583²
problematicus 7. 786; 8. 360², 361, 493, 495
proximus 6. 481
Sagensis 7. 864; 8. 495
salebrosus 6. 481
sublaevis 7. 864; 8. 495
substriatus 6. 456
striatus 0. 102, 292; 6. 817; 7. 471, 785², 786; 9. 228
sulcatus 1. 357, 744; 3. 329; 7. 477*, 481
tenui-lineatus 7. 864; 8. 495
triangularis 6. 481
trigonus 6. 625
umbonatus 8. 497
undulato-plicatus 0. 102
undulatus 6. 850; 7. 787
ventricosus 6. 456; 7. 492, 618; 8. 495
vetustus 2. 108
Weismanni 8. 643; 9. 17
spp. 4. 249
Insekten 4. 321; 6. 764; 7. 99; 8. 374
tertiäre 1. 759!
der Kohlen-Formation 6 2. 99
im Steinkohlen-Gebirge 2. 768
-Eyer: eine Ursache der Oolithen Bildung 8.226
-Fauna
von England 5. 746
von Öningen 5. 546
von Radoboj 0. 852
Geschichte 0. 17
-Koprolithen 2. 467
Insect-Limestone 4. 854
Integripallia (fam.) 6. 656, 657
Intermittiren der Quellen 9. 200
Interponirte Krystalle 3. 600
Intricaria
Bajocensis 5. 635
straminea 5. 634
Intricaten-Flysch 5. 178
Inversaria
gen. spp. 2. 125, 128!
Jod:
in Luft, Wasser, Thau und Schnee 2. 494
in phosphorsaurem Kalke 8. 822
in Süsswasser-Pflanzen 1. 197
-haltige Wasser 5. 834!
-Kalium 2. 794
-Metalle 8. 852
-Quellen 1. 161! 349!; 2. 295
Jodsilber 4. 451
Jodsoda-Quelle 1. 167
Jodolith 2. 615
Johnstonit 5. 808
Ionit 0. 420
Jordan-Wasser 3. 187!
Jordania gen. 8. 627!
bignonioides 8. 627
oblonga 8. 627
Jördensche Schicht 8. 594²
Jouannetia
semicaudata 5. 844
Irideae (fam.) 5. 639
Iridium 1. 694; 5. 69; 5. 837
Iris Escherae 5. 639, 639
obsoleta 5. 639
prisca 6. 505
tuberosa 9. 122
Isanomalen 3. 198
Isaster gen. 9. 255
Isastraea 2. 118*
Bernardana 4. 852
Condeana 4. 852; 6. 496
dictyophora 4. 868
dispar 8. 591
explanata 8. 873
foliacea 8. 591
Gourlandi 8. 591
Greenoughi 8. 873
Hennocquei 6. 496
limitata 4. 852
oblonga 2. 758; 8. 590, 591
Orbignyi 4. 852; 6. 496
polygonalis 8. 873
profunda 4. 868
tenuistriata 8. 358
Isatis spp. 6. 506
Ischyodon
Johnsoni 6. 494
Quenstedti 7. 366!
rostratus 8. 206
Thurmanni 8. 382; 9. 124
spp. 9. 764
Ischypterus
gen. 3. 744!; 7. 88
Marshi 7. 88
Ischyrhiza gen. 7. 856!
antiqua 7. 858!
mira 7. 856!
Ischyrocephalus
gen. 8. 493!
gracilis 9. 493
macropterus 9. 494
Ischyrodon
Meriani 6. 330; 7. 110
Ischyromys
typus 7. 115, 246!; 8. 376
Ischyrotherium
antiquum 7. 115, 245!; 8. 376
Isedrolotiliar (ordo) 6. 656
Iserin 0. 338; 7. 181!
Isis 2. 123*
hippuris 2. 855*
Melitensis 2. 461; 7. 233
Isisina 2. 123
Isoarca cornuta 6. 865
nitida 6. 865
transversa 8. 486
spp. 2. 977; 6. 871
Isocampe gen. 9. 868
striata 9. 868
Isocardien-Kalk 0. 738; 2. 459, 622; 4. 88
-Schichten 8. 1
Isocardia gen. 6. 865
acutangula 3. 605
angulata 6. 865
antiqua 6. 372
Bajocensis 6. 865
Burdigalensis 6. 865
caelata 6. 372
Campaniensis 6. 865
Carinthiaca 7. 616; 8. 1 ff., 125, 345
cingulata 6. 865
concentrica 0. 159, 722, 869; 2. 230; 4. 621; 7. 743
cor 1. 479; 2. 359; 4. 506; 6. 865³; 7. 52, 236

Isocardia
corculum 0. 225
cordata 7. 743
cordiformis 2. 158
crassa 4. 506; 6. 865²
cretacea 0. 294; 6. 865
dorsata 6. 865
dubia 6. 865
elongata 3. 816; 6. 865
exaltata 6. 865
excentrica 0. 869
fraterna 4. 506
gibbosa 6. 865
globulosa 4. 506
Goldfussana 6. 865
granulata 2. 158, 168
grandicornis 1. 146
grandis 2. 158, 168
Humboldti 1. 225; 2. 933; 6. 372
latior 6. 857
leporina 6. 865
lunulata 2. 158, 163, 171; 4. 506
Markoei 4. 506; 6 752
minima 0. 723; 4. 621; 6. 865
moltkeanoides 6. 865
multicostata 6. 865; 8. 740; 9. 860
Neocomiensis 0. 393; 6. 865
nitida 6. 862
nucleus 6. 865
oblonga 6. 865
obtusa 2. 158, 168
orbicularis 3. 816; 4. 355; 5. 848; 6. 865
Parisiensis 6. 865
Partschi 4. 546
parvula 6. 865
plicata 6. 865
Polonica 6. 865
praelonga 6. 857, 865
rhomboidalis 6. 865; 7. 743
rostrata 3. 319; 6. 865²
rustica 4. 506; 6. 752, 865
securiformis 6. 372
semiglabra 6. 865
striata 0. 159
sulcata 6. 865
Tanais 6. 865; 9. 847
tener 8. 484
Isocardia
tenera 0. 723; 4. 766; 6. 857, 865
transversa 6. 533, 865; 9. 138
trigona 6. 865
triquetra 2. 622
truncata 6. 865
tumida 4. 766
unioniformis 6. 644
ventricosa 4. 506; 6. 865²
Württembergensis 6. 865
Zieteni 6. 865
spp. 2. 977; 6. 865; 8. 616
Isocardium
rostratum 4. 766
Isochilina
gen. 8. 757!
cylindrica 8. 756
gracilis 8. 756; 9. 636
Ottawa 8. 756; 9. 636
Isocolidae (fam.) 4. 493
Isocolus 6. 224
spp. 4. 493
Isocrinus gen. 3. 238*
nobilis 6. 602
Isodoma gen. 8. 616!
spp. 8. 617
Isodonta gen. 3. 114; 6. 497!
Deshayesi 3. 114; 6. 497; 8. 128
Engelhardti 6. 495; 7. 210
Isodus sulcatus 3. 632
Isocteae (fam.) 5. 637
Isoëtes gen. 0. 629; 5. 868
Brauni 0. 502; 5. 637, 637
fossilis lacustris 0. 502
Scheuchzeri 5. 637
Brauni 3. 502; 5. 637
Isokras 0. 451; 2. 877
Isometrie
der Krystalle 5. 286
Isometrisch 4. 769
Isomorphe
Körper 4. 702*
Isomorphie 8. 699
Isomorphismus 1. 452, 595; 4. 69*, 77*, 298, 603, 702!; 5. 153; 6. 352; 8. 394; 9. 735
Isophyllia 2. 117
Isopleomorphismus 5. 153
Isopoden
Fährten 7. 878
Isoptychus
antiquus 5. 371
aquatilis 5. 371
Aubery 5. 371
Cuvieri 5. 371
Jourdani 5. 371
Vassoni 5. 371
Isorhynchus
gen. 6. 118
Isotelidae (fam.) 4. 493
Isotelus gen. 1. 507!; 3. 487
affinis 1. 507; 6. 116
gigas 1. 507
laticostatus 6. 116
megistos 2. 932
planus 1. 507
Powisi 0. 99; 1. 507; 6. 116
tyrannus 6. 116
Isothermen 3. 198
Issiodoromys
pseudanoema 5. 225, 371
Issoire 5. 223 p.
Istiaeus gen. 3. 118*
Isticus gen. 9. 492
gracilis 9. 492
grandis 9. 492, 493
macrocephalus 9. 492
microcephalus 9. 492
spp. 6. 611
Itabirit 9. 747*
Itakolumit 0. 238; 9. 747
Ittnerit 9. 803
Juglandinium 0. 636
Mediterraneum 4. 863
Juglandites 0. 636
costatus 1. 635
elegans 0. 117
Hagenanus 3. 228
minor 0. 116
rostratus 2. 987
salinarum 1. 635; 3. 382
Schweiggeri 3. 228
Juglans gen. 0. 636; 8. 749
acuminata 0. 507; 2. 755; 3. 506; 4 252; 8. 501, 749; 9. 117, 871, 873

Juglans
Bilinica 1. 128; 8. 501, 749; 9. 117, 871
Bruckmanni 0. 507; 2. 761; 3. 504
cinerea 8. 749
costata 1. 103, 635; 2. 755; 3. 383, 506, 631
deformis 1. 128; 2. 755; 3. 506; 6. 505
denticulata 2. 755
elaeoides 2. 755
elaenoides 3. 506; 9.375
elegans 8. 749
falcifolia 0.507; 2. 761
globosa 8. 499
Göpperti 8. 499
Heeri 4. 491; 8. 712
Hessenbergana 9. 122
hydrophila 4. 380, 491
hydrophilum 9. 375
inquirenda 6. 252
latifolia 0. 507; 1. 634; 3. 506; 8. 501
Novalensis 4. 282
nux-Tauriensis 5. 501; 9. 117
obtusa 3. 506
Protogeniae 3. 506
pristina0. 507; 3. 47, 506
quadrangula 8. 499
reticulata 9. 122
salinarum 1.635, 3.383
Senkenbergana 9. 122
serra 0. 507; 2. 761
Strozziana 8.501; 9. 117
tristis 3. 506
undulata 0.507; 2.761
venosa 2. 755
ventricosa 1. 635; 2. 755; 3. 383
Julus badius 5. 121
laevigatus 5. 121
politus 5. 121
rubens 5. 121
Juncus articulatus 5. 638
retractus 5. 638
Juncus
Scheuchzeri 5. 638
Jungermannia
bicuspidata 3. 745
cordifolia 3. 746
crenulata 3. 746
incisa 3. 745
inflata 3. 746
pumila 3. 746
sphaerocarpa 3. 746
Jungermannites 0. 627
acinaciformis 3. 225, 745
contortus 3. 225, 745
Neesanus 3. 225, 746
transversns 3. 745
Junkerit 6. 49*
Junghuhnites
Javanicus 3 435; 4. 631
Juniperinium
gen. 7. 364!
erraticum 7. 363
sanguineum 7. 363
Severzovi 7. 363
sylvestre 7. 363
Wolgicum 7. 363
Juniperites 0. 632
bacciferus 1. 102
Hartmannanus 3. 226
Juniperus gen 7. 364!
eocaenicus 4. 378
Jura,
schwarzer (Lias) 0.143, 180!
weisser 0. 167!
-Formation 0.719,721, 733, 738; 2. 967; 3.324,739; 4. 356ff., 514; 5. 53, 358, 364, 612,633p., 847, 856; 6. 57, 208, 210, 353, 451, 452!, 604, 741!, 763p., 818, 849, 850!; 7. 1, 129, 196, 206, 465!, 472, 481, 596, 846, 848, 851p., 858p., 864p.;
Jura-Formation 8.199, 349, 482!, 561, 603, 608, 630, 641, 710, 713, 720, 737, 741, 759p., 873p.; 9. 1, 104, 133, 143, 219, 221, 230, 354p., 385, 476, 513, 602, 606, 753, 846p.
in Brandenburg 3.581
in Ostindien 5. 734
in Pommern 3. 347
zu Port Natal 0. 482
in Russland 0. 225
in Spanien 1. 39; 2. 342
im Teutoburger Wald 0. 403
Deutsche mit der Englischen und Französischen verglichen 0. 139
geogr. Verbreitung 4. 78
Gliederung 2. 350
in den Alpen 4.455
bei Goslar 3.494
Schichtenfolge 3. 191
Schichten-Profil zu Cirin 4. 382
-Gebirge(Bayerns) 2. 92
-Gliederung 2. 622
-Dolomit 9. 412
-Kette 8. 725g.
-Kalk 3. 372
Jurakalk-Findlinge am Laacher See 1.60
Jurakalkstein 9. 410!
Jura-Periode 7. 466
Flora 0.111!; 2.885
-System 9. 824
-Versteinerungen als Geschiebe 3.608
Jurensis-Bett 6. 850
-Mergel 0. 180; 7. 18; 9. 406
-Pflaster 8. 450
Iwaarit 8. 313!

K.

Käfer 0. 26*; 6. 765; 9. 750
Kähne
in Torfmooren 6. 202
Kakochlor 2. 521
Kakoxen 4. 690!
Kalamiteen 9. 718
Kalamiten
-Kohle 5. 626, 627; 6. 476
Kalamiten
-Schichten 6. 369
Kälber, sogenannte 6.186!
Kali, kaustisches 2. 796
-Apatit 9. 191!

Kali
-Glimmer 6. 38; 8.699!
-Salpeter 2. 223!
Kalium 4. 72
in Meteoreisen 3. 473
Kalk, körniger 2. 77!, 446; 3. 490!
krystallinischer 2. 868, 876
von Friedrichshall 2.53
-Alpen 4. 468; 5. 219; 7. 616, 619, 689
Kalkeisenaugit 8. 700!
Kalk-Geschiebe
in Cypridinen-Schiefer 3. 159
Kalkglimmerschiefer 0. 539, 552
Kalkmagnesia-Olivin 4.451!
Kalk
-Oligoklas 2.320!; 4.599!
-Salze metamorphisch wirkend 8. 833
-Schiefer
des Zechsteins 3.779!
-Silikate 6. 842!
-Sinter, erbsenförmiger 5. 71
-Entstehung 5. 465
Kalkspath 0.451; 1.152*, 328, 389*, 393*, 394*, 397*, 398*, 399, 557, 578*, 819*, 820*; 2.515ff., 875; 3. 63!, 173, 187*, 475, 476, 695, 708; 4. 93, 187, 269*ff., 343*; 5. 69, 181, 184, 195, 414ff., 706*, 842; 6. 44*, 48, 842; 7. 586; 8. 33, 46, 214, 393, 549, 574!; 9. 186*
Kalk-Stalaktiten 9. 417!
Kalkstein. 1.474!; 8.472; 9. 443!
erdiger 1. 709!
von Friedrichshall 2. 536; 3. 66
von Galena 3. 609
(Analyse) 0. 445
Beimengungen 0. 701!
chemisches Verhalten 5. 838
-Einschlüsse in Basalt 3. 659
Kalkstein
der Gneiss- und Schiefer-Formation 2. 871
-Lager
in Glimmerschiefer 1. 573
metamorphisch 8. 707
durch Trappe 8. 387
Kalktalk-Augit 5. 186! 8. 700!
Kalktalkeisen
-Augit 8. 700!
Kalk-Trapp 5. 584
Kalktuff 2. 30, 48; 3. 322; 6. 202; 9. 37
(meerischer) 7. 611
der Azoren 0. 14
-Bildung 4. 107; 5. 33; 6. 537
mit Kunst-Produkten 4. 842
Kalk-Wagnerit 9. 191!
Kalymma gen. 6. 627!
grandis 5. 240; 6.626
striata 5. 240; 6. 626
Kalzit (Calcit) 1.405*: 2. 515 ff.; 7. 69; 8. 395
Kalzitische Sediment-Schichten 4. 257*
Kambrische
Schichtenfolge 9. 105
Kämmererit 2.850!; 3.62; 4. 345!
Kammkies 6. 192*
Kampecaris
Forfarensis 6. 598*
Kampylit 4. 817!
Kannel-Kohle 7. 341
zerlegt 3 331!
Kaneelstein 8. 48!
Kaolin 0. 355; 1. 389*, 403*; 2. 333, 535; 4. 189; 7. 715!; 8. 569, 829; 9. 680
-Bildung 2. 324
-Lagerstätten 3. 373
Kaolinisation 4. 815
Kapnit 1. 705!
Karbonate 1. 695
(Diamanten) 4. 73; 7. 328!
Karelinit 9. 733!
Karlsbader
Granit 8. 326
Karminspath 9. 190!
Karniol 8. 821*
Karpathen
-Kalke 0. 733, 738
-Sandstein 0. 737, 738; 1. 753; 5. 27 ff.; 7. 440
Karpholith 3.62!; 5.563!
Karphostilbit 6. 346!
Karren 7. 84
Karrenfelder 2. 826
Karstenia 0. 628
Karstenit 1.450!; 2.217; 5. 75, 692*; 6. 664
Karte
des Kaukasus 7. 769
von Nebrasca und Kansas 9. 823
geognostische
von Braunschweig 6. 816
von Hessen 2. 432, 828
des Siebengebirges 5. 87
von St. Gallen 5. 578
geologische 9. 231
von Belgien 9. 100
von Hannover 8.199
von Hessen 2. 202
von Holland 9. 58
der Rhein-Provinz 4. 257*; 9. 855
von Teschen 7. 351
von Westphalen 9.855
von Zentral-Europa 9. 625
Karwinskia 0. 636
Oeningensis 0. 506; 2. 761
multinervis 2. 761; 3. 506
Kaskaskia
-Kalkstein 7. 862; 8. 98
Kassiro-Tantalit 2. 863!
Katapleiit 1. 88!
Katogene
Metamorphose 5. 715
Katze, wilde 2. 112
Katzenauge 9. 289
Kaulquappen 5. 54
Kauth bei Beslau 2. 453
Kekia annulata 2.896; 8. 636, 640
cylindrica 2. 896
dilatata 8. 640

Keckia Hössi 8. 640
nodulosa 2. 896
Schneiderana 8. 640
vesiculosa 2. 896
Kelaeno gen. 4. 853
Kellia gen 6. 863
ambigua 2. 1004
coarctata 2 1004
cycladia 2. 1004
elliptica 2. 1004
orbicularis 2. 1004
pumila 2. 1004
rubra 2. 1004
suborbicularis 2. 1004; 3. 756; 6. 863
Kellovien 0 164!, 183
Kelloway-Kalk 0. 355
-rock 0. 164!, 183; 7. 207, 469; 8. 484, 582
Kelp 4. 820!
Kenngottit 7. 832!
Keokuk
-Limestone 8. 98
-Kalkstein 7. 862
Keramohalit 9. 305!
Keratophytes
anceps 3. 126; 4. 745
dubius 3. 127; 4. 744
retiformis 4. 744
vgl. Ceratophyles
Kerbthiere
Sechsfüsser 2. 983
Kernkrystalle 9. 51
Kerolith 1. 204*; 4. 192
Kersantit 1. 428!; 8. 849
Kersanton 1. 428!, 432; 7. 357*
Kesselstein 9. 819!
Keuper 0. 403; 5. 757 p.; 6. 823; 7. 142 p., 344 p.; 8. 550, 615 p., 720; 9. 3
-Formation 4. 408 p.; 6. 59; 7. 463, 621; 8. 227 gp., 228 gp.; 9. 349
-Grenze 7. 4. 93
-Lias-Grenze 8. 352, 353; 9 454, 628
-Schichten 8. 550 p.
-Periode: Flora 0. 111!
-Sandstein 8. 362; 9. 389! ff.
Key's 4. 223, 226
Kieselaluminit 4. 193
Kieselerde Hydrat 0 339
-Inkrustationen 9. 194*
Kieselige Gesteine
durch Trapp-metamorphisch 8. 387
Kiesel-Hölzer 5. 576!
-Infusorien
Fels-bildend 0. 472
-Kupfer 3 839
-Malachit 8. 831!
-Mangan 0. 683!
-Manganerz 6. 39*; 8. 701*
Kiesel-panzerige (-schaal.) Infusorien 7. 125!
Kieselsäure 9. 735, 816
-Hydrat 6. 556
Kieselsaure
-Gesteine verändert durch Dämpfe 2. 864
Manganoxyd-Hydrate 4. 179!
Kieselsaures
Zinnoxyd 4 346
Kiesel-schaalige (-panz.) Infusorien 0. 489
Kieselschiefer 5. 45 ff., 49 ff., 317; 6. 142, 204
Kieselschmelz 2. 335
Kieseltuff 0. 345!
Kiesel-Versteinerungen
farbig injizirt 6 607
Kieselwismuth 4. 826
Kieselzinkerz 1. 448!, 705!; 9. 449!
Kingena vgl. Kingina
Kingia cfr. Kingina 4. 509
Kingina gen. 7. 482
lima 4. 508; 9. 228
Killinit 9. 187*, 562!, 586, 622!
Killiney 9. 622
Kimmeridge
-Bildung 4. 355, 357
-Clay 0. 173, 185; 8. 488, 582
-Formation 6. 94 g.
-Gruppe 4. 488
-Thon 3. 816; 7. 469
Kimmeridgien 8. 488, 562
Kimito
-Tantalit 2. 863!; 8. 830!
Kippling 4. 769
Kir (Mineral) 8. 467
Klassifikation
der Fische 9. 381
der Mineralien 8. 75!
Klassifikation
der Thiere 9. 362
Klaus-Schichten 4. 88, 456; 7. 624; 8. 383; 9. 476
Klebschiefer 7. 834
Klima-Wechsel
von Zürich 2. 726!
Klingstein 1. 845!
Klinker 3. 187
Klinochlor 4. 69*; 5. 9!
Klinodiagonale
Hemipyramiden 5. 13
Klinodomen
(der Krystalle) 5. 13
Klinologie 2. 172
Klinopinakoid
(der Krystalle) 5. 13
Klinoprisma
(der Krystalle) 5. 13
Klippenkalk 0. 590, 735, 738; 5. 27 ff.; 6. 579; 8. 105; 9. 201
Klipsteinia 0. 635
Kloake
(Quenstedt's) 6. 741
Kloaken-Schicht 0. 503
Klymenien-Kalke 2. 56
Klytia Leachi 9. 494
Mandelslohi 1. 511
Knauer-Mollasse 4. 361
Knauffit 0. 220
Knebelit 0. 453!; 3. 69!
Knightia
Nimrodis 2. 750; 9. 374, 502
Knistersalz 3. 721
Knochen im Crag 0. 90
fossile in Amerika 0. 746, 747
in Mollassen-Kohle der Schweitz 1. 75*
im Torf 3. 45
-Breccie 1. 679; 2. 998; 4. 83, 473; 6. 489 p., 594, 875; 7. 875; 9. 220, 861
dalmatische 2. 453
um Montpellier 1. 759
-erde-Sandstein 3. 454!
-führender Sand 3. 139!
-Höhlen 1. 481, 599; 2. 998; 5. 125, 236; 6. 540, 574; 7. 699, 842; 8. 590, 598; 9. 465, 500, 640, 861

Knochen-Höhlen
von Alais 0. 90
in Bolivia 3. 752
von Laun 9. 93
um Montpellier 1. 759
von Sentheim 9. 93
zu la Tour bei Lunel 4. 198
-Lager 7. 729, 733
-Trümmer-Gestein 1. 44, 674
Knöchling 4. 769; 5. 286
Knorria gen. 0. 257, 629; 9. 804
acicularis 2. 891
acutifolia 2. 891
confluens 2. 891
Göpperti 2. 891
Gutbieri 5. 631
imbricata 1. 608; 2. 891; 5. 243, 868; 9. 131
Jugleri 2. 891
Kuensbergi 5. 631
longifolia 2. 891
megastigma 2. 891
polyphylla 2. 891
Richteri 5. 631
Schrammana 2. 891
Selloni 5. 631
Sellowi 0. 106; 1. 476
spp. 9. 381
Knotten-Erz 4. 606
-Sandstein 4. 606
Koak's
natürliche aus Kohlen 2. 85
Kobalt 2. 702!
-Erz 2. 67!; 8. 330
-Gang 0. 847
-Gehalt im Eisen-Wasser 5. 467
-Gruben 1. 332
-karbonat 1. 596
-kies 2. 71*
-nickelkies 2. 71*; 2. 588
-oxyd 6. 345
Kochbrunnen
(zu Wiesbaden) 4. 183*
Kochpunkt
plutonischer Gesteine 1. 739
Kochsalz 0. 449; 2. 794; 4. 450; 5. 455; 698*; 6. 436
-Lager in Böhmen 5. 858
Kochsalz
Wirkung auf Mineralbildung 5. 587, 589
Koelreuteria
prisca 9. 502
Koh-i-noor 0. 847; 3. 474
Kohle 6. 95; 8. 386; 9. 505!
(diluviale) 8. 659
fossile 6. 475, 476!
vgl. Braunkohlen und Steinkohlen
in Kreide-Formation 5. 86
in Russland 0. 617!
der Trias-Formation 8. 741
von Ungarn 0. 339!
des Zechsteins 3. 771
in Zentral-Amerika 5. 170
-Becken 5. 241
-Bildung 8. 86
-Bildungsweise 9. 347
-Brände 9. 273
-Eisenstein 2. 72!, 768; 4. 73!
-Formation 1. 471, 475; 4. 166, 636; 6. 79, 735; 8. 859; 9. 199, 221, 230, 273, 346
in Grönland 3. 271
des Lias 6. 357
von Oporto 0. 98
in Portugal 5. 95
protozoische in Kentucky 0. 224
-Gebirge 3 31
von Mans 1. 65
Fauna in Amerika 0. 857
-Kalkstein 5. 719, 856, 872 p.; 8. 98
der Bären-Insel 0. 86
Kohlen-Lager 4. 476
-Bildung 8. 79
-Lagerstätten 6. 729
Kohlen-Periode
Flora 0. 108
Kohlen-Reviere
in Süd-Wales 0. 498
Kohlensandstein
zerlegt 2. 330!
der Schweitz 1. 815
Kohlensäuerlinge 8. 696; 9. 46
Kohlensäure
metamorphisch wirkend 8. 832
-Quelle 9. 621
Kohlensaure
Eisenerze 3. 840!
Kohlensaurer
Kalk 8. 212
in Seewasser 0. 492
Kohlensaures
Blei 1. 401; 2. 210
Eisenoxydul 6. 580
Lanthanoxyd 4. 423!
Natron 2. 797, 806
Zink 4. 417
Kohlen-Schiefer
zerlegt 2. 330!
Kohlenstoff 9. 816
unter der Voltaschen Säule 1. 481
Kohlenwasserstoffgas
-Ausbruch 1. 464; 5. 731
-Entwickelung 2. 296
-Quelle 6. 724
Kokkolith 2. 879; 6. 186
Kokosnuss 3. 45
Kokscharowit 8. 690!
Kololithen 8. 228
Kolonien
der fossilen Fauna 2. 306
geologische 9. 221
Kolophonit 2. 879
Konarit 9. 185!
Konchylien 7. 631, 635; 9. 114
der Crag-Formation 2. 1003; 3. 762
Lage im Red Crag 1. 477
-Sammlung verkäuflich 5. 768
-Schaalen Versteinerungs-Art 4. 657
Konchyliologie 6. 855
allgemeine 3. 510
Konfekt von Tivoli 2. 857
Konglomerate 9. 155, 481, 577, 579
-Bildung 4. 419
Konichalzit 1. 91!
Koninckia 2. 120*
Koninckina
Leonhardi 4. 90, 504
Koninckinidae
(fam.) 4. 60!, 504
Konkrezionen 4. 367; 8. 859

Konkrezionen
-Bildung 4. 475
der Mollasse 7. 400
in Schieferletten 9. 713
Könleinit 0. 338
Kontakt
-Metamorphismus 8. 385
-Wirkungen 2. 716; 8. 81, 82, 85
Kontrastirende Entwickelung der Organismen 4. 607
Kopffüsser, silurische 4. 1
Koprolithen 5. 607, 728; 6. 432!; 7. 341; 8. 228; 9. 640
von Insekten 2. 467
Korallen 1. 625!; 2. 375!; 7. 104
des Bergkalks 2. 989
Britische 2. 757
fossile 2. 114
Britische 2. 989
aus England 4. 497
permische 2. 989
-Bänke 8. 590
-Bauten 8. 107
-Bildungend.Südsee 1. 356
-Erz 6. 196*
-Facies
des weissen Jura 0. 171
-Inseln 2. 88!; 4. 199!, 460ff.; 8. 593
-Kalk 0. 735, 738; 8. 486
-Riffe 4. 199!, 223!; 8. 336
und -Inseln 2. 88
jurassische 0. 177
silurische Sippen Amerikas 1. 765!
s. Polyparien
Korallinen-Region 2. 997
Körniger Kalk 0. 467; 1. 31; 2. 77m.; 6. 50, 577!, 583; 8. 47, 468!; 9. 486
Entstehung 2. 446
Ursprung 3. 490
Thoneisenstein 7. 343
Korund 0. 451; 1. 330, 404*, 589*, 693*; 2. 527; 4. 450, 453; 5. 455; 8. 569, 578*, 579*, 695
künstlich 3. 216*; 5. 215
Korundellith 2. 848
Kössener Schichten 4. 87, 88*, 763, 456; 5. 177, 219; 6. 747p.; 7. 92*, 614, 617, 619; 8. 4, 352, 353; 9. 452, 476, 628!
Krabben 9. 233
Krablit 4. 296
Kramenzelstein 7. 840
Kramenzel-Schiefer 5. 50ff.
Kramerberg 2. 282!
Krankenheil 2. 295, 298!
Krantzit 9. 447!
Krater-Gase 1. 866
Kratere 4. 96!; 6. 199
Kraterförmige
Boden-Senkungen 5. 581
Kraussia gen. 3. 254!
cognata 3. 255; 4. 504
Deshayesi 3. 255
Lamarckana 3. 255
pisum 3. 255; 4. 504
rubra 3. 255; 4. 60, 504
Krebse 8. 504
Krebsscheeren
-Kalk 5. 613p.; 7. 86
-Platten 0. 184
Kreide 0. 355, 708, 737!; 2. 124p.; 7. 116
metamorphische 7. 432
-artiges Tertiär-Gestein 5. 436!, 545
-Flora 4. 228; 8. 619
-Florula des Harzes 8. 364
-Formation 0. 386, 475, 721, 735, 738, 743; 1. 357; 2. 111p.; 767; 4. 108, 167, 846p., 866p.; 5. 207, 324, 358, 364, 493p., 586, 843, 856, 859p.; 6. 58, 95p., 206, 356, 357, 358!, 451, 480³p., 668, 711, 817; 7. 197, 204, 214, 369p., 458, 471, 480, 491p., 596, 613, 614, 625, 639p., 851p., 858p., 864p.; 8. 83, 231, 253²p., 350, 359g.p., 364p., 376p., 380p., 474, 493, 496, 553, 602, 608, 619p., 629p., 630g., 709, 737, 739, 744p., 850², 859;
Kreide-Formation 9. 106, 120, 123²p., 124p., 219, 313, 360p., 384p., 465, 466, 491p., 497, 607, 632, 824, 845p., 846, 856
von Aachen 0. 92*
in England 5. 632
v. Halberstadt
v. Blankenburg
v. Quedlinburg } 0. 133
in Sachsen 0. 306
in Texas 3. 165p.
-Reptilien 2. 380
-Gliederung
in den Alpen 3. 713, 719
in England 4. 508p.
bei Goslar 3. 494
-Profil
bei Genf 4. 250
-Gebirge 0. 190; 1. 617 791
in Bayern 2. 92
bei Aachen 0. 290
des Harzes 2. 55
in Texas 2. 960
Gliederung 2. 621
Quellen 2. 626
-Gruppe
in Spanien 1. 40
-Kohle 8. 86
-Mergel 0. 295; 1. 478; 2. 510p.
-Periode 7. 466
-Flora 0. 112!; 2. 885
-Sandstein 2 185!
-Saurier 2. 762
-Schichten
der Gosau 5. 53
-Typus, neuer 1. 730
-Versteinerungen 1. 602
als Geschiebe 3. 607
der Gosau 3. 634
Kreittonit 1. 694!
Kressenberg 2. 295; 4. 57
Krinoideen 8. 761
von Tennessee 0. 376
Krokodilier 8 759
Krokydolith 2. 715; 8. 848!
Kropf-Wasser 5. 834!
Kröte
lebend im festen Gestein 2. 243

Krotenstein(Felsart) 9.200*
Kröyeria
arenaria 9. 874
Krusensternia gen. 1. 490
spp. 4. 115
Krusten-Bildung
der Erde 5. 291!, 641, 769ff.
Kruster 1. 505
des Böhmischen Silur-Gebirges 4. 1
-Fährten 2. 982
Kryptogene
Erhebungen 5. 308ff.
Gesteins-Bildungen 1. 514
Kryptolith 3. 465
Krystalle
mit Einschlüssen 4.189, 190!
gebrochene 5. 194
tesserale 9. 293
wachsen 7. 74
Wärmeleitung 0. 451
Krystall-Bildung 3. 472
künstlich 3. 470, 472
gestörte 5. 201
Krystall-Drusen 0. 847
-Flächen,
gekrümmte 3. 837
-Formen 4. 769
Abhängigkeit 4.702!
bedingt von Atom-Wärme 7. 176
von Zusammensetzung 1. 597
-Beziehungen 8. 217
-Darstellung 8. 75*
-Mandeln 5. 803
-Modelle 5. 543
-Symmetrie 4. 306
-Systeme 2. 619
monoklinoedrisches 5. 11; 9. 293
orthotypes 3. 452
tesserales 2. 618
zwei- u. eingliedriges 5. 11
-Winkel, veränderlich 0. 620
-Zwillinge 4. 183, 306
Krystallinische Gebirge 2. 83
von Oporto 0. 99
Gesteine 4.295; 7.449; 8. 697; 9. 221, 471
Krystallinische Gesteine
auf nassem Wege 2. 446
Hüttenprodukte 2. 491
Sandsteine 6. 344
Schiefer 0. 514, 551, 730; 1. 29, 261ff., 513!; 5.97; 7.351, 615; 8. 221, 338, 352, 473; 9. 477, 740
Steiermarks 0. 712
-Gebirge 5. 584
Krystallisationen,
künstliche 3.59; 5.129!, 214!; 8. 578!
Krystallisations-Kraft
ausdehnende Wirkung 2 781!
Krystallisirtes
Platin 7. 830
Krystallographie 0. 217, 597; 4. 177!; 769; 8. 316
Kugel-Gefüge
der Felsarten 6 466
-Gesteine 2. 691
-Sandstein 4. 675
Kugelmässig 4. 769
Kugling 4. 769
Kuhtritte 1. 146
Kunker (Gestein) 5. 855
Kulm (Culm) 6. 475, 476
Kunstprodukte 8. 742
fossile 0. 477; 1 503
in Kalktuff 4. 842
Künstliche
Mineral-Bildungen 0. 457; 2. 216; 3. 641; 5. 129!, 214!, 587, 589; 6. 666, 472, 556; 8. 578!, 801 ff., 852; 9. 82, 191, 194, 446
Apatit 5. 100
Cyän-Titan 2. 703
Gadolinit 5. 696
Glimmer 4. 129
Silber 3. 703
Titan 4. 187
Künstliche Mineral-Krystallisationen 1. 692!, 706, 710!; 3.177,470; 6. 398, 431!
Kupfer 2. 531; 8. 694* 9. 623
Gediegen 0. 850!; 1. 463, 596; 5.349, 823; 7. 314, 589
gestrickte Gestalten 4. 187
künstliche Krystallisationen 5. 130
in Seewasser und Organismen 0. 352
-Bisulphat 1. 694
-Blüthe 1. 694
-Erze 1. 463; 6. 1, 75; 8.329, 576!; 9.305!
von Adelaide 2. 332
amLake superior 2. 49
-Lagerstätten 2.362; 4.843; 6. 85, 385; 7. 47, 79; 8. 476, 842; 9. 321
-Vorkommen 6. 461ff.; 7. 347, 350
Kupfer-Gehalt des Rothliegenden 3. 728!
Kupferglanz 1.387*, 463; 2. 532; 3. 181; 4. 188!; 9. 188*
Kupferglimmer 1. 708!; 2. 520
Kupfer-Gruben 4. 422; 6. 1
Kupfergrün 2.520; 7.550
Kupferindig 1. 463; 9. 624
Kupferkies 0. 214, 429; 1.386*, 387*, 391*, 463, 597; 2. 519, 532, 875, 879, 880; 3. 180; 4. 76*, 672; 5. 69, 197!, 699!, 824; 6. 442
künstlich 3. 177!
-Lager 3. 742
Kupferlasur 1.463; 2.853*; 4. 787; 5. 822; 6. 582; 7. 550; 8. 697
Kupfer-Linnäit 5. 560!
Kupfer-Natron
-Doppelkarbonat 3. 470
Kupferoxydul 1. 596, 694
Kupferpecherz 2. 520
Kupferschaum 0. 190

Kupferschiefer 3. 444; 4. 743; 6. 600p.; 7. 102p.; 8. 608, 758p.
(Flora) 0. 110
-Formation 4. 673, 795p.
der Wetterau 2.196!
Kupferschiefer
-Profil in der Wetterau 4. 614
Kupferschwärze 1. 463; 9. 295!
Kupfersmaragd 0 338
Kupfer
-Verwendung 2. 79
Kupfer
-Vitriol 5.821*; 7.582
Kupferwismuth 5. 836!
Kupferwismuthglanz 4. 423!
Küsten-Durchschnitte aus England 0. 858
Kyloe (Thier) 7. 868

L.

Labatia salicites 6. 505
Scheuchzeri 0. 505; 2.761; 3.505; 9.502
Labech(e)ia 2. 120*
spp. 7. 104
Labrador(it) 0. 347!, 683!; 1. 444, 557; 4. 598!, 600!, 601; 5. 448!; 6. 46!; 7. 334, 346, 717!; 8. 470!, 698²!; 9. 650
Labrador-Fels 6. 200
-Gesteine 1. 266; 9. 468
-Laven 2. 322
-Porphyr 9. 665
Labrax
major 5. 235
Labrus gen. 3. 123
parvulus 6. 481*
Valenciennesi 3. 119*
Labyrinthodon
Bucklandi 2. 895; 9. 496
Fürstenbergensis 5.756
Lyelli 4. 860!
ocella 5. 756; 8. 555
pachygnathus 3. 105
spp. 3. 507, 754; 5. 367
Labyrinthodontae (tribus) 0.752!; 4.422; 5. 757; 7. 857
Laccopteris 0. 628
Landrioti 6. 496
Laceripora
gen. 5. 865!; 7. 633
cribrosa 5. 865
Lacerta
agilis 7. 625
ambigua 5. 233
antiqua 5. 374
bifidentata 5. 233
crassidens 5. 233
Lacerta
fossilis 5. 374
Neptunia 6. 759
ocellata 5. 233
Philippiana 5. 233
Ponsortana 5. 233
pulla 9. 724!
Rottensis 6. 829; 9. 724
Sansaniensis 5. 233
Lacertae
ornithoideae 9. 867
Lachnus
Bonneti 3. 870, 874
cimicoides 6. 620
longulus 6. 620
pectorosus 3. 870, 874
pini 3. 863
quercus 3. 863
Lacuma
Scheuchzeri 2. 761; 9. 502²
Lacuna
reticulata 3. 764
suboperta 7. 509
vincta 7. 509
spp. 6. 750
Lacunosa-Bänke 0. 168
Laëdonien
(terrain) 6. 84; 8.725
Laëkenien
(terrain) 2 882. 7.503p.; 9. 228
Laevicardium
Spillmani 9. 498
Laganum
Jonesi 6. 229
profundum 4. 120, 121
Rogersi 6. 229
Lagena spp. 9. 865
Lagenalis-Bett 8. 482
Lagenocrinus gen. 6. 604
seminulum 6. 603
Lager
-Verhältnisse 3. 742
Lagerstätten
nutzbarer Mineralien 8. 330
sekundäre der Fossil-Reste 8. 234, 257
Lagodus gen. 7. 876
picoides 5. 371
spelaeus 5 371
Lagomys gen. 7. 872
alpinus 8. 276
antiqnus 5. 371
Corsicanus 5.225; 7.875
Meyeri 3. 164; 5. 622; 7. 845, 875
Oeningensis 5. 622; 7. 875
pusillus 7. 876
Sansaniensis 5. 225
Sardus 7. 873!
spelaeus 5.371; 7.875
verus 7. 873!
spp. 5. 225
Lagoni in Toskana 0. 492
Lagonit 5. 835!
Laguncula repens 2. 124
Lagunculapes gen. 9.868
latus 9. 868
Lagynida
(fam.) 5 754! ff.; 6. 756
Lagynis
gen. 5. 749 755
Lamellibranchia
(ordo) 6. 656
Laminarien-Region 2.997
Laminarites 0. 626
antiquissimus 5. 852
crenatus 0. 116
spathulatus 0. 116
Lamna
acuminata 0. 868; 1. 254; 3. 110; 5. 234; 9. 361
acutissima 3. 110
carbonaria 5. 628; 7. 485

Lamna clavata 7. 243
complanata 6. 601
compressa 0. 868; 1. 254; 3. 110; 8. 870
contortidens 0. 868; 1. 184; 2. 463, 1000; 3. 110, 132; 6. 535; 8. 870
crassidens 0. 868; 1. 254; 3. 110; 4. 515; 6. 601; 7. 25; 8. 870
cuspidata 0. 868; 2. 1000; 3. 110; 4. 515; 6. 601; 8. 590; 9. 138
dentata 3. 110
denticulata 2. 167, 463; 3. 132, 531; 4. 515; 6. 601
dubia 1. 184; 2. 1000; 3. 110; 5. 234; 6. 601; 8. 870
duplex 5. 728
elegans 0. 737, 868; 1. 254; 2. 167, 1000; 3. 110! 5. 234; 8. 740, 870; 9. 125. 866
extincta 2. 750
ferox 3. 110
gracilis 0. 868; 8. 870
Hopei 0. 868; 3. 110
lepida 5. 234
longidens 1. 184; 8. 486
ornata 7. 243!
plicatella 3. 110
raphiodon 1. 184; 3. 110; 6. 758; 7 625
subulata 6. 758; 9. 361
Texana 0. 102
undulata 2. 1000; 5. 728
verticalis 0. 868; 3. 110
spp. nov. 3. 110; 5. 234
Lamprodon
gen. 4. 638
primigenius 7. 234, 370, 759
Lampropholis
triquetra 5. 125
Lankasterit
(Lancast.) 4. 179, 193
Lanceopora gen. 4. 115!
Land-Hebungen 4. 461; 6. 730
Land-Seen 8. 84
Land-Senkungen 4. 461!
Landenien
(terrain) 2. 882; 3. 612; 7. 503p.
Landschnecken
lebender Arten: fossil 0. 868
-Kalk 3. 482
Längenthäler 3. 70
Lanthanit 9. 190!
Laophis
crotaloides 8. 384
Laparocerus
Wollastoni 6. 243
Lapiaz 7. 84
Lapis-lazuli 8. 824*
Lapparia gen. 6. 230!
dumosa 6. 230
Larderellit 5. 835
Larix gen. 0. 127
Francofurtensis 9. 122
gracilis 9. 122
sphaeroides 9. 122
Lariosauridae (fam.) 5. 745
Lariosaurus
Balsamoi 0. 734
Lasmogyra 2. 117*
Lasmophyllia 2. 117*
Lastraea gen. 3. 761
Dalmatica 5. 637
Fischeri 5. 637
Helvetica 5. 637
Oeningensis 5. 637
pulchella 5. 637
Styriaca 5. 637; 9. 871, 873
Lastrea vid. Lastraea
Lasur 2. 519
Lasurstein 2. 686*; 3. 620
Latereschara
gen. 4. 115!
Laterit 5. 855
Lateroflustrella gen. 4. 117!
Lateroflustrellaria
gen. 4. 117*
Lateromultelea
Ranvilleana 5. 634
Lsterotubigera
Bajocensis 5. 635
straminea 5. 634
verticillata 5. 634
Lates gibbus 5. 380
Heberti 5. 235
Partschi 6. 481*
Latistellati (Cidaridae) 7. 121
Latomaeandra
gen. 0. 758, 760; 2. 117*, 119
agaricites 4. 868
angulosa 4. 868
asperrima 4 868
astroides 4. 868
Ataciana 0. 760; 2. 377
Bertrandi 3. 606
brachygyra 4. 868
concentrica 4. 868
corrugata 0. 760
Davidsoni 8. 358
Edwardsi 0. 760; 2. 378
Flemingi 8. 357
linearis 8. 591
morchella 4. 868
Pelissieri 8. 591
plicata 0. 760
Raulini 0. 760
Sequana 8. 591
Soemmeringi 0. 760
tenuisepta 4. 868
spp. 2. 758
Latonia Seyfriedi 5. 622
Latrobit 1. 442*; 4. 598!
Latusastraea 2. 118
Lauka-Steine 6. 213!
Laumontit 1. 156*; 4. 28, 423; 5. 822; 6. 11
Laurentian 3. 495
-System 8. 854
Laurinium 0. 633
Laurophyllum
Beilschmiedioides 3. 434
Haasioides 3. 434
viburnifolium 3. 434
Laurus 0. 633
agathophyllum 4. 491; 6. 505; 9. 375, 502
benzoidea 2. 754
Brauni 3. 504
Bruckmanni 0. 505
Canariensis 8. 757; 9. 253
Carolinensis 9. 506
dermatophyllum 2. 754 9. 501
dulcis 3. 683
Fürstenbergi 0. 505; 3. 504; 9. 502
glaucoides 6. 505
Guiscardii 9. 117, 873
Lalages 3. 631; 4. 379; 9. 374, 376
nectandraefolia 6. 505

Laurus
obovata 2. 754; 3. 504; 4. 627; 9. 502
ocoteaefolia 2. 628; 9. 374
pachyphylla 4. 877
phoeboides 2. 628; 4. 379
primigenia 2. 754; 3 384, 503; 4. 252; 9. 374, 502².
princeps 9. 117, 502, 873
protodaphne 2. 754; 6. 623
styracifolia 2. 754; 3. 504; 9. 502
Swoszowicianus 1. 128; 2. 628; 3. 384; 6. 252; 9. 502
tetrantherioides 4. 379
tristaniaefolia 2. 754 6. 505
Lava 0. 3 ff., 231, 446, 455, 803; 1. 558, 725; 2. 315!; 486 ff, 570, 704!, 7. 22; 9. 299!, 314, 832, 842!
limacciosa micacea 7. 606
-Blöcke 2. 574
-Ergüsse 7. 591; 9. 633
-Gesteine 2. 666
-Kugeln 3. 684
-Ströme 1. 847; 2. 571
Lavadero (Waschwerk) 5. 205
Lavendulan 4. 344
Lavezstein 8. 73!
Lazar-Gänge 6. 717
Lazulith 4. 345; 5. 186, 348! 825; 9. 302*
Lazur-Feldspath 8. 690*
Lazurstein 8. 688*
Leadhillit 2. 519; 4. 453‖! 9. 302
Lebenwesen in der Atmosphäre 0. 248!
Leberkies 3. 262
Lebias
cephalotes 2. 304*; 5. 374; 7. 554*
crassicauda 2. 999
Meyeri 2. 252, 969; 7. 554
Lecanocrinus gen. 5. 251!
calyculus 5. 248, 251
macropetalus 5. 248, 251
ornatus 5. 248, 251
simplex 5. 248, 251
spp. 9. 236
Leclaire
-Kalkstein 9. 342
Lecythocrinus gen. 8. 372
Eifelanus 8. 372
Leda (Arachn.)
gen. 5. 120
promissa 5. 123
Leda (Acephal.)
gen. 6. 871
Acasta 4. 765
acuminata 6. 456, 871
Ahrendi 6. 649
alpina 9. 629
Althi 6. 872
Anglica 6. 872
angustidentata 6. 872
arata 9. 851
attenuata 6. 649, 871
bellatula 6. 649
bellistriata 9. 506
birostrata 6. 649
brevirostris 6. 649
Bronni 8. 643, 644!
caelata 6. 229
carinata 6. 649
caudata 2. 1004
clavata 6. 649
claviformis 6. 649
complanata 6. 456
Deffneri 7. 93, 94, 452, 629
delta 6. 649
dense-mammillata 9. 506
Deshayesana 9. 536
Deslongchampsi 6. 852
Diana 6. 852, 872
Doris 6. 872
Dunkeri 6. 872
Eastnori 6. 649
Escosurae 5. 98
fornicata 6. 649
fragilis 6. 872
fusiformis 6. 256
gigantea 6. 872
grandaeva 6. 649
Jugleri 6. 649
Kasanensis 6. 649
Krachtae 6. 649
lacryma 4 765; 6. 872
lanceolata 2. 1004; 6. 872
Leda latissima 6. 649
levata 6. 649
leiorhyncha 6. 649
lineolata 6. 649
longirostris 6. 649
Moreauensis 8. 495
Moreana 8. 484
Morrisi 6. 872
mucronalis 6. 872
mucronata 4. 765; 6. 872
multilineata 6. 230
Murchisoni 6. 649
myalis 2. 1004
Nicobarica 6. 872
nuculaeformis 9. 506
oblonga 6. 649, 872
Oppeli 8. 354, 643
ovum 6. 872
palmae 6. 649
pandoraeformis 9. 506
parunculus 6. 650
pella 6. 872
pernula 2. 1004; 6. 872
Phillipsi 0. 723; 6. 872
plana 6. 649
pulchella 6. 649
pulchra 6. 872
pygmaea 2. 1004; 6. 872
Romana 6. 454
Rosalia 6. 872
rostralis 6. 852, 872
scapha 6. 872
securiformis 6. 649
semistriata 2. 1004; 6. 872
solenoides 6. 649
speluncaria 6. 650; 7. 637
stilla 6. 649
striata 6. 872
subcarinata 6. 649²
subclaviformis 6. 872
subovalis 6. 872
subscitula 8. 349, 716
tenuirostris 6. 872; 7. 210; 8. 643
thraciaeformis 2. 1004
truncata 2 1004
tumida 6. 373; 6. 649
undulata 6. 872
ventricosa 8. 495
Verneuili 6. 649, 871
Vinti 3. 126; 4. 118, 748; 6. 650; 7. 637
Westendorpi 6. 872

Leda Woodana 6. 872
Zieteni 6. 872
spp. 6. 752, 871
Ledophora
gen. 3. 868, 875!
producta 3. 868, 874
Ledum 0. 634
Legnonotus gen. 5. 870!
Cothamensis 5. 870
Legumen
appressum 9. 498
ellipticum 9. 498
Leguminaria
Petersi 4. 869
Leguminosites 0. 637
Dalbergioides 4. 83
ingaefolius 2. 628
machaerioides 2. 628; 4. 627
Pyladis 9. 873
rectinervis 3. 506
Seyfriedi 3. 506
Vivianii 4. 627
Lehm 0. 355
Lehuntit 6. 197
Leiacanthus
Opatowitzanus 6. 745
Tarnowitzanus 6. 745
Lejeunia
serpyllifolia 3. 745
Leiobunum
longipes 5. 124
sarapum 5. 124
Leiocidaris gen. 7. 122; 9. 255
Leiodon gen. 2. 762*
anceps 2. 381; 3. 164; 5. 233, 744; 9. 361
stenodon 7. 625
spp. 7. 109
Leiopathes 2. 122*
Leiopyge 3. 488
Leiostoma spp. 6. 477
Leit-Muscheln 6. 634, 850 ff.; 8. 582
Leit-Pflanzen
der Perm-Formation 8. 502
der Tertiär-Zeit 9. 378!
Leitha-Formation 0. 223; 9. 844
-Sand 6. 751
-Kalk 7. 421; 8. 765; 3. 89; 8. 336!
Leitungsfähigkeit
galvanische 3. 697
Lemmus fossilis 5. 371
Lenne-Schiefer 5. 49
Lenticulites
complanatus 6. 101
Leonhardit 2. 524
Lepadidae
(fam.) 8. 620
Britische 2. 639!
Lepadocrinus
gen. 9. 236, 237
Lepas balanus 7. 117
Strömia 7. 117
tintinnabulum 7. 117
Leperditia
gen. 3. 104!; 7. 745!
alta 7. 745; 8. 756
amygdalina 8. 756; 9. 636
Anna 8. 756; 9. 636
arctica 7. 745; 8. 756
Balthica 4. 85, 86; 7. 745[2]
Britannica 3. 102; 7. 745
Canadensis 8. 756; 9. 636
fabulites 7. 745; 8. 756; 9. 636
gibbera 7. 745; 8. 756
gracilis 9. 636
marginata 7. 746; 8. 756
Ottawa 9. 636
ovata 8. 756
Pennsylvanica 8. 756
permiana 9. 761
Solvensis 7. 746
Leperditiidae
(fam.) 7. 746
Lepiconus gen. 8. 743
Lepidaster gen. 7. 748!
Forbesi 7. 747
Lepidetron
pubescens 5. 125
Lepidium
pisciculus 5. 125
Lepidocaris gen. 1. 506
Lepidocentrus gen. 6. 636
Eifelanus 6. 636!; 7. 860; 8. 372
Lepidodendreae
(fam.) 5. 240
Lepidodendron
gen. 0. 629; 9. 804
acerosum 5. 631
aculeatum 0. 264; 5. 631, 868; 6. 96, 98[2]
Lepidodendron
Anglicum 5. 631
appendiculatum 0. 264
Beyrichi 8. 402
Bloedei 1. 609
brevifolium 6. 98
caudatum 5. 868
Charpentieri 5. 868
confluens 0. 264; 5. 868
crassifolium 6. 98
crenatum 5. 631[2], 868; 6. 98[2]; 7. 165
cristatum 0. 265
dichotomum 5. 631, 868; 6. 98; 8. 402
elegans 6. 98; 7. 113; 8. 402; 9. 835
fastigiatum 1. 105
fusiforme 6. 98
Gaspeanum 9. 755
Goeppertanum 6. 98
gracile 6. 98; 7. 113
Haidingeri 6. 98
hexagonum 2. 891; 5. 243
iubricatum 0. 265; 5. 631, 868
lanceolatum 5. 631
laricinum 5. 243, 631; 8. 626
Lindleyanum 8. 402
lycopodioides 6. 98
Manebachense 5. 868
marginatum 5. 868
Mileckii 1. 476; 5. 631
nothum 6. 627; 8. 384
obovatum 1. 109; 5. 868; 6. 98
ornatissimum 1. 609
politum 9. 849
quadrangulare 5. 868
quadratum 5. 868
Richteri 5. 240; 6. 627
rimosum 5. 631, 868; 6. 98
rhombicum 5. 868
rugosum 5. 868
selaginoides 5. 631
sexangulare 2. 891
squamosum 2. 891
Steinbeckanum 5. 868; 8. 402
Sternbergi 5. 631; 6. 98
tetragonum 1. 476; 5. 243

Lepidodendron
undulatum 0. 264; 5. 631, 808; 6. 98; 8. 402²
Veltheimanum 5. 868
spp. 4. 743; 9. 379, 381
Lepidoderma gen. 6. 483!
granosum 6. 483!
Imhofi 8. 93; 9. 760
Lepidoidei (fam.) 9. 766
Lepidoides (fam.) 9. 823
Lepidokrokit 5. 823
Lepidolith 2. 848
Lepidophyllum 0. 629
acuminatum 5. 243, 631
binerve 6. 98
caricinum 0. 661, 673
intermedium 5. 631
lanceolatum 0. 672; 5 631
majus 5. 243, 631
tetragonum 5. 631
trinerve 5. 631
undulatum 5. 631
Veltheimanum 5. 243
spp. 9. 379, 381
Lepidophloyos 0. 629
crassicaule 5. 868
laricinum 5. 868; 6. 98; 7. 766
lepidophyllifolium 5. 868
obovatum 5. 868
rugosum 9. 849
spp. 9. 381
Lepidopides gen. 2. 980!
brevispondylus 2. 980
dubius 2. 981; 9. 844
leptospondylus 2. 980
longispondylus 9. 844
Lepidoptera (class.) 6. 765
Lepidosiren gen. 8. 760*
Lepidosteus gen. 3. 117*; 8. 760*
Suessonensis 5. 234
spp. 1. 713, 714; 7. 342
Lepidostrobus 0. 629
Brongniarti 5. 631; 8. 625
comosus 5. 631; 8. 625
emarginatus 8. 625
giganteus 8. 625
lepidophyllaceus 5. 631
lepidophyllatus 8. 625
major 5. 631; 8. 625
ornatus 5. 631; 8. 625
Lepidostrobus
pinaster 8. 625
undulatus 8. 625
variabilis 5. 631; 8. 201, 625; 9. 149
spp. 9. 381
Lepidotus
gen. 3. 118*, 132*
acutirostris 1. 183
breviceps 5. 862
Deccanensis 4. 640; 5. 862
giganteus 7. 815
gigas 1. 183; 3. 117
Haydeni 7. 115; 8. 376
longiceps 5. 862
Maximiliani 1. 183; 5. 234
minor 1. 183; 3. 117*, 8. 847
notopterus 1. 183
oblongus 1. 183, 496
occidentalis 5. 115, 376
ornatus 8. 6
parvulns 8. 6
primaevus 5. 868
speciosus 8. 6
sulcatus 2. 981; 9. 42
spp. 4. 382; 7. 88; 8. 748; 9. 42, 764
Lepisma
argentatum 5. 124
dubium 5. 124
Lepolith 1. 441!, 4. 600, 601; 8. 313
Leproconcha gen. 6. 364!
paradoxa 6. 364; 7. 760
Leptacanthus
Jenkinsoni 6. 123
junceus 6. 123
remotns 1. 608
spp. 8. 748
Leptaena gen. 3. 212!
acutistriata 8. 753
alata 2. 584
alternata 3. 340; 6. 118
analoga 6. 118
antiquata 6. 118
arachnoidea 6. 118; 7. 594
Beirensis 5. 98
Bielensis 6. 256
bifida 6. 256
Bischofi 6, 256; 8. 753
Bouchardi 3. 210
Leptaena
Bronni 6. 509
Cancrini 6. 118
caperata 6. 118
caudata 6. 509
clathrata 3. 103
compressa 6. 118
concentrica 9. 847
convexa 5. 852
convoluta 6. 626
corrugata 6. 118
crassistria 6. 118
crenistria 2. 340; 6. 118
cylindrica 6. 118
deltoidea 2 981; 5. 98; 6. 118
demissa 2. 252; 3. 213
depressa 2. 192, 340, 935; 3. 344, 812; 5. 852; 6. 118, 509
dilatata 2. 934
Dutertrei 1. 68; 2. 340, 3. 103, 816; 6. 501
euglypha 2. 926, 934, 981; 5. 853; 6. 118, 226
excavata 6. 118
explanata 6. 509
filosa 6. 118
Fischeri 3. 103
fragaria 6. 374
funiculata 6. 118, 226
Gaulthieri 3. 103
gigas 6. 118
Goldfussi 6. 117
grandis 6. 118
granulosa 3. 210
Hardrensis 6. 118
ignava 5. 98
imbrex 5. 852; 8. 594
interstrialis 2. 934; 3. 812; 6. 509
irregularis 2. 192; 6. 509
Kellyi 6. 118
laevigata 6. 118
lata 2. 581, 925, 934; 6. 118; 8. 269
laticosta 2. 584; 6. 374, 509
Leblanci 3. 103
lepis 2 192; 6. 509
Lhwydi 3. 103
liasina 3. 210
Lonsdalei 3. 103
Maestreana 2. 340
membranacea 2. 581; 3. 818

Leptaena
mesacosta 6. 736
minima 6. 118; 8. 754
Moorei 3. 210
Murchisoni 1. 105, 669; 2. 340, 925, 834; 3. 103; 6. 501, 509; 7. 220
Naranjoana 2. 340; 6. 509
nebulosa 8. 753
neutra 8. 753
nobilis 6. 118
nodulosa 6. 509
papilionacea 6. 118
Pearcei 3. 210
pecten 6. 118
pelargonata 6. 118
Phillipsi 6. 226, 501²
polita 3. 211; 6. 118
Polleti 3. 102
polytricha 6, 256
productoides 2. 928, 934, 935
profunda 8. 855
quinquecostata 6. 118; 8. 594
rostrata 5. 509
rugosa 2. 268; 6. 374, 509
sarcinulata 2. 108
scabricula 3. 814
Sedgwicki 2. 927, 934; 6. 501, 509
semiradiata 7. 389
senilis 6. 118
sericea 2. 981; 3. 344; 6. 501; 118; 8. 594²
signifera 6. 509
simulans 6. 118
sinuata 6. 118
solitaria 8. 753
sordida 6. 118, 374
Sowerbyi 8. 753
spinulosa 0. 243
spiriferoides 6. 118
squamosa 2. 1004
subaculeata 6. 118
submininima 3. 211; 6. 118
subplana 8. 855²
subtetragona 6. 256
subtransversa 6. 509
tenuicincta 3. 216; 6 118
tenuissime-striata 6. 118
Leptaena
transversalis 3. 344; 4. 61, 504; 6. 118, 226; 8. 855
umbraculum 6. 118
ungula 6. 118
Uralensis 6. 118
Verneuili 8. 753
vetusta 8. 753
spp. 5. 248
Leptagonia
gen. et spp. 6. 118
ungula 3. 216
Leptarctus gen. 8. 255!
primus 8. 255!, 376
Leptastraea
gen. 0. 763, 764; 2 118*
Leptauchenia
decora 7. 115; 8. 376
major 7. 854!; 8. 376
Leptocheles gen. 1. 506; 3. 629!
leptodactylus 3. 629
Murchisoni 3. 342*, 629
spp. 4. 2; 8. 715
Leptochoerus
spectabilis 7. 115, 244!; 8. 376
Leptocranius
longirostris 6. 760
rostro-major 9. 109
Leptocyathus 2. 115*
spp. 1. 627
Leptodactyloidea
(trib.) 9. 867
Leptodomus
gen. 6. 642, 645
amygdalinus 6. 120, 642
constrictus 3. 111; 6. 120
costellatus 3. 238; 6. 120
globulosus 6. 120
impressus 6. 120, 642
truncatus 6. 120
undatus 6. 120, 642
spp. 1. 253
Leptolepis gen. 3. 118*
concentricus 0. 119
sprattiformis 5. 614; 6. 604
spp. 4. 382; 9. 764
Leptomeria
distans 4. 379
divaricata 6. 505
flexuosa 4. 379
gracilis 4. 379
Evansi 8. 376, 877
Lepton
deltoideum 2. 1004
depressum 2. 1004
nitidum 2. 1004
spp. 9. 125
Leptophyllia gen. 4. 871!
clavata 4. 868
irregularis 4. 868
Leptoplastidae
(fam.) 4. 493
Leptoplastus spp. 4. 493; 6. 223
Leptopsammia 2. 119
Leptorhynchus
Clifti 6. 760
Leptoria
gen. 0. 761!; 2. 117*
antiqua 0. 761
delicatula 4. 868
Koninckı 4. 868
phrygia 0. 761
patellaris 4. 868
Leptosaurus gen. 6. 759
Leptoscelis
humata 7. 555; 9. 115
Leptoseris 2. 119*
fragilis 2. 377
Leptosmilia 2. 116*
Leptoteuthis gen. 4, 852
gigantea 9. 369, 370
gigas 9. 370
spp. 9. 369
Leptotherium
majus 9. 100
minus 9. 100
Leptoxylon
vid. Leptoxylum
Leptoxylum 0. 629
geminum 6. 98
Leptynit 0. 73*; 7. 357*
Lepus gen. 7. 872*
cuniculus 5. 225, 371
diluvianus 5. 225, 371; 9. 862
Issiodorensis 5. 225
Lacostei 5. 371
loxodus 2. 998; 5. 225
Neschersensis 5. 225
priscus 5. 225
sylvaticus 9. 496
Lestes vicina 9. 115
Lestodon
gen. 6. 232*; 7. 225!
armatus 6. 233; 7. 225
myloides 6. 233; 7. 225
Lesquereuxia
gen. 5. 755

Lethaea
geognostica 4. 855; 6. 634!
Rossica 2. 757; 3. 123; 4. 110!
Lettenkohle 2. 53; 3. 10; 5. 757; 6. 59
Lettenkohlen
-Fauna 3. 221
-Formation 3. 220p.; 7. 749gp.; 8. 142, 143
-Gruppe 6. 615 gp.; 8. 720
Leuchtenbergit 0. 691; 2. 704*; 6. 560!
Leucippe
Oweni 5. 371
Leuciscus
brevicauda 4. 623
bubalus 4. 623
elegans 4. 623
gibbus 1. 80; 7. 110
heterurus 5. 622
latiusculus 5. 622
macrurus 4. 623
Oeningensis 5. 622; 8. 373
papyraceus 2. 987; 4. 623; 7. 555
puellaris 4. 623
pusillus 5. 622
Stephani 4. 164
tarsiger 4. 623!
spp. 3. 685
Leukophan 3. 185!; 7. 583!
Leuzit 1. 389*, 558, 604; 2. 535; 3. 260; 5. 560!; 8. 69!, 291!, 686!
-Augit-Lava 7. 737*
-Gesteine 9. 832
-Laven 7. 361!; 8. 70!
Lias 0. 481, 589; 2. 983p.; 3. 420 ff., 530; 4. 356ff., 552*, 794; 5. 43, 746p., 843; 7. 460, 747p., 849, 850!; 7. 142 p.; 9. 13
(Gliederung) 0. 143 ff.
Parallel-Gliederung 9. 94
-Anthrazit 8. 220
-Flora 4. 854
-Formation 0. 405, 411; 1. 39; 4. 369; 5. 364, 463;
Lias
-Formation 6. 207, 454!, 491 g.p., 673, 718, 732p.; 7. 2, 204, 206, 206, 211,, 213, 469, 594, 612, 614, 696, 698, 858; 8. 296, 721, 725, 9. 133, 263, 344, 349, 370p., 385!; 851
-Grenzbreccie 8. 353
-Insekten 2. 983
-Insel
im Aargau 2. 983
-Kalk 9. 395!
-Kohle 6. 357
-Periode
Flora 0. 111!; 2. 885
-Sandstein 5. 214; 7. 207. 211, 213; 9. 7,. 390 !ff
-Saurier 5. 494
-Schiefer 0. 355; 9. 825
Liasien
(terrain) 1. 617; 4. 850; 6. 749; 9. 94, 371p.
Libocedrites 0. 632
ovalis 3. 746
salicornioides 2. 753; 3. 226, 746; 4. 495, 632; 9. 123
Libocedrus
Chilensis 3. 746; 4. 632
salicornioides 5. 638
Libellen 0. 20*
Libellula
Brodiei 0. 18*, 4. 132
dislocata 0. 119*; 4. 122
Doris 9. 118
Perse 6. 503
Libellulium
Agrias 5. 747
Kaupi 5. 747
Libethenit 5. 351
Lichas
gen. 0. 777, 785; 3. 487; 6. 224
angusta 9. 864
Barrandei 1. 255
Bucklandi 1. 255
conico-tuberculata 9. 864
Darlecarlica 9. 121
deflexa 9. 121
Lichas
Eichwaldi 9. 121, 864
Gothlandica 9. 864
granulosa 6. 256
Grayi 1. 255
Heberti 4. 122
hirsuta 1. 255
Hispanica 6. 500
Hübneri 5. 852
incola 7. 638
laciniata 6. 808
laticeps 9. 121
laxata 6. 116
margaritifera 9. 121
ornata 9. 121
palmata 3. 341
platyura 9. 121
propinqua 6. 116
Salteri 1. 255
sexlobata 6. 256; 8. 753
verrucosa 5. 852; 9. 121
spp. 4. 493; 5. 249
Lichenalia gen. 1. 767!
concentrica 1. 767
spp. 5. 248
Lichenodes
priscus 2. 258; 6 225
spp. 9. 504
Lichenopora
Phillipsi 5. 635
Lichia
prisca 5. 380, 381*
Lichidae (fam.) 4. 493
Liebenerit 2. 492, 535; 3. 602!; 9. 566!, 586
Liebethenit 2. 520
Lieferungen von Insekten und Pflanzen verkäuflich 4. 321
Lievrit 0. 58!, 705; 7. 719*; 9. 84
Lignit 1. 473, 734; 4. 211, 518; 5. 819; 6. 242, 732; 8. 95, 224, 281, 350; 9. 870
vgl. Braunkohlen
-Formation 5. 745
-Gebirge 2. 998
Lignite
Soisconnais 2. 882
Ligula (Nyst)
gen. 6. 859
alba 6. 859; 7. 506
donaciformis 7. 506
Lillia 0. 636

Lillit 9. 77!
Lima
acuticostata 7. 210
(acutilineata) 9. 498
alata 2. 229
alticosta 4. 851
amoena 6. 496
angusta 4. 869
antiqua 6. 208
antiquata 6. 217
aviculata 4. 851
bellula 4. 765; 8. 356
beta-calcis 6. 743
canalifera 0. 727, 728, 299; 8. 874
cardiiformis 4. 765
carinata 3. 318; 7. 785, 786
Carolina 1. 101
compressa 6. 496; 7. 210
concinna 0. 99
coronata 1. 410!, 419; 9. 629
costata 0. 99; 9. 359
Cottaldina 3. 617
crenulicosta 0. 101
decorata 4. 205; 6. 71; 8. 226
decussata 4. 108
dentata 6. 496; 7. 210; 8. 643
depunctata 9. 19
duplicata 1. 486; 2. 229, 349; 4. 765, 851; 7. 210; 8. 482; 9. 134
edula 6. 496
Electra 8. 356
elegans 9. 228
elongata 2. 188; 8. 874
exaltata 6. 496
exilis 2. 1004
expansa 0. 314
fallax 4. 851
Fischeri 6. 496
Galatea 6. 850
gibbosa 2. 349; 4. 621, 765
gigantea 0. 172; 2. 343, 349; 3. 530; 4 851; 6. 496; 7. 210, 211, 617; 8. 643; 9. 22, 629
globosa 9. 359
Hausmanni 4. 851
Helvetica 8. 482
Lima
Hermanni 0. 181; 1. 337; 4. 851; 6. 217, 456, 496; 9. 16ff.
heteromorpha 6. 211
Hettangiensis 6. 496
hians 2. 1004
Hoperi 7 787
impressa 4. 765
inaequicosta 8. 226
inaequicostata 1. 410!, 419; 3. 318; 9. 629
inaequistriata 6. 71; 8. 643
intermedia 2. 174; 6. 206
interpunctata 3. 23, 29
interstincta 7. 133
laeviuscula 1. 486; 2. 229
Lavizzarii 5. 480
lineata 0. 99, 485; 2. 912, 943; 3. 23, 29; 6. 363; 9. 359
longa 2. 188, 189; 7. 659, 677
longissima 5. 480
Loscombei 2. 1004
Luciensis 4. 765
lunaris 1. 486
lunularis 2. 229
lyrata 8. 356
minutissima 2. 229
multicostata 0. 94, 299; 2. 29; 8. 474
Neptuni 8. 753
nodulosa 6. 496; 7. 210
notata 2. 229; 7. 133; 8. 356
obscura 2. 349
Omaliusi 4. 851; 6. 496
ornata 8. 356
ovalis 1. 486; 2. 229; 3. 318; 4. 765; 8. 356, 874; 9. 629
ovata 2. 1004
pectiniformis 4. 765; 9. 134
pectinoides 8. 354, 643
Perezi 3. 605
permiana 4. 119, 747; 5. 498; 7. 637; 8. 745
plana 2. 189
plebeja 4. 851; 6. 496
Lima
plicata 2. 229
plicatula 2. 1004
praecursor 9. 455, 629
proboscidea 1. 484, 486; 2. 343, 349; 3. 816; 4. 765, 851
producta 3. 318
punctata 1. 410, 417, 419, 486; 2. 229; 3. 318; 4. 851; 6. 496; 7. 210. 698, 743; 8. 226, 643; 9. 16
punctatella 2. 229
pusilla 4. 747
radiata 2. 943; 3. 23, 29
Ramshaueri 5. 501
raricosta 0. 481
Rhotomagensis 6. 206
rigida 2. 288
rigidula 7. 133
semicircularis 3. 318; 4. 765, 851; 6. 211; 8. 356; 9. 629
semireticularis 2. 288
semisulcata 9. 228, 847
simplex 4. 546
squamicosta 2. 229
squamosa 2. 43; 5. 796
Stabilei 5. 479, 480
striata 0. 99, 485; 1. 649; 2. 25, 909, 912ff., 943; 3. 13, 23, 29, 167, 223; 4. 483; 5. 479, 480; 6. 245, 818; 7. 694; 9. 144, 359
striatissima 4. 869
succincta 8. 643
subaequilateralis 2. 174
subauriculata 2. 1004; 3. 756
subrigida 2. 188
substriata 1. 417, 419; 2. 349; 3. 318
sulcata 2. 349; 8. 356
tecta 4. 108
tecticosta 8. 354
tegulata 2. 349
tuberculata 6. 496; 8. 643
truncatifrons 0. 481
unistriata 3. 605

Lima
varians 0. 871
Wacoensis 0. 101
spp. 2. 977; 4. 249; 8. 384
Limaria 2. 121
spp. 5. 248; 7. 104
Limagne-Faunula 5. 370
Limatula
ovata 2. 1004
subauriculata 2. 1004
Limea gen. 6. 228
duplicata 6. 229; 8. 356; 9. 133, 134
Koninckana 4. 851
Limestone of the lower lias shale 0. 145
Limonit 2. 524ff.
Limnacis
succini 6. 620
Limnadia
Freysteini 9. 149
Limnadiidae
(fam.) 7. 746
Limnaea s. Limnaeus
Limnaeus
acuminatus 3. 147
Adelina 9. 217
angustus 4. 865
arenularius 4. 865
attenuatus 9. 750
auricularis 1. 760; 6. 594
Bouilleti 5. 746
bullatus 2. 765; 9. 137
caudatus 4. 864
cinctus 4. 865
columellaris 1. 713; 4. 865
convexus 4. 865
costellatus 4. 865
diaphanus 8. 494
elongatus 7. 729
fabula 0. 861; 3. 751; 4. 865
fuscus 6. 332
fusiformis 1. 712, 713; 4. 865
gibbosulus 4. 865
gracilis 2. 637
longiscatus 0. 799: 1. 712, 713, 714; 4. 864
maximus 4. 864
minimus 4. 865
minutus 3. 534, 763
mixtus 4. 865
Limnaeus
Nebrascensis 8. 494
obtusissimus 8. 875
ovalis 6. 594
ovatus 9. 475
oviformis 9. 750
ovum 4. 865
pachygaster 3. 751; 6. 332; 9. 137
palustris 1. 122*; 3. 751, 763; 8. 589
parvulus 5. 768
peracuminatus 9. 750
pereger 3. 763; 4. 832; 9. 475
peregrinus 8. 875
politus 1. 122*; 8. 589
pyramidalis 1. 713, 714; 4. 864
rectus 4. 865
socialis 6. 332
spina 9. 750
stagnalis 1. 760; 6. 594
subfusiformis 9. 750
sublatus 4. 865
subovatus 2. 765
subpalustris 0. 800; 5. 768
subquadratus 4. 865
sulcatus 4. 865
tenuicosta 7. 494; 8. 494
tenuis 4. 865
truncatulus 3. 763
tumidus 4. 865
turritus 4. 249
velutinus 8. 875
spp. 6. 750; 8. 847; 9. 114
Limneus vdr. Limnaeus
Limnobia
Murchisoni 6. 503
Limonit 2. 529; 3. 260
-Sandstein 7. 50, 235
Limopsis gen. 6. 873
aurita 2. 359, 1004; 6. 873; 7. 52
complanata 4. 870; 6. 873
Goldfussi 6. 533, 873
granulata 6. 873
minima 6. 873
minuta 2. 359
oblonga 6. 873
oolithica 4. 766; 6. 873
parvula 8. 495
Petschorae 6. 873
pygmaea 2. 1004; 7. 510
Reinwardti 6. 873
Limopsis
semiaurita 6. 873
texturata 9. 228
spp. 6. 873
Limulites
Bronni 4. 123
Limuloides gen. 8. 126*
Limulus
spp. 5. 614; 9. 751
Linarit 2. 852!; 9. 188*
Lindackerit 4. 450!; 6. 83
Lineare
Parallel-Struktur 7. 795ff.
Linguati
(Goniatitae) 1. 546!
Lingula gen. 3. 256!
acutangula 0. 103
anatina 4. 61, 504
antiqua 2. 981; 3. 447; 8. 497, 711
attenuata 6. 81, 118; 7. 639
Beani 3. 210; 4. 504; 6. 852; 9. 34
bicarinata 2. 109
brevirostris 8. 496, 697
Brimonti 4. 221
calcarea 3. 21
cloacina 9. 13
cornea 6. 81, 118; 8. 624, 625, 715; 9. 340, 507
Credneri 4. 119, 489; 6. 118; 7. 382. 637; 8. 844
crumena 6. 81
curta 6. 118
Davidsoni 7. 454
Davisi 3. 216; 5. 871; 6. 118
donaciformis 0. 860
Dumortieri 4. 504, 507
elliptica 6. 118
Fischeri 5. 502
fusca 4. 507
granulata 6. 118
Hawkei 4. 221
keuperea 3. 21
Koninckí 6. 509
Kurri 8. 643, 644!
lata 6. 118
latior 3. 211; 6. 118
Lesueuri 4. 221
Lewisi 6. 118
longissima 6. 118

Lingula
Longoviciensis 4. 851
minima 8. 715
Mortieri 4. 89
Murchisoni 3. 103
mytiloides 4. 507, 745; 7. 637
nana 5. 865; 9. 66
ovata 6. 118
ovalis 4. 508; 8. 488
obtusa 6. 118
paralleloides 6. 374
prima 2. 981; 3. 447; 8. 497
pusilla 5. 865
quadrata 8. 594; 9. 342
Raulinana 4. 508
sacculus 4. 851
spatula 6. 509
squamiformis 6. 118
subdecussata 6. 373
subovalis 4. 508; 7. 482
subparallela 6. 374
subspatulata 7. 864; 8. 495
sulcata 7. 639
tenera 9. 371
tenuigranulata 3. 216; 6. 118
tenuis 4. 507
tenuissima 0. 99; 2. 943; 3. 21, 29; 6. 616; 7. 759, 760; 9. 170, 359, 383²
transversa 3. 21
truncata 4. 508; 7. 482
umbonata 9. 849
spp. 1. 382; 5. 248; 9. 504
-Flags 3. 97; 5. 871p.; 6. 112; 9. 105
-Schiefer 7. 729, 730
Lingulidae
(fam.) 3. 256; 4. 61!, 504
Lingulina
gen. 5. 755; 7. 377
carinata 2. 893
costata 7. 378
papillosa 7. 378
rotundata 7. 378
Link'sche
Sammlung 3. 578
Linopteris
Gutbierana 9. 630
Linoptes
oculeus 2. 124
Linseit 1. 441!; 4. 600! 601
Linthia gen. 4. 499!
irregularis 9. 844
insignis 4. 499
spatangoides 4. 499
Linyphia
cheiracantha 5. 122
oblonga 5. 122
Liodesmus
gen. 9. 764, 767
gracilis 9. 767
sprattiformis 9. 767
Liodon (Leiodon)
anceps 5. 742
Liostracidae (fam.) 4. 493
Liostracus
spp. 4. 493; 6. 224
Liquidambar 0. 633
acerifolium 9. 501
affine 4. 627
Europaeum 0. 504; 2. 628, 753; 3. 227, 504; 6. 505, 506; 8. 498, 501; 9. 117, 501
incisum 3. 504
Italicum 4. 627
protensum 3. 504
Scarabellianum 4. 627
Seyfriedi 0. 505; 3. 504; 9. 501
Tiberinum 4. 627
spp. 8. 740
Liriodendron 0. 635
Helveticum 3. 505
Procaccinii 3. 505; 4. 627
spp. 3. 328
Liskeard
slate 3. 97; 6. 112
Lissocardia
magna 6. 746
Silesiaca 6. 746
Listera gen. 6. 859
Listriodon
Larteti 5. 225; 7. 249
splendens 0. 203; 7. 248!; 9. 175, 355
Lithactinia 2. 118
Litharaea 2. 119*
Amelïana 3. 876
asbestella 3. 74
bellula 3. 876
Deshayesana 3. 876
Litharaea
Desnoyersi 3. 876
Gravesi 3. 876
Heberti 3. 876
ramosa 3. 876; 7. 502
Websteri 3. 876
spp. 1. 627
Lithasteriscus
fasciculatus 6. 104
fistulosus 6. 104
globulus 6. 104
radiatus 6. 104
reniformis 6. 104
tribulus 6. 104
tuberculatus 6. 104
Lithion-Feldspath 6. 440
Lithobius
brevicornis 5. 121
longicornis 5. 121
maxillosus 5. 121
octops 5. 121
oxylophus 5. 121
planatus 5. 121
pleonops 5. 121
scaber 5. 121
spinulosus 5. 121
striatus 5. 121
Lithocampe
radicula 6. 104
Lithocharis
varicolor 6. 502, 503
Lithodendron 2. 122
articulatum 0. 759
caespitosum 0. 238; 1. 608; 2. 192; 6. 375
clathratum 9. 629
compressum 2. 250
cylindricum 0. 170
dianthus 2. 116*
dichotomum 0. 759; 1. 144, 145, 146, 414; 2. 299; 3. 299, 312, 431; 4. 558; 5. 176, 178; 6. 821; 9. 629
Edwardsi 0. 760
elegans 2. 250
Eunomia 0. 759
exiguum 0. 757
fasciculatum 7. 373
flabellum 0. 759
flexuosum 2. 145, 167, 170
funiculus 0. 760
Fusinierii 7. 233
gemmans 0. 762

Lithodendron
gibbosum 2. 250
gracile 0. 760
granulosum 0. 762
humile 0. 757, 762
irregulare 7. 233, 373
intricatum 0. 762
laeve 0. 759
manipulatum 0. 762
Meyeri 2. 250
Moreausiacum 0. 760
multicaule 0. 762
multistellatum 2. 250
parasitum 0. 767
plicatum 0. 760; 2. 299; 3. 299; 4. 532
pseudoflabellum 7. 233
pseudostylina 0. 759
ramulosum 0. 762
subdichotomum 0. 759; 1. 141; 3. 299, 318
sublaeve 0. 759
trichotomum 0. 184
virgineum 2. 250
-Kalk 1. 145; 2. 459. 594; 7. 617
-Schichten 5. 219
Lithodesmium
undulatum 0. 473
Lithodomus
Archiaci 4. 231
arenicola 6. 495
attenuatus 2. 230
Ciplyanus 3. 231
cordatus 7. 220
Hannoniae 3. 231
Jeckinsoni 3. 760
inclusus 4. 765
modiolus 3. 231
orbiculatus 3. 231
parasiticus 4. 765
pyriformis 3. 231
similis 3. 231
sublithophagus 7. 229
suborbiculatus 3. 231
Waterkeyni 4. 851
spp. 8. 384
Lithodontium
furcatum 0. 249; 4. 613
rostratum 0. 249; 4. 613
scorpius 4. 613
Lithographische
Schiefer 2. 832; 3. 72, 749 p.; 4. 51 ff., 577; 5. 328 p., 740 p., 763 p.; 6. 418 p., 825 p.; 7. 366 p., 533 p.;
Lithographische Schiefer 8. 366 p.; 622 p.; 9. 108 p., 354 gp., 381 p., 763 p.
Lithographus gen. 9. 869
cruscularis 9. 869
hieroglyphicus 9. 869
Lithologie 8. 539!
Lithomesites
ornatus 4. 739
Lithopera
Rossica 6. 104
Lithophagus
priscus 6. 363
Lithornis
emuinus 5. 220
vulturinus 7. 634
Lithosphaera
grammostoma 6. 104
osculata 6. 104
reniformis 6. 104
Lithosphaeridium
irregulare 4. 739
spp. 5. 471
Lithostachys
gen. 8. 639
alpina 8. 640
Lithostrotion (-tium)
gen. 2. 122; 3. 877
antiquum 6. 375
basaltiforme 3. 877; 9. 222
caespitosum 6. 375
elegans 2. 109
emarciatum 1. 608
floriforme 1. 609; 7. 373, 374; 8. 98
mammillare 1. 608
oblongum 2. 758
spp. 2. 990
Lithostrotium
s. Lithostrotion
Lithostylidium
catena 4. 739
clavatum 4. 613
clepsammidium 6. 104
curvatum 4. 613
denticulatum 4. 613, 739
furca 0. 489
laeve 4. 613
ovatum 4. 739
piscis 4. 739
quadratum 4. 739
rude 0. 249; 4. 613, 737, 739
sinuosum 4. 613
trabecula 4. 739
Lithostylidium
trapeza 4. 739
Litiopa papillosa 3. 764
Litogaster gen. 4. 51*
venusta 6. 367
Litorina alata 6. 372
alta 6. 363; 7. 760
Arduennensis 7. 209
cancellata 5. 253
clathrata 6. 454, 494; 7. 209; 8. 643
corallii 6. 121
Dunkeri 9. 360
Giebeli 9. 360
Göpperti 7. 761; 9. 360
helicina 7. 638
Hercynica 7. 638
Kneri 6. 363; 7. 760
Koninckana 7. 209
Liskaviensis 6. 363; 7. 760
litorea 1. 621 ff.; 3. 764; 4. 196; 7. 754
lyrata 6. 372
macrostoma 6. 372
Mancuniensis 4. 749; 7. 638
minima 4. 750
monastica 8. 875
nana 2. 228
neritoides 7. 509
nodifera 7. 866
Octavia 6. 121
palliata 7. 509
Piedroana 7. 242
purpurea 6. 372
rudis 7. 509
Schüttei 6. 363; 7. 760
suboperta 3. 764; 7. 509
subrugosa 6. 372
sulcata 1. 716; 4. 196
Tunstallensis 4. 749; 7. 638
undifera 6. 121
spp. 1. 253; 6. 750; 7. 865
Litorinella
acuta 0. 800; 1. 676; 2. 434 ff., 765; 3. 135, 137, 532; 6. 332, 333, 421; 8. 607; 9. 137
Draparnaudi 3. 327
globulus 6. 332

Litorinella
granulum 3. 327
inflata 2. 432 ff.; 8. 607
obtusa 8. 200
obtusata 3. 327
Litorinellen-Lalk 2. 433, 587; 3. 130, 136!, 482; 6. 333, 578; 8. 607
-Schichten 9. 121
Lits coquilliers 9. 228
Lituaria 2. 123
Lituites gen. 4. 853; 6. 126, 316; 8. 235!
Angelini 8. 236!
angulatus 6. 126
articulatus 6. 122
Breyni 8. 236!
convolvens 8. 236, 594
cornu-arietis 6. 122; 8. 236
intermedius 6. 500
lituus 3. 123; 8. 594
perfectus 8. 236
simplex 5. 258, 284
sinuatus 8. 236
undatus 8. 618*
undulatus 8. 236
spp. 4. 3 ff.
Lituola gen. 5. 755
Lituus
perfectus 9. 860
Llanberis
-Slate 3. 97; 6. 112
Llandeilo
-Flags 1. 104; 4. 124, 486, 487
-Gruppe 2. 259
Llandovery-rocks 9. 339
Lobelia
venosa 8. 498
Lobocoenia 2. 117*
Lobophyllia gen. 0. 758!
alveolaris 7. 233
calyculata 7. 233
contorta 3. 369; 6. 93; 7. 233
formosissima 7. 233
hyberna 7. 233
pseudo-Rocchettina 7. 233
pulchella 7. 233
semisulcata 6. 451
succincta 7. 233
Lobophyllum 2. 121
Lobopsammia 2. 119
cariosa 2. 251
Lobularia 2. 123
Lölingit 2. 531; 3. 694; 5. 823
Loliginites
coriaceus 9. 370
Loligo gen. 4. 852
alatus 5. 613
antiquus 5. 608
Bollensis 2. 642*
coriaceus 2. 642
Mentzeli 0. 99
priscus 2. 642; 5. 613; 9. 370
subsagittatns 9. 370
Loligopsis gen. 4. 853
Lomatia Oceanica 2. 750
pseudo-ilex 2. 750; 9. 374
reticulata 2. 750; 4. 379
Swanteviti 2. 750; 7. 614; 9. 374
synaphaeaefolia 2. 750; 9. 376
Lomatoceras
priodon 1. 125; 2. 246; 4. 126
Lomatophloyos 0. 629
crassicaule 0. 106; 6. 98
macrolepidotum 5. 868
Lomatus Hislopi 9. 750
Lonchidit 0. 701!
Lonchidium gen. 8. 238!
inaequale 8. 238
Lonchocephalus
spp. 9. 504
Lonchodomas 6. 224
spp. 4. 493
Lonchopteris
Germari 8. 372
Mantelli 0. 112; 7. 99
London-clay 2. 882; 3. 612; 4. 507 p.; 7. 503 p.; 9. 747
London-Thon 3. 190; 4. 761 p.; 9. 240 p.
Reptilien 2. 379
Longmynd
Group 6. 112
Lonsdal[e]ia 2. 120, 122*
crassiconus 6. 114
duplicata 6. 114
rugosa 6. 114
stylastreiformis 6. 114
spp. 2. 990; 7. 104
Lophelia 2. 116, 249, 250
Lophiochoerus
Blainvillei 7. 249
Lophiodii (fam.) 0. 867
Lophiodon gen. 7. 869
anthracoideus 0. 879; 5. 226
Aurelianensis 5. 226
d'Avarais 5. 226
Buxovillanus 0. 740, 879; 5. 226
Cesserasicus 0. 879; 2. 998; 5. 226
de Digoin 5. 226
du Laonnais 7. 488
du Soissonnais 7. 488
Duvali 5. 226
eocaenus 5. 226
de Gannat 5. 226
giganteus 5. 226
hyracinus 5. 226
Isselensis 0. 879; 5. 226
du Laonnais 7. 488
leptognathus 5. 226
de Limagne 5. 226
mastolophus 5. 226
medius 0. 879; 5. 226; 7. 845
minimus 0. 879; 5. 226
minutus 0. 879; 2. 360; 5. 226
Monspeliensis 5. 226
de Nanterre 5. 226
Occitanicus 0. 879; 5. 226
d'Orléans 5. 226
Parisiensis 5. 226; 7. 490
parvulus 0 879; 5. 226
Prevosti 5. 226
tapiroides 0. 879; 1. 501; 3. 740; 5. 226
Tapirotherium 0. 879; 5. 226
Vismaei 5. 226
Lophiomeryx
Chalianati 5. 373
Lophiotherium
gen. 5. 226
cervulus 0. 878
Lophius spp. 9. 494
Lophobranchi (ord.) 3. 240*
Lophoctenium
gen. 2. 374; 3. 628; 4. 125!
comosum 4. 125
Lophocrinus gen. 8. 59!
speciosus 8. 59!
Lophohelia 2. 116*, 249

Lophoit 3. 62
Lopholepis
gen. spp. 2. 125, 126!; 3. 348; 5. 635; 8. 112
Schmidti 8. 112
Lophonotus
hystrix 5. 121
Lophophyllum
spp. 2. 990
Lophoseris 2. 119*
spp. 2. 377
Lophosmilia 2. 116*
Lophosteus gen. 8. 113
superbus 8. 113
Lophotherium
spp. 4. 84
Loricaria gen. 4. 114
Loricula gen. 4. 114
Mac-Adami 8. 508
pulchella 2. 633
Loricoidea (fam.) 9. 867
Loripes
divaricatus 2. 1004
Losima (Thon) 7. 605
Löss 0. 790; 1. 728, 730!; 2. 971; 4. 166, 196; 6. 552; 7. 609; 8. 590; 9. 37, 202*, 212, 744
-Kindchen 3. 534; 8. 859
Löthrohr 2. 80; 9. 303
-Proben 8. 829
-Reaktionen 1. 198
Lottia parvula 3. 765
Lower Coal 0. 158
Greensand 0. 416
Loxechinus
gen. 7. 122; 9. 255
Loxoceras
gen. 6. 126!
Breyni 6. 122
laterale 6. 122
Sowerbyi 6. 122
Loxodon gen. 8. 378!
meridionalis 8. 379; 9. 816, 870
priscus 8. 379
Loxoklas 1. 444; 4. 594!, 599; 6. 194!
Loxonema
acutestriatum 9. 356
carinatum 9. 506
costatum 6. 372
Danvillense 9. 506
elegans 5. 501; 6. 121
fasciatum 4. 118, 750; 6. 121; 7. 638; 8. 766
funatum 6. 256
fusoides 8. 768
fusus 8. 768
Geinitzanum 3. 126; 4. 750; 7. 638
Halli 7. 116; 9. 827
Hehli 8. 768
Hennahanum 2. 930
impendens 6. 121
leprosum 8. 768
Mac Clintocki 9. 222
minutum 9. 506
Newberryi 9. 506
nexilie 6. 121
nodosum 9. 506
nudum 9. 356
obliquum 9. 356
oblique-arcuatum 6. 37
peracutum 9. 356
politum 9. 506
pulchellum 9. 356
reticulatum 5. 501; 6. 372
Roessleri 5. 498; 7. 638; 8. 745
Rossi 9. 222
rugiferum 6. 121
scalaroideum 6. 121
sinuosum 0. 243
strigillatum 9. 356
subulatum 6. 372
Swedenborganum 4. 750; 7. 638
tenuicarinatum 9. 506
tenuistria 6. 121
tumidum 6. 121
Urei 4. 750
vincta 7. 863
Yandellana 7. 863
spp. 1. 253
Lozero (Gestein) 6. 69
Lucernaria 2. 123
Lucina gen. 6. 863
acclinis 6. 752
Aegyptiaca 7. 229
aequalis 6. 863
affinis 1. 764; 6. 864; 7. 229
Agassizi 6. 864
albella 0. 861, 862; $6.\ 863^2$
aliena 6. 863
Altavillensis 6. 863
alveata 6. 752
ambigua 3. 605; 6. 863
ampliata 8. 486
angulata 6. 863
anodonta 6. 752
antiqua 2. 192
antiquata 6. 863. 864; 7. 53
antiquissima 6. 863
Apisidis 1. 764; 7. 229
arenacea 6. 495
astartea 6. 864
Basteroti 6. 864
Bellona 4. 766
bialata 1. 764; 7. 229
borealis 2. 1004
Brocchii 6. 864
Bronni 6 533
candida 6. 864
Caramanensis 5. 594
cardioides 4. 766; 6. 863
Cariensis 5. 844
carinifera 6. 752
circularis 6. 863
circinnata 3. 74
columbella 2. 1004; 5. 514, 595; 6. 717, 864; 8. 861
commutata 0. 862; 6. 864
concentrica 6. 863
contorta 1. 101, 764; 3. 605; 7. 229
cortracta 6. 752
Corbarica 0. 487; 6. 356, 863
cordiformis 6. 864
crassa 4. 766
Credneri 6. 363; 9. 360
crenulata 2. 1004; 6. 752
cribraria 6. 752
curvi-radiata 4. 506
cycloidea 1. 764; 7. 229
declivis 2. 924, 933; 6. 863
decorata 2. 1004
dentata 3. 74; $6.\ 864^2$
Deshayesi 0. 129
despecta 1. 486; 2. 230; 4. 766
digitalis 4. 506; 6. 864

Lucina
divaricata 1. 712, 714; 3. 74, 605; 4. 515; 6. 717, 863, 864; 8. 516, 861
dolabra 6. 752
Dufresnoyi 6. 863
Dujardini 6. 864
Dunkeri 6. 863
Dupinana 6. 863
duplicata 6. 863
edentula 6. 864
elegans 3. 605; 6. 863
elliptica 3. 756
exigua 6. 864
Fittoni 6. 863
Flandrica 4. 515
flexuosa 3. 756; 6. 864
Foremani 6. 752
Fortisana 1. 764; 6. 863; 7. 229
fragilis 6. 864
Galeottiana 6. 863
gigantea 3. 605; 6. 863
gibbosula 6. 863, 864
globiformis 6. 863
globosa 6. 863, 864
globularis 6. 864
globulosa 5. 475; 6. 864
Goldfussi 6. 863
Goodhalli 6. 863
grata 1. 101; 3. 369, 605; 6. 739
Grateloupi 6. 864
Griffithi 6. 863
Heberti 6. 863; 7. 845; 9. 138
hiatelloides 3, 74; 6. 864; 7. 204
Hisingeri 6. 797, 863
Jamaicensis 6. 752, 864
incrassata 6. 864
inflata 1. 764; 7. 229
intuspunctata 5. 844
irregularis 6. 864
lactea 6. 864[2]
laevis 6. 871
lamellosa 6. 864
lens 6. 864
lenticularis 0. 293; 6. 864
leonina 3. 74; 5. 594; 6. 717, 864; 8. 861; 9. 854
liasina 6. 863
lineata 2. 933; 6. 863
lyrata 0. 871; 2. 230; 4. 766: 5. 95; 6. 863; 8. 357
Menardi 1. 764; 7. 229
metastriata 6. 752
minima 4. 749; 7. 637
miocaenica 6. 864
Mississippiensis 6. 752
mitis 1. 715; 6. 863
modesta 6. 752
multilamellata 6. 864
multistriata 6. 752
mutabilis 3. 605; 6. 863
neglecta 3. 74; 6. 864
nivea 6. 864
obliqua 6. 863[2]
obtusa 5. 435
occidentalis 8. 495
orbicularis 1. 764 6. 863, 864; 7. 229
ornata 3. 74; 6. 864
Osiridis 1. 764; 7. 229
pandata 6. 752
parvula 6. 864
pecten 6. 864
Pennsylvanica 2. 509; 4. 717
perlevis 6. 752
Pharaonis 7. 229
Phillipsana 6. 863
plana 6. 852
plebeja 6. 363, 365; 7. 760
plicato-costata 0. 480; 4. 80
pomilia 6. 752
Portlandica 6. 863; 8. 488
prisca 8. 269
proavia 0. 228; 2. 192
problematica 6. 495; 8. 643
profunda 6. 863, 864
pulchella 6. 863
pulvinata 1. 712
radians 6. 752
radula 1. 741; 4. 515; 6. 864
rectangularis 6. 372
Reichi 6. 863[2]
renulata 6. 863[2]
Rigautana 8. 516
rotundata 4. 766; 6. 863[2]; 7. 133
saxorum 6. 863[3]
scopulorum 5. 594, 844; 6. 864
sculpta 1. 738; 6. 863
sinuosa 1. 764; 7. 229
Sismondai 6. 864
solenoides 3. 74
solidula 6. 863
Sowerbyi 6. 863
spinifera 3. 756; 7. 864
spuria 6. 864
squamosa 6. 752, 863; 9. 138
squamula 6. 863, 864
striatula 0. 862; 6. 864; 7. 845
subobliqua 6. 752
subpisum 5. 592
subplanata 6. 752
subscopulorum 3. 74; 9. 839
subundata 7. 864; 8. 495
subvexa 6. 752
sulcata 6. 863
sulcosa 6. 863
supracretacea 1. 101
symmetrica 6. 752
Taurina 6. 864
tenuistria 0. 861; 6. 533, 863; 7. 743
Thierensi 0. 861; 6. 863
tigerina 2. 509; 6. 864
transversa 6. 864
trigonula 6. 864
trisulcata 6. 752
uncinata 0. 861; 6. 863[2]
undata 6. 864
undula 6. 752
undulata 4. 515
unguis 6. 864
unicarinata 5. 435
unioniformis 6. 863
Vogti 5. 475
Volderana 6. 863
vulnerata 6. 864
spp. 1. 382; 2. 977; 6. 861, 864; 9. 125
Lucinopsis
Lajonkairei 2. 1004
trigonellaris 9. 34
undata 7. 510
Lucuma
Scheuchzeri 9. 502[2]
Ludlow-bonebed 8. 625, 715
-group 3. 97; 6. 112; 8. 594

Ludlow-Gruppe 2. 581
-Rock 1. 104; 6. 112; 8. 715
Luft
in Mineralwasser löslich 7. 472
-Gebilde 1. 808
s. Atmosphärische G.
-Druck
den Schmelzpunkt verändernd 8. 492
-Gehalt
im Meerwasser 0. 708
-Temperatur
sekulärer Wechsel 5. 554
-Vulkane 5. 465
Lumachelle 6. 216; 7. 605, 617
Lumbricaria
filaria 5. 613
Hoeana 8. 373
intestinum 5. 613
Lunatia
rectilabrum 9. 498
Lunulicardium
ventricosum 6. 372
spp. 6. 865
Lunulites gen. 4. 115!
Androsaces 6. 93, 740; 7. 499
Bellardii 3. 606
bimarginatus 6. 245
conicus 4. 117
Cuvieri 4. 117
radiatus 1. 716; 2. 461
subplenus 7. 499
umbellatus 4. 116
urceolatus 4. 117
Vandenheckei 3. 606; 4. 117
spp. 2. 125
Lupus primigenius 4. 638
spp. 9. 93
Lutra
Bravardi 5. 229, 371
Clermontensis 5. 229
dubia 5. 229
Elaveris 5. 229
mustelina 5. 371
Pontica 9. 862
Valetoni 5. 229, 371, 372
vulgaris 2. 998; 5. 229; 6. 574
Lutraria
carinifera 6. 858
Lutraria
compressa 7. 506
convexa 6. 716, 858
crassidens 6. 858
decurtata 7. 744
donacina 6. 857
elliptica 2. 43; 5. 595; 7. 507
elongata 2. 159, 169; 5. 848; 6. 643, 648
gibbosa 2. 159; 169; 7. 744
gurgitis 3. 231; 4. 755
Jurassi 2. 349
latissima 6. 858
ovalis 4. 755
oblata 6. 858
primaeva 6. 645, 648
prisca 6. 643, 648
recurva 2. 160, 169; 4. 755
rugosa 2. 43; 6. 858; 7. 510; 8. 839
Sanna 4. 520
similis 2. 160, 169
solenoides 2. 160, 169; 4. 514; 7. 858; 7. 510
speciosa 2. 159, 169
transmontana 7. 853
Traskei 7. 242
vetula 4. 658
spp. 6. 858
Lychnocanium
Rossicum 6. 104
Lyckholmische
Schicht 8. 594
Lycophrys
ephippium 0. 240, 242
expansus 0. 240, 242
scabrosus 0. 240
spp. 0. 364
Lycopodiaceae
(fam.) 5. 240; 8. 110
Lycopodiolithes
arboreus 8. 135
piniformis 5. 631
selaginoides 5. 631
Lycopodites 0. 629
acicularis 2. 891
affinis 1. 476
Bronni 0. 91
denticulatus 5. 868
dilatatus 5. 243
elongatus 5. 868
filiformis 1. 476; 6. 543, 666
Lycopodites
Gutbieri 5. 631
leptostachys 5. 868
macrophyllus 5. 868
Milleri 8. 384
pinastroides 6. 627
piniformis 1. 476; 5. 631; 6. 543
primaevus 5. 868
selaginoides 5. 631
Sickleranus 9. 849
stachygynandroides 5. 631
Stiehleranus 2. 891
taxinus 5. 868
Lycopodium spp. 1. 382
Lycoptera gen. 1. 768!
Middendorffi 1. 768
Lycotherium
ferreo-jurassicum 1. 501
sidero-mollassicum 1. 501
Lydit 5. 51 ff.; 9. 577
Lyellia 2. 120*
Lygaeites
acutus 3. 873
lividus 3. 873
obsoletus 3. 873
ovalis 3. 873
pusillus 3. 873
Lygaeus
atavinus 3. 873
dasypus 3. 873
Deucalionis 3. 873
fossitius 7. 555; 9. 115
tinctus 3. 870, 873
ventralis 3. 873
Lygodium
acrostichoides 5. 637
angulatum 5. 637
Gaudini 5. 637
Kargi 5. 637
Laharpei 5. 637
Lymnadiae
(fam.) 1. 510; 6. 115
Lymnaeus vdr. Limnaeus
Lynceus gen. 5. 126
Lyonsia 3. 111, 113; 6. 119, 858
alata 6. 642
amygdalina 6. 642
anatiniformis 6. 642
angustata 6. 643, 644, 647
anodontoides 6. 642
antiqua 6. 642
arcuata 6. 643, 647

Lyonsia
attenuata 6. 643
aviculoides 6. 643
Biarmica 6. 643, 646
bicarinata 6. 643
Britannica 3. 102
carinifera 4. 672
centralis 6. 643, 648
clavata 6. 643, 645
concava 8. 349
concinna 6. 643
contracta 6. 643
corrugata 6. 643
Coyana 6. 643, 649
curta 6. 642
cylindrica 6. 643
dubia 6. 643, 652
elongata 6. 643
faba 6. 642
Germari 0. 294
gibbosa 6. 642
gigantea 6. 643
Hallana 6. 642
impressa 6. 642
Kutorgana 6. 643, 645
laevigata 6. 643, 647
lyrata 6. 643, 647
minima 6. 643
minor 6. 643, 646
modiolaris 6. 643
mytiloides 6. 642
nasuta 6. 642
Normanana 6. 642, 654
nuculiformis 6. 642
obducta 6. 852
oblonga 6. 643
obsoleta 6. 642
Omaliana 6. 643, 645
ovata 6. 643
parallela 6. 642
phaseolina 6. 643, 647
prisca 6. 643, 644
Lyonsia
quadrata 6. 643
retusa 6. 642
rigida 6. 643, 647
Roemeri 6. 643
rotundata 6. 644
sanguinolaridea 6. 642
securiformis 6. 643
semisulcata 6. 642
sinuata 6. 643
socialis 6. 643
soleniformis 6. 643, 647
Sowerbyi 6. 643, 646
subangustata 6. 643, 645, 647
subattenuata 6. 643, 645
subaviculoides 6. 642
subcuneata 6. 643
subimpressa 6. 643
sublata 6. 642
submodiolaris 6. 642
subnasuta 6. 642
suboblonga 6. 643; 7. 628
subspatulata 6. 642
substriatula 6. 643
subtruncata 6. 642
subtumida 6. 643
tellinaria 6. 643, 647
terminalis 6. 642
Trentonensis 6. 642
truncata 6. 643
tumida 6. 643, 645, 647
undata 6. 642
unioides 6. 456
Verneuili 6. 643, 647
vetusta 6. 642, 643
spp. 7. 632
Lyriodon
gen. 3. 126; 6. 871
aliformis 0. 366
Lyriodon
elavatus 4. 370
concentricus 4. 355
conocardiiformis 1. 384
costatus 4. 766
Curionii 8. 125
curvirostris 5. 245
deltoideus 3. 25; 5. 245; 7. 760
elegans 8. 383
excentricus 6. 871
Goldfussi 2. 109
Herzogi 1. 384
Kefersteini 0. 733; 8. 2, 125
laevigatus 3. 25; 5. 245
limbatus 4. 870
litteratus 4. 766
navis 0. 225, 1. 419; 3. 319; 6. 871
Okeni 2. 109; 8. 124
orbicularis 3. 25; 5. 245
ovatus 3. 25; 5. 245
scaber 6. 871
simplex 5. 245
sulcatarius 6. 871
sulcatus 6. 871
transversus 6. 616
ventricosus 1. 384
vulgaris 6. 616; 7. 760
Lyriocrinus gen. 5. 250!
dactylus 5. 248, 250
spp. 9. 236
Lyrodesma
pulchella 6. 649
plana 6. 119, 649
Lyrodon
laevigatus 6. 363
Okeni 8. 124, 125
vdr. Lyriodon
Lysianassa litterata 7. 74

M.

Macacus
eocaenus 7. 120
pliocaenus 7. 120
Macaria ovata 5. 122
procera 5. 122
squamata 5. 122
tenuis 5. 122
Macellodus Brodiei 5. 237!
Macha
strigillata 7. 506
Machaeracanthus
gen. 8. 118
Machaeracanthus
spp. 8. 118
Machaerius
gen. 8. 870!
Archiari 8. 870!
Larteti 8. 870!
Machaerodus
gen. Kaup 5. 118!, 372
cultridens 5. 230; 9. 270
latidens 5. 230, 372; 9. 100
Machaerodus
leoninus 4. 638; 5. 375; 7. 234, 370, 759; 9. 270
palmidens 5. 230
primaevus 5. 115, 118; 8. 376, 877
spp. 9. 870
Machairodus (Kaup)
v. Machaerodus
Machairodus (Pisc.)
gen. Pand (non Kaup) 8. 112

Machairodus
angustus 8. 112
canaliculatus 8. 112
dilatatus 8. 112
ensiformis 8. 112
inaequalis 8. 112
incurvus 8. 112
planus 8. 112
rhomboideus 8. 112
solidus 8. 112
Machefer 0. 702!
Macigno 0. 305, 743!; 2. 998; 3. 92, 369; 5. 45 ff., 7. 203, 598
-Sandsteine 6. 91
-Schiefer 3. 574, 577
Maclure[i]a gen. 2. 1003
Logani 9. 635
macromphala 3. 232; 6. 121
magna 6. 121; 8. 351
Peachi 9. 338
Macrauchenia
gen. 6. 232*; 7. 224, 869
Patagonica 3. 752
Macrobiotus
Hufelandi 0. 250
Macrocephalen
-Schicht 0. 165, 182; 8. 484, 582²
Macrocephalus
gen. 3. 764
Macrochelys
mira 8. 297!
Macrocheilus
vid. Macrochilus
Macrochilus 6. 121
acutus 6 121; 9. 827
arculatus 5. 322; 6. 372; 7. 457
brevispiratus 3. 760; 6. 121
Charmelaisi 3. 102
curvilineus 6. 121
fusiformis 6. 372
inhabilis 7. 116; 9. 827
limnaeiformis 3. 760; 6. 121
Michotanus 6. 121
ovatus 6. 372
sigmilineus 6. 121
spiratus 6. 121; 8. 766
subclathratus 6. 372
symmetricus 4. 750; 6. 121; 7. 637
ventricosus 6. 121, 372
Macrochirus olifex 6. 742
Macrodon
gen. 4. 766!; 6. 120
Hirsonensis 0. 871; 2. 230; 4. 765; 9. 134
striatus 7. 637
Macromiosaurus
Plinii 0. 734
Macrophoca
gen. 7. 856!
Atlantica 7. 856!
Macropneustes
Deshayesi 4. 120, 121
pulvinatus 7. 859; 9. 844
Macropoma
Egertoni 8. 237
Mantelli 5. 623
speciosum 8. 751
Macropterna gen. 9. 868
divaricans 9. 868
gracilipes 9. 868
rhynchosauroidea 9. 868
vulgaris 9. 868
Macropus gen. 9. 246
Ajax 9. 246
Anak 9. 246
Atlas 9. 246
Titan 9. 246
Macrorhipis
gen. 9 764, 767
Münsteri 9. 767
striatissima 9 767
Macrorhynchus
Meyeri 7. 534
spp 1. 355
Macrosaurus
gen 0. 255!; 5. 744
Macrosemius gen. 3. 117*
spp. 4. 382; 9. 764
Macrospondylus
gen. 5. 106
Bollensis 0. 324; 6. 760
Macrostylocrinus
gen. 5. 251!
ornatus 5. 248, 251
spp. 9. 236
Macrotherium
giganteum 5. 230
Pentelicum 7. 370!
Renggeri 7. 845
Sansaniense 5. 230
spp. 3. 106; 4. 637, 638; 5. 375
Macrotracheli
(fam.) 5. 745
Mactra alboria 7. 241
alta 8. 495
arcuata 7. 507
artopta 7. 507
biangulata 8. 738
congesta 7. 507
constricta 7. 507
corallina 6. 859
cuneata 6. 858²; 7. 507
crassatella 7. 507
deaurata 7. 507
deltoides 6. 858³; 8. 738
delumbis 6. 752
depressa 1. 715; 6. 648, 858
Diegoana 7. 241, 242
Erebea 6. 858
Euxinica 7. 507
formosa 8. 495
glauca 6 859; 7. 507
helvacea 7. 507
inaequilatera 7. 507
incrassata 6. 648
lactea 6. 858
lisor 6. 859
magna 7. 507
modicella 7. 507
minutissima 4. 505
obtruncata 7. 507
ovalis 7. 507
ovata 6. 648
Podolica 7. 623; 8. 738
ponderosa 6. 752, 858; 7. 623; 8. 738
procrassa 7. 507
Saussurei 8. 488
securiformis 4. 636; 6. 495
semisulcata 6. 858
solida 2. 194 f.; 4. 36, 196, 7. 507
striata 7. 507
striatella 6. 858
stultorum 6. 859; 7. 507
substriatella 3. 74
subtriangula 3. 74
subtruncata 3. 756; 6. 859; 7. 507
tenuis 7. 404, 405!
Texana 6. 480
triangula 3. 74; 4. 528; 5. 607; 6. 858; 8. 584
triangularis 4. 505
triangulata 7. 510

Mactra
trigona 1. 412; 3. 319; 6. 363
tripartita 6. 858
truncata 7. 507
Tschihatscheffi 5. 594
Warrenana 8. 495
spp. 6. 599, 858; 7. 632
Mactracea
(fam.) 6. 858
Mactrina
minutissima 4. 505
triangularis 4. 505
Mactroidea
triangularis 4. 505
Mactromya
gen. 6. 250!
brevis 6. 250
gibbosa 0. 150, 180
globosa 1. 480; 2. 230
liasina 7. 211
litoralis 6. 250
mactroides 6. 250
rugosa 4. 355; 8. 488
tenuis 6. 250
Mactropsis
spp. 6. 752
Macularia
spp. 8. 507
Madenstein 5. 505
Madracis 2. 251!
Madremacchia 7. 594*
Madrepora 2. 119*
arachnoides 0. 766
coalescens 2. 251
elephantopus 2. 377
glabra 3. 369; 6. 93²
limbata 2. 252
Meyeri 2. 250
organum 2. 122
palmata 2. 250
porpita 2. 376, 377
raristella 9. 844
Taurinensis 9. 844
tubulosa 7. 233
turbinata 2. 121
Madreporacea
(fam.) 6. 113
Madreporen 2. 860*
Madreporites
porpita 2. 377
Maeandrastraea
gen. 0. 765, 766; 2. 118*
Maeandrina
gen. 0. 761!; 2. 117*
agaricites 0. 761
Maeandrina
ambigua 0. 766
angigyra 9. 844
antiqua 0. 761
Arausiaca 0. 766
Ataciana 0. 760; 2. 377
Bellardii 0. 761
bicarinata 7. 233
bisinuosa 0. 759
Bronni 2. 109
cerebriformis 0. 759
collinaria 7. 233
corrugata 0. 760
costata 7. 233
cristata 7. 233
Edwardsi 0. 760; 2. 378
filograna 0. 761
filogranaeformis 7. 233
fimbriata 7. 233
infundibuliformis 7. 233
Koninckl 0. 761
labyrinthica 0. 761
lamello-dentata 0. 760
lobato-rotundata 3. 369
macroreina 0. 759
Michelini 4. 868
montana 0. 760
polygonalis 7. 233
phrygia 0. 761
profunda 0. 760; 3. 369; 6. 93
Pyrenaica 0. 761
radiata 0. 761
Raulini 0. 760
reticulosa 0. 761
rostellina 0. 761
Salisburgensis 4. 868
Salzburgana 0. 761
scalaria 7. 233
serpentinoides 7. 233
Soemmeringi 0. 760
stellata 7. 233
stellifera 0. 759; 7. 233
subcircularis 7. 233
sublabyrinthica 7. 233
tenella Gr. 0. 761
tenella Mchn. 0. 761
venustula 0. 761
vermicellaris 2. 378
vetusta 0. 761
Maeandrophyllia 2. 118*
Maeonia gen. 1. 383!
Maesa
protogaea 4. 379
Maffeija (gen.)
cerotophylloides 7. 777
Magas gen. 3. 255!
orthi[di]formis 4. 504
pumila 5. 60, 504, 508; 7. 116, 482
truncata 4. 508
Magdeburger
Sand 3. 625; 8. 102
Magilus
antiquus 5. 387*
Magma,
plutonisches 7. 354!
Magnesia
-Augit 3. 658
-Bisilikat 1. 693*
-Glimmer 6. 348!
-Kalk 4. 710; 7. 89; 8. 351, 710; 9. 351
-Karbonat 1. 596
-Olivin 4. 451!
-Silikate 1. 693*
Turmalin 1. 596; 8. 699!
Magnesiaeisen
-Turmalin 8. 699!
Magnesian
-Conglomerat 1. 104
-Limestone 1. 104
Magnesit 6. 44!, 182!, 436!
Magnet-Berg
auf St.Domingo 5. 89
von Blagodat 2. 738
von Katschkanar 2. 738
-Wirkungen auf Krystalle 1. 450
Magneteisen 0. 343, 451; 1. 396*. 400*, 556, 559; 2. 875, 877, 879, 880; 3. 260, 464!, 476, 711; 4. 20, 69; 5. 823; 6. 267; 7. 65, 172; 9. 80*, 193*, 731
künstlich 3. 178!
-Erz 0. 338
-Lagerstätten 4. 843
Magneteisenstein 1. 328, 331; 2. 523; 8. 783, 794
Magnetismus
der Felsarten 1. 723
der Gesteine 1. 555!
der Mineralien 5. 838
Magnetische Kraft
der Gesteine 1. 723
Krystalle 1. 704
Polarität 4. 615

Magnetisches
Schwefeleisen 3. 838!
Magnetkies 0. 432, 694!; 2. 531, 615; 3. 262; 5. 69, 824; 8. 695!; 825*; 9. 82
Magnisellares (Goniatitae) 1. 537,547
Magnolia 0. 635
attenuata 2. 754
cor 8. 498
crassifolia 2. 894; 3. 227
Cyclopum 6. 505
Hoffmannia 8. 498
Magnoliastrum
arcinerve 3.435; 4.631
Michelioides 3. 435; 4. 631
Taulamoides 3. 435; 4. 631
Magnosia 7. 122
spp. 7. 852
Mahoning
-Sandstein 9. 849
Majanthemophyllum
athejinum 7. 776
petiolatum 2. 753
rajanaefolium 4. 252
Majanthemum
petiolatum 2. 993
Mainzer
Tertiär-Becken 4.421; 5. 187, 545
Majolika
-Marmor 6. 216
Makit 6. 699
Malachit 1. 386*, 391*. 398*, 463, 596; 2. 332, 519, 853*; 4. 672, 787; 5.575*, 822; 6. 582; 7.550; 8. 697, 852; 9. 289
Malacographia
Maderensis 5. 507
Malacozoorum
Generum indicis supplementa 3. 218
Malakolith 2. 879; 3.468*; 8. 700²*
Malakon 1. 179, 696; 2. 660; 4. 178!; 5. 513 ff.
Malière
(Gestein) 6. 848; 7. 469
Mallotus gen. 3. 118*
villosus 7. 248
Mallrickor 0. 34!
Malocystites gen. 9. 636
Barrandei 9. 636
Murchisoni 9. 636
Malpighia
glabraefolia 6. 505
Malpighiastrum 0. 635
byrsonimaefolium 9. 376
Dalmaticum 3. 510
giganteum 4. 252
Junghuhnanum 3. 435; 4. 631
lanceolatum 2. 754; 4. 627; 6. 252; 9. 376
Mammalia
Klassifikation 5. 877
von Nebrasca 5. 111
Mammalian
Crag 4. 505p., 507p.
Mammaliferous
Crag 4. 505p., 507p.
Mammillaria 0. 630
Mammillipora
mammillaris 4. 743
Mammont 3. 122, 322
Mammoth
Coal bed 9. 849
Mammut-Zeit 9. 349
Manatus gen. 7. 869
antiquus 7. 855!
fossilis 1. 492; 5. 231; 8. 529
Guettardi 1.492; 5. 231
spp. 0. 746; 2. 763; 5. 113; 8. 520*
Mandelstein 1. 557, 559, 563; 8. 170, 823
-Bildungen 1. 859!
-Porphyr 3.386!; 6.665
Mangan 6. 582
-Amphibol 0. 448!
-Augit 0. 447!; 3. 176
-Blende 6. 557; 7. 394!
-Chromit 1. 692*
-Erze 4. 92, 466*! 8. 330, 596; 9. 298*
-Bildung 5. 856
-Lagerstätten 4.718*; 7. 168; 8. 596
-haltiger Bleiglanz 5. 832!
-Idokras 1. 89!
-Karbonat 1. 596
-Kiesel 5. 822; 6. 40
-Mineralien 4. 179!
-Peridot 0. 448!
Mangan-Schaum 4. 404
-Spath 3. 476
-Turmalin 1. 596; 8. 699!
-Wagnerit 9. 191!
-Zinkspath 2. 69!
Manganese
Bisilicate of 0. 447
Ferrosilicate of 0. 447
Sesquisilicate of 0.447
Manganhydroxyd 1. 557, 559
Manganit 0. 191; 2. 291*, 520
Manganoxydhydrat 4. 93
-Bildung 5. 432
Manganoxydul
-Bildung 5. 430
Manganoxydulhydrate 0. 447!
Manicaria
formosa 5. 639
Manicina
gen. 0. 761!; 2. 117*
amaranthum 0. 760
areolata 0. 761
Hemprichi 0. 760
Manis gen. 4. 111
Manon
capitatum 0.170; 8.873
macrostoma 1. 744
mammillare 4. 743
marginatum 2. 349
porosum 7. 233
Manopora
gen. 2. 120; 3. 877
Manrésien
(étage) 9. 470
Mantellia
megalophylla 2. 887
nidiformis 2. 887
Manto
(Seifenwerk) 5. 205
Marantoidea
arenacea 6.618; 8.140
Marattiaceae
(fam.) 6. 98
Marbre
griotte 1. 331; 3. 569; 6. 368
Marcellus
-Schiefer 3. 817; 6. 368
Marcuinomys
gen. 5. 225; 7. 876
Margarit 2. 848; 4. 819!; 7. 331!

Margarita
elegantissima 3. 764
helicina 3. 765
maculata 3. 765
trochoidea 3. 765
undulata 7. 509
Margaritana
Wetzleri 2. 765
Margaritatus
-Bett 6. 456
Margarodit 4. 816!
Marginaria
gen. 4. 115!, 117
spp. 2. 125
Marginella
albilabris 6. 753
bifido-plicata 7. 635
crassilabris 6. 753
eburnea 7. 635
eburneola 6. 753
denticulata 6. 753
gracilis 7. 635
involuta 3. 634; 4. 874
larvata 6. 753
limatula 6. 753
miliacea 7. 635
ovulata 2. 163; 7. 635
perexigua 6. 753
pusilla 7. 635
simplex 7. 635
succinea 6 753
vittata 7. 635
spp. 2. 630; 3. 627; 6. 479
Marginipora
gen. 0. 240; 5. 755; 7. 227
Marginula
tumida 2. 253
Marginulina
gen. 5. 755; 7. 377
abbreviata 7. 379
Acknerana 7. 379
aculeata 7. 379
affinis 7. 379
agglutinans 7. 379
alata 9. 371
anceps 7. 378
arcuata 7. 497
attenuata 7. 378
Beyrichi 7. 497
Bronnana 7. 379
carinata 7. 379
compressiuscula 7. 497
contraria 1. 378
cristell arioides 1. 378 7. 37
Marginulina
Czjzekana 7. 379
deformis 7. 379
dubia 7. 378
duodecimcostata 9. 371
echinata 7. 379
Ehrenbergana 7. 379
erecta 7. 379
eximia 7. 379
fabacea 9. 371
Fichtelana 7. 378
gladius 7. 497
Haidingerana 7. 379
Hauerana 7. 379
hirsuta 7. 379
hispida 7. 379
incerta 7. 378
inepta 7. 379
inflata 7. 379
inflexa 7. 378
interlineata 9. 371
intermedia 7. 379
inversa 7. 379
irregularis 7. 378
Mertensi 9. 371
obliqua 4. 867
Orbignyana 7. 378
ornata 9 371
Partschana 7. 379
pediformis 6. 756
prima 9. 371
pustulosa 7. 379
pygmaea 7. 379
Reussana 7. 378
rugosa 7. 379
similis 7. 379
spinata 9. 371
spirata 7. 497
tenuis 6. 756
Terquemi 9. 371
tumida 6. 756
undulata 9. 371
vagina 7. 379
variabilis 7. 379
vittata 7. 379
spp. 2. 511*, 631, 6. 756; 9. 865
Mariacrinus
gen. 9. 236!
spp. 9. 236
Mariminna 0. 631
Meneghinii 2. 993
pedunculata 2. 993
Ungeri 2. 993
Markasit 2. 530, 531ff.; 3. 476; 6. 188*
Marlofstein 7. 7
Marl-stone 0. 181; 1. 484; 8. 355
series 0. 148
Marlekor 0. 34!; 1. 174
Marmatit 4. 190; 9. 814!
Marmo
Africano 9. 742
bianco-e-nero 9. 742
di Carrara 9. 742
Cipolino 9. 742
giallo antico 9. 742
giallo brecciato 9. 742
grechetto duro 9. 742
greco duro 9. 742
majolica 0. 735; 6. 208
Puvonazzo 9. 742
ravaccione 7. 594*
rosso antico 9. 742
Marmolith 1. 204*
Marmor 1. 444!; 2. 490*; 3. 694!; 7. 594; 9. 741
von Neubeuern 3. 83, 304
Rother 2. 456
Zuckerkörniger 1 474!
Carystium 9. 742
Lunense 9. 742
Numidicum 9. 742
Parium 9. 742
porinum 9. 742
Theusebii 9. 742
Marns
à Cyathula 7. 503p.
à foulon 0. 158, 182
à Ostrea cyathula 2. 882
à Plicatula 0. 180; 6. 457
à Ptérocères 4. 353!
à Virgules 4. 353!
de Hauterive 4. 654
jaspisées 2. 358
oxfordiennes 0. 164!ff.
supérieures au gypse 2. 882
vésuliennes 0. 158, 182
Marsenia tentaculata 3. 765
Marsupialoidea(fam.) 9. 867
Marsupiocrinus
coelatus 6. 115
Marsupites
spp. 3. 109
Martes
Ardea 5. 230
Martini-Thon 7. 655

Martinia
gen. et spp. 6. 117
Clannyana 4. 119, 747; 7. 223, 381, 637
Winchana 4. 119, 747; 7. 223, 381, 637
Martit 1. 694; 4. 710; 9. 193*
Marwood
-Gruppe 3. 816, 817
-Sandstone 3. 97; 6. 112
Masken-Krebse 7. 556
Masonit 0. 338; 2. 849!; 7. 170
Masse
-Gesteine 9. 478
in Steiermark 0. 712
Mastigopleuridae (fam.) 4. 493
Mastigusa
acuminata 5. 124
Mastodon
gen. 5. 369; 7 57, 485, 867, 869
Andium 3. 123; 5. 382; 6. 232; 7. 58. 486
angustidens 1. 75, 76, 498, 501, 502; 2. 44, 360, 987!; 3. 331, 378, 617; 4. 168, 609; 5. 225, 372, 622, 819; 6. 90, 172, 232, 331; 7. 57, 235, 375, 486⁴, 759; 8. 586, 765, 869; 9. 870
Arvernensis 1. 502; 2. 989; 4. 609, 610; 5. 225, 372; 7. 57, 58, (arborescens) 486²; 8. 765; 9. 116, 118. 870
Atticus 7. 235, 759
Borsoni 5. 225, 372; 7. 58, 486; 9. 870
brevirostris 1. 492; 2. 998; 4. 495, 609; 5. 225, 364, 372; 6. 96; 7. 486
Buffoni 2. 989; 7. 486
Cuvieri 2. 988; 7. 486
Guajaci 5. 225
giganteus 2. 988; 4. 866; 5. 112; 6. 127, 498!
Humboldti 2. 988; 3. 752; 5. 382; 7. 58, 486
Mastodon
Jägeri 5. 757
latidens 1. 501; 7. 58, 487
longirostris 1. 502; 2. 988; 3. 106, 617; 5. 225; 6. 491; 7. 57, 486; 8. 765
minutus 7. 486
mirificus 9. 252!
Ohioticus 2. 988; 7. 58, 486²; 8. 376
Pentelicus 7. 370
Pyrenaicus 9. 870
Simorrensis 1. 763; 5. 225, 370; 7. 248, 486
Sivalensis 7. 487
tapiroides 1. 502; 2. 989; 4. 732; 5. 225, 372, 869; 7. 486
Turicensis 3. 163*; 7. 486
Vellavus 5. 372
Vialleti 5. 372
spp. 4. 122, 638; 8. 510, 622
Mastodonsaurii (fam.) 1. 251
Mastodonsaurus 0. 754!
Jaegeri 3. 15; 6. 760
robustus 1. 251!
Vaslenensis 5. 756
spp. 3. 221
Mastogonia
Actinocyclus 6. 103
Mastrichter Kreide 2. 124p.
Schichten 2. 112p.
Mastrichtien 9. 384
Matlockit 2. 210; 3. 173!; 4. 182!; 5. 198
Mattaione (Gestein) 7. 605; 8. 89
Mayhill
-Sandstein 4. 486
Mazonit 2. 849
Meandrastraea etc.
vid. Maeandrastraea etc.
Mechanische Geologie 4. 385; 5. 288!, 641, 764; 6. 511!, 769; 7. 415
Mecochirus
gen. 1. 511!
Pearcei 0. 122
socialis 1. 511; 8. 484
Mecolepis gen. 7. 626!
Mecolepis
granulatus 7. 626
insculptus 7. 626
lineatus 7. 626
ornatissimus 7. 626
serratus 7. 626
tuberculatus 7. 626
spp. 7. 341
Mecynodon gen. 7. 628!
auriculatus 7. 629
carinatus 7. 628
oblongus 7. 628
Medien der Existenz der Organismen in geologischer Zeit 1. 633
Medullosa
gen. 0. 630
elegans 8. 503
porosa 8. 503
stellata 8. 503
Medusaephyllum
Ibergense 6. 255
Meer-Wasser 0. 708; 7. 829!
Analyse 0. 454!; 5. 87
Luft-haltig 7. 472
-Zusammensetzung 0. 61
Meeres-Grund
-Bildung in grosser Tiefe 5. 470
-Hebungen und Senkungen an beiden Polen der Erde 2. 444
-Höhenwechsel 4. 474
-Mollasse 5. 636p.
eigenthümliche Petrefakten 5. 795
-Regionen 3. 755
-Sand 1. 492; 3. 131!, 531 p.
obrer 3. 189
untrer 3. 189
umMontpellier 4. 609p.
-Spiegel: Wechsel 9. 627
-Strömungen: Einfluss auf's Klima 3. 20
-Tiefe: grösste 3. 489
verschieden bevölkert 7. 111
-Tuff 7. 611
Meerisches Leben verschiedener Tiefen 4. 610
Meerschaum 0. 313; 1. 204*; 4. 70
Megacentrus (Coleopt. g.)
tristis 2. 985

Megaceros
Hybernicus 5. 227
Megachirus gen. 1. 511
Megadendron
Saxonicum 8. 503
Megadesma spp. 6. 864
Megadesmus gen. 1. 382
Megalania gen. 9. 239!
prisca 9. 239!
Megalaspis
spp. 2. 242, 243!; 6. 224
attenuata 6. 803
heros 6. 803
Megalichthys gen. 8. 761*
Hibberti 6. 123
Megaloceros
Savinum 4. 862
Megalodon gen. Sow. =
Megalodus Gf. 6. 871
antiquus 6. 871
bipartitus 0. 284; 2. 932
carinatus 2. 932
Carinthiacus 8. 125
carpomorphus 6. 871
concentricus 7. 629
cucullatus 2. 108;
6. 871; 7. 457, 629
Deshayesanus 6. 864, 871
elongatus 7. 629
oblongus 6. 643
scutatus 8. 1; 4. 830
striatus 2. 932
suborbicularis 6. 256
transversus 6. 871
triqueter 8. 1; 9. 476
-Schichten 8. 1
Megalodus gen. Gf. =
Megalodon Sow. 3. 126
auriculatus 3. 127;
7. 629
carinatus 3. 127; 7. 628
cucullatus 1. 137; 3. 127
oblongus 2. 287, 288;
7. 628
rhomboidalis 3. 126
rhomboideus 7. 627
scutatus 1. 137, 139,
418; 3. 167; 4. 203,
204, 456, 555;
6. 738; 7. 621;
9. 629
triqueter 5. 178, 219;
6. 847, 849; 7. 615,
617, 621, 692
truncatus 3. 126; 7. 627
-Kalk 4. 456; 5. 219
Megalomeryx gen. 9. 249!
Megalomeryx
Niobrarensis 9. 249!
Megalomus gen. 5. 252!
Canadensis 5. 248, 252
Megalonyx
gen. 6. 240!; 8. 120,
123
dissimilis 5. 113; 6. 240!
Jeffersoni 4. 111; 5. 113;
6. 109, 240!; 7. 729;
9. 100
laqueatus 1. 637; 4. 860;
5. 113; 6. 240, 241
potens 5. 113; 6. 240,
241
Megalops
forcipatus 5. 380
Megalorhachis gen. 6. 628!
elliptica 5. 240; 6. 626
Megalosauri
(fam.) 6. 760
Megalosaurus
gen. spp. 5. 233, 744;
7. 850!
Bucklandi 6. 760;
7. 106
horridus 8. 376
spp. 2. 759; 6 494,
604
Megalurus
gen. 3. 117, 118*
Austeni 8. 237; 9. 381
Damoni 8. 237; 9. 381
parvus 9. 767
spp. 4. 382; 9, 764
Megambonia gen. 9. 755
Megantereon gen. 8. 877
aphanista 5. 372
cultridens 5. 372
Falconeri 5. 372
hyaenoides 5. 372
latidens 5. 372
macroscelis 5. 372
neogaeus 5. 372
Ogygia 5. 372
palmidens 5. 372
spp. 4. 609
Meganthereon
vdr. Megantereon
Megaphyllum spp. 9. 381
Megaphytum 0. 629
approximatum 5. 868
distans 5. 631!, 868
dubium 2. 891
frondosum 5. 631!
giganteum 5. 868
Hollebeni 2. 891; 4. 46
Megaphytum
Kuhanum 2. 891
majus 6. 868
remotissimum 2. 891
Megasiphonia 6. 126!
Parkinsoni 7. 204
Megaspira spp. 1. 676
Megastoma gen. 1. 184
Apenninum 1. 183
Buvignieri 3. 235
Megatherium gen. 3. 215*;
6. 232, 241!; 8. 119
Americanum 7. 761;
9. 239*
boreale 6 240
Cuvieri 4. 111; 5. 113;
6. 172, 241; 9. 100
Jeffersoni 6. 240
mirabile 5. 113; 6. 241
spp. 2. 361; 9. 496
Megathyris
gen. 3. 239!, 240, 255
cristellula 4. 507
cuneiformis 4. 508
Davidsoni 5. 239
Megatrema
Anglicum 7. 117
Megerl[e]ia gen. 3. 254!
lima 4. 504; 7. 482, 786
pectoralis 7 785
pectunculus 8. 486
pulchella 3. 254
truncata 3. 254; 4. 60,
504
Mehlbatzen 2. 21, 53,
915; 3. 11
des Zechsteins 3. 771,
779
Mehlstein 9. 484; 2. 20*;
3. 614
Mejonit 3. 61*, 261;
5. 196; 7. 175
Melachym 7. 723*
Melampus
tridentatus 4. 865
Melanasphalt 4. 816!
Melanconites
serialis 3. 225
Melania
abbreviata 6. 494
acute-striata 9. 356
angulata 1. 712
Anthonyi 7. 495; 8. 494
Beckeri 3. 751
canaliculata 7. 729
cerithioides 8. 585, 586,
587

Melania conica 1. 714
convexa 7. 495; 8. 377, 494
costellata 3. 331, 370, 3. 604; 5. 369; 6. 93
costulata 0. 279
crassilabrata 6. 494
cyclostoma 6. 494
dubia 7. 760
elongata 0. 714; 1. 740; 7. 760
Escheri 1. 122*; 2. 44; 8. 200, 585, 586², 589; 9. 137, 140
fasciata 1. 712
formosa 9. 356
fragilis 8. 740; 9. 866
gigantea 4. 559; 7. 760
gracilis 9. 356
grosse-costata 2. 637; 4. 249
Heddingtonensis 4. 534
Heyseana 9. 125
hordeacea 3. 604
horrida 3. 751; 8. 512, 714
Hunteri 9. 750
intermedia 7. 760
invenusta 8. 377
limnaearis 6. 625
longissima 9. 356
minutula 7. 495; 8. 494
multistriata 1. 495; 8. 494
muricata 1. 712; 8. 514, 714
Nebrascensis 7. 495; 8. 494
omissa 8. 377
paludinalis 9. 357
procera 2. 229
quadrilineata 9. 750
scalata 7. 760
Schlotheimi 2. 20; 6. 363; 7. 760; 8. 719
similis 9. 356
spina 3. 751
striata 3. 431; 4. 534
strigillata 9. 356
strombiformis 0. 401, 410, 414
Stygii 3. 331; 5. 369
subcolumnaris 9. 356
sublaevis 8. 377
subscalaris 9. 356
subtortuosa 8. 377
tabulata 8. 585
Melania
tenuicarinata 8. 377
tenuis 1. 141, 145; 3. 313
terebellata 3. 764
Theodorii 6. 494
trochiformis 9. 356
turbinata 6. 494
turris 2. 229
turrita 2. 637; 4. 249; 7. 216; 8. 585
Turritella 6. 494
turritissima 8. 515
unicingulata 4. 494
usta 6. 494
variabilis 5. 501
vittata 0. 160
vulgaris 7. 760
Warrenana 8. 377
Wetzleri 2. 637
Zenkeni 6. 494
spp. 6. 750
Melanit 5. 838!, 8. 77!
Melanophila (Coleopt. g.)
affinis 2. 985
sculptilis 2. 985
Melanophora
concinna 5. 122
lepida 5. 122
mundula 5. 122, 123
nitida 5. 122
nobilis 5. 122
regalis 5. 122
Melanopsis
ancillaroides 1. 712
Bouei 2. 627; 7. 182
brevis 1. 713, 714
buccinoidea 1. 676; 3. 80; 4. 515
callosa 1. 676
carinata 1. 712; 8. 515
citharella 0. 856
Dufouri 6. 90; 7. 181, 182
Fritzi 1. 676
fusiformis 1. 712; 5. 475 ff.
gradata 8. 585, 587
impressa 2. 765
laevigata 9. 475
Martiniana 2. 627
minuta 1. 712
Pichleri 7. 618
praerosa 2. 637, 765; 3. 751; 4. 249; 6. 535; 9. 36
pygmaea 2. 627
Melanopsis subulata 9. 137
spp. 6. 750
Melanterit 5. 153
Melaphyr 1. 323, 555 ff.; 2. 357, 369; 3. 456!, 525; 4. 302!; 7. 347, 357*, 361!, 435, 737*; 8. 145!, 554, 8. 808; 9 56, 214, 485, 641, 657 ff., 816
-Mandelstein 3. 535
Melastoma 0. 637
Melastomites 0. 637
cinnamomifolius 9. 122
Druidum 4. 622; 9. 375, 376
lanceolata 2. 755
marumiaefolia 2. 755
miconioides 2. 755; 9. 503
quinquenervis 3. 505
Meles
antediluvianus 5. 624
fossilis 4. 473; 5. 371
taxus 2. 998; 5. 229; 6. 111; 8. 869
vulgaris 7. 556
Meletta
crenata 2. 980; 8. 585, 587², 9. 640
gracillima 3. 683; 4. 734
longimana 2. 980; 8. 590; 9. 844
sardinites 2. 980; 8. 587; 9. 844
Melia gen. 5. 503; 6. 126
Melicerita gen. 4. 116!
Melinophan 3. 184!; 7. 583!
Melitaea 2. 123
Melittolepis gen. 8. 113
elegans 8. 113
Mellilith 3. 261; 4. 440
Melobasis 7. 122
Melobesites n. g.
membranaceus 7. 777
Melocrinus
gen. 4 253!; 6. 602
gibbosus 6. 374; 8. 371
hieroglyphicus 8. 371
triasinus 5. 316; 6. 245; 8. 763*; 9. 359
spp. 9. 236
Melocrinites spp. 5. 248
Melonia gen. 8. 243
Melonites
gen. 5. 492*; 7. 122

Melonites
multipora 0. 376; 5. 492; 6. 328!
Melosaurus
Uralensis 8. 301
Melosira crenulata 0. 473
distans 2. 196
dubia 0. 473
sulcata 0. 473
Membranipora gen. 4. 117!
cincta 4. 869
dilatata 3. 678
fenestrata 7. 502
hexapora 4. 869
Membracites
cristatus 3. 874
Mene gen. 3. 123*
Menipea gen. 4. 114
Menilit-Schiefer 9. 844
Mennige 5. 466
Menocephalus gen. 3. 336*
spp. 9. 504
Menodon
plicatus 5. 233, 756
Menophyllum 2. 121*
Mensch 8. 598; 742
abhängig vom Boden 8. 478!; 9. 107
Alter seiner Art 0. 477; 2. 241; 5. 221; 8. 510, 619, 862!
Menschen-Knochen 8. 309
-Rassen 0. 246; 1. 369
-Reste 1. 503, 504, 505, 636; 3. 251; 7. 842
antediluvianische 2. 600
mit solchen ausgestorbener Thiere beisammen 2. 92
-Zeit 2. 240
Menura superba 7. 312
Menyanthes-Frucht 3. 146
Mercenaria
perlaminosa 6. 480; 7. 241
spp. 6. 752
Meretrix aequorea 6. 229
Californiana 7. 242
Dariena 7. 242
decisa 7. 242
imitabilis 6. 229
sobrina 6. 229
Tippahana 9. 498
Tularana 7. 242
uniomeris 7. 241
Uvasana 7. 242
spp. 6. 752
Mergelschiefer 7. 629
Mergus
Ronzoni 5. 231; 7. 634
Meriones
Laurillardi 2. 225
Merista
gen. 3. 223!; 4. 62, 127!
tumida 8. 594
Meristos
Hunteri 9. 750
Merulina 2. 118*
folium 2. 378
Merychippus
gen. 8. 254!; 9. 251!
insignis 8. 254!, 376; 9. 251!
mirabilis 9. 251!
Merychyus gen. 9. 249!
elegans 9. 250!
major 9. 250
medius 9. 250
Merycochoerus
gen. 9. 249!
proprius 9. 249!
Merycodus gen. 9. 248
necatus 8. 376; 9. 248!
Merycoidodon
Culbertsoni 5. 114; 8. 376
gracilis 5. 115; 8. 376
major 5. 115; 8. 376
Merycopotamus
gen. 7. 869
Merycotherium
gen. 7. 869
Mesenteripora
daedalea 5. 634
Eudesana 5. 634
Michelini 5. 634
microphylla 5. 634
Mesocena
quaternaria 6. 103
senaria 5. 471
septenaria 5. 471
triangulum 6. 103
Mesodesma
Germari 6. 495
Mesodiodon gen. 3. 93!
dentirostris 3. 94
longirostris 3. 94
micropterus 3. 94
Sowerbyi 3. 94
Mesodiodontae 8. 240
Mesodon
gen. 3. 117*; 5. 486!
gibbosus 5. 487
macropterus 5. 487
Mesodon spp. 9. 764
Meso-endogene
Erdrinden-Theile 7. 800
Mesogaster
gracilis 3. 108
Mesokryptogene
Auftauchungen 5. 651
Mesol 5. 702!
Mesolith 3. 680; 5. 73, 707!; 6. 346!, 634, 656; 9. 653
Mesoneuron gen. 6. 629!
lygodioides 6. 627
tripos 6. 627
Mesopithecus
major 5. 375; 7. 120 759
Pentelicus 4. 637, 638; 5. 375; 7. 120, 234!, 370, 759
Mesopora
chloris 4. 737 ff.; 7. 750
Mesopyre 7. 357!
Mesospheniscus
gen. 3. 488
Mesostylus
gen. 5. 127, 128
antiquus 5. 54
Faujasi 5. 127
Mesotherium
gen. 8. 121!
Mesotyp 1. 593; 3. 475, 681; 4. 423; 9. 623
Mespilia 7. 122
Mespillus gen. 4. 763
Mespilocrinus
gen. 6. 603!
Forbesanus 6. 602
granifer 6. 602
Mespilus dura 8. 499
inaequalis 8. 499
Mesturus gen. 9. 767
verrucosus 9. 764, 767
Metacanthus gen. 3. 487
Metachlorit 9. 83
Metagene
Mineralien 8. 76
Metallbringer 1. 214
Metalle, neue 2. 69, 76
Metallurgische
Krystallkunde 3. 177
Metamorphische
Agentien 8. 855²
Gesteine 1. 530, 851!, 5. 829; 8. 92, 348, 352, 604; 9. 825
Grauwacke 4. 728!

Metamorphische
Kräfte 9. 210
Sandsteine 8. 389!
Schiefer 7. 80
Thone 8. 390
Metamorphismus 5. 45; 8. 707
der Felsarten 1. 530; 4.731!, 837; 5.728!; 8. 95, 385, 727!; 9. 840
Metamorphose
(Prozess) 2.968; 5.715; 7. 89; 9. 222!, 223!, 307, 468
der Felsarten 2. 721; 4. 604; 5. 174; 6. 595; 7. 432; 9 474
der Gesteine 0. 310, 557; 2. 880; 4. 205, 707!; 8. 832, 837, 846, 851!, 855²; 9. 205, 209, 481, 505, 599
des Granits 7. 37
der Grauwacke 4. 728
der Kalksteine 8. 707
kalzitischer Sedimente in Feldspath-Gestein 4. 257!
des Olivins in Serpentin 1. 605
durch Dämpfe 2.864, 962
durch Granit 8. 707
pneumatolitysche 1.863!
Metaporhinus
Gueymardi 4. 653
Metaxit 9. 445!
Metaxytherium
Beaumonti 5. 231
Cordieri 5. 231, 492
Cuvieri 1. 492; 3. 107; 5. 231
Serresi 1. 492
spp. 2. 998
Meteor
1852, Mai 11: 2. 586
Meteoreisen
(im Allgemeinen) 1.696!; 3. 174, 186!; 6. 439; 7. 53, 68; 8. 769; 9. 444, 737
aus Süd-Afrika 5. 562
von Atacama 2. 53, 864; 4. 568; 5. 1; 6. 441;
Meteoreisen
von Atacama 7. 166!, 257!, 415; 8. 215!; 9. 178
von Bolson de Mapimi 8. 770 ff.
von Burlington 3. 186!
vom Cap 5. 455!; 6. 842!
von Chihuahua 8. 770ff.
von Concepcion 8. 770ff.
von Cosby's creek 5. 562!
von Durango 8. 769ff.
von Greenville 3. 186!
von Grönland 5. 350!
von Hainholz 8. 567
vom Hommoney creek 3. 186!
von Huajuquillo 8.770ff.
von Lenarto 3. 186!
von Lion-river 3. 473
von Mexico 5. 446*; 6. 257!; 8. 769 ff.
von Rasgatà 3. 54!
von Rio Florido 8.770
der Ruff mountains 3.474; 4. 72; 6. 51!
von San Gregorio 8.770ff.
von Schwetz 2. 847!, 863!
von Seeläsgen 2. 211!
aus Seneca County 3. 694
von Tarapaca 6. 553!
von Toluca 5. 572!
vom Toluca-Thal 7.830!
von Tuczon 7. 166!
von Venagas 8. 770 ff.
von Xiquipilco 7.578!
von Zacatecas 0.446!; 9. 736
Meteorische
Gebirge 9. 218
Meteorite 6. 257!
geographische Vertheilung 2. 618
von Amerika 2. 614!
von Borgholz 9. 297*
von Hainholz 8. 567*; 9. 297*
von Oktibbeha County 8. 823
Meteorsteine 0. 455; 2. 343; 6. 257 ff.
Gemengtheile 2. 324
Ackerhuus 6.435!; 7.831!
Meteorsteine
von Borkut 7. 177!
v. Bremervörde 7. 332!
von Civita vecchia 8. 87
von Debreczin 9.192*
von Dünaburg 4. 184!
in Flandern 9. 743
von Gütersloh 2. 767
von Hainholz 8. 567
von Juvenas 0. 63
van Kaba 9. 192*
von Kakowa 9. 292*
von Mainz 9. 194!
von Ohaba 9. 79!
von Orawitza 9. 292*
von Ösel 6. 690!; 8. 320!
von Petersburgh 8.686!
in Siebenbürgen 3.725
von Stannern 3. 699!
von Thorn 3. 844!
Metopias
gen. 0. 754!; 3. 487
aries 9. 121
diagnosticus 5. 757
Hübneri 9. 121
(Ecnw.) spp. 4. 493
Metoptoma
elliptica 6. 120
pileus 6. 125
Metriophyllum 2. 121*
spp. 4. 497
Metriorhynchus
gen. 5. 233
Geoffroyi 6. 760
Metrosideros
calophyllum 4. 380
extincta 4. 380
Meulières:
Bildungsart 4. 207
Flora 0. 114
Meyenites 0. 638
Meyeria n. g. 0. 124!
magna 0. 125
ornata 7. 659, 672
Miargyrit 5. 705
Miarolit,
um Lyon 0. 74*
Miascit
(Miaskit) 2. 714
Mica
ferro-magnésien 8. 849
Micacite 8. 592
Michelinia 2. 120*
glomerata 6. 113
grandis 6. 113

Michelinia
spp. 2. 990
Micrabacia 2 118*
Beaumonti 2. 376
coronula 2.376; 9.228
spp. 1. 627
Micranthaxia (Coleopt. g.)
rediviva 2. 985
spp. 2. 985
Micraster
Aquitanicus 7. 859
arenatus 7. 748
brevis 7. 748, 853, 859
bufo 0. 388; 4. 538
cor-anguinum 0. 387. 388, 407; 1. 311; 6. 80, 483, 817; 7. 155, 614, 748, 786, 787, 859; 9. 228, 632
cor-testudinarium 7.614, 748
cordatus 7. 748
gibbus 7. 748
Gleizezei 7. 859
Helveticus 4. 120
integer 7. 859
latus 7. 748
Leskei 7. 787
Matheroni 7. 859
Michelini 7. 748, 853
minimus 3. 329
suborbicularis 2. 152, 168, 170
verticalis 7. 859
Microchoerus 1. 713
Microcyphus 7. 122
Microdon
gen. 1. 253; 3. 117*; 5. 486!
analis 1. 761*
elegans 5. 486
formosus 5. 486
hexagonus 1.761; 5.485
Hirsonensis 8. 357
notabilis 5. 486
radiatus 1. 355; 5. 486
truncatus 5. 485
spp. 9. 764
Microlabis
Sternbergi 8. 93
Microlepis gen. 8. 249
exilis 8. 509
lepidus 5. 853; 8. 509
Microlestes
antiquus 1. 505
Microlestes
spp. 6. 454
Micromeryx
Flourensanus 5. 227
spp. 8. 204
Micromys
Aniciensis 5. 225
minutus 5. 225
Microparia
gen. 3. 487
spp. 4. 493
Micropholis
Stowi 9. 496!
Microphyllia 2. 117, 119*
Ataciana 2. 377
Edwardsi 2. 378
Micropora gen. 7. 633
Microps gen. 3. 117*
furcata 8. 6
Micropsalis
papyracea 9. 725
Micropsis gen. 7. 860!
Desori 7. 859
Micropyge gen. 3. 487
Microsolena 2. 119*
excelsa 3. 876
granulata 3. 877
incrustata 3. 876
irregularis 3. 876
porosa 3. 876
portlandica 8. 591
racemosa 3. 876
regularis 3. 876
tuberosa 3. 876
spp. 2. 758
Microtherium
gen. 5.228, 373; 8.236
Renggeri 0.204; 1. 75, 76, 680; 9. 173
Microzamia 0. 630
Micryphantes
globulus 5. 122
infulatus 5. 122
molybdinus 5. 122
regularis 5. 122
turritus 5. 122
Micula
gregaria 6. 245
speciosa 6. 245
Miemit 7. 605
Mikrogeologie 5.758; 6.605
Mikroklin 9. 583*
Mikrolith 2. 209!, 862
Mikroskopische Prüfung der Gesteine 1. 367
Struktur der Gesteine 5. 829
Mikroskopische Struktur des körnigen Kalkes 6. 50
Untersuchungs-Weise der Gesteine 3. 401, 597
Miliola
gen. 5. 749, 755
Austriaca 7. 271!, 309
consobrina 7. 271!, 309
cribrosa 7. 273!
gibba 7. 271!, 309
Haidingeri 7.272!, 309
laevis 4. 737, 738
Panderi 8. 630, 632
praelonga 7. 272!
saxorum 7. 272!, 309
Miliolida
(fam.) 5.754!ff.; 7.271
Milioliten-Kalk 3. 189; 9. 470
Miliolites
sabulosus 8. 243
Millepora 2. 120
capitata 2. 766
cellulosa 1. 490
cervicornis 2. 860*
conifera 5. 635
corymbosa 5. 635
dumetosa 5. 635
globularis 7. 233
parasitica 7. 233
pyriformis 5. 635
ramea 7. 233
ramosa 8. 264, 265
repens 8. 265
straminea 0. 163; 5. 635
Milleporidae
(fam.) 6. 113; 9. 67
Millerit 6. 438*; 7. 331
Millerocrinus
aculeatus 8. 486
echinatus 7.135; 8.486; 9. 135
Greppini 8. 486
Milleri 2. 151, 167
Münsteranus 8. 486
ornatus 8. 486
Millstone grit 1.104, 226; 2. 989; 7. 124 p., 753, 754
Milnia gen. 1. 490!
decorata 6. 95
Mimetesit 4. 817!
Mimosa Wartmanni 3. 506
Mimosites 0. 637

Mimosites
cassiaeformis 4. 380
Haeringiana 4. 380; 8. 712
palaeogaeus 4. 380, 491; 9. 376
Mineral-Arten
künstlich 0. 457
vom Vesuv ausgeworfen 3. 254!
-Bildung 4. 721; 9. 446
fortdauernde 6. 440
künstliche 2. 216; 4. 790; 5. 129!214!
auf nassem Wege 1. 596!
durch Kochsalz 5. 587, 589; 6. 436
durch Krystallisation auf trockenem Wege 1. 692, 706
durch Mineral-Dämpfe 5. 215
-Brenze 9. 463
-Chemie 8. 682
-Dämpfe auf Felsarten wirkend 5. 214; 6. 472
-Geographie 8. 77
-Krystallisationen
künstlich 3 470, 472
-Quellen 0. 716; 4. 466, 719; 5. 33, 208, 467; 6. 143, 694!, 731; 7. 452; 8. 311!, 696!, 825!; 9. 88, 129, 198*
Analysen 4. 183, 184!
v. Baden (bei Wien) 2. 729
bei Bristol 2. 704!
bei Halle 0. 337!
der Herkules-Bäder 3. 591!
zu Karlsbad 4. 683
v. Kosteinitz 0. 345!
-Reichthum
von Australien 5. 206
von China 1. 724
von Cochinchina 6. 566
von Finnland 8. 312
von Grossbritanien 9. 186!
von Kärnthen 5. 821
von Liegnitz 6. 561
von Nordamerika 8. 327
Mineral-Reichthum
der Oberpfalz 5. 704
der Vereinten Staaten 5. 527; 6. 385
von Serbien 6. 710
-System 8. 75!
-Topographie 5. 821
von Bayern 5. 348
-Wasser 4. 86; 5. 834!; 6. 345!; 7. 578
Kohlensäure-haltiges 0. 464
von Cransac 2. 66, 71
von Niederbronn 2. 68!
von Steben 3. 702!
von Sternberg 2. 74!
von Weissenburg 0. 62!
von Wolkenstein 5. 450!
-Zusammsetzung 1. 597
Mineralien:
künstliche 2. 491; 3. 59, 177; 6. 398, 431!, 472
von Bayern 5. 348
mit Flüssigkeiten erfüllt 6. 43
Verbundenseyn in den Felsarten 1. 555!
-Handel 2. 363; 3. 640, 768; 4. 768; 8. 256
Zipser's 4. 128
-Handlungen 6. 171, 172
-Sammlung in Turin 9. 60
Wiser's 4. 26, 6. 11
Mineralisirte Holzkohle 1. 735; 6. 606
Mineralogie
(System) 0. 596, 622; 3. 373!; 8. 75!
von Nassau 9. 84, 627
der Oberpfalz 5. 704
des Österreichischen Kaiser-Staates 8. 57*
von Sardinien 9. 60
von Tyrol 3. 839!
Minette 5. 213; 7. 606; 8. 848!
Minimus-Thon 7. 475 ff., 659 ff.
Miocän 2. 882; 3. 190
-Bildungen 3. 331; 4. 573
Miocän
-Fauna 5. 223!
-Flora 0. 114!; 4. 490, 494, 631; 6. 504; 9. 505
von Italien 4. 626
-Formation 0. 223, 739; 1. 235; 4. 507p.; 6. 477p., 479p., 533 p., 750 p.; 7 231p., 241, 266p., 495, 500; 8. 200, 376p., 403p., 709, 711, 874g., 875p.; 9 35, 824
-Gebilde 0. 716, 720
-Gebirge 3. 625, 806; 8. 590
in Bayern 4. 517!
Mirbelites 0. 636
Lesbius 4. 863
Miquelites
elegans 3. 435; 4. 631
Mischio (Gestein) 8. 89
di Serravezza 7. 594
Misenit 1. 589
Misothermus
gen. 6. 490!
torquatus 6. 490, 875
Mispickel 1. 597; 3. 459, 694; 6. 189*
Misy 2. 71!
Mitella gen. 8. 620
Darwinana 5. 126
Darwini 8. 620
elegans 8. 620
fallax 8. 620
glabra 8. 620; 9. 494
Guascoi 8. 620
lithotryoides 8. 620
Smeetsi 8. 620
valida 5. 126; 8. 620
Mitra gen. 2. 1002!
acuta 2. 1002
aperta 2. 1002
Astensis 2. 1002
bacillum 2. 1002
Bonellii 2. 1002
Borsoni 2. 1002; 7. 51
Bronni 2. 1002
cancellata 2. 1002; 3. 635; 4. 875
conquisita 6. 230
cornicula 2. 1002; 7. 509
corrugata 2. 1002
crassicostata 2. 1002
cupressina 2. 1002

Mitra Dertonensis 2. 1002
Dufresnei 2. 1002
dumosa 6. 230
ebenus 2. 1002; 7. 509
elegans 2. 1002
episcopalis 2. 1002
fusiformis 2. 43; 2. 1002
glabra 5. 126
goniophora 2. 1002
incognita 2. 1002; 3. 75
labratula 7. 635
laevis 2. 1002; 7. 509
leucozona 2. 1002
lutescens 2. 1002
megaspira 2. 1002
Michaudi 2. 1002
Mississippiensis 6. 230
monodonta 7. 635
Neptuni 1. 101
Nicensis 3. 604
nuda 7. 866
obesa 7. 635
oblita 2. 1002
obsoleta 2. 1002
Partschi 2. 630
parva 1. 715; 7. 635
plicatella 3. 604; 5. 475 ff.
plicatula 2. 1002; 7. 509
plicifera 3. 763; 7. 509
porrecta 7. 635
pseudo-papalis 2. 1002
pulchella 2. 1002
pumila 7. 635
pupa 2. 1002
pyramidella 2. 1002; 7. 509
recticosta 2. 1002
scabra 1. 715; 7. 635
scalarata 2. 1002
scrobiculata 0. 223; 2. 1002; 3. 75
striato-sulcata 2. 1002
striatula 2. 1002
striola 3. 75
submutica 5 475, 476
subumbilicata 2. 1002
Terebellum 3. 604; 8. 874
turricula 2. 1002
Vignyensis 1 101
voluti formis 7. 635
spp. 2. 630; 4. 626; 6. 479
Mitropicea Decheni 0. 117
Noeggerathi 0. 117
Mittel-Dolomit 7. 690, 692
Mittel-Oolith
Gliederung 3. 233 p.
Mittel-rheinischer Geologen-Verein 4. 459
Mittelmeer 5. 472
Mizalia gen. Ber.
vgl. Myzalia
Mizzonit 3. 61*, 261
Moa 0. 126; 1. 227, 249, 255; 5. 125; 8. 619
Modiola
acuminata 4. 748; 7. 223
angustissima 4. 869
antiqua 6. 642
aspera 4. 765
barbata 2. 1004; 3. 756
bipartita 0. 723; 7. 133
compressa 4. 765
concentrica 2. 932
concentrice-costellata 0. 102
contracta 7. 242
cordata 5. 844; 7. 229
costata 4. 749
costulata 2. 1004
Credneri 9. 169*
cuneata 2. 229
dimidiata 1. 141; 3. 319
discors 2. 1004
Escheri 2. 43
faba 3. 231
Gastrochaena 0. 99; 6. 245, 363
gibbosa 0. 159; 4. 621
Goldfussi 6. 245
gracilis 3. 319
granulosa 3. 231
Hillana 6. 218
hirundiniformis 6. 245 9. 359
imbricata 0. 163; 4. 765; 9. 135
inclusa 4. 765
Kahlebergensis 6. 256
Leckenbyi 7. 743
lithophaga 0. 172, 174; 1. 764; 7. 229; 9. 464
marmorata 2. 1004
modiolus 2. 1004
obtusa 2. 109
Pallasi 3. 319
Papuana 2. 855*
Pedernalis 0. 102
phaseolina 2. 1004
Modiola
plicata 0. 871; 4. 765; 6. 848; 8. 357
pulcherrima 4. 765; 7. 133
rhombea 2. 1004
reversa 0. 294
scalprum 6. 495
Schafhäutli 9. 629
semisulcata 6. 642
sericea 2. 1004; 6. 533
similis 1. 141; 3. 319
simpla 3. 126; 4. 749; 7. 374, 722
Sowerbyana 4. 765
substriata 6. 245; 9. 359
tenuistria 1. 715
texta 2. 285, 288; 4. 554; 9. 629
Thielaui 3. 220; 6. 245; 9. 169
tulipa 3. 756
undulata 3. 312, 319
ungulata 7. 743
vulgaris 1. 624
spp. 6. 495
Modiolarca 2. 231!
ovata 2. 230
Modiolopsis
gen. 1. 382; 6. 642
anodontoides 6. 642
antiqua 6. 119
arcuata 6. 642
aviculoides 6. 642
carinata 6. 642
complanata 6. 119
Credneri 5. 316
curta 6. 642
elegantula 5. 98
expansa 6. 119
faba 6. 642
laevis 8. 715
lata 6. 642; 9. 755
lithophaga 7. 502
modiolaris 6. 119, 642
mytiloides 6. 642
nasuta 6. 642
Nilssoni 6. 119
nuculiformis 6. 642
parallela 6. 642
platyphylla 6. 119
postlineata 6. 119
solenoides 6. 119
spatulata 6. 642
subspatulata 9. 755
terminalis 6. 642

Modiolopsis
Becki 1. 125; 4. 126
Trentonensis 6. 642
truncata 6. 642
spp. 1. 253; 5. 252
Moellon-Kalk 5. 223 p.
Mofete 7. 606
Mohlites 0. 638
Moho 1. 256
Molekülar Bewegungen in Mineralien 5. 688!
Molasse 4. 360
s. Mollasse
Mollasse 0. 305, 355; 1. 501 p., 746, 2. 35!, 301; 3. 79*; 4. 360, 657; 5. 364, 636 p.; 6. 359, 458, 601 p., 604 p.; 7. 110 p., 248 p., 400, 623 p., 845; 8. 717, 722, 747 p.
-Flora 3. 501
-Formation 6. 707; 7. 779
-Gebirge 4. 517, 712
-Geschiebe mit Eindrücken 3. 797
-Gruppe 6. 355
-Petrefakten 8. 63
Mollia gen. 4. 115!
Mollusken
im Crag 4. 505. 507
im Muschelkalke 0. 99
tertiäre 2. 630
geologische Aufeinanderfolge 6. 641
geologische Entwicklung und Verbreitung 0. 748!
-Facies des weissen Juras 0. 173
-Fauna um Genf 2. 512
um Wien 3. 753
-Geographie 0. 748
Moltkia Isis 3. 608
Molybdän-Bleispath 2. 210!
Molybdänglanz 2. 877, 880; 5. 181; 6. 444!; 8. 43*
Molybdänsaures Bleioxyd 2. 336; 9. 295!
Molytes
Hassenkampi 7. 555
Monacrum gen. 4. 831
Monetulites gen. 5. 619!
Monimetes gen. 7. 777
Monimia anceps 4. 379
Haeringana 4. 379
Monocarya
gen. Anthoz 3. 109
Monoceros
Blainvillei 7. 404
Monochlamydea (Vegetabilia) 2. 504!
Monoculus ovum 7. 503
Monadacna gen. 6. 867
Monodon spp. 1. 505
Monodonta
decussata 3. 234
formosa 3. 234
granosa 6. 372
heliciformis 2. 228
imbricata 3. 234
Labbadyei 3. 234
laevigata 2. 228
Lyelli 1. 487; 2. 228; 3. 234
propinqua 4. 505
purpurea 6. 372
sulcosa 1. 487; 2. 228
spp. 5. 768
Monographie der fossilen Koniferen 3. 623
Monograpsus
gen. 2. 374!; 4. 126; 5. 541; 8. 764
gemmatus 4. 127
Jüngsti 5. 542
Linnaei 4. 127
latus 5. 541
oblique-truncatus 5. 541
peregrinus 4. 127
polyodonta 5. 542
Priodon 4. 47; 5. 541
Proteus 5. 542
sagittarius 5. 542
spina 4. 127
subdentatus 5. 542
testis 4. 126
triangulatus 4. 127
urceolus 4. 127
Monophlebus
irregularis 6. 620
trivenosus 6. 620
spp. 5. 125
Monopleura gen. 3. 240*
imbricata 5. 377
Monopleurodus
gen. 8. 113
Ohhesaarensis 8. 113
Monoprion
gen. 1. 124; 3. 274; 4. 126
Monoprion
Bohemicus 1. 125
chimaera 1. 125
colonus 1. 125
convolutus 4. 126
Halli 1. 125; 4. 126 9. 603
Heubneri 4. 126
millepeda 4. 127
Nilssoni 1. 125; 4. 126
nuntius 1. 125; 4. 126
pectinatus 4. 127
priodon 1. 125; 4. 126
Proteus 1. 125; 4. 126
Roemeri 1. 125
sagittarius 4. 126; 8. 654
Sedgwicki 4. 126
spiralis 1. 125
tectus 1. 125
testis 4. 126
turriculatus 1. 125; 4. 126
spp. 3. 636
Monothalamia (ordo) 5. 754!
Monotis
Albertii 3. 11, 24; 6. 363
Americana 8. 766
anomala 5. 848
barbata 3. 310!, 312, 319; 9. 629
Clarai 9. 359
decussata 0. 525; 6. 818; 8. 583
echinata 3. 581
elegans 9. 32, 34
Garforthensis 4. 748; 7. 637
gryphaeoides 4. 747; 7. 637
Halli 8. 766
Hawni 8. 349
inaequivalvis 3. 22
lineata 5. 501; 7. 695
papyrea 9. 17 ff.
radialis 4. 748; 7. 637; 8. 716, 766
salinaria 0. 587, 733; 1. 134; 5. 219, 500, 501; 8. 4²
septentrionalis 9. 222
speluncaria 3. 126; 4. 118; 7. 637; 8. 766; 9. 761

Monotis
substriata 3.530; 4.370; 7. 698; 9. 263
tenuicostata 8. 496; 9. 824
variabilis 8. 766
-Kalke 4. 370; 9. 263, 403!
-Schiefer 9. 17
Monoklinoedrisches Krystall-System 5. 11
Monradit 1. 204*
Monrolith 6. 187!
Montacuta
bidentata 2. 1004
donacina 2. 1004
ferruginosa 2. 1004
substriata 2. 1004
truncata 2. 1004
Montastraea
Guettardi 0. 764
Monticellit 3. 262
Monticularia 2. 117*
Bourgueti 4. 627; 7. 233
conferta 2. 120
Guettardi 0. 762
maeandrinoides 0. 762
microconus 7. 233
Styriana 0. 762
venusta 7. 233
Monticulipora
gen. 7. 104*
foliosa 7. 104
inconstans 5. 653
ramosa 7. 104
spp. 2. 120; 7. 104²
Montipora
gen. 2 120; 3. 877
Montlivaltia 2. 117*
acaulis 2. 109
bilobata 3. 606
boletiformis 0. 759
crenata 0. 759
cupuliformis 4. 868; 8. 357
Delabechei 8. 357
detrita 6. 740
dilatata 4. 868
gracilis 0. 759
granulosa 0. 759
Guettardi 0. 759; 4. 852; 7. 210; 8. 643
Haimei 4. 852; 7. 210
Lesueuri 8. 591
rudis 4. 868
Montlivaltia
rugosa 2. 109
triasina 6. 245; 9. 359
trochoides 8. 873
Waterhousei 8. 357
Wrighti 8. 357
Zieteni 0. 766
spp. 2. 758
Montmorillonit 6. 690
Montserrien (étage) 9. 470
Moor-Brand 3. 550
Moor-Erde 7. 434!
Moos-Gold 5. 827
Mopsea gen. 2. 123*
spp. 1. 627
Moränen 0. 545; 6. 172; 8. 275, 339, 343, 9. 61
in den Pyrenäen 5. 83
Morinda 0. 634
Chiavonica 4. 252
Morio
Aeneae 2. 163. 169
Mormonia
taeniata 6. 622
Morphastraea 2. 118
Morpholithe 0. 36; 8. 632
Morrisia gen 3. 255!
anomioides 4. 60, 504
appressa 4. 504
Mortieria gen 2. 122*
spp. 2. 990
Mortonia
gen. 9. 255
Mosandrit 3. 600!
Mosasaurus
gen. 5. 246; 8. 877
Camperi 2. 762*; 5. 233; 8. 207; 9. 361, 492
Carolinensis 2. 763*
Couperi 2. 763*
Dekayi 2. 762*, 764
gracilis 2. 381; 3. 109; 8. 207; 9. 361, 492
Hofmanni 3. 109; 7. 625; 9. 492
leiodon 2. 762*
Maximiliani 0. 256! 2. 762*; 7. 493; 8. 376
minor 2. 763*
Missuriensis 8. 376
stenodon 2. 381, 762*; 7. 625; 9. 361
Moschus
gen. 5. 373; 7. 869
Moschus
aquaticus 9. 108
armatus 5. 227
elegans 5. 227
Gelyensis 5. 228
Meyeri 6. 828; 7. 491; 9. 725
murinus 5. 227
Nouleti 5. 227
Pratti 5. 227
Mosellaesaurus
rostro-major 5. 233
spp. 5. 743
Mossottit 6. 197!
Moulinia
densata 7. 853
spp. 7. 404
Mountain limestone 1. 104
Mucropalpus
elegans 6. 622
Mücken 0. 22*
Münster'sche Sammlung 1. 510
Münsteria 0. 626
annulata 3. 413; 8. 640
dilatata 8. 640
flagellaris 8. 640
geniculata 8. 640
hamata 8. 640
Hössi 8. 640
Kecki 8. 636
Oosteri 8. 640
Schneiderana 8. 640
spiralis 7. 778
Mulinia spp. 7. 404
Multescharellina
gen. 4. 116!
Multescharinella
gen. 4. 116!
Multescharipora
gen 4. 117!
Multicrescis
acuminata 5. 653
macrocaulis 5. 653
Multinodicrescis
subinconstans 5. 653
Multisparsa
Luceana 5. 634
Mumien
-Bildung 2. 687
Murchisonae
-Bett 6. 852
Murchisonia
alpina 2. 109
angulata 6. 121
angusta 6. 120

Murchisonia
attenuata 7. 863
Biarmica 7. 374
bilineata 2. 107; 6. 209; 7. 457
brevis 6. 256
cancellata 3. 232; 6. 120
cingulata 6. 120; 8. 594
conulus 7. 863
coronata 2. 107
dispar 3. 760; 6. 121
elegantula 7. 863
exilis 5. 865
gyrogonia 3. 232; 6. 120
insculpta 7. 863
Kasanensis 8. 766
Lloydi 6. 120
melaniaeformis 6. 736
perversa 8. 766
pulchra 6. 120
quadricarinata 6. 121
quadricincta 9. 847
scalaris 1. 636
simplex 3. 232; 6. 121
striatula 5. 501; 9. 847
subangulata 4. 118; 7. 638; 8. 766; 9. 847
subulata 8. 855
sulcata 6. 121
terebriformis 7. 863
torquata 3. 232; 6. 121
tricincta 6. 371
turricula 5. 865
turritella 7. 863
vermicula 7. 863
Verneuilana 6. 121
spp. 5. 248
Murex
asper 1. 716
bispinosus 1. 716
Borni 3. 508
brevicauda 0. 861
capito 7. 421; 9. 839
conspicuus 3. 134, 327
cuniculosus 0. 862
Czjzeki 3. 508
defossus 1. 716
Deshayesi 6. 534
erinaceus 3. 763
exortus 7. 636
frondosus 1. 715
goniostomus 3. 508
Haccanensis 3. 236
Murex
Haidingeri 3. 507
horridus 0. 861
lingua-bovis 3. 75
minax 1. 716
nodulatus 0. 869
Partschi 3. 508
porulosus 3. 508
quadratus 0. 294
rostratus 7. 636
rusticulus 3. 75
Sandbergeri 7. 420
Schönni 3. 507; 9. 839
scrobiculator 3. 507
sexdentatus 1. 712
spinicosta 3. 75
spinulosus 5. 475
subclavatus 7. 421
sublavatus 9. 839
subulatus 0. 751
thiara 0. 751
tortuosus 3. 763
tricarinatus 0. 861
truncatus 5. 603
trunculus 2. 43
tuberosus 0. 869
tubifer 0. 861
ventricosus 3. 507
versicostatus 3. 236
Vindobonensis 3. 507
Zealandicus 1. 229
spp. 3. 507; 6. 477, 479, 750
Muricea 2. 123
Murre 3. 792
Mus
Aniciensis 5. 225
Aymardi 5. 225
decumanus 3. 378
Gerardanus 5. 225
Gergovianus 5. 225
minutus 5. 225
orthodon 6. 875
sylvaticus 5. 371
Musacites
primaevus 2. 993
Musaeites 0. 631
Musaraneus
priscus 5. 371
Muschel-Ablagerungen der Nordsee 1. 621
-Anhäufungen 6. 593
-Breccie des Zechsteins 3. 775
-Marmor 6. 215; 8. 2
opalisirender 0. 733
-Sand 3. 482
Muschel
-Sandstein 2. 45
-Schaalen 6 845!
-Trümmer-Gestein 0.14
Muschelkalk 0. 355, 587, 732; 2. 17, 48, 53; 3. 9, 529, 614; 4. 840; 5. 358; 6. 207, 362p., 730, 745p.; 7. 195, 463, 549, 621; 8. 719, 761, 9. 143, 497
Eisenstein-Führung2.337
Mollusken-Fauna 0. 99
-Dolomit 2. 93
-Formation 0. 483; 2. 907!,912!,942!; 3. 65
-Gebirge 2. 972
-Reptilien 1. 80
-Saurier 2. 601, 883!; 5. 366!, 755
-Versteinerungen 5.479²
Vertheilung nach den Schichten 2. 942
Muscites 0. 627
apiculatus 3. 225, 746
confertus 3. 225, 746
dubius 3. 225. 746
elegans 3. 746
falcifolius 2. 888
Heppi 3. 502; 5. 637
hirsutissimus 3. 225; 746
imbricatus 2. 888
Oeningensis 2. 760; 3. 502; 5. 736
Schimperi 3. 502; 5. 637
serratus 3. 225, 746
Sternberganus 2. 888
Museum of Practical Geology 2. 59
Musocarpum 0. 631
contractum 8. 626
difforme 2. 993; 8. 626
prismaticum 2. 993; 8. 626
Musophyllum
truncatum 3. 434; 4. 630
Mussa 0. 759; 2. 117*
abbreviata 4. 868
Mustela
angustifrons 5. 229
antiqua 5. 624
Ardea 5. 230
brevidens 9. 173!
Croizeti 5. 229

Mustela
elegans 5. 229
elongata 2. 998; 5. 229
foina 5. 229
genettoides 5. 229
hydrocyon 5. 229
lutroides 5. 230, 371
martes 5. 229; 6. 574; 9. 862
minuta 5. 230
Pardinensis 5. 230
plesictis 5. 229, 371
putorius 2. 998; 5. 229; 9. 100
Schmerlingi 5. 371
sectoria 5. 230
taxodon 5. 229
vulgaris 3. 377; 9. 100
viverroides 5. 229
zorilloidea 5. 230
Mutterlauge
einer See-Saline 7.829!
Mya acuta 7. 507
aequata 7. 744
anatina 6. 857
angustata 1. 712
arctica 7. 507
arenaria 1. 621; 4.196; 6. 875; 7. 507
Bivonae 7. 507
calceiformis 7. 743
dilatata 2. 230; 7. 743
depressa 6. 858
elongata 0. 292, 391, 393, 485; 1. 63; 6. 860; 7. 507, 659
elegans 6. 645
gibbosa 7. 744
impressa 6. 643, 645
intermedia 6. 857
laeviuscula 3. 231
lata 7. 507
litterata 7. 743
mactroides 7. 761
margaritifera 7. 743
mercenaria 7. 507
minuta 5. 628, 843
Montereyana 7. 853
obtusa 7. 761
Omaliana 6. 645
ornata 6. 857
ovalis 3.230; 6.857,870
pullus 6. 857; 7. 507
rotundata 6. 643, 646
rustica 7. 507
Mya
Spengleri 7. 507
subovata 7. 507
subtruncata 7. 507
sulcata 6. 646
Swainsoni 7. 507
Tongrorum 3. 231
tugon 6. 857
truncata 1. 473, 621, 623; 4. 86; 6. 857; 7. 507
Vezelayi 7. 743
V-scripta 0.164; 7. 744
spp. 1. 382
Myaceae (fam.) 6. 245!
Myacites
Albertii 9. 169*, 360
Audouini 6. 250
Beani 7. 744
brevis 7. 760
calceiformis 7. 743
Canalensis 9. 360
compressus 7. 743
crassiusculus 7. 743
decurtatus 7. 744
depressus 0. 158
dilatatus 7. 743; 8. 357
elegans 6. 645; 7. 637
elongatus 3.26; 6.363; 7. 760; 9. 169
Escheri 9. 629
faba 9. 629
Fassaensis 0. 129, 366, 367, 732; 5. 219; 6. 64, 245, 570, 737; 7. 615, 621; 9. 360
ferratus 9. 32, 34
gibbosus 6 645; 7.744
impressus 6. 643, 645
inaequivalvis 6. 245; 9. 360
Letticus 6. 616; 7. 760
longus 7. 760
mactroides 9. 360
musculoides 7. 760
oblongus 8. 357
Omali[us]anus 6. 645
Pennsylvanicus 9. 234
primaevus 6. 645, 648
punctatus 8. 357
Scarburghensis 7. 744
securiformis 7. 744
striatulus 6. 643
subellipticus 8. 497; 9. 824
Myacites
subundatus 9. 360
sulcatus 6. 644, 645
tenuistriatus 8. 357
Terquemius 7. 743
tumidus 6. 643, 645; 7. 743
unioniformis 7. 743
ventricosus 3. 26
Vezelayi 7. 743
Myaciten-Thone 6. 60
Myalina
acuminata 6. 119; 7. 223
crassa 6. 373
fimbriata 6. 373
Kansanensis 8. 766
perattenuata 8. 349
squamosa 6.119; 7.223, 637
subquadrata 6. 736; 8. 766
tenuistriata 6. 373
spp. 5. 252
Myarion
angustidens 5. 371
antiquus 5. 371
minutus 5. 371
musculoides 5. 371
Mycedium
(elephantopus) 2. 377
Mycetophila
gen. 0. 758!
Lamarckana 0. 759
Meigenana 6. 503
morio 6. 503
pallipes 6. 503
pulchella 0. 33
stellifera 0. 759
Mycetophyllia 2. 117*
antiqua 4. 868
Mycetodactylus
gen. 5. 250!
convolutus 5. 248, 250
Myelopitys 0. 630
Mygale
antiqua 5. 223
Arvernensis 5. 224
minuta 5. 223
Najadum 5. 224, 371
Sansaniensis 5. 224
Myliobates
angustidens 2. 1000
Apenninus 1. 184
canaliculatus 6. 601
crassus 5. 234; 8. 870
Faujasi 5. 234

Myliobates
Girondicus 5. 234
goniopleurus 2. 166, 170; 6. 601
Guyoti 8. 870
Holmesi 0. 746
lateralis 6. 601
meridionalis 5. 234
micropleurus 2. 166, 170; 5. 234
obesus 7. 115
Oweni 6. 601; 5. 234
punctatus 6. 601
rugosus 7. 115
serratus 7. 115
Toliapicus 2. 166, 170; 6. 601; 9. 844
transversalis 0. 746
spp. 1. 254
Mylodon
gen. 6. 240!; 8. 120
Darwini 4. 111; 6. 241!; 9. 100
Harlani 4. 111; 5. 113; 6. 241!; 9. 100, 496
robustus 3. 810, 4. 111; 6. 241!
Mylognathus gen. 8. 256!
priscus 8. 256!, 376
Myoconcha gen. 6. 238
Actacon 4. 766
Brunneri 8. 383
compressa 6. 256; 8. 643
costata 4. 749; 7. 637
crassa 1. 486; 2. 229; 4. 766; 8. 357
cretacea 6. 869
Curionii 8. 125
elongata 4. 766
Gastrochaena 0. 99
Goldfussi 9. 169*
incurva 6. 752
Lombardica 8. 125
modioliformis 4. 749; 7. 637
ornata 6. 869
Myodes
lemmus 6. 490; 9. 349
torquatus 6. 490; 9. 349
Myolagus Meyeri 7. 876
Sardus 7. 876
Myolemmus
ambiguus 5. 371; 7. 876
Myonia gen. 1. 382
Myoparo gen. 6. 873
Myophoria gen. 3. 126*
Myophoria
carbonaria 6. 119, 646, 648
cardissoides 1. 649; 2. 917, 943; 3. 25; 6. 245; 7. 760; 8. 719; 9. 360
curvirostris 0. 485; 2. 943; 7. 594, 760, 761; 8. 383; 9. 359²
depressa 6. 119, 648
elegans 0. 99; 2. 917; 3. 24; 4. 479; 8. 383
elongata 8. 125
Emmrichi 9. 629
Goldfussi 2. 909; 3. 16 24; 4. 113; 5. 245 479; 7. 760; 8. 720 9. 168*
inaequicostata 8. 125
inflata 9. 629
intermedia 7. 760
Kefersteini 5. 245; 6. 738; 7. 622; 8. 2, 124²
laevigata 0. 485; 2. 943; 3. 25, 30, 126; 7. 760; 9. 360
lineata 5. 245
modiolina 6. 245
multiradiata 9. 629
obliqua 6. 119, 652
obscura 3. 126; 6. 119
orbicularis 2. 908, 909, 943; 3. 25; 8. 766
ornata 3. 319; 5. 246
ovata 2. 943; 3. 25; 6. 245; 9. 360
pes-anseris 2. 917; 3. 24; 4. 840; 5. 245; 9. 383
praecursor 9. 452 ff.
Raiblana 6. 218
rhomboidea 7. 627
rotundata 6. 119, 651
simplex 2. 943; 3. 25; 4. 840; 6. 245
Struckmanni 9. 383²
transversa 7. 760; 9. 383²
truncata 7. 627
vulgaris 0. 99, 485; 2. 908, 909, 943; 3. 24, 29; 4. 235, 840; 5. 245, 479; 6. 207, 245, 871; 9. 359
Whatelyae 6. 218, 738; 8. 2, 124 ff.
Myoporum
ambiguum 4. 379
Larteti 5. 371
Sansaniensis 5. 224
Myopsis
gen. 4. 755!; 6. 246, 249!
arcuata 0. 230
Jurassi 4. 755; 6. 249
marginata 4. 755; 6. 249
punctata 2. 230
fossilis 5. 371
Myotherium (Glir.)
gen. 4. 831
Myoxus Cuvieri 5. 224
glis 2. 899; 5. 225
incertus 5. 224
murinus 5. 371
nitela 2. 968; 5. 225, 371
obtusangulus 9. 173!
Parisiensis 5. 224
Sansaniensis 5. 224
spelaeus 5. 224;
spp. 5. 371
Myrianites
gen. 2. 374; 8. 764*
Mac-Leayi 4. 126; 6. 115
Murchisoni 4. 126
Sillimani 4. 126
tenuis 3. 380; 6. 115
spp. 3. 123
Myriaporidae (fam.) 6. 114
Myrica 0. 633
acuminata 2. 751; 9. 503
amissa 9. 501
antiqua 4. 378; 9. 502
arguta 3. 503; 9. 503
banksiaefolia 2. 750; 3. 503; 9. 503
carpinifolia 3. 226
denticulata 8. 500
deperdita 1. 128; 3. 503; 4. 491; 9. 501²
Faya 6. 244
Gaudini 9. 501
granulosa 8. 498
Haeringiana 2. 750; 4. 532; 9. 374
Helvetica 3. 503; 9. 503
integrifolia 3. 503; 4. 491; 9. 501
Joannis 8. 500
Laharpei 9. 501

Myrica
longifolia 2. 750; 3. 47, 503; 9. 374, 503
obtusiloba 3. 503; 9. 501
Oeningensis 9. 501
Ophir 2. 750, 753; 3. 503; 9. 374, 503
rugosa 3. 226
salicifolia 3. 226
salicina 9. 501
speciosa 2. 750; 9. 374
Studeri 9. 501
subcordata 3. 226
subintegra 3. 226
ulmifolia 9. 374
Ungeri 9. 501
Vindobonensis 9. 501
weinmanniaefolia 6. 505
Myriophyllia 2. 117*
Myriophyllites 0. 636
dubius 6. 97
gracilis 5. 629
microphyllus 6. 97
myriophyllum 5. 629
Myriopoda (class.) 6. 765
Myriozoum
truncatum 2. 855*
Myripristis
leptacanthus 5. 380
Myrmecophaga
gen. 4. 111
Myrmicium
Heeri 5. 747
Myrsine
celastroides 4. 379
chamaedrys 9. 376
Draconum 9. 375
Europaea 4. 379
salicoides 2. 760; 3. 505
Myrthomyophyton n. g.
stephanophorus 7. 777
Myrtillocrinus
gen. 6. 376!
elongatus 6. 234, 374, 633; 7. 860
Myrtonius serratus 6. 746
Myrtus 0. 637
Atlantica 4. 380
Austriaca 2. 628
communis 6. 244; 9. 253
Oceanica 4. 380
Mysarachne
Picteti 5. 224, 371
Mysia gen. 9. 126
Mystacides spp. 6. 622
Mystriosauri
(fam.) 6. 760
Mystriosaurus
gen. 5. 421*, 494*
Bollensis 5. 106
Brongniarti 5. 495
Chapmani 5. 495
Egertoni 5. 107, 494 ff.
Franconicus 5. 494 ff.
Laurillardi 5. 106, 494; 6. 760
longipes 5. 495
macrolepidotus 5. 107, 494 ff.
Mandelslohi 5. 495
Murki 5. 495
Münsteri 5. 107, 494 ff.
Schmidti 5. 495
Senkenberganus 5. 495
speciosus 5. 107, 494 ff.
tenuirostris 5. 107, 494 ff.
Tiedemanni 5. 495
spp. 4. 370
Mytilina
polymorpha 6. 239
Mytilites arcnarius 3. 24
costatus 1. 647; 3. 24
eduliformis 3. 24
keratophagus 4. 748
socialis 1. 642; 3. 24
striatus 4. 748; 6. 875
vetustns 3. 24
Mytilomeria gen. 6. 238
Mytilomya gen. 6. 862
Mytilus
actininotus 3. 231
acuminatus 4. 748; 7. 637
acutirostris 2. 943; 6. 239, 862
affinis 1. 712
ampelitaecola 3. 231
ampliatus 3. 231
amplus 0. 172, 174, 184; 4. 765; 7. 86
anatinus 9. 116
antiquorum 3. 74
apertus 6. 239, 862; 8. 874
apicicrassus 3. 231
Aquisgranensis 3. 231
Aramacus 7. 502
arca 6. 239
arcuarius 3. 24
arenarius 6. 363
arenicola 6. 495
asper 4. 765
Mytilus
attenuatus 7. 492; 8. 495
aviculoides 6. 643
barbatus 7. 229
Basteroti 6. 862
Benedenanus 3. 231
bilocularis 6. 238
Binfieldi 4. 765
bipartitus 8. 357
Brardi 0. 800; 1. 714; 2. 765; 4. 520; 6. 239, 862; 7. 604
carinatus 6. 860; 7. 507
cestinotus 3. 231
Chemnitzi 6. 239
chorus 7. 223
Ciplyanus 3. 231
clathratus 3. 231; 6. 869
cochleatus 6. 239
compressus 4. 765
concavus 8. 766
concentricus 3. 231
Cordolianus 3. 231
Cottae 3. 231
crenatus 2. 229
cuneatus 1. 486; 6. 852; 7. 743; 8. 357
decoratus 6. 71, 495; 8. 226
dichotomus 6. 495
dimidiatus 6. 500
divisus 3. 231
eduliformis 1. 649; 4. 413; 6. 245, 363; 9. 359
edulis 1. 621 ff.; 2 194 f., 1004; 3. 564; 4. 36, 196, 765; 6. 593, 730; 7. 180, 248; 9. 260
ellipticus 3. 605
Esinensis 9. 499
fabalis 3. 231
falcatus 1. 744
Faujasi 4. 528; 8. 607; 9. 839
Fidia 6. 218
Floenianus 3. 231
Fontenoyanus 3. 231
fragilis 1. 609
furcatus 4. 765
Galliennei 3. 231
Galpinanus 8. 495
Gastrochaena 6. 363; 7. 760

Mytilus
gibbosus 1. 412, 419; 3. 319; 4. 851
glabratus 6. 495; 7. 210
Hageni 6. 239
Hainoensis 3. 231
Hausmanni 3. 776, 780; 4. 118, 748, 489, 748; 5. 875; 7. 223, 637
Helli 9. 629
hesperianus 2. 1004
hillanoides 4. 851
Hillanus 6. 454; 8. 643
imbricatus 4. 765
inaequivalvis 6. 239, 862
incurvus 4. 869; 6. 752
inflatus 3. 231
jurensis 4. 355, 765
laevis 8. 643
lamellosus 6. 495
Leckenbyi 7. 743
Lefebvreanus 3. 231
liasinus 6. 495
Ligeriensis 6. 206
ligonula 3. 231
lineatus 3. 231; 6. 239
lithophagus 5. 595, 844
Lonsdalei 4. 765
Mariae 3. 231
meridionalis 7. 223
minimus 6. 454
minutus 3. 319; 7. 93, 94; 8. 352, 353²; 9. 452ff., 629
Morrenanus 3. 231
Morrisi 8. 643
Mosensis 3. 231
Mülleri 3. 231; 6. 363, 365
nitidulus 6. 454, 495; 8. 643
nudus 3. 231
numerus 7. 242
numismalis 6. 456
Omaliusanus 3. 231
Orbignyanus 4. 250
Palatonicus 6. 239
Pallasi 3. 126; 7. 223, 374
pallidus 8. 488
palmatus 3. 231
pectinatus 1. 486; 2. 229; 8. 357
Permianus 8. 766
pernella 3. 231
pertenuis 8. 497
Phaedra 1. 101
Piedroanus 7. 242
pileopsis 3. 231
plebejus 6. 239
plicatus 4. 765
polymorphus 6. 239, 862
praepes 3. 231
priscus 6. 373
productus 6. 495
psammitis 6. 625
psilonotus 3. 231; 4. 851; 6. 495
pulcher 1. 486; 2. 229; 8. 357
pulcherrimus 4. 765
pygmaeus 1. 141; 2. 108; 3. 319
Quenstedti 6. 363
Queteletanus 3. 231
radiatus 0. 294
rectus 8. 766
rectrocessus 3. 231
rostriformis 6. 239, 862
rusticus 6. 495
Calypso 8. 874
scalaris 3. 231
scalprum 0. 481; 6. 495
semiplicatus 0. 102
septifer 4. 118, 748; 7. 223, 637
Simoni 6. 495
socialis 3. 135; 9. 137
solenoides 4. 765
Sowerbyanus 4. 765; 7. 133
spatulatus 5. 475
squamosus 4. 118, 748; 7. 223; 8. 716, 766
striatissimus 4. 869
striatulus 1. 486; 2. 229; 6. 495; 8. 357
striatus 7. 637
subarcuatus 8. 495
subcarinatus 6. 239, 862; 8. 874
sublaevis 4. 765
subglobosus 6. 239
subparallelus 4. 851
subpectinatus 8. 488
subrectus 2. 229
sulcatus 4. 766
tenuistriatus 4. 765; 8. 486
tenuitesta 0. 102
Terquemanus 3. 23; 4. 851
textus 6. 495
Thielaui 3. 220
Toilliczanus 3. 231
Tornacensis 3. 231
tumidus 4 765; 7. 743
undulatus 3. 231
ungula-caprae 6. 239
ungulatus 7. 743
unguiculatus 6. 119
vetustus 0. 99, 485; 2. 909, 943; 4. 413
Villersensis 8. 486
Voironensis 9. 124
Wesmaelanus 3. 231
Wolgensis 6. 239
spp. 2. 977; 7. 623; 8. 384
Mytulites 3. 24
vdr. Mytilites
Myzalia
gen. 5. 120
globosa 5. 122
pilosula 5. 122
punctulata 5. 122
rostrata 5. 122
truncata 5. 122

N.

Nabis livida 3. 873
lucida 6. 620
maculata 3. 873
vagabunda 3. 873
Näckebröd 0. 34!
Nadeleisenerz 3. 475, 837
Nadelerz 2. 534; 4. 76*; 9. 734
Nagelkohle 9. 238
Nagelflue 0. 645; 4. 361!; 6. 132; 9. 740, 779, 813

Nagelflue
-Geschiebe:
mit Eindrücken 2.827; 8. 106
Nager (der)
von Salmendingen 2.360
von Waltsch 3. 578; 6. 362
Najadita gen. 4. 855!
lanceolata 4. 855
obtusa 2. 993; 4. 855
petiolata 2. 993; 4. 855
Najadopsis
gen. 5. 639!
delicatula 5. 639
dichotoma 5. 639
major 5. 639
Najas
effugita 5. 639
stylosa 5. 639
Nakrit 7. 70
Nanocrinus
gen. 6. 632!
paradoxus 6. 632!; 7. 860
Naphtha 1. 718; 6. 696
-Quellen 1. 718
Narcodes gen. 8. 249
Narica
spinescens 3. 230
Naseus
rectifrons 5. 380
Nassa
asperula 3. 75
Basteroti 3. 75
carinata 3. 635
Caronis 6. 93
columbelloides 0. 751
conglobata 3. 763
consociata 3. 763
costula 3. 763
elegans 3. 763
flexuosa 6. 93
granulata 3. 763
incrassata 2. 509; 3. 763
interstriata 7 242
labiosa 3. 763
Monensis 3. 763; 7. 509
microstoma 3. 763
murina 3. 75
Piedroana 7. 242
pliocaena 7. 509
prismatica 3. 763
propinqua 3. 763
proxima 3. 763
pygmaea 7. 509
Nassa
reticosa 3. 763
striata 3. 75
spp. 4. 626
Nasua
Parisiensis 5. 230
Natica
abducta 0. 160; 2. 228; 8. 356
acuminata 4. 874
adducta 1. 487; 3. 235
Alderi 7. 510
alpina 4. 555
ambigua 3. 234; 7. 492; 8. 494
ambulacrum 1. 715
ampliata 1. 609
amplissima 6. 384
angulata 3. 634
angusta 9. 356
angustata 5. 475; 6. 740
annulata 6. 256
Beaumonti 5. 475
bicarinata 3. 604
bifasciata 9. 356
Bowerbanki 7. 510
brevissima 4. 874, 809
bulbifera 4. 870
bulbiformis 3. 717, 633, 634; 4. 874; 5. 591, 593
Cainallii 9. 356
canaliculata 0. 294; 2. 228; 3. 234
canrena 1. 741; 2. 43, 162, 169
Carlyana 7. 863
Cassiana 9. 356
catena 3. 765
catenoides 3. 765
cepacea 3. 604; 6. 93
Chinensis 9. 356
cincta 3. 235
cirriformis 3. 765
clausa 1. 621 ff.; 3. 765
cognata 6. 363; 7. 760
Comensis 6. 758²; 9. 356
complanata 9. 356
compressa 3. 74
concinna 7. 864; 8. 494
coronata 3. 234
costata 6. 64
crassa 1. 741
Natica
crassatina 0. 862; 3. 370; 5. 475; 6. 93, 739; 8. 590, 874
crenata 3. 634; 4. 873
decussata 1. 487; 2. 228
Dejanira 6. 763
Delbosi 0. 862; 4. 573
depressa 1. 712
depressula 7. 509
Diegoana 7. 242
doliolum 7. 760
elegans 8. 488
elegantissima 9. 356
epiglottina 1. 712; 8. 740; 9. 866
exaltata 4. 874
facellata 9. 356
fastosa 9. 356
Favreina 8. 740
formosa 3. 234
Gaillardoti 0. 99; 2. 943; 6. 363; 7. 760; 9. 170, 360
gaultina 4. 250
geniculata 7. 242
gibbosa 7. 242
gigantea 2. 435
glaucina 2. 43; 4. 515
glaucinoides 0. 860; 3. 765; 5. 603; 6. 534; 9. 125
globosa 3. 230; 5. 848; 8. 488
globulosa 3. 234
Gomondi 2. 228
grandis 3. 234
granum 9. 357
gregaria 6. 363, 366, 245; 7. 760
Groenlandica 3. 765
Guillemini 2. 358; 3. 765
Hantonensis 1. 716; 9. 125
helicina 2. 43; 4. 661
helicoides 3. 765
hemiclausa 1. 741; 2. 162, 169; 3. 765
hemisphaerica 8. 488
Hercynica 3. 7; 4. 118, 489, 750; 7. 638
Hörnesana 3. 634; 4. 873
hybrida 2. 162, 169; 3. 604

Natica
immersa 3. 634; 4. 874
impressa 5. 501
inaequiplicata 5. 501
incerta 5. 479; 6. 363; 7. 760
inflata 2. 930
intermedia 3. 234
Inwaldana 2. 348; 6. 763
Klipsteini 5. 501
Koninckana 4. 850; 6. 494
labellata 1. 712
Leckhamptonensis 2. 228
Leibnitzana 4. 118, 750; 7. 638
lemniscata 6. 758; 9. 356
Lipoldi 6. 758
Littonana 7. 863
longa 1. 764; 7. 229
lugubris 9. 356
lyrata 3. 634; 4. 870; 5. 591
macrostoma 2. 228; 5. 848; 8. 488
maculosa 6. 737
magister 9. 506
mammillaris 6. 93
maxima 0. 862
Meriani 6. 758²; 8. 383f; 9. 356, 629
Michelini 3. 234
millepunctata 2. 43; 5. 595; 7. 783; 9. 839
minima 4. 750; 7. 638
monstrum 9. 356
Moreauensis 7. 492; 8. 494
multipunctata 3. 765
multistriata 7. 369
mutabilis 3. 604
naulitiformis 9. 356
neritina 5. 501; 9. 356
neritoidea 3. 234
nodosa 5. 865
obesa 0. 714, 736; 1. 740
obliquata 7. 864; 8. 494
obstructa 9. 356
occidentalis 7. 492; 8. 494
occlusa 3. 765
Ocoyana 7. 242
Oetites 7. 242
Natica olla 3. 74
oolithica 3. 20; 6. 363; 7. 760
orbiculata 9. 357
pachystoma 7. 404
paludata 9. 356
paludiniformis 7. 864; 8. 494
papilio 9. 356
patula 1. 715, 741, 764; 3. 604, 765; 7. 229
Pedernalis 0. 102
Pelops 6. 850
permunda 6. 230
perusta 8. 587
petrosa 9. 498
phasianella 0. 481
Picteti 5. 475
piligera 6. 372
Piovernae 9. 356
plicata 7. 210
plicistria 3. 230; 6. 125
plumbea 6. 384
polymita 9. 356
ponderosa 3. 604
praegrandis 0. 102
praelonga 0. 480; 4. 80; 6. 451; 8. 874
prolixa 9. 356
proxima 3. 765
pseudo-spirata 5. 501
pulchella 9. 357
pulla 7. 760
pungens 4. 874
pyramidata 3. 234
rectilabrum 9. 498
reticulata 9. 356
retusa 7. 210
retro-punctata 9. 356
robustella 9. 357
Roemeri 4. 874
rugosa 3. 634; 4. 873
semiglobosa 3. 634; 4. 873
Sharpei 3. 234
sigaretina 1. 764; 3. 370, 604; 5. 369, 475 ff.; 6. 93, 739; 7. 229
Smithi 7. 509
sphaeroidalis 9. 357
spirata 1. 740; 2. 162, 169; 3. 370; 6. 739
striata 1. 715
Stoddardi 9. 750
Stricklandi 3. 234
Studeri 5. 475 ff.; 6. 740
Natica subangulata 6. 454
subbulbiformis 4. 874
subcanaliculata 3. 234
subcostata 6. 500
subcrassa 7. 492; 8. 494
subepiglottina 3. 74
sublabellata 3. 74
sublineata 6. 758²
subovata 9. 356
subspirata 5. 501
Suessoniensis 6. 739
sulcata 2. 509
supracretacea 1. 101
Tancredi 3. 234
tecta 9. 357
tigrina 3. 74
tumidula 2. 228
Tuomayana 8. 494
turbilina 6. 245, 363; 7. 760; 9. 360
turris 6. 363
varians 3. 765
variata 3. 230
ventrica 7. 116
ventricosa 9. 827
Verneuili 3. 234
Vulcani 8. 587
vulgaris 0. 294
Willemeti 3. 604
spp. 1. 382; 6. 750; 9. 123
Naticella
compressa 5. 501
costata 0. 732; 5. 219; 6. 214; 7. 615, 621, 760; 9. 477
decussata 1. 487; 2. 228
plicata 7. 695
rugoso-carinata 7. 695
tuba 4. 546!
Naticidae (fam.) 6. 121
Naticodon gen. 3. 232!; 6. 161
brevispira 3. 230,
globosus 3. 230
otaroide 3. 230
pyrula 3. 230
spiratus 3. 230
variatus 3. 230
Naticopsis gen. 6. 121
ampliata 6. 121
glaucinoides 6. 121
plicistria 6. 121
Pricei 8. 766
spirata 6. 121
variata 6. 121
spp. 5. 248

Natrolith 2. 526; 3. 464, 684, 843; 5. 702; 6. 181; 7. 324, 328!
-Syenit 3. 465
Natron,
kaustisches 2. 796
-Mesotyp 1. 593
-Salpeter 2.224; 3.835!
-Spodumen 4. 593
-hydrosilikat 3. 64!
Natur-Selbstdruck 6. 478
Naturforscher-Versammlung in Gotha und ihre Verhandlungen 2. 49
Nautilidae
(fam.) 6. 125, 308!; 7. 679*; 8. 617!
Nautilini
(Goniatitae) 1. 547!
Nautiloceras
gen. 6. 126!; 8. 617
Nautiloida
(fam.) 5. 754! ff.
Nautilus
gen. 4. 853; 6. 126!, 316*; 7. 679*
Albensis 9. 373
acutus 1. 539
aduncus
affinis 4. 850
aganiticus 2. 349
anomalus 6. 320
angulatus 6. 480; 8. 241
aratus 0. 733; 2. 456; 4. 552; 6. 743, 748; 8. 105
Archiacanus 5. 633
Aturi 4. 854; 5. 405*
australis 4. 853
Austriacus 6. 748
Baberi 3. 234
Barrandei 0. 250
bicarinatus 1. 608
bidorsatus 0. 99, 485; 2. 908, 910, 916; 3. 10, 13, 19, 29; 5. 316, 358; 7. 761; 9. 91
bilobatus 6. 121
bisulcatus 5. 512
Bohemicus 4. 6*
Bouchardanus 9. 373
Bowerbankanus 4. 750; 7. 638
Bucklandi 4. 853
Calloviensis 8. 484
cariniferus 6. 122
Nautilus
centralis 4. 853
Clarkanus 7. 863
clathratus 4. 548!; 6. 748
Clementinus 9. 373
clitellarius 1. 609
complanatus 6. 122
compressus 5. 633
Cornuelanus 4. 375
coronatus 6. 122
costato-coronatus 3. 760; 6. 122
Danicus 1. 101
Deshayesi 2. 1000; 4. 854
Dekayi 8. 484; 9. 498
Deslongchampsanus 5. 633; 9. 373
dilatatus 3. 874
discus 6. 122
dispansus 3. 234
Domeykus 0. 481
dorsalis 8. 618
Dufrenoyi 4. 375
Edouardanus 0. 157
elegans 0. 102, 727; 2. 961; 4. 870; 5. 633²; 7. 785, 787; 9. 373
ellipticus 2. 165, 170
excavatus 6. 217
excentricus 8. 349
expansus 5. 633
Fittoni 5. 633
Fleuriau-anus 5. 633; 7. 204
Freieslebeni 2. 197; 3. 126, 128, 772; 4. 118, 489, 750; 7. 638
giganteus 0. 174; 4. 355; 8. 488
gigas 2. 343
globatus 2. 108; 6. 122; 9. 827
Goniatites 0. 251; 1. 538
Gravesanus 6. 748
Hebertinus 1. 101
heterophyllus 0. 251
imperialis 3.604; 4.853
ingens 6. 122
inornatus 8. 356
intermedius 5. 625; 6. 217, 748; 7. 618
Kentuckyensis 9. 827
laevigatus 0. 728; 5. 633
Nautilus
Largilliertanus 5. 633
lineatus 0. 157; 2.229; 6. 217; 7. 130
lingulatus 0. 434, 603, 736; 2. 164, 170; 3. 85, 604; 9. 844
Llwydi 6. 122
Malherbei 6. 494
mammillaris 4. 375
Martinii 4. 375
mesodicus 1. 538
Milletanus 4. 375
mirus 6. 320
Neckeranus 4. 375; 7. 474; 9. 373
neocomiensis 5. 633; 9. 373
nobilis 2. 146
nodulosus 5. 512
occidentalis 8. 766
opalinus 9. 29
orbiculatus 6. 480
orbiculus 8. 241
oxystomus 6. 122
parabolicus 2.164, 170
Parkinsoni 4. 854
Perezi 3. 604
permianus 8. 766
plicatus 4. 375
Pompilius 2. 855*; 3. 404; 4. 854; 5. 229, 284*
propinquus 2. 165
pseudo-elegans 0. 393; 5. 324, 633; 8.874; 9. 373
quadratus 6. 122
Quenstedti 0. 251
radiatus 5. 633; 9.373
Ramshaueri 5. 502
rectangularis 5. 502
redivivus 5. 512
regalis 1. 764; 3. 370, 604; 4. 853; 6. 93, 739; 7. 229
Requienanus 0 487; 4. 375
reticulatus 1. 538
Salisburgensis 0. 251; 1. 538
Schlumbergeri 6. 494; 8. 643
Schmidti 5. 625
semistriatus 0. 481; 1. 415, 419
Simonyi 0. 251

Nautilus
simplex 0. 102, 386; 2. 961; 4. 538
Sowerbyanus 5. 633; 8. 505
Sowerbyi 4. 853
Spillimanni 6. 480
squamosus 9. 373
Sternbergi 4. 6*
striatus 0. 481; 6. 217, 494, 743, 748; 7. 595; 8. 643; 9. 827
Stúri 6. 748
subtruncatus 3. 234
subtuberculatus 2. 278; 6. 371; 8. 618
sulcatus 6. 122
sypho 4. 854
Theobaldi 4. 489
Toarcensis 6. 850
triangularis 1. 743
trochlea 6. 121
truncatus 0. 723; 3. 319; 8. 356
tuberculatus 1. 608; 6. 121
tuberosus 3. 760; 6. 121
undulatus 5. 633
urbanus 4. 853
Varusensis 9. 373
ziczac 1. 538; 3. 85; 4. 854; 9. 844
spp. 1. 382; 4. 3 ff.; 9. 123
Navicula
affinis 4. 613
amphiceros 0. 473
amphioxys 0. 473, 491
amphirhynchus 0. 491
aponina 0. 473
aspera 6. 230
attenuata 0. 473
bacillum 0. 491; 4. 613
carassius 0. 473
costata 2. 196
cristata 5. 471
crytocephala 0. 473
curvula 0. 489
cuspidata 0. 473
didyma 0. 473
elliptica 0. 473
fulva 0. 491
gastrum 0. 473
gracilis 0. 473, 491; 4. 739
Navicula
hemiptera 0. 473
interrupta 0. 473
lamprocampa 0. 473
librile 1. 229
lunosa 0. 473
major 0. 473
neglecta 0. 473
oblonga 0. 473
platalea 4. 613
rhomboides 0. 473
scalprum 0. 473; 6. 104
semen 0. 250
sigma 0. 489; 4. 613
silicula 4. 613
sphaerophora 0. 473
Suecica 0. 473
tabellaria 4. 613
Thuringica 0. 473
viridis 0. 473; 2. 196
spp. 6. 752
Neaera
caudata 6. 858
costellata 6. 858
cuspidata 3. 756; 6. 858; 7. 507
Ibbetsoni 7. 743
jugosa 7. 507
spp. 7. 632
Nebengestein auf Erzführung wirkend 3. 726
Nebulipora 6. 113
expansa 6. 113
explanata 7. 104
lens 6. 113; 7. 104
lobata 0. 117
ovulum 5. 865
papillata 6. 113; 7. 104
petiolata 0. 117
serrata 0. 117
Neft-Gil (Mineral) 8. 468!
Negros (Erzgänge) 1. 615
Negundo
trifoliata 0. 507, 508; 2. 762
Nehrungen:
Entstehung 0. 80*
Neithea
adunca 9. 839
alata 4. 80
alpina 4. 869
Dutemplei 4. 869
gigas 9. 839
laevis 1. 742
occidentalis 6. 480
quadricostata 4. 869
quiquecostata 9. 234
Neithea
simplex 9. 839
striato-costata 4. 869
spp. n. 1. 603; 6. 752
Nekrolog;
Charpentier's 5. 678
Nelomys gen. 4. 864
Nelumbium
Buchi 3. 510
nymphaeoides 4. 877
Nemacanthus
spp. 5. 234
Nemalith 1. 556; 2. 66!
Nemaphyllum 2. 122
Nemapodia
gen. 2. 374; 5. 593; 6. 171; 8. 764!
Nemastoma
clavigerum 5. 124
denticulatum 5. 124
incertum 5. 124
tuberculatum 5. 124
Nematophyllum
arachnoideum 6. 114
clisioides 6. 114
decipiens 6. 114
minus 6. 114
spp. 2. 990
Nematura gen. 3. 327
granulum 3. 327
spp. 1. 712
Nemertites
gen. 2. 374; 8. 764*
Ollivanti 4. 126; 6. 115
Strozzii 7. 598
Nemopantes 0. 636
Nemopodia
gen. 4. 126
Nemopteryx
mandibularis 4. 751
spp. 9. 862
Nemoura
affinis 6. 621
ciliata 6. 621
elongata 6. 621
furca 6. 621
gracilis 6. 621
lata 6. 621
linearis 6. 621
minuscula 6. 621
ocularis 6. 621
puncticollis 6. 621
Neocomien 0. 390, 416, 474, 735, 738; 2. 92, 187, 454, 510, 594, 823; 3. 192, 717, 811;

Neocomien
4. 204, 250, 310, 357 ff., 508, 539, 652, 740*; 5. 43, 358, 364, 473, 845; 6. 66, 356, 719, 847; 7. 481, 618; 8. 629p., 709, 848; 9. 123 p., 124 p., 372p.
in Venezuela 0. 480
-Bildung
um Braunschweig 0. 230
im Jura 0. 865
-Formation 6. 663
-Grenze, obre 1. 737
-Kalk 0. 355
Neogen
-Formation 3. 331; 7. 52, 614; 8. 834, 874p., 875g.
-Fossilien
von Wien 2. 112!
-Gebirge 3. 806, 809!
Neogene
Säugethier-Faunen 4. 608
Neolith 4. 71
Neomys
Lembronica 5. 225
Neopyre 7. 357!
Neosaurii (ord.) 5. 742
Neotokit 3. 61; 8. 313!
Neozoische
Gebirge 9. 100
Neoschizodus
gen. 5. 245!
curvirostris 6. 363; 8. 383
elongatus 5. 245!; 6. 363
laevigatus 5. 245!; 6. 363, 365; 9. 360
ovatus 6. 245, 363, 365; 9. 360
posterus 7. 93, 94; 9. 452ff.
simplex 5. 245!
Nepa
atavina 3. 874
Nephelin 1. 558; 2. 535; 3. 261, 602; 6. 423; 7. 43; 9. 586
-Fels 1. 558, 591!; 2. 485!; 3. 742; 7. 28, 41!; 9. 832
Nephrodium gen. 3. 761
Nephrotus
Chorzowensis 6. 746
Nephthya 2. 123
Nephrit 1. 204*; 4. 71
Nephropteris
spp. 9. 380
Nepidium
Stolones 5. 747
Neptunische Entstehung
von Feldspathen 0. 43*ff.
von Granit 0. 48*
von Quarz 0. 48*
Nereiserpula
gen. 8. 748
Nereites
gen. 2. 374; 5. 593; 8. 764*
Cambrensis 4. 126; 6. 115
carbonarius 7. 754!
Deweyi 4. 126
gracilis 4. 126
lanceolatus 4. 126
Loomisi 4. 126
Mac-Leayi 4. 126
multiformis 6. 67
pugnus 4. 126
Sedgwicki 4. 126; 6. 115; 7. 754!
spp. 3. 123
-Schichten 3. 615, 622; 4. 633
Nereograpsus
gen. 2. 374!; 4. 126!; 8. 764*
Beyrichi 4. 126
Cambrensis 3. 622; 4. 126
Mac-Leayi 4. 126
Sedgwicki 4. 126
Neridomus
gen. 3. 237!
hemisphaericus 3. 234
minutus 3. 234
Nerinaea s. Nerinea
Nerinea
gen. 0. 638!
acicula 2. 229
acus 0. 102
bicincta 3. 633, 634, 715, 718; 4. 870, 873; 5. 87
Bouei 3. 634
brevis 0. 639
Bruntrutana 0. 184, 639, 726, 735; 2. 229, 348; 4. 354; 6. 763
Nerinea
Buchi 3. 634; 4. 873; 7. 618
Carpathica 2. 348; 6. 743
castor 6. 763
cincta 0. 726; 3. 634; 4. 873
conoidea 6. 763
conulus 6. 763
crispa 2. 348; 6. 763
cylindrica 0. 639
depressa 0. 184; 2. 348; 6. 763
Dufrenoyi 3. 234; 7. 131, 132
Eudesi 3. 234
flexuosa 3 634
funiculus 3. 234
Geinitzi 4. 566
gigantea 8. 874
Gosae 0. 726
gracilis 3. 634
grandis 0. 639; 8. 873
granulata 3. 634; 4. 873
Haidingeri 6. 763
Haueri 6. 763
hebraica 9. 356
Hoernesi 6 763; 9. 356
Hoheneggeri 6. 763
incavata 3. 634; 4. 873
incisa 3. 165
Mandelslohi 2. 348
margaritifera 8. 380
Marrotana 0. 639
Matthiolii 9. 356
megaspira 9. 356
monilifera 0. 639; 1. 743
Moreana 6. 763
neglecta 9. 356
nobilis 0. 639; 1. 358, 744; 3. 634
Olisiponensis 7. 204
Orbignyana 2. 348; 6. 763
Pailletteana 3. 634; 4. 873; 7. 204
Partschi 6. 763
patella 7. 846
Perigordina 0. 639
Plassenensis 6. 763
plicata 3. 634; 4. 873
polyptycha 4. 873
prisca 6. 758
pulchella 0. 639; 7. 204
punctata 3. 234; 7. 132
pusilla 9. 356

Nerinea pyramidalis 6. 763
quinquecincta 0. 639
Roemeri 2. 348
Santonensis 6. 763
Serapidis 1. 764; 7. 229
Staszycii 6. 763
Strambergensis 6. 763
Stricklandi 3. 234
subaequalis 7. 204
Suessi 6. 763
supracretacea 3. 604
suprajurensis 0. 726
tricincta 0. 639
trinodosa 0. 184
turbinata 3. 633, 634
Turritella 0. 639
turritellaris 0. 726; 3. 634; 4. 873
Visurgis 0. 626
Voltzi 2. 348; 3. 234
Wosinskiana 2. 348
Zeuschneri 6. 763
spp. nn. 2. 229
Nerineen-Kalk 0. 355; 2. 346 p.; 4. 360; 6. 763; 7. 154
Nerinella 0. 639!
Dupiniana 0. 639
Nerita angulata 0. 174, 248; 8. 488
aperta 1. 712; 4. 524
Austriaca 5. 501
Bavarica 4. 524!, 526
bisinuata 0. 248
callosa 9. 356
cancellata 3. 234
cassidiformis 2. 228
cestophora 3. 230
cingulata 4. 869
conoidea 0. 222, 736; 1. 764; 6. 251
costata 1. 487; 2. 228; 8. 356
costellata 2. 348
costulata 3. 234
crassa 3. 604
crepidula 9. 356
Esinensis 9. 356
gigantea 9. 839
glebosa 3. 230
Goldfussi 3. 634
Haliotis 6. 256
hemisphaerica 3. 234; 5. 848
Hörnesana 4. 874
jurensis 5. 848
Klipsteini 5. 501
laevigata 2. 228; 3. 235
Nerita Laffoni 0. 856
lineata 2. 228
liasina 6. 454; 8. 643
Lyelli 1. 487; 2. 228
minuta 2. 228; 3. 234
Münsteri 5. 501
ovulum 9. 356
perversa 0. 860; 3. 604
picta 9. 839
plicistria 3. 230
Plutonis 9. 839
Prinzingeri 6. 384
pseudocostata 3. 235
pulla 1. 487
rugosa 3. 234
Schmidelana 7. 229
semiluna 7. 210
spirata 3. 230
subplicata 3. 74
sulcosa 2. 228; 3. 234
tricarinata 5. 475
tumidula 2. 228
variata 3. 230
varicosa 3. 234
spp. 6. 750
Nerites s. Nereites 7. 753
Neritina arenacea 6. 494
cannabis 6. 494; 7. 210
concava 1. 712, 714; 3. 532
conoidea 0. 487; 3. 331; 5. 369; 8. 586
crenulata 4. 249
cyrtocelis 2. 765
Danubialis 8. 875
fluviatilis 1. 623; 2. 765
fulminifera 9. 138
Grateloupana 9. 137
Hettangiensis 6. 494; 7. 210
obtusangula 2. 765
Schmidelana 6. 356
sparsa 2. 765
Staffinensis 2. 352
virginea 6. 90
zebra 9. 116
Neritinium 0. 634
dubium 1. 128; 3. 227
Neritoma bisinuata 0. 248!
sinuosa 0. 248; 8. 488
Neritopsis
compressa 5. 501
exigua 6. 495
galeola 9. 356
pustulosa 3. 604
sulcosa 3. 234
varicosa 3. 234
Neritopsis spp. 6. 750
Nero di Prato 7. 599
Nervation
der Blätter 4. 621!; 6. 478
Nesodon
gen. 3. 757!; 6. 232*, 7. 224, 869
imbricatus 3. 758
magnus 3. 758
ovinus 3. 758
Sullivani 3. 758
Nestor 0. 125
spp. 1. 251
Netzläufer (-Pflanzen) 4. 376
Neubayerner Marmor 3. 83
Neuer Rother Sandstein 1. 475
Neurocoris
gen. 3. 866, 875!
elongatus 3. 873
rotundatus 3. 873
Neuropora
damicornis 5. 635
Defrancei 5. 635
spinosa 5. 635
spp. 2. 125
Neuroptera (ordo) 6. 620!
Neuropterideae (fam.) 5. 240; 9. 380!
Neuropteris 0. 627
acuminata 5. 630
acutifolia 5. 630; 6. 97
adnata 1. 610
affinis 5. 630
Albertii 2. 886
alpina 0. 120, 669; 5. 630
angustifolia 6. 97
auriculata 0. 91; 1. 476
Bohemica 6. 97
Clarksoni 9. 849
conferta 6. 56
confluens 5. 630
conformis 1. 609
cordata 5. 97
coriacea 3. 121
Dufrenoyi 5. 353; 7. 113
elliptica 8. 503
Escheri 0. 661, 668!
fimbriata 9. 849
flexuosa 0. 120, 668; 5. 630; 6. 97; 9. 849
gigantea 0. 120, 668; 3. 121; 5. 630²; 6. 97; 8. 159

Neuropteris
heterophylla 0. 91, 668
hirsuta 9. 849
Huttonana 4. 743
Huttoni 2. 886
ingens 5. 630
lancifera 9. 826
linaefolia 8. 358
Loshi 0. 661, 668; 2. 890; 3. 121; 6. 96, 97; 8. 503, 759
macrophylla 5. 630
Murchisoni 2. 886
obtusa 6. 97
obovata 6. 97
ovata 1. 476; 8. 159
Rogersorum 8. 401!
rotundifolia 5. 630
rubescens 6. 97
Scheuchzeri 8. 400
Soreti 0. 661, 669
squarrosa 3. 121; 5. 630
subcrenulata 1. 476; 8. 159
tenuifolia 0. 120, 662, 668; 1. 476, 609; 5. 630; 9. 848
Villiersi 1. 476
spp. 9. 379, 380
Neustosaurus
Gigondarum 5 232, 743
New-red-Sandstone 1. 104; 5. 499; 7. 732; 8. 228
Niagara-Gruppe 8. 594; 9. 235
-Kalkstein 9. 342
Niederländisches Hebungs-System 1. 94, 104
Niederrheinische Braunkohlen-Flora 2. 751
Niesen-Schiefer und Sandstein 0. 742!
Nichtleiter
des Galvanismus 3. 698
Nickel 6. 554
-Erze 1. 348; 4. 175!; 8. 330; 9. 450*
-Gehalt in Eisen-Wassern 5. 467
-haltiger Magnetkies 8. 825*
-haltiges Mineral 9.818!
Nickelantimonkies 6. 570
Nickelarsenikglanz 2.491!
Nickelbournonit 1. 348!
Nickeleisen 2. 615; 7. 335
Nickelkarbonat 1. 596
Nickelglanz 0. 190
-Eisenkies 3. 174
Nickeloxyd 6. 345
Nickeloxydul 9. 450
Nickelsilikat 0. 59!
Nickelsmaragd 4. 345!, 815!; 5. 534*
Nickelspeise 2. 492!
Nicolia 0. 638
Nigrin 3. 175, 367!
Nil-Schlamm 7. 168!
Nileidae (fam.) 4. 493
Nileus
gen. 0. 779, 785; 3. 487; 6. 224
Barryensis 7. 380
glomerinus 7. 380
palpebrosus 6. 803
spp. 2. 242; 4. 493
Nilssonia
gen 0. 630; 6. 616!, 618
Bergeri 6. 618
brevis 6. 618
Brongniarti 2. 887; 6. 618
comta 6. 618
elongata 6. 618
Sternbergi 6. 618
Niob-haltiges Mineral 9.732
-Pelop-saures Uran-Mangan-Oxydul 0.57!
-Säure 1. 693*
Niobe 6. 224
gen. spp. 2. 242, 243!
Niobit 7. 581
Nipadites 0. 631
acutus 2. 994
Bowerbanki 2. 994, 1003
clavatus 2. 994
cordiformis 2. 994
crassus 2. 994
ellipticus 2. 994
giganteus 2. 994
lanceolatus 2. 994
Parkinsonis 2. 994
Pellegrinianus 4. 251
pruniformis 2. 994
pyramidalis 2. 994
semiteres 2. 994, 1003
turgidus 2. 994
Nipadites
umbonatus 2. 994
Niso minor 2. 463
spp. 6. 750
Niveau
allgemeines, des Meeres 5. 219
-Verhältnisse der Miocän-Formation 0. 738
-Wechsel zu Land und Meer 5. 709, 732
-Wechsel des Landes im stillen Meere 4. 460
Noah-Hölzer 0. 127
Noctuites
deperditus 6. 503
Nodicava gen.
compressa 5. 653
pustulosa 5. 653
Nodicrescis
anomalopora 9. 120
inaequalis 5. 653
Nodosaria
gen. 5. 755; 7. 377
Acknerana 2. 631; 7. 377
affinis 2. 508; 7. 378
ambigua 7. 377
armata 2. 631; 7. 378
asperula 2. 631; 7. 378
Badensis 2. 631; 7. 305!, 309, 378
bacillum 2. 631; 7. 378
Beyrichi 7. 377
Bielzana 2. 631; 7. 378
Bouéana 2. 631; 7. 378
Bronnana 2. 631; 7. 378
Bruckenthalana 2. 631; 7. 377
Buchana 2. 631; 7. 377
capillaris 2. 631; 7. 378
capitata 7. 497
clavaeformis 2. 631; 7. 378
compressiuscula 2. 631; 7. 378
conica 2. 631; 7. 378
conspurcata 2. 253; 6. 756
cylindrella 7. 497
Czjzeckana 2. 631; 7. 378
decemcostata 7. 306!
Ehrenbergana 2. 631; 7. 378

Nodosaria
elegans 2. 631; 7. 378, 497
Ewaldi 2. 253; 6. 756
exilis 2. 631; 7. 378
Fichtelana 2. 631; 7. 378
Geinitzana 2. 631; 7. 377
Geinitzi 4. 489, 490; 6. 504
glandulinoides 2. 631; 7. 377
gracilis 2. 631; 7. 378
Haidingerana 2. 631
Hauerana 2. 631; 7. 377
hispida 2. 631; 7. 378
Javanica 7. 750
incerta 7. 377
inconstans 2. 631; 7. 377
intermittens 7. 497
inversa 2 631; 7. 377
irregularis 7. 378
laevis 4. 738
lagenifera 7. 377
limbata 1. 228
longiscata 2. 631; 7. 378
mammilla 2. 631; 7. 377
Mariae 6. 756
monile 4. 738; 7. 750
multicosta 7. 378
nitida 9. 371
nodifera 2. 631; 7. 378
Orbignyana 2. 631; 7. 377
prima 9. 371
prismatica 4. 672
proboscidea 4. 762
raphanistrum 2. 461, 508
Reussana 2. 631; 7. 378
Roemerana 2. 631; 7. 378
rudis 7. 378
Scharbergana 2. 631; 7. 378
sexcostata 9. 371
soluta 6. 756
spinicosta 2. 631; 7. 378
spinosa 2. 631; 7. 378
stipitata 2. 254, 631; 7. 377
urceolata 2. 349
Nodosaria
variabilis 2. 631; 7, 378
venusta 2. 254; 7. 497
verrucosula 2. 631; 7. 378
Zippei 4. 762
spp. 2. 511*; 9. 865
Nodosarida
(fam.) 5. 754! ff.
Nodus (Cet.)
gen. 4. 848
Noeggerathia
gen. 0. 627, 873; 5. 861
abscissa 2. 891
aequalis 1. 610; 2. 891
Beinertana 5. 631
caryotoides 6. 98
crassa 5. 24; 8. 503
dichotoma 2. 891; 6. 375
distans 1. 610; 2. 891
flabellata 5. 243
foliosa 6. 98; 8. 625
graminifolia 5. 240; 6. 627, 630
obliqua 2. 891
ovata 2. 891
palmaeformis 5. 243, 631; 8. 503
Rückerana 2. 891; 3. 622
speciosa 6. 98
tenuistriata 2. 891; 6. 375
Vogesiaca 8. 129!
spp. 1. 382; 3. 511; 8. 358; 9. 379, 380
Nonionida
(fam.) 5. 754!ff.
Nonionina
gen. 5. 755; 7. 377
affinis 2. 253; 6. 756; 7. 497
archetypus 8. 632
Bavarica 7. 750
Bouéana 7. 298*, 309, 497
bulloides 2. 253, 512; 6. 756; 7. 497
communis 1. 361; 7. 298, 497
dense-punctata 7. 299!
falx 1. 378
Germanica 0. 473
granosa 7. 497
Nonionina
heteropora 7. 301!
inflata 5. 86
latidorsata 6. 756
pauper 7. 300!
placenta 2.253; 6 756; 7. 497
punctata 7. 497
quinqueloba 2. 253; 6. 756; 7. 497
rotula 7. 633
Soldanii 7. 497
splendida 7. 497
subgranosa 7. 299!
tuberculata 7. 497
spp. 2. 511*; 4. 738ff.
Nontronit 0. 706!; 4.819!; 6. 35; 9. 84
Nordenskiöldit 5 831!
Nordische Blöcke 5. 77!
Geschiebe 3. 608; 5. 77!; 9. 307
Norit 5. 513
Northampton
Sandstone 0. 156
Nostoc
protogaeum 3. 502; 5. 637; 9. 122
Nostichinae
(fam.) 5. 637
Nostolepis
gen. 8. 113
striatus 8. 113
Notaeus
gen. 3. 118*, 224
Agassizi 3. 119; 6. 481
Notagogus
gen. 3. 117*
erythrolepis 1. 183
latissimus 1. 183
minor 1. 183
Pentlandi 1. 183
spp. 4. 382; 9. 764
Notamia gen. 4. 114
Notelaea
eocaenica 9. 374
Nothoceras
gen. 6. 316*, 317!; 8. 617
Bohemicum 6.317!, 324
Nothopteris 0. 638
Nothosaurus
aduncidens 3. 162!; 5. 366
Andriani 2. 883; 3. 507; 5. 233, 366

Nothosaurus
angustifrons 5. 366
Bergeri 5. 757
clavatus 5. 367
Cuvieri 2. 19 ff.; 8. 615
giganteus 2. 884; 3. 162*; 5. 233
mirabilis 2. 883; 5. 233, 366; 6. 760
Münsteri 1. 80; 2. 883; 3. 507; 5. 366
Picardi 8. 615
Schimperi 5. 233, 756
venustus 5. 367
spp. 2. 942; 3. 15, 614; 5. 757
Nothotherium
gen. 7. 700; 9. 244!
inerme 9. 245
Mitchelli 9. 245
Notidanus Münsteri 2. 759
primigenius 0. 868; 1. 254; 5. 234; 8. 870; 9. 138
serratus 5. 614
spp. 9. 764
Notomya gen. 1. 382
Notonecta
unifasciata 8. 227
Notopocorystes
n. g. 0. 122!
Bechei 0. 122!
Carteri 5. 859; 8. 231
Mantelli 0. 122!
Mülleri 8. 231
Notornis 0. 125
Mantelli 1. 251, 256
Notosomus
gen. 3. 117*; 8. 237!
octostychius 8. 237
spp. 9. 764
Nucinella gen. 2. 1005!
miliaris 2. 1004
Nucleocrinus
elegans 2. 747*
Nucleolites
carinatus 7. 747
castanea 7. 748
clunicularis 0. 722; 2. 229; 4. 621; 7. 132, 134, 747
conicus 7. 852
crucifer 8. 360
decollatus 9. 364
depressus 7. 748
dimidiatus 6. 101
Edmundi 7. 852
Nucleolites
gracilis 7. 747
granulosus 6. 95
Gresslyi 4. 647! ff.
incisus 4. 649
lacunosus 4. 647; 6. 206
latiporus 7. 852
Michelini 6. 101
neocomiensis 4. 653!
Nicoleti 4. 654
Olfersi 4. 647! ff.
orbicularis 0. 722; 4. 621
pyramidatus 7. 747, 852
Sarthacensis 7. 852
scutatus 6. 101; 7. 747
sinuatus 4. 621; 7. 134
Sowerbyi 7. 747, 852
subquadratus 4. 654
truncatulus 0. 230; 4. 649
Woodwardi 6. 100
Nucleopygus
incisus 6. 228
Nucula gen. 6. 649, 872
acuminata 6. 871, 872
acuta 6. 752
aequalis 6. 752
aequilateralis 7. 492; 8. 495
Ahrendi 2. 932; 6. 649
Albertina 6. 873
amoena 4. 851
amygdaloides 6. 872
Anglica 6. 120, 872
antiquata 6. 872
arctica 6. 873
attenuata 6. 120, 649
axiniformis 6. 495; 7. 743
bella 6. 752
bellatula 6. 649
Beirensis 5. 98
Beyrichi 5. 498
bicarinata 6. 872
birostrata 6. 649
bivirgata 9. 313
Bohemica 7. 639
brevicultrata 6. 373
brevirostris 6. 649, 872
Brongnarti 6. 872
Bruckmanni 6. 872
Bussacensis 5. 98
Caecilia 6. 872
Calcarensis 6. 752
cancellata 7. 492; 8. 495
capsaeformis 6. 872
Nucula
carinata 6. 649
Carolinensis 6. 752
caudata 4. 765
Ciae 5. 98
clavata 6. 120, 649
claviformis 0. 155, 156, 182; 6. 218, 649, 871, 872; 7. 613; 9. 29
Cobboldiae 2. 1004
coelata 6. 752
commutata 6. 873
complanata 5. 219; 6. 872; 9. 629
concentrica 6. 752, 872
corbuloides 6. 872
cordata 6. 872
cordiformis 6. 872
cornuta 6. 373, 649
Costae 5. 98; 6. 500
cultelliformis 6. 752
cultrata 6. 373
cuneata 6. 363, 752[3]
decisa 7. 241, 242
decussata 4. 869; 6. 873
delta 6. 649
deltoidea 1. 712
depressa 6. 872
Deshayesana 5. 435
divaricata 7. 241
dubia 7. 760
elliptica 6. 872
emarginata 1. 741; 2. 43; 4. 515; 6. 872
Erato 6. 872
Eschwegei 5. 98; 6. 500
Evansi 7. 492; 8. 495
exilis 7. 760
expansa 7. 695
Ezquerrae 5. 98
Feronia 6. 872
fornicata 2. 932; 6. 649
fragilis 6. 872
Gahardana 3. 103
gibbosa 6. 120, 872
glacialis 6. 873; 9. 259
globosa 6 872
Goldfussi 0. 99; 1. 647; 2. 943; 3. 26, 29; 7. 761
grandaeva 6. 649
gregaria 5. 245; 7. 760
gutta 6. 872
Halli 6. 872
Hamiltonensis 6. 872

Nucula
Hammeri 0. 155, 156, 182; 4. 370; 6. 58, 218, 852, 872; 9. 29, 827
Hausmanni 6. 872
Hermanni 6. 873
Hopensacki 6. 500
Houghtoni 9. 506
impressa 6. 872
incrassata 6. 872; 7. 760
interrupta 1. 741; 6. 872
Italica 6. 873
Jugleri 2. 932; 6. 373, 649
Kasanensis 6. 649; 8. 766
Krachtai 2. 932; 6. 120, 373, 649
Krotonis 6. 373
lacryma 4. 765; 6. 872²
laevigata 2. 1004; 6. 872, 873
laevis 6. 752
Laigneli 3. 102
latissima 6. 649
leiorhyncha 6. 649
levata 6. 120, 649
liciata 6. 752
limulata 6. 752
lineata 6. 737, 872
lineolata 6. 649
longirostris 6. 649
luciniformis 6. 120
Lyellana 3. 482; 9. 138
Maestrei 5. 98
major 7. 639
Mantelli 6. 872
margaritacea 3. 605; 6. 872, 873; 9. 847
Menkei 6. 872
minima 1. 715
minuta 6. 872
mucronata 3. 308; 4. 765; 6. 752, 872
Murchisonae 6. 649
nasuta 7. 863
nitida 3. 756
nucleus 2. 1004; 3. 756; 6. 872, 873
nuda 6. 872
obesa 2. 932; 6. 872, 873
obliqua 6. 872²
oblonga 1. 484; 6. 643, 872
obsolete-striata 8. 495
Nucula obtusa 6. 872
Omaliusi 4. 851
opulenta 6. 752
ovalis 0. 155; 6. 872³
ovata 6. 872, 873
ovum 0. 181; 6. 872; 7. 613
palmae 6. 649
parallela 2. 932
parunculus 6. 650
parva 6. 725
pectinata 5. 161; 6. 872²
percrassa 9. 498
peregrina 6. 873
Philippiana 6. 872
Phillipsi 0. 723; 6. 872
pisum 7. 404
Placentina 6. 872
plano-marginata 7. 492; 8. 495
plicata 6. 872
plicatella 6. 872
Podolica 6. 872
Polii 6. 873
polyodonta 6. 256
primigenia 6. 646
prisca 6. 373
proxima 6. 873
Puelchana 6. 873
pullastriformis 6. 120
punctata 6. 873
pygmaea 6. 872²
Ramondi 5. 592
Raulinana 3. 103
reflexa 8. 582
Renauxana 6. 872
Reussi 6. 872
Rhotomagensis 6. 873
Ribeiroi 5. 98; 6. 500
Rosthorni 7. 615; 8. 345
rostrata 6. 872²
scalaris 2. 925, 932
scapha 1. 744
scitula 8. 495
securiformis 2. 932; 6. 373, 649²
semicostata 4. 531!
semistriata 1. 415, 419
sericea 6. 752
Shumardana 7. 863
silens 8. 753
similis 1. 715; 6. 753
Smithi 2. 581
solenoides 2. 932; 6. 649
speciosa 8. 766; 9. 360
speluncaria 4. 118, 748; 6. 650²
Nucula stilla 6. 649
striata 6. 871, 872
striatula 6. 872
subaequalis 2. 932
subcordata 6. 872
subcuneata 6. 872
subdeltoidea 6. 872
subglobosa 4. 765, 851
subnasuta 7. 864; 8. 495
subnuda 6. 872
subobliqua 6. 872
subovalis 6. 871
subovata 6. 873
subplana 7. 492; 8. 495
subradiata 3. 319
subscitula 8. 349, 716
substriata 3. 312
subtransversa 3. 605; 6. 873
subtrigona 6. 752, 872
sulcata 6. 873²
sulcellata 8. 125
Tateiana 4. 748; 7. 637
tellinula 6. 752
tenera 6. 873
tenui-arata 6. 373
tenuis 2. 1004; 6. 872; 873
tenuisulcata 6. 872
trigona 1. 715; 6. 872
trigonella 4. 546
trigonula 3. 1004
triquetra 6. 872
tumida 6. 373², 872²
Ulysses 6. 872
undulata 6. 872
unioniformis 2. 932; 6. 373
variabilis 1. 486; 2. 230; 4. 765; 6. 872²; 7. 133; 9. 21, 34
ventricosa 7 864; 8. 495
Vinti 4. 748; 6. 120, 650²
Virletina 3. 103
Waltoni 4. 765; 7. 133 ff.
Wimmensis 6. 872
Zelima 6. 871
Zieteni 6. 872
Zollikoferi 9. 383
spp. 1. 382; 2. 977; 6. 871; 7. 623
Nuculites
post-striatus 6. 120
Nuletta
Druckfehler statt Meletta

Nullipora
annulata 3. 303!; 7. 695; 9. 499
palmata 3. 84
ramosissima 0. 224; 3. 84; 8. 336
Nulliporen
-Kalke 1. 360; 8. 336!
-Sandstein 1. 479
Numenius
gypsorum 5. 231
Numismalen
-Mergel 8. 583
-Thone 0. 180
Nummopalatus
gen. 8. 870!
Edwardsius 8. 870
Nummulina
gen. 1. 139; 5. 755
antiquior 1. 495!; 7. 633
assilinoides 2. 44
Biaritzana 1. 765
complanata 0. 240
discorbina 1. 765
elliptica 2. 151; 3. 83ff.
falcifera 2. 148
laevigata 0. 238!, 603; 3. 88
lenticularis 2. 150; 3. 74; 6. 245
modiolata 2. 150; 3. 88
nummiformis 1. 765
orbicularis 2. 151; 3. 83
polygyrata 6. 245
Ramondi 1. 765
rotula 2. 150; 3. 83
umbilicata 2. 150; 3. 83ff.
umbo-costata 2. 147
umbo-reticulata 2. 147; 3. 316
Nummuliten
-Formation 0. 90, 303. 474, 486, 602, 736, 737, 738, 829, 854; 1. 139, 599, 764p., 750 p.; 2. 302 p., 355, 882; 3. 73, 83*, 158, 603 p.; 4. 120p., 319, 357ff., 499, 613; 5. 358, 472, 475!, 681, 732, 734; 6. 91!, 251, 356, 451, 708, 719, 738;
Nummuliten
-Formation 7. 154, 229 p., 230, 481, 500, 598, 775 p., 844, 858 p., 862 p.; 8. 88, 89, 717, 874; 9. 318, 470, 607, 844 g. p.
-Kalk 1. 41; 4. 737*ff.; 5. 27ff., 364, 617, 640; 7. 750 p.; 8. 850; 9. 739
-Marmor 2. 295
-Sandstein 5. 44
Nummulites
gen. 1. 379; 5. 617*. 619!; 6. 497
Ataticus 0. 487
Beaumonti 4. 458; 7. 230
Bellardii 3. 606; 4. 458
Biaritzensis 3. 606; 4. 458; 5. 618; 6. 356; 7. 230
Brongniarti 4. 458; 7. 230
Caillaudi 4. 458; 7. 230
Carpentieri 4. 458; 7. 204
complanatus 3. 606; 4. 458; 7. 204
contortus 3. 606; 4. 458; 5. 473, 476
curvispira 4. 458; 7. 230
Defrancei 4. 458
Deshayesi 4. 458
distans 3. 606; 4. 458; 7. 204, 230; 8. 874
discorbinus 4. 458; 7. 230
Dufrenoyi 4. 458; 7. 750
elegans 1. 716
elongatus 6. 451
exponens 3. 606; 4. 458
Fichteli 4. 458
Garanensis 4. 458
Garansanus 5. 473
globosus 2. 44; 8. 738
globulus 0. 487
granulosus 3. 606; 4. 458; 7. 204, 230
Guettardi 4. 458; 7. 230; 8. 740; 9. 866
Gyzehensis 4. 458; 7. 230
Nummulites
Heberti 4. 458
intermedius 3. 606; 4. 458; 6. 93², 739; 7. 500
irregularis 4. 458; 5. 597; 8. 740; 9. 866
laevigatus 3. 189; 4. 458; 7. 500; 8. 738; 9. 844
Lamarcki 4. 458
latispira 4. 458
lenticularis 4. 535
Leymeriei 6. 356
Lucasanus 3. 606; 4. 458; 7. 230
Lyelli 4. 458; 7. 230
mammillatus 3. 606; 4. 458
Mantelli 0. 240; 3. 165; 5. 618
Meneghinii 4. 458
Molli 4. 458; 7. 204
Murchisoni 4. 458; 7. 750
obesus 3. 606; 4. 458; 5. 618
obtusus 4. 458
perforatus 3. 606; 4. 458; 7. 230, 500; 8. 738
planulatus 4. 458; 6. 356; 8. 738, 740; 9. 866
Puschi 3. 606; 4. 458
Pratti 4. 458
Ramondi 3. 606; 4. 458; 5. 473, 597; 6. 356; 7. 230, 500; 8. 874
regularis 2. 44
Rouaulti 4. 458
scaber 4. 458; 9. 844
Sismondai 4. 458
spira 4. 458
spissus 8. 738
striatus 3. 606; 4. 458; 5. 473, 476; 7. 230, 750
sublaevigatus 4. 458
Targionii 7. 604
Tschihatscheffi 4. 458
variolarius 1. 716; 4. 458
Vasca 4. 458
Verneuili 4 458
Vicaryi 4. 458
Viquesneli 4. 458
spp. 4. 457 g.

Nuthetes
destructor 5. 237!
Nuttainia
gen. 3. 487
concentrica 4. 502
Nuttallit 5. 196
Nyctereutes
brevirostris 5. 372
megamastoides 5. 372
Nyctomyces 0. 626
densus 3. 745
Nymphaea 0. 635
alba 7. 758
Nymphaea
Arethusae 0. 114, 802; 4. 213; 7. 757*
biradiata 7. 758
Blandusiae 7. 636, 758
Charpentieri 3. 505; 7. 758
lignitica 6. 505
Nymphaeaceae(fam.) 7.756
Nymphaeites
gen. 7. 756
Arethusae 7. 757
Blandusiae 7. 758
Nymphaeites
Brongniarti 7. 757
Charpentieri 7. 758
lignitica 7. 757
Ludwigi 7. 757; 8. 498
Weberi 7. 757
Nymphes
Mengeanus 6. 622
Nyssa 0. 633
maxima 2. 754
obovata 2. 754
rugosa 2. 754
spp. 0. 505; 2. 760

O.

Oberalmer Schichten 6.847
Obereocän-Gebirge 3. 625
Oberflächen-Bildung der Erde 3. 852!; 5. 291! ff., 641, 796ff.
-Geologie 8. 81
Ober-Quader 0. 134ff.
Obisium
Rathkei 5. 124
Sieboldi 5. 124
Obolen-Sandstein 5. 852
Obolus 0. 228, 373
antiquissimus 0. 373
Apollinis 0. 373; 3. 338; 4. 61, 502, 504; 8. 594
Bowlesi 6. 500
Davidsoni 4. 502
filosus 6. 500
Ingricus 0. 373
politus 4. 502
sculptus 4. 502, 504
siluricus 0. 373; 8. 594
transversus 4. 502, 504
spp. 8. 632; 8. 504, 721
Obsidian 0. 702; 5. 68!, 577; 7. 357*, 360!, 361!, 737*; 9. 446*
der Azoren 0. 4 ff.
Obtusus-Bett 6. 452!
Occhio
di Pavone 9. 742
Oceanus gen. 4. 853
Ochs
(fossile Arten) 1. 256
in Amerika 5. 243
Ochsenfuss
-Eindrücke 8. 621
Ochthosia
(gen. cfr. Verruca) 5.126
Strömia 7. 117
Ocia hirsuta 5. 123
Ocrynische Gebirgs-Gruppe 0. 859
Octocoenia 2. 117*
Octopus gen. 4. 852
Ocypete
gen. 5. 120
angustifrons 5. 123
crassipes 5. 123
decumana 5. 123
marginata 5. 123
triguttata 5. 123
Oculina 2. 116*, 249!
Americana 2. 249
axillaris 2. 250
cariosa 2. 251
coalescens 2. 251
compressa 2. 250
conferta 2. 249
crasso-ramosa 2. 251
elegans 2. 250
Ellisi 2. 251
flabelliformis 2. 250
gemmata 2. 250
gibbosa 2. 250
hirtella 2. 250
limbata 2. 252
Meyeri 2. 250
Neustriaca 2. 252
ocellata 2. 251
oculata 2. 250
palmata 2. 250
prolifera 2. 250
raristella 2. 250
rosacea 2. 250
rosea 2. 250; 6. 93
rugosa 2. 251
Oculina
Solanderi 2. 250
virginea 2. 249, 251, 462
spp. 1. 627
Odax
Carolinensis 7. 115
Odobaenotherium
gen. 9. 239
Larteti 9. 239
Odontacanthus
gen. 8. 249
Odondaspis
Desori 8. 383
elegans 1. 184
gracilis 2. 463; 8. 383; 9. 124, 372
Hopei 8. 870
raphiodon 2. 463
Studeri 9. 124
subulata 8. 382; 9. 124
spp. 3. 110
Odontella
turgida 0. 473
Odontocerus spp. 6. 622
Odontochile
gen. 1. 507!; 3. 487
amphora 4. 501
caudata 6. 116
longicaudata 6. 116
mucronata 4. 501
obtusicaudata 6. 116
truncato-caudata 6. 116
Odontopleura
gen. 1. 509; 3. 487; 6. 116
spp. 4. 493; 6. 370
Odontopteris 0. 627
alpina 5. 630
Boehmi 5. 630

Odontopteris
Brardi 0. 108, 120, 669; 5. 97; 7. 165
Britannica 5.630; 8.201; 9. 149
cristata 8. 503
cycadea 6. 496
dentata 5. 630
Fischeri 2. 58
imbricata 2. 280, 890; 6. 375
jurensis 5.613; 6. 604
minor 0.108,670; 7.165
Münsteri 1. 609
obtusa 0. 120, 669; 5. 97
obtusifolia 6. 56
obtusiloba 8. 503, 758
Reichana 5. 629
Stiehlerana 2. 890
spp. 1. 476; 9. 379, 380
Odontosaurus
Voltzi 5. 233, 756
Odontostoma spp. 6. 750
Odontostomia
(rectius pro Odostomia)
Odontotodus
gen. 8. 113
Rootsikuellensis 8. 113
Odostomia
pellucida 3. 764
plicata 3. 764
pupa 3. 764
reticulata 3. 764
simillima 3. 764
subulata 1. 712
truncatula 7. 509
unidentata 7. 509
Oedipoda
melanosticta 0. 853
Oerstedtit 9. 736
Öfen (Riesentöpfe) 4. 153
Ofenschlacken 2. 768
krystallinische 5. 129
Offaster
gen. 9. 255
Ogkoit 4. 257*
Ogygia
gen. 0. 778!, 785; 3. 487; 6. 224
Brongniarti 3. 102
Buchi 1. 68; 6. 116; 7. 381
desiderata 7. 638
Desmaresti 3. 102
dilatata 7. 381
Ogygia
glabrata 5. 98
Guettardi 0. 99
Portlocki 7. 381
radians 1. 509; 6. 116
sola 7. 638
tyrannus 7. 380
spp. 4. 493
Ogyginae
(fam.) 1. 509!; 6. 116
Ogygiocaris
spp. 4. 493; 6. 224
Ohio
-Thier 6. 498
Oidium
moniliforme 3. 745
thujigenum 3. 745
Oiseau
de St. Nazare 5. 489
Oistodus
gen. 8. 112
acuminatus 8. 112
inaequalis 8. 112
lanceolatus 8. 112
parallelus 8. 112
Oktaedrischer
Eisenglanz 9. 731!
Oldhamia
gen. 8. 362
spp. 9. 504
Old-red
-Sandstone 1. 104; 3. 106p.; 8. 384p.; 9. 337, 490, 491
Olea 0. 634
Bohemica 8. 500
Olenus
gen. 0. 779!, 785; 1. 508!; 3. 486
asaphoides 5. 593
micrurus 7. 381
spp. 4. 493; 6. 223; 9. 504
Oligocän
-Fauna 3. 624; 4. 626!
-Formation 6. 477! p.; 8. 102, 506, 513, 585, 635p., 712, 713!, 717; 9. 114, 125p., 838
-Gebirge 3. 624; 4. 626; 6. 28
-Schichten 9. 140
Oligocarpia 0. 628
crosa 5. 629
Gutbieri 5. 630
longipinnata 5. 630
Oligoklas 0. 426; 1. 170!, 428*ff., 444; 2. 320!, 879; 3. 600, 696; 4. 189, 593!, 599, 823!; 5. 198, 449!, 832!; 8. 698²!; 9. 622
(Kalk-O.) 0. 62!
-Albit 4. 595!, 599
-Laven 2. 322
-Orthoklas 4. 596!, 599
-Porphyr 2. 716
Oligonit 3. 700*
Oligopleurus
spp. 4. 382, 383; 9. 764
Oligopori
(Cidaridae) 7. 121
Oliva
alpina 4. 204, 555
Basterotina 3. 75
brandaris 1. 101
Branderi 1. 715
Dufresnei 3. 75
Dufrenoyi 4. 515
hispidula 2. 509
Pedroensis 7. 242
Peruviana 7. 404
subclavula 3. 75
spp. 2. 630; 3. 627; 6. 479
Olivanites
globosus 0. 376
Verneuili 0.376; 2.745
Oliven-Quarz 8. 652²
Olivin 0. 810!; 1. 558, 604!, 660; 2. 318!, 522, 859, 864!; 3. 176*, 668; 4. 76, 91*, 451!; 5. 71, 565*; 6. 267; 8. 569, 654; 9. 288*
der Azoren 0. 3 ff.
Olivula
staminea 9. 234
Ollacrinus
gen. 6. 602
Omegodon
gen. 5. 224
Omegodus
echimyoides 5. 371
Ommastrephia
gen. 4. 853
Omosaurus
gen. 7. 857!
perplexus 7. 857!
Omphalia
gen. 3. 635!; 4. 853

Omphalia
conica 3. 633, 634; 4. 873; 7. 618
conoidea 4. 873
Coquandana 3. 634; 4. 870
Giebeli 3. 634
Kefersteini 3. 634; 4. 873
ovata 3. 634
suffarcinata 3. 634; 4. 873
subgradata 3. 634
turgida 3. 634
ventricosa 8. 633, 634
Omphalodus
Charzowensis 0. 246!
Omphalomela 0. 638
Omphalophacus gen. 5. 755
Omphazit 5. 822
Omphyma 2. 121*
spp. 7. 104
Onca lepida 5. 121
pumila 5. 121
Onchosaurus
radicalis 5. 233, 744; 9. 361
Onchus
curvatus 8. 113
Deweyi 3. 341*, 342
dubius 8. 113
Murchisoni 1. 506; 3. 629, 630; 8. 113, 594, 625
tenuistriatus 3. 629, 630, 6. 122; 8. 715
tricarinatus 8. 113
spp. 5. 249
Oncobotrys
buccinum 7. 750
Oncoceras gen. 6. 126!
spp. 5. 248
Oncopareia gen. 5. 127!
Bredai 5. 127
heterodon 5. 127
Oncophorus
Beskidensis 1. 753
Oniscia harpula 2. 509
spp. 2. 978; 6. 479
Oniscolepis gen. 8. 113
crenulatus 8. 113
dentatus 8. 113
magnus 8. 113
serratus 8. 113
Oniscus
convexus 5. 121
Onkosin 9. 563!, 586
Onondaga
-Kalkstein 3. 817
-Salt-group 9. 342
Onychodus gen. } 8. 117!
spp. 2. }
Onychoteuthis
gen. 4. 853
Onychotherium
gen. 6. 240
Oolina acicularis 9. 371
costata 7. 269!
fasciata 7. 270!
Haidingeri 1. 378; 7. 269!
lanceolata 9. 371
ovata 9. 371
punctata 7. 268!
simplex 2. 512
striatula 7. 269!
spp. 2. 511*
Oolith 0. 155!, 481, 734, 738; 3. 299; 7. 86; 8. 759
des Zechsteins 3. 774!
Oolite of Bath 0. 161!
Oolithe
de Bayeux 0. 158, 183
Oolithen-Bildung 8. 226
von Minchinhampton 0. 869
de Caen 0. 160!, 183
ferrugineuse 0. 156!, 183
inférieure 0. 156, 183
0. 158!, 183!
miliaire 7. 469
Oolith-Formation 4. 541; 5. 843; 6. 207; 7. 206, 596, 864 p.; 9. 133
-Gebilde Bayerns 1. 364
-Kalkstein 0. 355
-Periode: Flora 0. 111!
-Struktur 4. 841
Opal 0. 421; 5. 827; 6. 187, 189, 556; 8. 213, 801, 828!; 9. 829
(-Sinter,-Tuff) 0. 793
-Gruben 8. 213
Opalisirender
Muschelmarmor 0. 733, 738
Opechinus
gen. 7. 122; 9. 255
Opegrapha
Thomasana 3. 225, 745
Opegraphites
striato-punctatus 0. 117
Opeosaurus
Suevicus 5. 366
Operculina
gen. 5. 617, 619!, 751, 755; 7. 377
ammonea 3. 606; 5. 474, 475 ff.
angigyra 2. 254
Arabica 3. 383*
Boissyi 6. 245
complanata 3. 74
crenato-costata 6. 245
granulosa 3. 606
involvens 2. 254
plicata 1. 378
punctata 2. 254
semicostata 6. 245
striata 1. 378
Taurinensis 6. 93, 739
spp. 9. 123
Operculinen
-Schichten 9. 470
Ophicalcit 7. 600, 604
Ophidion (Serpent.)
antiquum 5. 374
Ophileta
compacta 9. 338
Ophioderma
Egertoni 8. 357
Gavesi 6. 101
Griesbachi 6. 101
Ophioglossites gen. 7. 777
Ophiolith 5. 46; 7. 601
-Konglomerate 8. 89
Ophiolithisches
Tertiär-Gebirge 7. 603
Ophiopsis
gen. 3. 117, 118*
spp. 4. 382; 9. 764
Ophisurus
acuticaudus 5. 380
Ophit 7. 357*
-Porphyr 7. 357*
Ophiura
Libanotica 9. 365
olifex 6. 742
Salteri 6. 115
Wetherelli 4. 762; 9. 365
spp. Eichw. 7. 633
Ophiuridae fam.) 8. 127
Opilio corniger 5. 124
ovalis 5. 124
ramiger 5. 124
Opis gen. 6. 868
affinis 6. 868

Opis angusta 2. 229
Arduennensis 6. 868
bella 9. 498
bicornis 5. 623; 6. 868
bicarinata 9. 498
cardissoides 6. 868
carinata 8. 356
Carusensis 6. 456, 868
cloacina 9. 629
Deshayesi 7. 743
dilatata 6. 868
elongata 2. 229
excavata 6. 868[3]
gibbosa 2. 230
Hoeninghausi 6. 868
Hugardana 6. 868
lunulata 1. 486; 4. 766; 6. 868
Moreausia 2. 229; 6. 868
paradoxa 6. 868
Phillipsana 6. 868
pusilla 6. 868
Sabaudiana 6. 868
Sarthacensis 6. 868
similis 6. 852, 868; 7. 743
tricarinata 6. 868
trigonalis 6. 868
Truellei 6. 868
spp. 2. 977; 6. 868; 7. 623
Oplosaurus
arcuatus 5. 744
Oplotherium
gen. 5. 228, 373
leptognathum 5. 373
spp. 5. 615
Oracanthus
Milleri 6. 123
vetustus 7. 368
spp. 8. 118
Orangit 2. 80!; 4. 447!
Orbicula 0. 373
Alexandrica 3. 103
Arduennensis 6. 509
Avrilana 3. 103
Bischofi 8. 754
Cantraineana 3. 230
Cimacensis 3. 230; 5. 384
concentrica 5. 874
Daleidensis 2. 934
Davreuxana 3. 230
discoidea 7. 761
excentrica 5. 874
filosa 6. 501
Orbicula
Forbesi 0. 374; 6. 256
gibbosa 3. 230
hieroglyphica 3. 230
Humphriesana 3. 210
Koninckı 4. 119, 745; 4. 489; 7. 637
lamellosa 4. 507
maeotis 0. 226
mesocoela 3. 230
nitida 3. 230; 5. 874
Norwegica 4. 507
obtusa 3. 230
psammophora 3. 230
quadrata 5. 874
reflexa 3. 210
reversa 8. 754
rugata 2. 581; 8. 715, 753
Ryckholtana 5. 874
Silesiaca 0. 99
speluncaria 4. 745
subconcentrica 2. 934
tortuosa 3. 230
Townshendi 3. 210
spp. 5. 248
cfr. Orbiculoidea 3. 230
Orbiculidae
(fam.) 3. 256!
Orbiculina
gen. 5. 755 7. 377; 8. 241!, 247
adunca 8. 241[2]
angulata 8. 241
Bischofi 6. 256
numismalis 8. 241[2]
uncinata 8. 241
spp. 4. 737
Orbiculoidea
gen. 0. 373; 6. 374
Cantraineana 3. 230
Cimacensis 3. 230
Davreuxana 3. 230
Dumontana 3. 230
elliptica 4. 61, 504
Forbesi 4. 504
gibbosa 3. 230
hieroglyphica 3. 230
implicata 6. 116
mesocoela 3. 230
Namona 3. 230
nitida 3. 230
obtusa 3. 230
psammophora 3. 230
reflexa 3. 210
tortuosa 3. 230
Orbignyina 1. 380
Orbipora gen. 7. 633
Orbis rotella 5. 501
Orbitoiden-Gesteine 5. 617
-Kalk 7. 750 p.
Orbitoides
gen. 5. 755, 617, 618!, 640
Javanicus 6. 608, 609; 7. 750
microthalama 7. 750
Pratti 3. 316; 6. 608; 7. 750
spp. 0. 240, 241; 7. 228
Orbitolites 2. 120; 5. 473
vdr. Orbitulites
Orbitulina gen. 5. 755
conoidea 6. 356
lenticularis 3. 328, 329
lenticulata 3. 166; 4. 250
longa 7. 227
spp. 9. 123
Orbituliten
-Bildung 0. 368
-Gebirge 1. 743
-Kalk 0. 486; 1. 41
-Kalksteine 2. 594; 6. 229
-Sandstein 2. 454; 5. 86
-Schichten 2. 92; 4. 250
Orbitulites
gen. 5. 617, 618, 640, 755; 7. 225; 8. 242, 247
Androsaces 7. 232
angulatus 7. 232
Cassianicus 6. 245
complanatus 0. 240!; 4. 737; 5. 617; 7. 227, 232
concavus 6. 356; 7. 228
conicus 7. 228
convexo-convexus 7. 232
depressus 7. 232
disculus 7. 228
discus 2. 44
elliptĭcus 7. 228
Fortisi 7. 228
Gensiacus 7. 228
giganteus 7. 228
lenticulatus 5. 473; 7. 228
macropora 7. 228
Malabaricus 8. 241
mammillatus 7. 228
Mantelli 0. 240; 6. 229
marginalis 7. 227

Orbitulites
medius 7. 744
nummulitiformis 8. 232
papillosus 7. 232
papyraceus 7. 228
parmula 2. 44
pileolus 6. 228
planus 7. 228
Pratti 0. 240; 7. 232
radians 7. 228
Roncanus 7. 232
secans 0. 470; 7. 228
sella 7. 228
socialis 0. 470; 7. 228
stellaris 8. 740
stellatus 5. 474; 7. 228
submedius 5. 474
subradiatus 7. 232
Texanus 0. 101; 3. 165
spp. 2. 125; 6. 245
Orbulina
gen. 7. 377
Orbulinida
(fam.) 5. 754! ff.
Orbulites
ziczac 4. 854
Orcynus
latior 5. 380
Ordazit 7. 57
Oreaster spp. 3. 109
Oreodaphne
foetens 6. 244; 8. 757; 9. 253
Heeri 8. 501, 502; 9. 117, 754
Oreodon
gen. 5. 117!
Culbertsoni 5. 114, 117; 8. 376
gracilis 5. 115, 117; 8. 376; 9. 861
major 5. 115, 117; 7. 854!; 8. 376
priscus 5. 114; 8. 376
-Schicht 9. 824
Organisches Leben
in grossen Meeres-Tiefen 4. 610; 5. 470
Organische Reste
auf sekundärer Lagerstätte 7. 609
Welt:
stufenweise Entwickelung 1. 628!, 631!, 633!; 8. 635!
Organischer
Quarz-Sand 9. 464
Organisations-Stufe
gegenüber dem Wohn-Element der Thiere 1. 115!
Organismen,
fossile: Javas 1. 71
in heissen Quellen 0. 492
-Typen
embryonische 0. 374
progressive 0. 374
prophetische 0. 374
synthetische 0. 375
Oribates
convexulus 5. 124
politus 5. 124
Oriskany
-Sandstein 9. 235
Orithyia
Bechei 0. 122!
Orkan 1. 465
Ormoceras
gen. 5. 385ff.; 6. 126!; 8. 617, 618
Bayfieldi 5. 408*
tenuifilum 5. 398*, 405*; 7. 683; 9. 789
vertebratum 5. 407
spp. 5. 248
Ormoceratidae
(fam.) 6. 126
Ornaten-Thone 0. 182; 8. 582
Ornithichnites
Danae 7. 634
diversus 1. 512; 9. 867
fulicoides 7. 634
ingens 9. 867
isodactylus 9. 867
minimus 7. 634; 9. 867
parvulus 9. 867
tetradactylus 7. 634
tuberosus 9. 867
Ornithocephalus 5. 619!
antiquus 5. 620
brevirostris 5. 620, 766; 6. 760
crassirostris 5. 619, 620
dubius 5. 619, 620
Gemmingi 5. 620
giganteus 5. 765
grandis 5. 620, 765!
Kochi 5. 620
longicaudatus 5. 619, 620
longipes 5. 620
longirostris 5. 619, 620
medius 5. 619, 620
Ornithocephalus
Meyeri 5. 619, 620, 766!
Münsteri 5. 619, 620
propinquus 8. 366!
ramphastinus 5. 619, 620
secundarius 5. 619, 620, 765
vulturinus 8. 367!
Ornithoidea (fam.) 9. 867
Ornithoidichnites 5. 478
cuneatus 9. 867
Deani 9. 867
delicatulus 9. 867
divaricatus 9. 867
elegans 9. 867
fulicoides 9. 867, 868
gracilior 9. 867
gracillimus 9. 867
ingens 9. 867
macrodactylus 9. 867
minimus 9. 868
Redfieldi 9. 867
Rogersi 9. 868
Sillimani 9. 867
tenuis 9. 867
tetradactylus 9. 867
Ornitholithes 1. 492
Ornithologie,
fossile 7. 633
Ornithopora
gen. 4. 113!
Ornithoporina gen. 4. 113!
Ornithopterus gen. 4. 52
Lavateri 9. 355
Ornithopus
gen. 9. 867
gallinaceus 6. 238; 9. 867
gracilior 9. 867
loripes 9. 867
Ornithosauri
(fam.) 6. 760
Orographie:
Deutschlands 8. 478
Orologie 4. 387 ff.
der Erde 3. 852!
Oromys
Aesopi 5. 113; 7. 855
Oroseris 2. 119*
Apenninica 2. 377
plana 2. 378
Sancti-Mihieli 2. 378
spelaea 2. 377
Orotherium gen. 4. 831
spp. 5. 227

Orthacanthus
gen. 8. 743
Decheni 0.104; 6.329; 7. 630
Orthidae (fam.) 3. 256
Orthis
Actoniae 6.118; 8.594
adscendens 5. 852; 8. 632
anomala 7.608; 8.269, 271
arachnoidea 1. 608, 609; 7. 472
arcuata 6. 118
Baylei 1. 67
Beaumonti 2.340, 935; 6. 501, 508
Berthoisi 3.102; 5. 98
biloba 6. 118
Bussacensis 5. 98
callactis 2.375; 6.118
calligramma 4. 61, 504; 5. 852; 6. 118, 500, 803; 8. 594[3]; 9. 339
canaliculata 6. 508
circularis 6.508; 8.745
confinis 1.636; 6. 118
congrua 1. 609
connivens 6. 118
crenistria 2. 340, 935; 7. 615; 9. 827, 847
crispa 6. 118
Danjoui 3. 102
Davidsoni 8. 594
deflexa 8. 351
devonica 2.340; 6.501
dilatata 0. 282, 288; 7. 456
dubia 7. 863
Dumontana 3. 817
Duriensis 0. 99
Eifelensis 1.66; 2.340; 6. 373, 508; 7. 220
elegantula 1. 499; 3. 304; 4. 504; 6. 118, 226; 8. 594, 753, 855
excavata 8. 374
eximia 7. 620; 9. 847
exornata 5. 98
expansa 6. 118
explanata 7. 456
extensa 8. 594
Filiceraei 3. 102
fissicosta 5. 98
Orthis
flabellulum 6.118, 509; 8. 594, 855
Gervillei 1. 66; 2.340
gibbera 6. 118
gracilis 8. 753
Hardensis 0. 243
Hardrensis 6. 374
hians 6. 508
hipparionyx 6. 501, 508
Hipponyx 2. 936
Hirnantensis 3. 216; 6. 118
hybrida 1. 499; 3. 344; 6. 118, 226; 8. 594
interlineata 5.873, 874; 6. 118, 626
interstrialis 6. 509
Laspei 4. 746
laticosta 1. 67
lepida 6. 508
Lewisi 6. 508
lunata 6. 81, 118, 508
Lusitanica 0. 99
Lyellana 5. 873
lynx 8. 594[2], 855
marginata 1. 609
Michelini 5.873; 6.118
Miniensis 0. 99
minuta 6. 374
Missouriensis 6. 736
moesta 7. 639
Mounieri 3. 102
Mundae 5. 98
noctilio 0. 99
obovata 6. 508
obtusa 8. 594
Olivierana 9. 847
opercularis 2. 340
orbicularis 1. 66; 2. 340; 3. 103; 6. 501
parva 5. 98[2]; 6. 118; 8. 594, 632
pecten 6. 226, 797
pelargonata 4. 119, 746; 8. 844
persamentosa 3. 110; 6. 118
personata 8. 745
pisum 3. 344
plicata 6. 118
porcata 6. 118
productoides 6. 509
protensa 6. 118
redux 4. 634
Orthis resupinata 1.608; 2 192; 5. 873, 874; 6. 118, 125; 7. 455
retrostriata 3. 216; 6. 118
reversa 6. 118
Ribeiroi 5. 98
rigida 6. 118
Romingeri 2. 258; 6. 225
rugata 6. 81
rugosa 2. 192
rustica 4. 504; 6. 118
sacculus 6. 374
sagittifera 3.216; 6.118
sarmentosa 6. 118
Sedgwicki 6. 374
semicircularis 3. 814
semiradiata 0. 284, 286; 6. 374
socialis 7. 639
striatula 1. 68; 2 340, 935; 3. 103; 4. 501, 508; 6. 37; 7. 220
subarachnoidea 6. 374
testudinaria 2. 192, 981; 4. 634; 5. 98; 6. 118, 374, 501, 508; 8. 594
tetragona 6. 209, 374, 508
triangularis 8. 745
turgida 3. 216; 6. 118
umbraculum 0. 102; 1. 68; 2. 192, 269; 6. 374, 508; 7. 863; 9. 847, 849, 850*, 851
undifera 6. 508
vasalis 5. 98
venusta 6. 508
Verneuili 5. 853
vespertilio 6. 118, 501
Voisini 3. 103
vulvaria 2. 928, 935
Wangenheimi 3. 636
spp. 3. 240; 5. 248; 9. 504
Orthisina
adscendens 4. 61, 504; 6. 118
anomala 4.504; 8.269, 594
arachnoidea 5. 873
crassa 9. 869
crenistria 5. 873, 874; 6. 574

Orthisina
hemipronites 4. 504
Missouriensis 8. 766
pelargonata 7. 637
Portlockiana 5. 873
quadrata 5. 873
Scotica 3. 216; 6. 118
Shumardana 8. 766
umbraculum 8. 766
Verneuili 8. 594
Orthit 2. 69!, 78!, 652!; 3. 552*; 4. 821*; 5. 513 ff.; 6. 191, 395!; 7. 442!, 808; 8. 566!, 567!, 573!; 9. 816! 819!
Orthoceras
gen. 4. 853; 5. 258ff.; 6. 126!, 316*, 599; 8. 235!; 9. 780!
acuarium 6. 371, 625
acus 6. 256
acutissimum 6. 371
aequiseptum 0. 243
alveare 7. 621
angulatum 5. 392*; 6. 122; 8. 235!
annellum 8. 594
annulato-costatum 8. 235!
annulatum 0. 243; 3. 343; 6. 122; 8. 235²!, 594
arcuatellum 6. 371
arcuo-lyratum 6. 122
attenuatum 6. 371
baculiforme 6. 122
bicingulatum 6. 371; 9. 846
Bigsbyi 5. 400*
bilineatum 6. 122
bisiphonatum 7. 253; 9. 507
Bohemicum 4. 47
bonum 7. 634
brachytomum 3. 759
Breyni 6. 122
Brighti 6. 122
Buchi 5. 404*
bullatum 6. 122
calamiteum 2. 278; 6. 371
Cazanovei 3. 102
centrale 6. 122
clathratum 6. 371
cochleatum 8. 235!, 770
Orthoceras
cochleiforme 6. 371
columnare 8. 235!
commune 5. 265, 285!; 6. 625; 8. 235!
complexum 6. 320!, 325; 7. 639
compressum 6. 371
concors 9. 793, 797!
conicum 7. 251*; 8. 235!
conoideum 6. 625
cordiforme 6. 122
cornu-vaccinum 3. 760; 6. 122
costatum 8. 235!
crassiventre 5. 402*ff.; 7. 682; 8. 235!; 270, 594
crassum 6. 371
crebrum 6. 126
crenulatum 1. 491
Cuvieri 9. 789
cylindraceum 6. 122
Dannebergi 6. 371
demissum 6. 126
dentaloideum 3. 230
depressum 5. 502; 7. 617
dimidiatum 6.122, 625
docens 5. 392* ff.
duplex 5. 264, 285', 385; 6. 500, 803; 8. 235!; 9. 605
dubium 7. 621; 8. 383
Eifelense 2. 192
elegans 2. 109; 8. 238
ellipticum 6. 122, 371, 625
ellipsoideum 9. 846
epigrus 7. 863
exspectans 7. 639
fasciculare 6. 625
Flemingi 6. 122
foliosum 6. 122
fusiforme 6. 122; 8. 617
Gesneri 6. 122
giganteum 0. 243; 5. 407; 6. 122
Gottlandicum 8. 235!
gracile 0. 280
gregarium 0.523; 3.102; 6. 625; 8. 715
gregaroides 1. 65
Griffithi 9. 222
Hagenowi 8. 235!
Orthoceras
Helmerseni 9. 846
Hisingeri 3.102; 8.235
hospes 8. 236
ibex 6. 122
imbricatum 5. 392*ff.; 6.122, 625; 8.235!, 594
inaequiseptum 6. 122
iniquiclathratum 6.371
intermedium 6. 122
Jonasi 9. 783, 797!
Jovellani 2.340; 5.404*, 409*
Kickapooense 8. 766
laeve 8. 236
laevigatum 2. 335!
laqueatum 6. 122
Laumonti 5. 404*
laterale 6. 122
lineare 6. 371
Ludense 6. 122
macromerum 0. 243
maximum 6. 625
mendax 9. 783, 797!
Mocktreense 6. 122, 371
multiseptatum 6. 256
mundum 9. 608
Nilssoni 8. 235!
nodulosum 2. 192
nummularium 5. 392*, 407*
oblique-septatum 6. 371
Ommaneyi 4. 85; 9. 222
d'Orbignyi 0. 243
ornatum 8. 235!
ovale 0. 243; 1. 608; 6. 122; 7. 374
paradoxum 6. 122
piriforme 6. 122
planicanaliculatum 6.371
planiseptatum 2. 452, 926, 929; 6. 371; 9. 846
platymerum 0. 243
politum 6. 122; 8. 715
polygonum 6. 371
Polyphemus 1. 491
primaevum 6. 122
primum 7. 639
pulchellum 0. 250
pusillum 6. 126
pyramidatum 5. 407*
pyriforme 6. 122
rapiforme 6.371; 9.846

Orthoeras
regulare 4. 8*; 6. 371, 625; 8. 235²!
Reinhardi 8. 235!
remotum 0. 99
rivale 9. 782, 796!
rugosum 6. 122
salinum 0. 250
scalare 2. 279; 6. 371
Schlotheimi 6. 371; 8. 238
semipartitum 3. 102; 6. 122
simplicissimum 6. 371
socium 9. 789, 798!
Sowerbyi 6. 122
speciosum 6. 625
Steinhaueri 6. 625
striatulum 0. 250; 6. 122; 8. 235!
striatum 0. 523; 6. 122
striolatum 2. 279; 6. 371
styloideum 0. 523; 4. 47
subannulare 5. 408*
subannulatum 6. 122
subflexuosum 6. 371, 625
subundulatum 6. 122
Tallavignesi 3. 102
tenue 5. 865; 8. 236
tenui-annulatum 6. 122
tenuicinctum 6. 122
tenuifilum 9. 789
tenuilineatum 6. 371
tenuistriatum 6. 122
tracheale 6. 122
triangulare 2. 452, 927, 929; 5. 404*; 6. 369, 371; 9. 789
trigonale 7. 252!
trochleare 5. 266*, 852
truncatum 5. 280; 9. 792
tubicinella 6. 122, 371
typus 6. 126
undato-lineolatum 6. 371
undulatum 3. 123; 6. 122; 8. 236!
vagans 0. 99; 6. 122
vaginatum 5. 266*; 8. 235!, 594
ventricosum 6. 122²
vermiculare 6. 500; 9. 846
vertebratum 6. 371
verticillatum 8. 235!
Orthoceras
Vibrayei 9. 783, 797!
victor 9. 789
virgatum 3. 343
virgo 8. 753
vittatum 6. 371
Wahlenbergi 8. 235!
Wissenbachi 6. 371
spp. 1. 253; 4. 3 ff.; 5. 248; 9. 504
-Schichten 6. 369
vgl. Orthoceratit
Orthoceratiten
-Kalk 3. 622; 6. 803; 8. 632
-Kalkstein 3. 614
Orthoceratites
elegans 4. 548
gracilis 3. 308, 319
inflatus 6. 126
serratus 2. 246
striolatus 2. 104 ff.
subpyriformis 6. 126
vid. Orthoceras
Orthocerina gen. 5. 755
Orthocoelacanthi (trib.) 9. 382!
Orthoconchae (ordo) 6. 656
Orthodactylus gen. 9. 868
floriferus 9. 868
introvergens 9. 868
linearis 9. 868
Orthoklas 0. 187; 1. 6*, 444; 2. 879; 4. 296; 5. 449!, 822; 6. 194, 555, 8. 37, 54, 698²!
künstlich 0. 48*
pseudomorph 0. 44, 46!
Orthoklastische Krystall-Form 4. 598*
Orthonota
gen. 6. 644, 864, 871
amygdalina 8. 715²
contracta 6. 644
parallela 6. 644
Pholadis 6. 644
Verneuili 6. 871
spp. 5. 252
Orthonotus
cymbiformis 6. 119
nasutus 6. 119
semisulcatus 6. 119
Orthoptera (class.) 6. 620!
Orthopteren 0. 21*
Orthosaurus
gen. 5, 232; 7. 538
Orthose 3. 696
Orthose-Spath 8. 592*
Orthostoma gen. 6. 494!
avena 6. 494; 7. 209
frumentum 6. 494; 7. 210
oriza 6. 494
triticum 6. 494; 7. 210
turgidum 6. 494
Orthothrix
Cancrini 4. 480
excavata 3. 128, 776, 778; 4. 119, 746, 489, 746; 7. 637; 8. 374
Goldfussi 4. 119, 746, 489, 746; 7. 637⁴; 8. 373
lamellosa 3. 128, 772; 4. 119, 746, 489; 7. 637; 8. 373
Orthotypes Krystall-System 3. 452
Orthozeren-Schiefer 1. 225
Orthrocän-Fauna 5. 223
Orycterocetus
cornutidens 7. 856!
quadratidens 7. 856*
Orycteropus gen. 4. 111
Orycterotherium
Missuriense 5. 113; 6. 241
Oregonense 5. 113; 6. 241
Oryktognosie 4. 701; 6. 704
Oryza exasperata 5. 638
Oryzaria gen. 8. 243
Osborne series 7. 503 p.
Osculipora 2. 126
Osmelit 8. 471*
Osmeroides gen. 3. 118*
megapterus 3. 108
Osmerus Cordieri 9. 492
Osmium 5. 837
-Iridium 5. 837
Osmunda
gigantea 5. 630; 6. 97
Kargi 2. 760; 3. 502; 5. 637
Oeningensis 0. 502; 2. 760
regalis 6. 244
Schmiedeli 6. 253
pictus 6. 622
Osteodesma
gen. 6. 642
Kutorgana 6. 643, 645; 7. 374
Osteodes gen. 6. 230!
irroratus 6. 230

Osteodesmidae (fam.) 6. 858
Osteolepis arenatus 6. 123; 9. 491
brevis 6. 123; 9. 491
macrolepidotus 6. 123
major 5. 853; 6. 123
microlepidotus 6. 123
Osteolith 3. 705!; 6. 422; 9. 195!
-Lager 3. 705!
Osteopera platycephala 5. 113
Osteophorus 6. 545
Roemeri 6. 824!; 7. 630; 8. 300
Osteoplax erosus 6. 124
Osteornis ardeaceus 7. 634
diomedaeus 3. 106; 5. 376
scolopacinus 7. 634
Ostodemia Kutorgana 8. 502
Ostracion imperialis 7. 775!, 813
spp. 5. 232
Ostracites crista 4. 746
laevigatus 3. 23
pectiniformis 4. 765
Ostracoda (trib.) 7. 488; 8. 622, 756; 9. 636
Ostranit 5. 563!
Ostrea gen. 7. 383
acuminata 0. 159, 183; 4. 710, 765, 851; 6. 207; 7. 131, 133, 206; 8. 726; 9. 134
acuta 3. 759
Annonei 1. 747
angulosa 1. 744
anomala 6. 496; 7. 210
anomiaeformis 0. 101
aquila 4. 250
Archiaci 3. 369, 606; 6. 93², 739; 7. 364
arcta 5. 501
arcuata 4. 851; 6. 496; 7. 210, 213²
Arduennensis 9. 313
Bellovacina 0 861; 3. 189; 7. 384
biauriculata 1. 742; 5. 364; 8. 874
Broliensis 7. 213
Ostrea Bruntrutana 0. 184
Buckmani 6. 211; 7. 212²
calceola 6. 852
callifera 2. 509; 4. 515; 6. 333, 533; 7. 384, 845; 8. 590; 9. 138
callosa 1. 747
Canadensis 2. 43, 361
canaliculata 1. 101
canteriata 7. 384
carinata 0. 101, 292, 295, 392; 1. 358, 742, 744; 2. 454; 5. 27, 592; 7. 458, 785; 9. 847
cariosa 7. 384
caudata 4. 515; 7. 384
Clot-Beyi 7. 230
cochlearia 7. 384
Collinii 3. 531
colubrina 8. 874
columba 4. 840; 7. 603, 614
complicata 2. 917; 3. 22; 6. 496; 7. 210
confragosa 9. 498
congesta 7. 491; 8. 361, 493, 495, 709
contracta 6. 480
costata 0. 164, 182, 722; 1. 486; 2. 229, 343; 4. 710, 765; 6. 207; 7. 133, 212; 8. 357, 583
Couloni 0. 482; 3. 815, 9. 372²
crassissima 1. 764; 3. 88; 5. 594, 595; 6. 451; 7. 230, 384²
crenulata 6. 481
crepidula 0. 487; 7. 384
cretacea 0. 725
crispata 7. 384
crista-galli 0. 158, 159, 182; 8. 722; 9. 94
cristata 9. 95
cubitus 3. 606; 7. 384
curvirostris 8. 874
cyathula 0. 860; 2. 882; 3. 190, 482; 5. 475, 6. 535; 7. 384², 503, 845; 8. 451
cymbium 0. 481; 4. 851; 7. 212, 213, 469
cymbula 1. 764; 3. 606; 4. 515; 7. 230, 384, 740; 9. 866
Ostrea cymbularia 3. 86
cymbularis 2. 153, 168
decemcostata 3. 22; 6. 363, 365
decussata 8. 583
deltoidea 0. 174, 185, 723; 7. 384, 849; 8. 488
denticulifera 9. 498
difformis 0. 99; 3. 22; 5. 479; 6. 496; 7. 761
digitalina 9. 383, 854
dilatata 7. 213
diluviana 1. 358, 743 7. 743
diluvii 0. 480
discites 3. 22
disjuncta 1. 744
distorta 1. 355
dubia 2. 153
eduliformis 8. 722; 9. 35
edulina 7. 384
edulis 1. 621 ff.; 2. 194 f., 1004; 4. 36; 5. 596; 8. 584
elongata 7. 213
excavata 7. 502
exigua 3. 22, 29
Exogyra 8. 874
expansa 0. 174; 2. 44; 8. 488
falcata 0. 174
ferruginea 7. 212
Frecheti 7. 384
fimbriata 7. 384
fimbrioides 9. 383
flabellata 3. 617; 8. 874
flabelliformis 0. 297; 2. 153; 8. 874
flabelloides 6. 852
flabellula 1. 715, 764; 3. 606; 4. 515, 528; 7. 229, 384²; 9. 866
foliacea 6. 451
foliosa 8. 584
foveolata 7. 384
frondosa 7. 384
frons 8. 744, 874
fusella [?] 2. 43
Georgiana 6. 229
Giengensis 9. 839, 854
gigantea 0. 486, 487, 861; 2. 153, 168; 3. 84 ff., 369, 606; 4. 530; 6. 93; 7. 213, 384²; 8. 874

Ostrea
gigantica 6. 739
glabra 8. 377
Goldfussi 7. 213
gracilis 9. 629
gregaria 0. 481; 3. 617; 4. 765; 8. 486, 874
gryphoides 9. 853, 854
Haidingerana 2. 458; 7. 617, 690; 9. 852
hastata 2. 759
Hebridica 2. 352
Heermanni 6. 480; 7. 242
Hellica 8. 488
hemisphaerica 0. 481
heteroclyta 7. 229
hippopodium 0. 101, 292; 8. 874; 9. 847
hippopus 7. 384
incurva 7. 213
inscripta 7. 384
intus-striata 9. 629
irregularis 3. 530; 4. 851; 6. 496; 7. 208, 210; 8. 643; 9. 16
Kargi 5. 637
Keyserlingkana 5. 873
Knorri 0. 159; 4. 765; 7. 212²; 8. 482
Koessenensis 9. 629
laeviuscula 7. 213
lacerta 4. 515
laciniata 0. 294; 8. 874
lamellosa 5. 595; 7. 384, 502; 9. 839, 854
laquei 9. 16
larva 0. 470; 5. 364; 8. 360², 495, 744
lata 7. 213
lobata 7. 213
lateralis 0. 388; 1. 730, 742; 5. 324; 7. 384
latissima 0. 486, 861; 1. 41; 2. 153
linguatula 2. 43
lingulata 1. 743
Liskaviensis 6. 363
longicauda 7. 384
longirostris 3. 81, 482; 4. 515; 5. 364; 6. 535, 633; 7. 384²
Maccullochi 7. 213²
macroptera 0. 230; 8. 343
Marcignyana 9. 455
Ostrea
Marshi 0. 159, 160, 164, 183, 481, 722; 4. 81, 851; 7. 133, 743; 8. 360, 710; 9. 94
Martinsi 7. 384
Megaera 1. 101
Melania 6. 739
menoides 2. 349
Milletana 1. 357, 744; 4. 250
Montis-caprilis 7. 617², 690, 695; 8. 4; 9. 753
mutabilis 3. 81
multicostata 1. 764; 2. 917; 3. 22; 6. 363, 365, 496; 7. 210, 229, 384³
multiformis 2. 349; 4. 354; 5. 848
navicularis 0. 476
neglecta 7. 384
nodosa 8. 874
obliquata 7. 213²
oblonga 1. 716
orbicularis 3. 369, 606; 6. 739
orbiculata 6. 93
obscura 4. 765
pulliata 7. 384
palmetta 4. 765
panda 0. 725
Pangadiensis 9. 750
paradoxa 9. 866
patina 8. 495
pectiniformis 0. 158, 159, 160; 4. 765; 8. 722
peculiaris 9. 498
Pellicoi 3. 617
pera 9. 866
Phaedra 4. 851; 7. 212
Pictaviensis 7. 212
Pillae 7. 204, 603, 604
placunoides 1. 139, 413!, 419; 3. 22; 6. 363, 365; 7. 760
plumosa 9. 498
polymorpha 4. 851; 7. 212
princeps 2. 1004
producta 7. 384
pseudo-edulis 5. 844
pulligera 0. 481; 4. 81
punctifera 7. 384
Ostrea
pusilla 4. 748
Pyrenaica 7. 204, 384
radicula 7. 384
rarilamella 7. 384
reniformis 7. 760
reticulatus 3. 23
Rivoti 0. 481; 4. 81
Rollandi 7. 384
rugosa 4. 765
rugata 7. 384
saccellus 7. 384
sandalina 0. 481; 4. 851
scabrosa 6. 363; 7. 760
Schübleri 7. 760
sellaeformis 6. 229; 7. 91
semiplana 0. 297; 2. 153, 168
Sequana 0. 184; 4. 354
serrata 0. 364
sinuata 7. 384
solitaria 0. 173, 1. 417, 419; 2. 343; 4. 355; 5. 848
Sowerbyi 4. 765
spondyloides 0. 99; 3-21; 5. 479; 6. 363; 7. 761
squarrosa 7. 384
subanomia 3. 22; 6. 363; 7. 760; 9. 359
subarmata 1. 764; 7. 230
subdeltoidea 7. 384
subgigantea 7. 384
subhippopodium 7. 384
sublamellosa 6. 818
sublobata 7. 212
suborbiculata 2. 153
subpectinata 2. 153
subrugulosa 4. 765
suilla 7. 213
sulcata 6. 817
sulcifera 7. 743
Stomatia 8. 767
strictiplicata 8. 384
symmetrica 1. 764; 7. 230
Talmontana 7. 384
Taylorana 4. 748
tenuis 0. 99
translucida 8. 377
trigona 6. 496
trigonalis 6. 230
undata 4. 515; 7. 384²
ungulata 1. 741

Ostrea
ventilabrum 1. 733, 764; 6. 227, 535; 7. 229; 8. 740, 874; 9. 866
ventricosa 7. 213
vesicularis 0. 488, 737; 1. 481, 730; 2 512; 3. 606; 4. 81, 557, 841; 5. 364; 6. 80, 206, 672, 673, 817; 7. 384; 8. 360, 361; 638, 739, 740, 874; 9. 632, 844, 847
vesiculosa 1. 742
vespertina 7. 241, 242
virgata 7. 384; 8. 740; 9. 866
Virginiana 7. 384
Virginica 2 509; 7. 384
virgula 7. 469
Virleti 7. 502
Visigothorum 7. 384
spp. 4. 250; 7. 383!; 9. 123
Ostrya 0. 633
Oeningensis 9. 501
Otaria spp. 5. 621
Otarion gen. 3. 488
Eichwaldi 1. 608
Otodus
apiculatus 0. 868
appendiculatus 0. 102, 868; 1. 254; 3. 110; 4. 672; 5. 728; 7. 625; 8. 382; 9. 124, 361
borealis 6. 758
Brandti 6. 758
crassus 0. 868; 6. 758
laevis 0. 868
lanceolaris 2. 167, 170
lanceolatus 1 254; 2. 145, 167
latus 9. 361
lineatus 1. 254
macrotus 0. 868; 2. 167
obliquus 0. 868; 1. 254; 2. 167; 3. 110
praedator 5. 623
Renardi 6. 758
Salentinus 1. 183
semiplicatus 5. 728
subbasalis 6. 758
sulcatus 2. 167, 463, 1000
trigonatus 0. 868
Otodus
spp. n. n. 3. 110; 5. 234
Otopteris
acuminata 4. 855
obtusa 4. 855
Otozamites 6. 616!
acuminatus 6. 616
acutus 6. 616
Beani 4. 34
Bechei 6. 617
brevifolius 3. 242; 6. 496, 616
Bucklandi 6. 496, 617
elegans 6 616
falcatus 6. 617
Goldiaei 6. 616
gramineus 6. 616
hastatus 6. 616
laevis 6. 616
lagotis 6. 617
latifolius 6. 617
Mandelslohi 6. 617
microphyllus 6. 616
obtusus 6. 617
Schmideli 6. 617
undulatus 6. 617
Vogesiacus 6. 617
Whitbyensis 6. 617
Youngi 6. 616
Otozoum
gen. 9. 509, 868
Moodi 9. 868
Oulangia
gen. 0. 767!; 2. 118*
Oulastraea
gen. 0. 763, 764; 2. 118*
Oulophyllia
gen. 0. 758, 760!; 2. 117*
montana 0. 760
profunda 0. 760; 6. 740
Stockésana 0. 760
tuberosa 0. 760
Valmondoisiaca 2. 377
Ovalastraea 0. 767; 2. 118
Ovibos gen. 3. 124
maximus 6. 109
moschatus 6. 109; 7. 868
Ovis gen. 7. 869
mammillaris 5. 112
primaeva 5. 227, 373
spp. 3. 378; 5. 384
Ovula
antiqua 7. 635
Bellardii 3. 604
Ovula
cretacea 1. 101
iota 6. 753
Leathesi 3. 763
striata 3. 634; 4. 874
tuberculosa 7. 635; 8. 874
ventricosa 4. 874
spp. 2. 630
Ovulina
gen. 5. 755
elegantissima 6. 756
lacryma 6. 756
Sicula 7. 269!
tenuis 6. 756
Ovulinida
(fam.) 6. 756
Ovulites
margaritula 7. 232
Ovulum retusum 7. 635
Owenit 6. 555!
Oxalis corniculata 7. 228
Oxford-clay 0. 164!, 183; 7. 207; 8. 487, 582
-Formation 0. 589
-Gruppe 8. 486
-Mergel 0. 355
-Thon 0. 734, 738; 3. 40; 7. 469
Gliederung 0. 722
-strata 8. 486
Oxfordien 0. 164!, 183; 8. 486, 582
Oxisulfüre 1. 597
Oxydations-Prozess 5. 430
Oxygnathus gen. 5. 870!
ornatus 5. 870
Oxygomphius
frequens 9. 173
simplicidens 9. 173
Oxylobium
pultenaeoides 9. 375
Oxynoten-Lager 9. 21
Oxynotus-Bett 6. 452!
-Lager 6. 742
Oxypete (Arachn.)
gen. 5. 120
scr. Ocypete
Oxyrhina
angustidens 5. 728
basisulcata 2. 1000
complanata 2. 1000
crassa 0. 868
Desori 0. 868; 2. 167, 1000; 3. 110, 370; 4. 515; 5. 234; 6. 93, 739

Oxyrhina
hastalis 0. 868; 1. 183, 254; 2. 1000; 3. 110; 5. 234; 8. 870
heteromorpha 5. 728
isocelica 2. 1000
leptodon 1. 183; 3. 110
longidens 5. 614
macer 2. 759; 5. 614
macrorhiza 8. 382; 9. 124
Mantelli 0. 102, 868; 5. 234, 623, 728; 6. 483; 7. 625; 9. 361
Oxyrhina
minuta 0. 868; 2. 1000
plana 7. 243!
plicatilis 0 868; 2. 1000; 5. 234
quadrans 3. 110
Rouillieri 6. 758
Sillimani 0. 868
subinflata 3. 110; 5. 234
Taroti 8. 870
trigonodon 8. 870
tumula 7. 243!
Vanieri 8. 870
Oxyrhina
Wilsoni 0. 868
xiphodon 0. 868; 1. 183, 254; 2. 167; 3. 110; 5. 234; 8. 870
Zippei 1. 183; 3. 110; 5. 234; 7. 625
spp. 3 109, 110
Oxythyreus
gen. 9. 639!
gibbus 9. 640
Ozarkit 0. 619!; 6. 36!
Ozokerit 1. 350!; 7. 440; 8. 468!

P.

Paarzehige
Hufethiere 7. 867
Pachycardia gen. 8. 125!
rugosa 8. 124, 125
Pachyclypus gen. 9. 255
Pachycoris
Escheri 3. 873
Germari 3. 873
guttula 3. 865
protogaeus 3. 873
Schusboei 3. 865
Pachycormus
gen. 3. 117, 118*
elongatus 9. 767
gibbosus 9. 767
latipennis 8. 237
latus 9. 767
striatissimus 9. 767
Pachycrinites
gen. 6. 602
Pachydermata (ordo)
fossilia 1. 497!
Pachydermen 0. 878
Pachydesma
Inezana 7. 853
Pachydomus gen. 1. 382!
spp. 6. 864
Pachygaster
gen. Gieb. 3. 165
Pachygyra 2. 116*
daedalea 4. 863
princeps 4. 867
Pachylepis gen. 8 113
costatus 8. 113
glaber 8. 113
Pachymerus
bisignatus 3. 873
Bojeri 3. 872, 873; 6. 503
Pachymerus coloratus 6. 620
Dryadum 3. 873; 6. 503
fasciatus 3. 873; 6. 503
morio 3. 873
Murchisoni 3. 873; 6. 503
oblongus 3. 870, 873
obsoletus 3. 873
pulchellus 3. 873; 6. 503
senius 6. 620
Pachymya
gigas 3. 231
Pachynolophus
Cesserasicus 0. 879
Duvali 7. 490
Prevosti 5. 226; 7. 490
Vismaei 7. 490
Pachyodon
(Acephal. gen. Brown, non Stchb.) 6. 228
Pachyodon (Aceph. gen Stutchb.) 6. 120, 870
concinnus 0. 181
imbricatus 6. 871
hybridus 0. 181
Pachyodon
(Mammal. gen. Myr.)
spp. 6. 331
mirabilis 1. 501, 503
Pachyphloeus 0. 629
Pachypleura gen. 6. 218
Pachypteris 0. 630
cretacea 0. 116
gracilis 2. 887
speciosa 6. 253
Thinnfeldi 6. 253, 254
Pachyphyllum
gen. 2. 121*; 9. 379!
Pachyphyllum
spp. 4. 497; 9. 379*
Pachyrhamphus
gen. 6. 760
Pachyrisma
gen. 1. 114; 3. 114; 4. 766
columbella 5. 501
grande 1. 114!; 4. 766; 6. 870
Pachyschisma
applanatum 6. 372
Pachyseris 2. 119*
(Agaricia rugosa) 2. 377
Murchisoni 5. 475 ff.
Pachytherium
magnum 4. 111
Pacos
(Erz-Gänge) 1. 611, 615
Paffrather-Kalk 6. 209
Pagellus
Libanicus 3. 108
microdon 5. 380
Pagodus gen. 3. 236
nodosus 3. 234
Pagurus Faujasi 5. 127
platycheles 0. 122
suprajurensis 7. 557; 8. 722
Pajsbergit 3. 183!; 6. 39*; 8. 701*
Paidium
crassicorne 5. 125
piriforme 5. 125
Palaearca gen. 9. 755!
spp. 9. 755
Palaeaster
gen. 5. 252!; 7. 120*, 8. 126

Palaeaster
asperrimus 8. 126
coronella 8. 126
hirundo 8. 126
Niagarensis 5. 248, 252; 9. 636
obtusus 8. 126
pulchellus 9. 636
Ruthveni 8. 126
spp. 8. 126; 9. 236
Palaëchinidae (fam.) 1. 749!
Palaëchinus 7. 122
Rhenanus 7. 860; 8. 109
Palaëdaphus
insignis 5. 234; 8. 205
Palaeodaphus } vid. Pala-
Paloedaphus } ëdaphus
Palaeeudyptes
antarctica 9. 495!
Palaemon Roemeri 9. 494
spinimanus 5. 614
spinipes 5. 614
tenuicauda 9. 494
Palaeobalistum
gen. 5. 487!
Goedeli 5. 487
orbiculatum 5. 487
Ponsorti 5. 487
Palaeobatis gen. 8. 123
angustissimus 1. 81; 2. 942; 4. 840; 6. 745
insignis 8. 123!
Palaeobatrachus
gen. spp. 5. 233
gigas 2. 465; 3. 162*; 6. 420; 7. 555
Goldfussi 2. 57, 466; 6. 759; 7. 555; 8. 203²; 9. 724
gracilis 7. 555
Palaeobromelia
gen. 2. 992!
Jugleri 2. 887, 992, 993
Palaeochara
rigida 7. 777
Palaeochelys
costula 1. 77
Haslachensis 1. 77
Taunica 1. 680
Palaeochoerus
gen. 5. 228
major 5. 228, 373
probus 7. 855!; 8. 376
suillus 5. 373
Palaeochoerus
typus 5. 228, 373; 6. 638
Waterhousei 5. 373
Palaeochorda
major 6. 67
teres 6. 67
Palaeocidaris
exilis 5. 865, 866
Palaeocoma
gen. 7. 120*; 8. 127!
Colvini 8. 127
cygnipes 8. 127
cylindrica 9. 636
Marstoni 8. 127
Milleri 6. 456
pyrotechnica 8. 127
spinosa 9. 636
vermiformis 8. 127
Palaeocome
Eichw. 7. 633
Palaeocorys gen. 3. 875!
spectabilis 3. 873
Palaeocrangon
gen. 5. 498
problematicus 5. 498; 8. 745*
Palaeocrinus
gen. nov. 9. 635
striatus 9. 635
Palaeocyclus 2. 119*
Fletcheri 2. 377
porpita 2. 377; 8. 754
praeacutus 2. 377
rugosus 2. 377
spp. 7. 104
Palaeocyon
primaevus 5. 229
Palaeocystites gen. 9. 636
Chapmani 9. 636
Dawsoni 9. 636
tenuiradiatus 9. 636
Palaeodendrologicon
Rossicum 7. 362
Palaeodiscus gen. 8. 128!
ferox 8. 128
Palaeoendogene
Erdrinden-Theile 7. 800
Palaeogadus gen. 9. 863!
Troscheli 9. 862
Palaeogale
fecunda 9. 173*
Palaeohyus
Wylensis 9. 430
Palaeokeura
gen. 4. 253!
Pellegriniana 4. 251
Paläo-Krystalle 8. 394
Palaeolagus
Haydeni 7. 115. 246!; 8. 376
Paläolithe 7. 593
Paläolithisch 6. 634!, 656
Paläolithische
Fauna in Russland 8. 238
Flora 9. 804
Formationen 8. 715, 737. 756
Gebirge 5. 718, 719; 6. 354; 9. 337
Versteinerungen 3. 102
Palaeolobium 0. 637
grandifolium 4. 252
Haeringanum 4. 380, 627
heterophyllum 4. 380; 9. 376
Radobojense 4. 252, 380
Sotzkianum 9. 376
Steinheimensis 1. 503
Palaeomeryx gen. 5. 373
Bojani 1. 503; 7. 845; 8. 204
eminens 5. 622
Kaupi 1. 503; 6. 330; 8. 61
medius 0. 202; 1. 75, 76, 503²; 6. 330; 7. 491; 9. 724
minimus 1. 504; 3. 378
minor 1. 75, 76*, 503², 504, 680; 6. 330; 9. 174
Nicoleti 1. 503; 8. 203
pygmaeus 1. 503, 504, 677; 2. 303
Scheuchzeri 1. 76, 501, 503, 677, 2. 360; 3. 685; 4. 50; 6. 420; 8. 204
Palaeomys L.P., non Kp.
gen. 5. 225
spelaeus 5. 624
Paläo-Mineralien 6. 181
-Natrolith 6. 181; 8. 394
Palaeonictis
gigantea 5. 230; 7. 490
Palaeoniscus
(Crust. gen. M.Edw.)
Brongniarti 5. 337; 6. 421; 8. 712
obtusus 4. 114
Palaeoniscus
Pisc. gen. Blv. 3. 117, 118*; 8. 612

Palaeoniscus
arcuatus 3. 744
arenaceus 2. 56
Beaumonti 3. 744
catopterus 4. 751; 9. 510
comtus 4. 750
decorus 3. 744
dimidiatus 3. 217
dubius 4. 166
Duvernoyi 8. 614*
elegans 4. 750; 6. 123
elongatus 3. 217
Freyeslebeni 4. 489; 6. 123; 8. 608
fultus 3. 744
Gelberti 0. 104
gibbus 3. 217
glaphyrus 4. 751; 6. 123
katopterus 4. 751; 9. 510
latus 7. 88
longissimus 4. 751
macrophthalmus 4. 751; 6. 123
macropterus 3. 744
magnus 9. 104
Monensis 3. 744
opisthopterus 3. 217
superstes 9. 510
tenuicauda 3. 217
Voltzi 3. 446; 4. 166
Vratislaviensis 7. 629ff.
spp. 4. 124
Palaeontographica 8. 556
Paläontographische Studien 6. 330
Paläontologie 1. 182, 239, 492
allgemeine 2. 629!
Beziehungen zur Stratigraphie 4. 616
des Lias 6. 491
von Böhmen 3. 482
Britische 6. 111
von Canada 9. 635
vom Elsass 4. 123
Französische 5. 222!
der Lombardei 8. 766; 9. 59, 356, 499
von Luxemburg 6. 491
von New-York 3. 339; 5. 247
von Österreich 8. 504
von Russland 8. 238; 9. 861
von Schweden 2. 242!; 4. 492; 6. 792 ff., 811 ff.
Paläontologie
der Schweitz 4. 374, 639; 5. 614; 6. 559; 8. 118, 628; 9. 123, 372
des Thüringer Waldes 6. 624
Palaeonycteris
robustus 5. 371
Paläophytologie 2. 629; 4. 631
Palaeopora 2. 120
expatiata 6. 113
fovosa 6. 113
interstincta 6. 113
megostoma 6. 113
patelliformis 6. 113
subtilis 2. 128; 6. 113
tubulata 6. 113
pyriformis 6. 113
Palaeophis
giganteus 5. 233
longus 2. 380
porcatus 2. 380; 3. 108
Toliapicus 2. 380
Typhoeus 2. 380; 3. 108
Palaeophryne
Gessneri 6. 759
Palaeophrynus
dissimilis 5. 622
grandipes 2. 57, 892
Hoeianus 8. 373, 503; 9. 710
irregularis 2. 890
rugosus 2. 890
simplex 2. 890
tubularis 2. 890
virgatus 2. 890
spp. 5. 248
Palaeopteris
gen. 5. 632
Schnorrana 5. 630
Palaeopyge
Ramsayi 7. 238
spp. 9. 504
Paläopyre 7. 357!
Palaeornis
Parisiensis 5. 376
Palaeosauri
(fam.) 6. 759
Palaeosaurus (Fitz.) 5. 756
Sternbergi 6. 759
Palaeosaurus (Geoffr.) 6. 760
Palaeosaurus (Leidy)
priscus 7. 857!
Palaeosaurus (R.-St.)
cylindricodon 4. 751
platyodon 4. 751; 5. 238
Palaeoscincus
costatus 7. 113!; 8. 376
Palaeosciurus
Chalaniati 5. 371
Feignouxi 5. 371
Palaeoscyllium
formosum 7. 366!
spp. 9. 764
Palaeospathe 0. 631
aroidea 2. 995
elliptica 4. 251
Mazzottiana 7. 776 777
Sternbergi 2. 995; 6. 99
Palaeoteuthis gen. 6. 110!
Dunensis 6. 110!; 8. 55!
Palaeotherii (fam.) 0. 867
Palaeotherium
gen. 0. 747!; 5. 118!; 7. 867!, 869
Aniciense 5. 226
annectens 0. 878; 1. 713; 5. 226
Argentonicum 5. 226
Aurelianense 1. 493, 502, 503; 3. 107; 5. 761
Bairdi 5. 115; 8. 376
Buxovillanum 5. 226
commune 2. 758
crassum 2. 498, 878; 4. 84; 5. 226
curtum 0. 878, 879; 2. 759; 3. 250; 4. 640; 5. 226, 373; 7. 250
Duvali 5. 226, 373
equinum 1. 763; 2. 759; 3. 106; 5. 226
giganteum 5. 115, 118; 7. 248; 8. 376
Girondicum 5. 226
gracile 5. 373
hippoides 2. 759, 831; 3. 250*; 5. 226, 761
indeterminatum 5. 226
Isselanum 5. 226
latum 2. 759; 5. 226

Palaeotherium
magnum 0. 498, 878; 1. 503, 504; 2. 759; 3. 378; 5. 226, 373; 7. 845
medium 0. 498, 878; 1. 502; 2. 758, 824; 3. 250*, 378; 4. 84, 640; 5. 226; 6. 502; 7. 555, 845
minus 0. 748, 878, 879; 1. 592; 2. 759, 824; 3. 250*; 4. 84, 85, 640; 5. 226, 373; 7. 250
Monspessulanum 5. 226
Occitanicum 5. 226
ovinum 5. 226, 373
parvum 1. 713
plenum 1. 713
Prouti 5. 115; 7. 247
Schinzi 6. 502
tapiroides 5. 226
Velaunum 2. 759; 5. 226, 373
spp. 2. 305
Paläotherien
-Formation 2. 758; 3. 250
-Gebirge 2. 346p.!
Palaeothrissum
elegans 4. 750
macrocephalum 4. 750
magnum 4. 750
Palaeotriton
Andrias 6. 759
Palaeotrochis
major 7. 123
minor 7. 123
Palaeotrogus
Steinheimensis 1. 503
Palaeoxyris
gen. 0. 630; 2. 992!
carbonaria 1. 477
microrhombea 2. 993
multiceps 2. 993
Münsteri 2. 993
regularis 2. 993
Palaeozoic
Rocks (Sedgw.) 3. 97!; 6. 112
Paläozoisch 6. 634
vgl. Paläolithisch
Paläozoische
Formationen 0. 731; 8. 854
Paläozoische
Gebirge 1. 65; 3. 727; 6. 735; 7. 593; 9. 100
Gesteine 2. 727; 4. 486
Paläozoologie 2. 629
Palagonit 0. 58!; 1. 851!; 5. 66
Palamopus
gen. 9. 868
Clarki 9. 868
Dananus 9. 868
Palanoema
antiqua 5. 371
Palapteryx
dromioides 0. 125
geranoides 0. 125
ingens 0. 125; 1. 250, 373
robustus 1. 373
struthionides 8. 618*
Palasterina
gen. 7. 120*; 8. 126!
antiqua 8. 127
primaeva 8. 127
rugosa 9. 636
stellata 9. 636
Palastraea
gen. 6. 114
Paleryx
depressus 2. 380
rhombifer 2. 380
spp. 7. 625
Palic-See:
Wasser 8. 79!
Palichthyologie 3. 744; 5. 961, 870
Palingenia
macrops 6. 621
Palinurus
communis 7. 154
Palissya 0. 632
Massalongoi 5. 316; 6. 245; 7. 778; 9. 359
Paliurus 0. 636
inaequalis 3. 506
Palladium 1. 694; 5. 69
Palliobranchia
(class.) 6. 656; 7. 381
Pallium
crassicardo 7. 853
Palmacites
(Brgn.) gen. 0. 631
(Stb.) gen. 0. 631; 9. 238
Palmacites
annulatus 2. 992
astrocaryaeformis 8. 626
canaliculatus 5. 631, 639
carbonigenus 0. 253; 2. 995
caryotoides 3. 121; 6. 98
crassipes 2. 995
dubius 0. 254; 2. 995; 8. 627
echinatus 2. 995
flabellatus 2. 994
Helveticus 5. 639
incisus 0. 265
incurvatus 0. 264
intricatus 2. 995
keupereus 6. 618
leptoxylon 0 253; 2. 995
Martiusii 5. 639
microxylon 0. 253; 2. 995
Moussoni 5. 639
Noeggerathi 8. 626, 627
oculatus 5. 631
Partschi 0. 254; 2. 995
squamosus 6. 98
sulcatus 5. 631
varians 2. 896, 995
variolus 6. 99
verticillatus 5. 629; 6. 97
Palmen, fossile 0. 253
tertiäre 3. 212*
-Stämme 4. 612
Palmipora 2. 120
Palmocarpon
gen. 4. 229!
cretaceum 4. 229
Paloedaphus
insignis 5. 234; 8. 205 (s. Palaëdaphus)
Paloplotherium
gen. 1. 713, 714; 2. 1000!; 5. 373, 761; 7. 869
annectens 0. 498; 2. 1000; 3. 250; 5. 226, 373
minus 0. 498
spp. 0. 879
Palpipes
gen. 1. 376!
cursor 1. 377!
priscus 1. 377!
Paltodus
gen. 8. 112

Paltodus
bicostatus 8. 112
canaliculatus 8. 112
obtusus 8. 112
rotundus 8. 112
subaequalis 8. 112
truncatus 8. 112
Paludina
achatinoides 8. 875
acicularis 9. 750
acuta 0. 800; 1. 736; 8. 515; 9. 475
ampullacea 9. 116
angulosa 1. 713
Baltica 5. 854
carinifera 7. 99
Casteli } 3. 751; 8.515
Chasteli }
circinnata 8. 589
concinnata 1. 122*
conoidea 2.765; 9.750
Conradi 7.494; 8. 494
conulus 2. 352
Deccanensis 9. 750
Desmaresti 5. 746
Duboisi 7. 623
exigua 5. 768
fluviorum 7. 99
Leai 7. 494; 8. 494
Leidyi 7. 495; 8. 494
lenta 1. 712ff.; 2. 988; 3. 764; 7. 509; 8. 515; 9. 36
marginata 1.760; 7.509
minuta 7. 509
multilineata 7. 494; 8. 494
nobilis 2. 765
normalis 9. 750
parilis 7. 509
peculiaris 7.495; 8.494
ponderosa 7. 729
pusilla 0. 800
pyramis 9. 750
Rawesi 9. 750
retusa 7. 494; 8. 494
Sadleri 7. 181
Sankeyi 9. 750
semicarinata 5. 746
similis 9. 116
soluta 9. 750
Styriaca 8. 585, 587
subcylindracea 9. 750
sulcata 9. 116
Takliensis 9. 750
tentaculata 2. 637, 765; 3. 764; 4. 249
Paludina
trochiformis 7. 495; 8. 494
ulvae 1. 623
varicosa 2. 765
Verneuili 7. 623
vetula 7. 494; 8. 494
Virapai 9. 750
vivipara 2. 194 f.; 3. 564; 6. 592ff.
Wapsharei 9. 750
spp. 6. 750
Paludestrina
pendula 3. 764
subumbilicata 3. 764
terebellata 3. 764
turrita 9. 116
ulvae 3. 764
Pampa's 6. 232 p.
Pamphractus
gen. 1. 494*, 495; 6. 124
Pananthites
denticulatus 5. 868
Panax
longissimum 2. 754; 4. 379; 9. 375
Panchina
(Gestein) 7. 603, 605, 606; 8. 88, 89
Pandanocarpus
spp. 2. 1003
Pandanus
Austriacus 2.994,1003
Carniolicus 2.994,1003
pseudo-inermis 2. 994, 1003
Simildae 7. 622
Sotzkianus 2.994, 1003; 9. 374
trinervis 2. 1003
Pandeletejus
spp. 3. 105
Panderella gen. 8. 634!
crepusculum 8. 634
-Grünsand 8. 634
Pandion spp. 5. 231
Pandora
bilyrata 6. 480
clavata 6. 642, 643, 645
inaequivalvis 7. 507
obtusa 7. 507
pinna 7. 507
rostrata 6. 857
spp. 7. 632
Pandoracea (fam.) 6.858
Pangolin
gigantesque 5. 230
Panicum
Hartungi 5. 638
macellum 5. 638
rostratum 5. 638
troglodytarum 5. 638
Paniselien
(terrain) 2.882; 7.503p.
Panopaea
gen. 4. 755; 6. 246, 247!
aequata 6. 852
Agassizi 7. 744
Aldouini 8. 488
Aldrovandii 6. 857
Americana 6. 752
antiqua 9. 227
arcuata 0. 230
Basteroti 6. 857
Carteroni 0. 415
concava 8. 349
Cooperi 8. 349
crassa 6. 454
cretacea 6. 480
decurtata 8. 482
delicatissima 2. 230
depressa 9. 455
Deshayesi 6. 857
dilatata 7. 743
elongata 0. 292; 6. 752; 8. 486
Faujasi 1. 479; 4. 514; 5. 594; 7. 507; 8. 584
Galathea 6. 454; 8. 643
gibbossa 0. 722; 7. 744
gigantea 4. 755
Goldfussi 6. 752
Guibaliana 4. 751
gurgitis 0. 292, 294; 3. 231
Hebertana 6. 535
Heberti 9. 138
intermedia 0. 861; 3. 189, 605; 6. 739, 857
Isaurica 5. 594
liasina 8. 643
lunulata 3. 777; 4. 118, 749, 489; 6. 644, 646, 651; 7. 637
Mackrothi 8. 373
mandibula 0. 294
Menardi 2. 33; 6. 451, 857; 9. 839
Murchisonae 0. 225

Panopaea
Neocomiensis 5. 160; 7. 659
Norwegica 7. 507
occidentalis 8. 495
peregrina 0. 481, 723
plicata 0. 292, 294; 7. 659
reflexa 6. 752
Roemeri 0. 292
rotundata 6. 852
rugosa 1. 715; 6. 495
securiformis 8. 482
Simildae 8. 365
sinuosa 8. 486
subelliptica 8. 497; 9 824
tellina 8. 388
tenuistria 7. 743
tenuistriata 4. 755
Terquemia 7. 743
triasina 6. 857
spp. 2. 977; 7. 632
Panorpa
brevicauda 6. 622
Panorpidium
tessellatum 5. 747
Paphia
crassatella 6. 868
Papier-Kohle 3. 685; 5. 337
Papierspath 4. 351*
Papilio
Corydon 3. 489
Papillina
gen. 6. 230!
Mississippiensis 6. 230
Papyridea
bella 9. 498
Parabatrachus
Colei 3. 624!
Parabolina
spp. 4. 493; 6. 223
Paracyathus 2. 115*
spp. 1. 627
Paradoxides
gen. 0. 779!, 785; 1. 508!; 3. 486
bimucronatus 4. 501
Bohemicus 6. 225
Boltoni 6. 876
bucephali 7. 380
Forchhammeri 3. 336
Harlani 6. 876
Loveni 3. 336; 6. 814
spinosus 6. 876
Tessini 6. 225
Paradoxides
spp. 2. 242; 6. 223; 9. 504, 721
Paradoxidinae
(fam.) 6. 116
Paradoxinae
(fam.) 1. 508!
Paradoxites
Grotei 6. 370
Paragenesis 0. 327
Parahippus
gen. 9. 250!
cognatus 9. 250!
Paralcyonium 2. 123
Parallel-Gliederung
des Devon-Gebirges 3. 817
der Silur-Formation 3. 345
-Klassification
des Eocän-Gebirges 9. 228
des Tertiär-Gebirges 3. 482; 9. 838
der Lias-Formation 9. 345!
-Struktur 7. 795ff.
Paralogit 8. 689!
Paramorphismus 5. 695!
Paramorphosen 3. 465; 4. 596; 5. 695!; 6. 181; 8. 394, 572!
Parasaurus
Geinitzi 7. 104; 8. 62
Parasmilia 2. 116*
Bouei 4. 867
centralis 9. 228
spp. 1. 627; 9. 123
Parastilbit 5. 707!; 8. 215!
Parastoma 6. 224
Parastraea
gen. 0. 763!, 767; 2. 118*
caryophylloides 0. 767
grandiflora 4. 868
gratissima 0. 767
Nantuacensis 0. 767
spp. 1. 627
Pargasit 4. 71
Parischer
Marmor 7. 594; 9. 742
Pariser Becken 5. 360! g., 580; 7. 733
Industrie-Ausstellung 6. 171
Tertiär-Formation 7. 503p
Parisien
(terrain) 3. 607; 9. 470, 748
inférieur 5. 223p.
supérieur 5. 223p.
Parka
decipiens 9. 507
Parkinsoni-Bett 6. 852
Parmelia
lacunosa 3. 745
Parophit 4. 708!, 9. 563!, 586
Partschia 0. 629
Pas-de-Boeufs 8. 620
Passalostrobus 0. 632
Passya
gen. 9. 126!
spp. 9. 125
Patella
ancilloides 0. 869
antiqua 2. 108
antiquissima 0. 374; 7. 362
appendiculata 3. 237
arachnoidea 3. 235
Aubentonensis 3. 235
cingulata 3. 235
conulus 5. 501
disciformis 9. 847
Dunkeri 6. 495; 7. 210
elegans 3. 21
ferruginea 9. 839
Hennocquei 6. 495
Hettangiensis 6. 495; 7. 210
Hollebeni 5. 498; 7. 637
inaequicostata 4. 546!;
inornata 2. 228; 3. 235; 8. 356
lineata 9. 499
mitreola 5. 865
nana 2. 235
nitida 1. 487; 2. 228
papyracea 4. 370
paradoxa 3. 235
pellucida 7. 510
retifera 2. 228
retrorsa 6. 125
Roemeri 3. 235
rugosa 0. 869; 1. 487; 2. 228; 3. 235; 8. 356
Schmidti 6. 495; 7. 210
solaris 6. 125
striatula 3. 235
subquadrata 6. 495

Patella
sulcata 3. 235
suprajurensis 3. 235
vulgata 3. 765
spp. 6. 750
Patellites discoides 3. 20
Patelloidea gen. 3. 765
Paterait 7. 324!
Patinula acaulis 2. 109
Patula spp. 8. 507
Paullinia
ambigua 9. 502
Chiavonica 9. 502
Pavetta 0. 634
Pavia
macrostachya 8. 501
Septimmontana 2. 755
Pavolunulites gen. 4. 115!
Pavonaria gen. 2. 123*
Pavonia 2. 119*
dubia 7. 233
hemisphaerica 2. 378
infundibuliformis 2. 377
lactuca 2. 378
maeandrinoides 2. 378
obtusangula 2. 378
plicata 2. 378
siderea 2. 378
tuberosa 0. 760; 2. 378
Pea-grit 1. 484; 8. 355!
Pechkohle 3. 718; 8. 278
Pechstein 5. 60!, 449!; 6. 193, 555!; 7. 184, 360!, 737*; 8. 651; 9. 214
-Gang mit Porphyr-Trümmern 4. 565
-Porphyr 5. 65!
Pecopteris
gen. 0. 628; 3. 761
abbreviata 0. 91, 110; 1. 476; 5. 353, 630; 7. 113
acuminata 4. 525
acuta 5. 630
aequalis 5. 630
affinis 5. 630
alata 7. 113
angusta 8. 373
angustifida 6. 98
angustissima 6. 98
antiqua 6. 99
arborea 5. 650
arborescens 0. 91; 5. 97; 8. 159, 226 9. 849
arguta 5. 97, 630
Pecopteris
aspera 5. 630
aspidioides 5. 630; 6. 98
Beaumonti 0. 661
bifurcata 5. 630
Bioti 1. 476; 5. 630
blechnoides 6. 98
Bredowi 1. 476
Brongniartana 6. 253
bullata 8. 358
Candolleana 0. 671; 5. 630
Carolinensis 8. 358
chaerophylloides 8. 159
Christoli 7. 113
Cisti 8. 226
Cordai 2. 886
crassinervis 8. 373
crenulata 0. 110; 5. 353
cristata 5. 629, 630
cyathea 0. 120; 5. 97, 630²
debilis 6. 97
Defrancei 7. 766
delicatula 5. 630
dentata 5. 630; 7. 113
discreta 6. 99
dubia 5. 629; 6. 99
elegans 1. 476; 3. 762
erosa 5. 630
excellens 6. 99
falcata 8. 358
fastigiata 6. 98
Geinitzi 2. 886
gigantea 7. 165
Glockerana 6. 98
Göpperti 5. 630
Haiburnensis 8. 401
heterophylla 9. 848
Humboldtana 3. 225, 746
Huttonana 6. 253
incerta 0. 116
incisa 6. 98
jurensis 5. 613
laciniata 6. 98
lepidorhachis 5. 630
leptophylla 5. 97
Leucopetrae 8. 373
lignitum 8. 373
linearis 2. 886; 5. 630
Lodevensis 5. 353; 7. 113
lonchitica 6. 98; 7. 113
longifolia 5. 97, 630; 6. 98
Miltoni 5. 630
Pecopteris
mucronata 6. 98
Murchisoni 2. 886
muricata 7. 766
Murrayana 6. 253
nervosa 5. 630
Novae-Hollandiae 5. 630
orbiculata 6. 99
Oreopteridis 0. 91; 5. 97, 630; 7. 113; 8. 226
ovata 5. 630
pennaeformis 5. 630; 6. 98
platyrhachis 5. 630; 6. 98; 7. 113
Pluckeneti 0. 671; 1. 476
plumosa 6. 98; 9. 826
polymorpha 0. 91, 671; 2. 886; 5. 630
polypodioides 0. 116
propinqua 6. 253
pteroides 0. 120, 671; 5. 630; 8. 226
pulchra 0. 661, 672
Radnicensis 6. 98
repanda 6. 98
Schlotheimi 5. 630
Sillimani 5. 629
similis 6. 98
Stedtensis 1. 102
Steinmülleri 4. 204; 6. 820
striata 2. 890
Stuttgartensis 6. 820; 8. 358
tenella 0. 116
tenuis 6. 253
triangularis 6. 98
truncata 1. 477; 5. 630
Ungeri 2. 886
unita 5. 630
Valdensis 5. 637
valida 6. 99
venusta 6. 97
villosa 5. 630; 8. 226
Whitbyensis 8. 358
Zippei 0. 736; 3. 633; 5. 87
Zwickawiensis 5. 630
spp. 9. 379, 380
Pecten
acutauritus 1. 417!, 419; 7. 94; 9. 629
acuti-alatus 8. 766
acuticosta 4. 851; 7. 210

Pecten
acutiradiatus 1. 410, 419; 3. 318
aequicostatus 0. 101, 292, 295, 727; 2. 92, 454
aequiplicatus 6. 496
aequivalvis 0. 149, 150, 181, 412; 2. 343, 737; 4. 851; 6. 456; 7. 612; 9. 94, 95
Agassizi 9. 124
alatus 0. 481, 482; 4. 80
Alberti 6. 363; 7. 760; 9. 169*, 359, 383
altiplectus 7. 853
amatus 8. 643, 644!
ambiguus 1. 410, 417, 419; 3. 318; 9. 629
amplus 3. 606
annulatus 4. 765
arcuatus 4. 765; 6. 93
articulatus 4. 851; 8. 356
asper 0. 727; 7. 471
asperrimus 1. 229
asperulus 2. 155
atavus 0. 230, 392
Bathus 7. 220
Beaveri 7. 785
benedictus 5. 595; 7. 502, 773
Beudanti 3. 74; 5. 364
Bouei 5. 875
Bruei 2. 1004
Burdigalensis 2. 43; 3. 74, 369; 4. 515, 6. 93, 101²; 7. 502, 783
calvus 6. 496; 7. 10
carboniferus 9. 506
carinatus 1. 715
catilliformis 7. 242
cicatrisatus 8. 874
clathratus 1. 486; 2. 229; 4. 765; 7. 132
Cleavelandicus 8. 716, 766
cloacinus 7. 94; 9. 13, 629
comatus 8. 357, 582
concentrice-striatus 5. 501
contrarius 6. 545; 7. 698; 8. 449
Pecten
convexicostatus 7. 502
corneus 3. 530; 9. 228
crassitesta 0. 230, 231, 390 ff.; 1. 577; 4. 364; 5. 160, 161, 325 ff.; 7. 480, 659
cretosus 7. 204
cristatus 8. 584
curvatus 0. 294, 728
cutiformis 5. 501
Danicus 2. 1004
decoratus 7. 695
demissus 0. 158, 182, 226, 723; 7. 130, 743; 8. 356, 713; 9. 133
densistria 6. 373
depressus 7. 785
deserti 7. 242
disciformis 4. 851
discites 0. 99, 484, 485; 2. 908, 909, 912, 917, 943; 3. 11, 22, 29, 223, 614; 6. 245, 363, 365; 7. 760; 9. 359
discors 3. 606
dispar 6. 496
disparilis 9. 16 ff.
dubius 2. 1004; 7. 204
Dufrenoyi 0. 481; 4. 80
Dujardini 0. 728
duplicicosta 0. 101
elongatus 1. 743
Espaillaci 7. 204
exilis 4. 869
Falgeri 4. 204, 555; 9. 629
fibrosus 0. 167; 723; 7. 133; 8. 484, 582
filosus 8. 125
fimbriatus 6. 119
flabelliformis 4. 515; 7. 502
flexuosus 2. 349
formosus 7. 694
Fuchsi 7. 615
furfuraceus 6. 533
Geinitzanus 8. 373
Gerardi 2. 1004; 9. 854
Germaniae 4. 851
giganteus 7. 135
glaber 0. 150 ff.; 2. 463; 8. 354; 9. 19, 360
gracilis 2. 1004
grandaevus 2. 279; 6. 373
Pecten grandis 2. 1004
Gravesi 3. 606
Hasbachi 2. 931
Heermanni 6. 480
Hehli 6. 208, 217; 8. 354, 643
Helli 7. 694
hemicostatus 4. 765
heterocostatus 1. 764
Humphreysi 6. 752
Jacobaeus 6. 451
imbricatus 2. 155, 168, 3. 86, 88
inaequicostatus 8. 486
inaequistriatus 0. 99, 485; 2. 53. 943; 3. 24; 5. 479; 6. 245, 363
incrustans 6. 850
intertextus 8. 486
Islandicus 1. 621; 2. 1004
Knockoniensis 7. 220
Kokscharoffi 5. 875
laevigatus 0. 485; 1. 649; 2. 908, 909, 917; 3. 23, 369; 4. 840; 5. 479; 6. 739; 7. 760; 8. 719
laevis 4. 869
lamellosus 0. 174; 3. 816; 8. 488
laminosus 0. 243, 415
laticosta 6. 101
latissimus 1. 236
lens 0. 226; 2. 229, 349; 4. 765; 6. 218; 7. 131, 133; 8. 356; 9. 34
liasinus 7. 614; 8. 354; 9. 476
lineatus 1. 225
lineolatus 2. 229
Lilli 1. 733
Liskaviensis 6. 363
Lugdunensis 4. 204, 555, 7. 94; 9. 629
Mackrothi 5. 498; 8. 373, 844
Malvinae 9. 839
matronalis 7. 204
maximus 2. 1004; 3. 756; 7. 502, 510
Meeki 7. 853
membranaceus 5. 728; 7. 204

Pecten Michaelensis 8. 486
Missouryensis 6. 736
Morrisi 6. 363
multistriatus 3. 606
Münsteri 6. 373
Nebrascensis 7. 492; 8. 495
Nevadanus 7. 242
Nilssoni 4. 672, 869; 5. 728
nodosus 6. 451
obscurus 4. 765
occidentalis 6. 736
oolithicus 7. 743
orbicularis 0. 392; 8. 874; 9. 228
opercularis 0. 721; 1. 624; 2. 1004; 3. 74, 756; 4. 515; 8. 584
palmatus 4. 515; 7. 783; 9. 839
parvicostatus 3. 606
peregrinus 4. 765
perplanatus 0. 725
personatus 0. 157, 182. 183; 4. 765, 851; 7. 130, 134; 9. 30, 34
Philenor 6. 456
pictus 6. 533; 8. 590; 9. 138
planicostatus 3. 239; 7. 502
plebejus 2. 155; 3. 606
polymorphus 7. 510
Poulsoni 0. 724; 6. 229, 752
Pradoanus 3. 617
primigenius 6. 373
princeps 2. 156, 168; 2. 1004
priscus 3. 531; 4. 747; 7. 10 ff.; 8. 226, 296
pumilus 7. 206; 9. 133
punctatissimus 8. 643
punctatus 2. 156
pusillus 3. 128, 777; 4. 118, 747, 489; 6. 119; 7. 637; 9. 169, 171
pusio 2. 1004; 9. 839
quadricostatus 0. 101, 292, 293, 297, 299, 388, 727, 728; 1. 315; 3. 165; 4. 108; 5. 593; 6. 480
Pecten
quadristriatus 3. 605
quinquecostatus 0. 94, 292; 2. 92; 3. 165; 5. 86, 592; 7. 370, 458; 8. 360, 874
quinquelineatus 3. 239
radialis 4. 748
rarispina 3. 369
reconditus 1. 716; 4. 515
reticulatus 0. 99; 3. 23; 4. 546; 6 363
retiferus 4. 765
rigidus 7. 864; 8. 495
ringens 8. 766
Rypheus 8. 482; 9. 135
salinarius 5. 501
sarmenticius 9. 839
Saturnus 4. 851
scabrellus 2. 43, 1004; 4. 515; 5. 594 ff.; 8. 403; 9. 839
scabriusculus 7. 502, 773
Schafhäutli 9. 629
Schlotheimi 6. 363
Schmiederi 6. 363
Schroeteri 6. 363
scutella 5. 501
scutularis 2. 155, 168
segregatus 5. 875
semicostatus 4. 765
sericeus 6. 875
similis 0. 163; 2. 1004; 3. 756
simplex 7. 502
solarium 4. 515
solea 3. 606; 7. 783
squamulosus 5. 844
striato-costatus 0. 292, 368; 2. 454; 8. 744
striato-punctatus 0. 393
strionalis 6. 744; 7. 10 ff.; 9. 22
subacutus 1. 743
subelongatus 6. 119
subfibrosus 8. 486
subimbricatus 2. 155; 3. 86
sublaevis 6. 456
suborbicularis 2. 44, 156, 168; 3. 86
subspinosus 2. 349
subspinulosus 6. 373
subtextorius 1. 496; 7. 135
subtripartitus 3. 606; 9. 844
Pecten
suprajurensis 8. 488
sulcatus 4. 765; 9. 360
tenuicostatus 5. 501
tenuistriatus 0. 99, 246, 485; 3. 11, 13, 23, 29; 6. 363; 9. 359
Thorenti 3. 606; 6. 93, 739; 7. 204, 229
textilis 6. 218
textorius 1. 316, 337; 2. 349; 3. 530; 4. 851; 6. 208, 217, 744; 7. 211, 698; 8. 357; 9. 20, 22
texturatus 6. 496; 7. 94; 8. 643; 9. 629
tigrinus 2. 1004
transversus 2. 107
tricostatus 6. 206
Trigeri 6. 454
undenarius 9. 29
vagans 0. 723; 4. 765; 8. 482; 9. 135
varius 2. 1004; 3. 756; 6. 739; 7. 502; 8. 584
Valoniensis 7. 93, 94; 8. 352, 353; 9. 13, 452 ff., 629
velatus 1. 410, 419; 3. 318; 4 765; 6. 744; 9. 629
venustus 4. 515
vespertinus 7. 241
vimineus 1. 486; 2. 229, 343; 8. 486
Virdunensis 7. 155
virgatus 0. 728
vitreus 7. 132
Woodwardi 4. 765
Zieteni 6. 601
spp. 1. 382; 4. 250; 8. 384
Pectinia 2. 116*
Pectinidae (fam.) 6. 119
Pectunculus gen. 6. 873
angusticostatus 0. 862; 3. 369; 6. 93, 873
arcuatus 6. 533
arcatus 9. 138
auritus 6. 873
australis 6. 873
Barbadensis 7. 853
brevirostris 6. 873
calvus 4. 870
complanatus 6. 873

Pectunculus
cor 2. 168; 3. 74; 6. 873
corallensis 6. 873
costatus 1. 715; 6. 873²
costulatus 2. 159
crassus 2. 435, 971; 6. 533, 873; 7. 53; 8. 590; 9. 138
decussatus 6. 873
deletus 0. 860; 3. 605; 6. 93², 739, 873; 7. 53
depressus 2. 168; 3. 605
Duboisi 6. 873
dubius 2. 157
elegans 6. 873, 875
fasciatus 4. 506
Fichteli 6. 873; 9. 839
glycimeris 2. 1004; 3. 756; 6. 873²
Goldfussi 6. 873; 9. 125
granulatus 6. 873
Haueri 6. 873
hemicardo 6. 873
Insubricus 2. 43; 3. 74; 6. 873
latiarca 6. 873
Marullensis 6. 873
minimus 4. 766; 6. 873
Moreau[si]anus 6. 873
oblongus 4. 766; 6. 873
obovatus 6. 873
obsoletus 4. 566
oolithicus 4. 766; 6. 873
pectinatus 6. 873
Petschorae 6. 873
pilosus 0. 862; 3. 74; 6. 873
Plumsteadiensis 1. 715
polyodontus 3. 74; 4. 227, 515; 6. 873⁴
pulvinatus 2. 168; 3. 605; 6. 873; 7. 53; 8. 516; 9. 125, 854
pusillus 6. 873
Reinwardti 6. 873
Reussi 6. 873
stamineus 6. 229
semiauritus 6. 873
Siouxensis 7. 864; 8. 495
subconcentricus 1. 742
striatissimus 3. 605
Pectunculus
subaustralis 6. 873
subdecussatus 6. 873
subimbricatus 8. 377
sublaevis 0. 294
subsulcatus 6. 873
sulcatus 4. 505; 6. 873
terebratularis 0. 862; 6. 873
umbonatus 6. 873; 9. 228
variabilis 6. 873
violacescens 6. 873
spp. 1. 382; 2. 977; 6. 873
Pectunculina
gen. 6. 873
parvula 7. 492; 8. 495
Pedina 7. 122
Bakeri 6. 100, 491
Davoustana 7. 852
Etheridgei 6. 100, 491; 7. 768
Pedipes
glaber 4. 865
Pegmatit 0. 73*, 355; 3. 366; 5. 739; 7. 357*
Pekari
(Dicotyles) 8. 122
Pektolith 1. 819* 2. 516 8. 471!; 9. 187*
Pelagia
clypeata 5. 635
Pelagorhynchus
gen. 9. 492!
blochiiformis 9. 492!
dercetiformis 9. 492!
Pelagornis
miocaenus 7. 505!
Pelagosaurus
typus 0. 323; 5. 424*, 494, 495; 6. 760
Pelagus spp. (Phoca) 5. 621
Pelarganax
gen. 7. 634
Pelargides
gen. 7. 634
Pelikanit 8. 828!; 9. 450!
Peliom 2. 517, 522
Pelitischer Felsittuff 9. 544!
Pelodytes spp. 5. 233
Pelophilus
Agassizi 6. 759
Conybearei 0. 745!; 5. 233
Radobojensis 0. 203
Peltastes 7. 122
pentagonifera 4. 653
punctata 4. 654
stellulatus 4. 312
Peltophyllum
gen. spp. 7. 778
Peltura
gen. 0. 779!, 785; 3. 486; 6. 225
spp. 4. 493; 6. 223
Pemphigus
bursifex 3. 864, 874
Pemphix
Albertii 4. 51; 6. 367
Sueuri 4. 51; 6. 746; 9. 144
-Kalk 0. 484
Penaeus
speciosus 5. 613
Peneroplida
(fam.) 5. 754! ff.
Peneroplis
gen. 5. 751, 755
Peniclilium
curtipes 3. 225, 745
Penitella
spelaeum 7. 242
Pennatula 2. 123
Pennin 0. 691; 3. 62; 5. 186
Penniretepora
gen. 6. 114
Pennit 1. 448!
Pentacoenia 2. 117*
Pentacrinites
s. Pentacrinus
Pentacrinus
gen. 4. 230 ff.; 8. 876
Agassizi 5. 369
alpinus 9. 365
angulatus 8. 643
annulatus 5. 368
asteriscus 8. 496, 497; 9. 824
astralis 7. 132
basaltiformis 0. 145, 225; 3. 530; 6. 217, 742; 7. 5, 10, 12, 698²; 8. 873, 876
bicoronatus 5. 369
Bollensis 6. 850
Bronni 5. 369
Buchi 5. 369
carinatus 5. 368
cingulatus 0. 184; 2. 151, 167; 8. 486
colligatus 6. 605

Pentacrinus
didactylus 3. 84; 4. 762; 9. 365, 844
dubius 0. 485; 6. 245; 9. 359
fasciculosus 4. 745; 6. 850
Gastaldii 6. 93, 739; 9. 365
Goldfussi 6. 101
jurensis 6. 850
laevis 6. 456
lanceolatus 5. 368
moniliferus 9. 21
Nicoleti 7. 132; 9. 134
nodulosus 5. 368
Oakeshottanus 4. 762; 9. 365
opalinus 9. 29
paradoxus 5. 671
pentagonalis 5. 613; 7. 135, 595; 8. 486
personati 8. 876
priscus 6. 375; 7. 362
propinquus 0. 525; 1. 141, 415, 419; 2. 284; 3. 318; 7. 617; 8. 4
Quenstedti 6. 850
ramosus 4. 745
scalaris 3. 530; 6. 454, 496; 7. 210; 8. 710; 9. 21 ff.
Sowerbyi 4. 762; 9. 365
stelliferus 5. 369
subangularis 0. 180; 8. 456, 742; 7. 10, 698; 8. 876
subbasaltiformis 4. 762
subteres 7. 795
teres 6. 245
tortistellatus 3. 318; 9. 629
tuberculatus 6. 454, 742; 7. 211; 9. 17ff., 94
versistellatus 1. 414!, 410
vulgaris 0. 159, 163, 183
Württembergicus 6. 852
spp. 3. 109; 9. 123
Pentadia gen. 1. 383!
Pentagonal-Netz der Hebungs-Systeme auf der Erdoberfläche 1. 95!; 2. 82
vgl. System
Pentamerus
acute-lobatus 6. 374
biplicatus 6. 508
brevirostris 6. 117, 374
borealis 5. 853, 854; 8. 594
carbonarius 3. 211
Conchidium 4. 85, 504; 6. 798; 9. 222
costatus 8. 753
Esthonus 5. 853, 865; 8. 594
formosus 6. 508
galeatus 2. 192, 340; 4. 504; 6. 117, 226, 256, 508; 7. 387; 8. 753
globus 2. 340; 6. 117; 374, 508
integer 8. 753
Knighti 2. 220; 4. 60, 504; 6. 117, 256; 8. 753²
laevis 6. 117; 9. 758
lens 9. 339, 758
lyratus 9. 758
microcamerus 3. 216; 6. 117
oblongus 0. 640; 1. 498; 3 344; 6. 117, 205; 8. 855; 9. 63, 339, 342
optatus 6. 508
pelagicus 8. 753
sulcatus 8. 269
undatus 6. 117
spp. 5. 252
-Schichten 4. 488
Pentameren
-Kalk 5. 853², 854; 8. 594
Pentatoma
antiquum 3. 873
appendiculatum 3. 873
lividum 3. 873
longiceps 3. 873
Morloti 3. 873
obsoletum 3. 873
stigmatum 3. 873
vetustum 3. 873
Pentatrematites
vdr. Pentatremites
Pentatremites
gen. 2. 743!; 9. 57
acutus 2. 744
angularis 2. 744
astraeaeformis 2. 744
campanulatus 1. 748; 2. 744; 6. 115
conoideus 7. 863
crenulatus 2. 744
Derbyensis 2. 744; 6. 115
Dutertrei 2. 744
ellipticus 2. 744; 6. 115
florealis 2. 744; 8. 628
globosus 2. 744
gracilis 2. 744
granulatus 2. 744
inflatus 2. 744
Koninckanus 7. 863
laterniformis 2. 748
melo 2. 748
Norwoodi 2. 748
obliquatus 2. 744
oblongus 2. 744
orbicularis 2. 744
Orbignyanus 2. 744
ovalis 2. 108, 744
Paillettei 2. 744; 3. 238
pentagonalis 2. 745
pentangularis 2. 744
planus 2. 744; 6. 375
Puzosi 2. 744
pyriformis 2. 744
Reinwardti 2. 744
Schulzi 2. 744
stelliformis 2. 748
sulcatus 2. 744
Verneuli 2. 745
spp. 8. 751
cfr. Pentrematites, Pentremites etc.
Penthaleus
tristiculus 5. 124
Pentrematites 4. 230 ff.
Pentremidea gen. 2. 748*
Paillettei 2. 748
Schultzi 2. 748
Pentremitidea gen. 6. 603
Pentremites (Pentatremit.)
caryophyllatus 6. 603
Cherokeus 0. 376
crenulatus 6. 603
curtus 6. 735
elongatus 6. 735
florealis 0. 376
inflatus 6. 603
Orbignyanus 6 603
Paillettei 2. 340; 6. 603
Puzosi 6. 603
pyriformis 0. 376

Pentremites
Reinwardi 0. 225, 376
Roemeri 6. 735
Sayi 6. 735
Schulzi 2. 340
Tennesseae 0. 376
Waterhouseanus 6.603
cfr. Pentatremites
Peplosmilia 2. 116*
portlandica 8. 591
spp. 1. 627
Peratherium
gen. 4. 831
spp. 5. 230
Perca
angusta 5. 374
lepidota 5. 374; 5. 622
Lorenti 5. 862
Moguntina 2. 303
Percylith 2. 75!
Perdix spp. 7. 765
Perforata (Coralliaria)
(tribus) 2. 119
Perfossus
angularis 0. 253
Periaster
Orbignyanus 7. 859
Periastron
gen. 6. 628!
reticulatum 6. 626
Pericosmus
excentricus 6. 101
latus 6. 101
Peridot 2. 615; 3. 69, 262
(künstlich) 5. 215
hyalin 1. 693*
Periechocrinus
moniliformis 6. 115; 7. 860
Perigene
Mineralien 8. 76!
Periklas 3. 261*
künstlich 5. 215
Periklin 0. 551, 552; 4. 261* ff.
Perimorphose 8. 33, 40!; 9. 51
Perioden
der Erdbildung 4. 498
der Flora 0. 107
Periodische
Quellen 7. 338
Periomys
spp. 5. 225
Peripaedium 2. 121
Periploma applicata 9.498
Periploma
Biarmica 6. 645
planulata 6. 645
Robinaldina 6. 858
spp. 2. 977
Periptera capra 6. 103
Perischodomus
gen. 1. 749!; 7. 122
biserialis 1. 748
Perischoechinidae
(fam.) 1. 749!; 6.115; 7. 120
Perismilia 2. 117*
Perisporium
minutulum 5. 637
populicola 5. 637
Perissodactyla (trib.) 0.866; 7. 867, 869
Perla
prisca 6. 621
resinata 6. 621
succinica 6. 621
Perlglimmer 2. 849!; 7. 331!
Perlit 7. 354!, 357*, 360!, 361!, 737*
Perlretinit 7. 354!, 357*
Perlspath 3. 535, 708!
Perlstein 5. 67!; 6. 195!
Perm-Formation 4. 742p.; 6. 64, 543, 666; 7.342, 374p., 381p.; 636, 732; 8. 298, 349, 359, 497, 502p, 608, 710, 716, 726, 745p., 758p., 765, 843; 9. 103, 154g., 235p., 341, 761p., 824, 846, 510
Permien 1. 104
Permische Bildungen 0.84
Flora 0. 110; 5. 548
Gebilde 5. 353
Gletscher 5. 217
Korallen 2. 989
Steinkohlen 6. 543
Versteinerungen 4.742
Perna
Americana 4. 82
ampla 0. 174
aviculaeformis 9. 629
Bouchardi 8. 488
Bouei 8. 125
Gueuxi 6. 454; 8. 643
Hagenowi 6. 495
isognomonoides 6. 852
Lamarcki 9. 844
Perna
lanceolata 1. 743
maxillata 0.720; 3.74; 5. 844
meleagrinoides 9. 750
Mulleti 0. 394; 1. 358, 744; 3. 811, 815; 4. 364
Murchisoni 2. 352
mytiloidea 1. 486
mytiloides 2. 229; 5. 848; 8. 486
plana 0. 174, 184; 4. 355
quadrata 0. 183; 5.748!; 7. 743
rugosa 4. 765; 5. 748; 7. 743; 8. 357
Soldanii 2. 435*
Suessi 8. 488
vetusta 7. 761
spp. 4. 249; 8. 384
Peronopsis 3. 488
Perowskit 5. 839!
Peroxyde
de fer magnéso-boraté 1. 693*
Persea
Brauni 9. 502
speciosa 9. 117, 503, 873
Persichino
-Marmor 7. 595
Persoonia
cuspidata 2. 750
Daphnes 2.750; 4.379; 9. 374
deperdita 4. 252
firma 9. 503
incerta 4. 252
laurina 9. 503
Myrtillus 2.750; 4. 379; 9. 374
oviformis 9. 505
Veneta 4. 252
Vicetina 4. 252
Petalaxis
spp. 2. 990
Petalit 3. 53!
Petaloconchus
spp. 2. 509!
Petalodus
acuminatus 6. 123
Alleghaniensis 7. 368!
Hastingsi 6. 123
psittacinus 6. 123
rectus 6. 123

Petalodus
sagittatus 6. 123
truncatus 6. 122
Petalolithus 2. 246!, 374, 408!
folium 2. 246*
ovatus 2. 246; 4. 126
palmeus 2. 246; 4. 126
parallelo-costatus 2. 246; 4. 126
Petalopora
Bryoz. gen. 3. 109
Petalopteryx
gen. 3. 108!
Syriacus 3. 108
Petherwin-Group 3. 97; 5. 874; 6. 112
-Slate 6. 112
Petraeus spp. 9. 114
Petraia 2. 121, 990; 6. 114
aequisulcata 6. 114
bina 6. 114
Celtica 6. 114
dentalis 4. 744
elongata 6. 114
gigas 6. 114
profunda 4. 119, 744
regulus 6. 626
rugosa 6. 114
subduplicata 6. 114
turbinata 6. 255
uniserialis 6. 114
Petraster gen. 9. 636
rigidus 9. 636
Petrefakten
(Gerölle) auf sekundärer Lagerstätte 3. 159
Bayerns 1. 407*
-Bildung in Mollasse 5. 795
-Conservirung 6. 876
-Handel 1. 321; 2. 452; 4. 321, 768; 8. 256; 9. 383
-Händler 1. 711
-Kunde 4. 367
-Sammlung in Constanz 5. 621
-Tausch 2. 939
-Verzeichniss deutsches 3. 165
Petricola
abbreviata 6. 860
centenaria 6. 860
chamoides 6. 860
Duboisi 6. 860
Petricola
elegans 3. 605
fragilis 6. 859
lamellosa 6. 860
laminosa 7. 506
lithophaga 6. 860
ochroleuca 6. 859
peregrina 6. 860
Piedroana 7. 242
rupestris 4. 506; 6. 860²
striata 6. 860
spp. 2. 977; 6. 860
Petridelaunische Fluth 4. 157
Petrifikations -Weise 4. 657
Petrobius
albomaculatus 5. 124
angueus 5. 124
confinis 5. 124
coruscus 5. 124
electus 5. 124
imbricatus 5. 124
longipalpus 5. 124
macrurus 5. 124
saliens 5. 124
seticornis 5. 124
Petrodus
patelliformis 6. 123
Petrophiloides 0. 634
cellularius 2. 750
conoideus 2. 750
cylindricus 2. 750
ellipticus 2. 750
imbricatus 2. 750
oviformis 2. 750
Richardsoni 2. 750; 3. 510
Petrophyllia
Arcansensis 6. 480
Petrorophus (Coleopt. g.)
truncatus 2. 983, 984
Petrosilex 0 74; 3. 696; 4. 728!; 7. 354!, 357*, 734 ff.; 8. 391
Petzholdtia 0. 638
Peuce 0. 632
Aquisgranensis 0. 117
Australis 5. 576
Biarmica 7. 363
dubia 5. 576
Eggensis 1. 101
Lesbia 4. 863
minor 8. 336
pauperrima 5. 576
Schmidana 5. 576
Sibirica 5. 576
Peuce
Silesiaca 1. 635; 3. 383
Zipserana 5. 576
Peucedanites
Oeningensis 3. 505
Peucedanum
dubium 8. 499
Peziza candida 3. 745
claviformis 3. 745
umbonata 3. 745
Pezizites 0. 626
candidus 3. 225
Pflanzen, fossile 0. 625
Verbreitungs-Weise 8. 877
Nutzen im Haushalt d. Natur 7. 254
der Steinkohlen 1. 475
jurassische 4. 31
tertiäre 3. 46
-ArtenUrsprung: 2. 507
-Geographie 7. 255
ursprüngliche 5. 605
-Geschichte und Geographie 0. 755
-Sippen für die Perioden bezeichnend 2. 885
-System 2. 504!
-Verbreitung vom Boden bedingt 7. 255
-Welt 2. 503!, 505!; 7. 749; 9. 377
Australiens 8. 535
-Zellgewebe in devonischer Kohle 6. 605
Pflinz (Erz) 5. 140
Phacidium
Eugeniarum 5. 637
Gmelinorum 5. 637
Poacitarum 3. 502; 5. 637
Populi-ovalis 2. 760; 3. 502; 5. 637
Phacites
Gothlandicus 6. 797
Phacochoerus gen. 7. 869
spp. 3. 378; 8. 233
Phacodus gen. pisc. 3. 109*
Phacolith 6. 27
Phacops
gen. 0. 779!, 785; 1. 507!; 3. 487; 6. 224
albifrons 4. 501
alifrons 6. 116
angusticeps 8. 753
apiculata 4. 501

Phacops
brevicauda 2. 929; 6. 370
Brongniarti 4. 501
calliteles 3. 815
caudata 7. 380; 9. 121
clavifrons 9. 121
coniocephala 4. 501
conophthalma 4. 501; 9. 121
cryptophthalma 1. 225, 663; 2. 275 ff.; 3. 523; 4. 46, 454; 6. 370, 625
Dalmani 4. 501
Downingiae 4. 500; 6. 116; 9. 121
dubia 9. 121
Dujardini 5. 98
eucentra 6. 225
granulata 6. 625
Jamesi 4. 501
Juckesi 4. 501
laciniata 2. 585, 927, 929; 6. 370
laevigata 6. 625
laevis 6. 256
latifrons 0. 279, 281; 1. 66, 67, 68, 225, 226, 663; 2. 192, 268, 275, 340, 927, 928; 3. 814; 4. 47; 6. 370, 500; 7. 220, 456
limbata 6. 370
limulura 3. 341
longicaudata 5. 97; 7. 380
macrocephala 6. 625
macrophthalma 0. 225; 1. 500, 663; 4. 500; 6. 370
mastophthalma 6. 625
Michelini 3. 102
mucronata 7. 380
Murchisoni 4. 501
obtusi-caudata 7. 380
proava 5. 98
rotundifrons 6. 370
sclerops 4. 501
socialis 6. 320
speciosa 9. 121
stellifera 2. 107, 929
Sternbergi 8. 753
Stockesi 2. 375; 9. 121, 339
subcaudata 4. 500
Phacops
truncato-caudata 7. 380; 9. 121
tuberculata 6. 256; 8. 753
variolaris 1. 255; 4. 501
venusta [?] 2. 276
spp. 2. 242*; 5. 249
Phaculina gen. 5. 755
Phaenopora
gen. 1. 765!
constellata 1. 765
ensiformis 1. 765
explanata 1. 765
spp. 5. 248
Phaëton
gen. (Barr.) 3. 487
Phaetonides 6. 224
spp. 4. 493
Phakolith 6. 27
Phalacroma gen. 3. 488
Phalacromides 1. 510
Phalangopus
subtilis 5. 124
Phanerostomum
dilatatum 7. 750
hispidulum 7. 750
senarium 7. 750
porulosum 7. 750
Phanoptes gen. 3. 487
Pharetrium vdr. Ditrypa
Pharmakolith 2. 515; 3. 470
Pharmakosiderit 9. 625*
Pharostoma spp. 4. 493
Phascolomys spp. 8. 510
Phascum
cuspidatum 3. 746
Phaseolites 0. 637
dolichophyllum 6. 506
eriosemaefolium 6. 506; 9. 375
kennedyoides 4. 380
microphyllus 4. 380
Oeningensis 3. 506
ocbicularis 3. 47, 506, 4. 380; 9. 375
Phasganodus gen. 9. 378
divus 9. 378
Phasianella
acuminata 6. 758
acute-maculata 9. 357
acutiuscula 2. 229; 3. 234
Aquensis 3. 74
cerithiiformis 7. 210
Phasianella
conica 3. 234, 634; 4. 874
elegans 3. 234
Ervyna 3. 634; 4. 874
Gosauica 3. 634; 4. 874
gregaria 7. 760
latiuscula 3. 235
Leymeriei 3. 234
liasina 6. 494; 7. 210
Morencyna 7. 210
nana 6. 494; 8. 643*
nuciformis 3. 234
ovata 6. 372
paludinalis 9. 357
parvula 3. 234
Prevostina 3. 74
striata 3. 235
striatula 4. 874
subangulata 2. 229
sulcata 7. 509
tumidula 3. 234
turbiniformis 2. 229
variabilis 5. 501
ventricosa 6. 372
spp. 5. 768
Phasianemus gen. 3. 764
Phasma spp. 6. 620
Phegopteris gen. 3. 761
Phenakit 8. 789
künstlich 5. 215
Phialocrinus 7. 633
Phidippus
fasciatus 5. 123
formosus 5. 123
frenatus 5. 123
gibberulus 5. 123
impressus 5. 123
marginatus 5. 123
melanocephalus 5. 123
paululus 5. 123
pusillus 5. 123
Philine gen. 3. 765
Phillipsastraea 2. 122*
Cantabrica 2. 341
Torreana 2. 341
spp. 2. 990
Phillipsia
gen. 0. 780!, 785; 1. 508!; 3. 487; 6. 224
excentrica 1. 608
gemmulifera 6. 116; 9. 874
Jonesi 6. 116
Meramecensis 6. 735

Phillipsia
seminifera 6. 116
truncatula 9. 874
Phillipsit 3. 174, 257
Philodina
erythrophthalma 9.510
Philodromus
dubius 5. 123
marginatus 5. 123
microcephalus 5. 123
reptans 5. 123
retrogradus 5. 123
squamiger 5. 123
spinimanus 5. 123
spinipes 5. 123
Philonexis
gen. 4. 852
Philonthus
Bojeri 6. 503
Marcelli 6. 503
Phlebolepis
gen. 8. 113
elegans 8. 113
Phlebopteris
Phillipsi 7. 113
Phloeocoris
monstrosus 3. 873
Phlogopit 3.176*; 6. 346; 8. 822, 849
Phoca
debilis 8. 252!
fossilis 5. 231
Gervaisi 8. 869
Larreyi 8. 869
maritima 5. 230
Occitana 1. 493; 2. 998; 4. 495; 5. 230
Pedronii 5. 230
rugidens 0. 201
vitulina 7. 877
Wymani 5. 112; 8. 252!
spp. 1. 254, 493; 5. 230; 7. 248!
Phocaena
crassidens 7. 110
Phocaenopsis
Mantelli 9. 495
Phocodon
spp. 1. 254; 5. 112
Phoenicites 0. 631
formosus 3. 503
Italicus 7. 813
perfossus 2. 995
pumilus 2. 995
salicifolius 2. 995
Phoenicites
spectabilis 2. 994; 3. 503; 5. 639; 9. 374
Veronensis 7. 776
Wettinioides 7. 776
Phoenicopterus
Croizeti 5. 231
Pholaden;
Fels-bohrende 3. 98; 4. 733
Pholadidea
papyracea 7. 507
Pholadomya
gen. 6. 246, 247!
acuticosta 0. 723; 3.816; 6. 645, 857; 7. 743
aequalis 6. 857
aequivalvis 3. 231
affinis 3. 605
Agassizi 8. 516, 518²
ambigua 0. 150; 4. 851; 6. 743
angustata 0. 227; 6. 643, 645, 857
arcuata 2. 43; 3. 45; 8. 515, 517
arenacea 6. 495
Aspasia 6. 248
bucardium 4. 851
canaliculata 8. 486
cancellata 6. 857²
carinata 8. 484
caudata 0. 293, 297; 3. 231
cingulata 8. 486
complanata 5. 848
conformis 8. 873
cordata 9. 32
cuneata 4. 368; 6. 857
curta 6. 644, 645
Davreuxi 4. 850
decorata 1. 496; 2.343; 3. 530; 4. 851; 6. 456; 7. 698; 8. 296
decussata 6. 857
Deshayesi 4. 850
designata 0. 294
dichotoma 3. 231
donaciformis 6. 857
donacina 1. 357, 744; 6. 857
elegantula 8. 495
elongata 4. 313; 6. 451
Pholadomya
Esmarki 0. 736; 3. 231; 4. 870; 6. 857
exaltata 7.135; 8.486; 9. 135
fibrosa 8. 495
fidicula 0. 481; 4. 370, 851; 6. 857; 8. 357
foliacea 4. 851
Fraasi 6 454
gibbosa 4. 621
gigas 3. 231
glabra 4. 851; 6. 743; 8. 643
Heberti 6. 495; 7. 210
Heraulti 7. 743
hesterna 7. 507
heteropleura 7. 210
hortulana 8. 488
iridinoides 6. 645
Koninckı 3. 231
lagenalis 2. 286!, 288; 9. 629
Langi 6. 857
liasina 4. 205; 6. 71; 8. 226
loricata 6. 645
lunulata 6. 645
margaritacea 6. 857
media 4. 851
monticola 0. 227
multicostata 4. 355; 6. 857; 8. 488, 582
Münsteri 2. 107, 192; 6. 645², 857
Murchisonae [err. pro:]
Murchisoni 0. 164, 183, 722; 2. 349; 4. 621, 851; 7. 133, 743; 8. 582
musculoides 6. 645
nana 7. 744
neocomiensis 6. 857
Nicensis 3. 605
noduli'era 0.294; 6.857
nuda 6. 857; 8. 517
Nysti 4. 850
oblita 7. 743
oblitterata 3. 231
obtusa 0. 157
Omali[us]ana 6.643, 645
orbiculata 5. 848
ovalis 6. 857; 7. 744
ovulum 7. 743
parvicosta 7. 135

Pholadomya
paucicosta 5. 848; 8. 488
pelagica 7. 744
Perezi 3. 605
plicata 6. 644 ff.
Prevosti 0. 487
producta 6. 857
Protei 0. 173, 184; 4. 355; 8. 488
Puschi 0. 736; 3. 45, 231, 331, 370, 605; 4. 520; 5. 369; 6. 93, 739
radiata 6. 645, 857
regularis 6. 645
reticulata 6. 857
retusa 6. 857
rhombifera 6. 850
Saemanni 7. 743
Scheuchzeri 0. 490; 4. 313; 5. 845
semicostata 6. 857²
similis 7. 133
socialis 7. 743
solitaria 7. 743
subangulata 6. 218
subarcuata 8. 518
subdecussata 8. 484
subradiata 6. 644, 645
subventricosa 8. 377
sulcata 6. 645
transversa 3. 231
trapezina 3. 617
tenuis 6. 480
Tippahana 9. 498
Tornacensis 3. 231
truncata 0. 173
umbonata 6. 857
undata 7. 492; 8. 495
ventricosa 6. 248
Vezelayi 0.159; 8. 726
Visetensis 3. 231; 6. 644
Voltzi 0. 150
Weissi 3. 45*
Württembergica 8. 484
Zieteni 0. 481; 4 851
spp. 1. 382; 2. 977; 7. 632
Pholas
candida 6. 857
Cordieri 3. 102
costellata 7. 744
crispata 7. 507
cristata 6. 857
cuneata 8. 497
Pholas
cylindrica 2.43; 5.795; 6. 857; 7. 507
dactylus 5. 795
dimidiata 6. 857
hians 6. 857
Hommairei 8. 875
Kickxana 3. 231
Nystana 3. 231
oolithica 7. 743
pulchralis 7. 744
rugosa 5. 796
sclerotites 0. 727
scutata 2. 43; 6. 857
supracretacea 3. 231
ungulata 1. 146
spp. 7. 632
Pholerit 2. 69!; 7. 70; 9. 719
Pholidophorus gen. 3. 117*
brevissimus 8. 237
Curionii 0. 734
dorsalis 8. 6
furcatus 8. 6
gracilis 5. 614; 9. 767
granulatus 5. 870
Higginsi 5. 870
latiusculus 8. 6
loricatus 8. 6
nitidus 5. 870
obscurus 3. 117
parvus 8. 6
pusillus 8. 6
Stabileanus 1. 183
tenuiserratus 5. 614
spp. 4. 382; 8. 748; 9. 764
Pholidopleurus
gen. 8. 17!; 9. 39
typus 8. 12!
Pholidosaurus
Schaumburgensis 7. 534
spp. 2. 145, 167, 171
Phoma spp. 0. 502
Phonolith 0.13ff.; 2.962; 3. 680; 4. 161, 402!ff.; 5.598; 6.24, 706, 845; 7. 35, 185, 357*, 360!, 445!, 583!, 734, 737, 836!; 8. 220; 9, 803. 831
-Tuff 3. 684
Phorcynis catulina 4. 382
Phorus
conchyliophorus 2. 161, 169
Phorus cumulans 3. 604
Deshayesi 3. 74
minutus 3. 634; 4. 874
plicatus 3. 634; 4. 874
reclusus 6. 230
umbilicaris 2. 161, 169
umbilicatus 6. 480
Phos
Veraguensis 2. 509, 510
Phosphatic
Beds 9. 748
Phosphor
-Metalle 9. 191!
Phosphorit 1.27; 4.722*, 5. 569!; 8. 822
Phosphornickeleisen 6.265
Phosphorsäure:
in Felsarten 8. 214
Phosphorsaure
Yttererde 5. 513
-Hydrat 3. 592
Phosphorsaurer
Kalk 3. 476!, 705
Phosphorsaures
Natron 2. 794, 796, 805
Phosphorzinn 2. 789
Phragmites
communis 9. 347
Oeningensis 2. 760; 3. 502; 5. 638; 7. 502; 8. 589; 9. 122, 873
spp. 0. 503
Phragmoceras
gen. 4. 853; 5. 258, 385ff.; 6.126!, 316*
Brateri 6. 625
bicarinatum 6. 371
Broderipi 4. 10*
calistoma 4. 10*
compressum 5. 865
intermedium 6. 122
laterale 6. 625
Loveni 4. 10*
orthogaster 5. 404*; 6. 371
perversum 4. 10*
ventricosum 6. 122
spp. 1. 253; 4. 3 ff. 5. 248
Phryganea
dubia 6. 622
fossilis 6. 622
longirostris 6. 622
picta 6. 622

Phryganen-Kalk 2. 855!
Phryganidium
Pytho 5. 748
Phthoropteridae
(fam.) 1. 115!; 6. 98
Phycodes
gen. 3. 629
circinnatus 3. 615; 4. 47
Phycogorgonia 2. 123
Phycosiphon
gen. 8. 639
incertum 8. 640
Phylladelphia
gen. 8. 135!
strigata 8. 133!
Phyllades 5. 364
micacées 5. 353
Phyllangia
gen. 0. 767!; 2. 118*
conferta 0. 768
Phyllanthus
Haeringana 4. 380
Phyllastraea 2. 119*
Phyllerium
Friesi 2. 760; 5. 637
Kunzi 5. 637
Phylliraea
latifolia 4. 627
Phyllit
(Gebirgsart) 9. 458!
Phyllites 0. 633, 638,
arcinervis 3. 435, 504
Castrensis 9. 117
cinnamomeus 9. 503[3]
cinnamomifolius 3. 504; 9. 503
cinnamomum 9. 503
emarginatus 0. 299
flagellinervis 3. 505
furcinervis 9. 502
Geinitzanus 0. 299
hymen[ae]oides 9. 253
inaequalis 1. 102
laevigatus 4. 229
lobulatus 9. 253
Montalionis 9. 117
myrtaceus 1. 102
paleola 4. 145
pelagicus 3. 633; 5. 87
Pisanus 9. 117
populinus 9.501
repandus 5.493; 8.365
reticulosus 1. 102
salignus 1. 102
Sarzanellanus 9. 871
Thierensi 4. 229
Ungeranus 3. 28
Phyllites
venosus 9. 501
Winkleri 0. 117
Ziegleri 6. 244
Phyllocoenia
d'Archiaci 7. 502
decussata 4. 867
Doublieri 0. 756
grandis 4. 867
irradians 6. 245
Lilli 4. 867
Neptuni 1. 102
Oceani 1. 102
Vallis-clausae 0. 756
Phyllocrinus
Sabaudianus 9. 124
Phyllodes 2. 116*
Phyllodus
gen. 3. 123*
Duvali 5. 234
inconstans 5. 234
latidens 5. 234
Levesquei 5. 234
marginalis 5. 234
spp. 1. 255
Phyllogorgonia 2. 123
Phyllograpta 6. 225
Phyllolepis
concentricus 9. 490
Phyllopora
gen. 1. 489!; 3. 127!
Ehrenbergi 3. 126; 4. 119, 744; 8. 766
Phyllotheca 0. 627
spp. 1. 382
Phymastraea
gen. 0. 763!, 764; 2. 118*
Phymechinus
gen. 7. 122; 9. 255
Phymosoma 7. 122
Physa
Bristowi 8. 847
Galloprovincialis 9. 470
Bradleyi 9. 750
gigantea 5.581; 7.490; 9. 470
heterostropha 7. 729
longiuscula 7. 494; 8. 494
Nebrascensis 7. 494; 8. 494
Prinsepi 9. 750
rhomboidea 7.494; 8.494
secalina 8. 494
subelongata 7. 494; 8. 494
Physacium
gen. 3. 487
Physagenia
gen. 5. 639!
Parlatorei 5. 639
Physematopitys
gen. 2. 895!
Salisburyoides 2. 894; 2. 986; 3. 226
Physeter
antiquus 1. 492; 2.998; 5. 231
bidens 3. 94
spp. 0. 746; 1. 501
Physichthys
Hoeninghausi 6. 610
Physikalischer Bau der Erde 7. 84!
Physikalische Geographie der Alpen 5. 91
Geologie 0. 858; 6. 211!
Physomphalus
porosus 7. 750
Physonemus
arcuatus 6. 123
subteres 6. 123
Physotrema
gen. spp. 3. 30
Phytamorphae 8. 633
Phytocoris
angustulus 6. 620
Balticus 6. 620
consobrinus 6. 620
electrinus 6. 620
euglotta 6. 620
gulosus 6. 620
gummosus 6. 620
involutus 6. 620
merus 6. 620
punctiger 6 620
raptorius 6. 620
Sendeli 6. 620
vetustus 6. 620
Phytogyra 2. 116*
Phytolitharia (ordo) 0.489; 5. 759; 6. 104
Phytonomus
firmus 6. 503
Phytopsis
cellulosa 2. 890
tubulosa 2. 890
Phytosaurus
gen. 6. 760
Phytostatic 0. 352
Piauzit 7. 163*
Piccolominites 0. 638

Piceites
geanthracis 2. 753, 894; 3. 226
Pictou-Kohle 4. 633
Pierre ollaire 8. 73!
quarrée 4. 728
Piedra
frailesca 6. 470
franciscana 6. 470
colombina 7. 598
forte 6. 216; 7. 597; 8. 636
lenticulare 7. 604
morte 7. 598
paesina 7. 598
porco 7. 604
serena 7. 599
verde 8. 88
Pikranalzim 4. 818!; 7. 176, 600!
Pikrolith 1. 588!; 6. 703!
Pikrophyll 1. 204*
Pikrophyllit 3. 837
Pikrosmin 1. 204*; 3. 463
Pikrothomsonit 5. 76! 7. 600!
Pileolus
dexter 6. 625
laevis 1. 487; 3. 234
plicatus 2. 228
sulcatus 3. 234
Pileopsis ampliata 7. 762
angusta 7. 762
cassidea 1. 661; 2. 930; 6. 500
cornuta 7. 762
laevis 2. 228
neritoides 7. 762
prisca 0. 225; 2. 930
nuda 6. 495
semiglobata 2. 161, 169
striata 7. 762
substriata 7. 762
vetusta 7. 762*; 8. 753
spp. 1. 382
Pileus gen. 9. 255
Pilton-Gruppe 3. 816, 817
Pimelea
Oeningensis 9. 503
pulchella 9. 503
crassipes 9. 503
maritima 9. 503
Pimelit 4. 182!
a. Schlesien 0. 59!
Pimelodus
Cyclopum 2. 964
Sadleri 2. 980
Pimpinellites
spp. 7. 777
Pimpla Saussurei 6. 503
spp. 4. 639
Pinakoid
(der Krystalle) 5. 13; 6. 165
Pinguit 0. 706!; 4. 404; 6. 35, 351
Pinit 0. 452; 1. 399*; 2. 522; 9. 445, 564!, 586
Pinites 0. 632
Aequimontanus 4. 491
Aleuticus 7. 363
Aquisgranensis 0. 118
Baeranus 0. 127
brachylepis 3. 226
Brandlingi 8. 871
cretaceus 6. 640
eximius 3. 746
Goeppertanus 3. 28
Goetheanus 2. 761; 4. 491
gypsaceus 2. 894; 3. 226, 382
jurassicus 7. 363
jurensis 4. 856
Kotschyanus 6. 252
Linki 2. 888
Menkeanus 2. 468
Mengeanus 3. 746
microstachys 0. 874
Middendorffanus 0. 126
Mosquensis 7. 363
Naumanni 8. 503
orobiformis 8. 503
ovoideus 2. 894; 3. 226; 3. 382
Pachtanus 7. 363; 9. 847
palaeostrobus 4. 378
Partschi 2. 628
patens 4. 229
pertinax 7. 363
ponderosus 2. 894, 986; 3. 226; 6. 505
protolarix 2. 753, 894; 3. 226; 4. 364; 8. 332
pseudo-strobus 1. 635
pumilio 3. 226
pumilis 2. 894
resinosissimus 3. 746
rigidus 3. 226, 747
rigios 4. 491
Rinkanus 3. 749
salinarum 1. 635; 3. 383
Pinites Saturni 4. 627
succinifer 3. 226, 746, 749
Thomasanus 2. 635, 753; 3. 226
undulatus 5. 624
Urani 4. 627
Wielizkensis 2. 635
Pinitoid 9. 569, 586, 686
Pinna Amalthei 6. 744
ampla 4. 765
Brocchii 2. 43; 4. 658
cancellata 7. 743
cuneata 2. 229; 4. 765; 8. 357
diluviana 4. 851
fissa 4. 851; 8. 357
flabelliformis 6. 119
flexicostata 6. 119
folium 6. 456; 7. 614; 9. 629
granulata 5. 848; 8. 488
Hartmanni 4. 370, 553, 851; 8. 643
hastata 2. 229
inflata 4. 851
lanceolata 8. 486
laqueata 9. 498
margaritacea 1. 716
Meriani 9. 629
mitis 2. 352
Moorei 6. 456
Murchisoni 9. 34
nigra 2. 855*
nobilis 3. 74; 6. 845
opalina 9. 34
ornata 8. 488
pectinata 2. 1004
prisca 3. 319; 4. 413, 743; 6. 643; 8. 374; 9. 629
quadrangularis 0. 294
restituta 1. 358
Robinaldina 1. 744
Saussurei 3. 219; 4. 355; 8. 488
similis 4. 851
spatula 3. 760; 6. 119
tetragona 9. 228
vomis 9. 629
spp. 0. 102; 8. 384
Pinnigrada (class.) 6. 761
Pinnistellae (class.) 6. 761
Pinnoctopus
gen. 4. 852
Pinnogène 3. 219, 220

Pinnularia (Veget. gen.) 0. 638; 9. 379
Pinnularia (Diatom. gen.)
acuta 0. 491
affinis 0. 491
amphiceros 4. 613
amphioxys 4. 613
borealis 0. 250
capillacea 1. 477; 5. 629
craticula 4. 613
decurrens 0. 491
fusus 0. 491
inaequalis 0. 491; 4. 613
mesogongyla 4. 613
nobilis 0. 491
peregrina 0. 491
Rhenana 0. 491
semen 4. 613
viridis 0. 491
viridula 0. 491; 4. 613
Pinus alba 7. 100
anomala 3. 747
anthracina 8. 627
banksioides 3. 747
brevifolia 0. 502; 3. 502; 5. 638
brevis 8. 498
Brauni 5. 638
Chattorum 9. 123
dubia 5. 638
disseminata 8. 498
exogyra 2. 896
Francofurtensis 9. 122
Goetheana 2.761; 3.502, 5. 638
gracilis 9. 122
Haidingeri 9. 117
Hampeana 3. 502; 5. 638
hepios 3. 502; 5. 638; 6. 502; 9. 873
indefinita 8. 498; 9. 122
Langana 5. 638
Lardyana 5. 638
larix 3. 191
leuce 5. 638
macroradiata 3. 747
Oceanines 3. 502; 5. 638; 9. 123, 873
palaeostrobus 5. 638; 9. 873
Pallasana 3. 382
problematica 9. 122
radiosa 3. 747
Pinus
resinosa 8. 498
rhabdosperma 5. 638
Santiana 9. 117
Saturni 9. 873
Schnittspahni 8. 498
serotina 3. 747
sphaeroides 9. 122
Strozzii 9. 873
subrigida 3. 747
sylvatica 3. 747
sylvestris 6. 568, 734; 9. 117
sylvicola 3. 747
taeda 3. 747
trigonifolia 3. 747
tumida 8. 498
uncinoides 8. 501; 9. 117
vexatoria 9. 873
Piocormus gen. 4. 56
laticeps 5. 764
Piperites
bullatus 3. 434; 4. 630
Hasskarlanus 3. 434; 4. 630
Miguelanus 3. 434; 4. 630
Pipistrellus
noctuloides 5. 371
Pirates
Oeningensis 3. 865, 873
Pirula (Pyrula)
clava 2. 43; 3. 75
clathrata 2. 163, 169
condita 3. 75
coronata 2. 43
gracilis 2. 163, 169
laevigata 2. 163, 169
reticulata 2. 43, 358
tricostata 3. 604
Pirulina spp. 2. 511*
Pirus 0. 637
minor 3. 47
cfr. Pyrus
Pisces 8. 110, 239
Pisidium
amnicum 1. 760; 2. 1004
antiquum 3. 135; 8. 200
Henslowanum 2. 1004
obliquum 9. 348
pulchellum 2. 1004
pusillum 2. 1004
spp. 8. 616
Pisocrinus gen. 9. 759!
Pisocrinus
ornatus 9. 759
pilula 9. 759
Pisolith 1. 484
Pisolithen
-Gebirge 1. 100, 102
-Kalke 1. 745; 4. 108!, 368; 5. 223 p.; 7. 732!
-Mergel 1. 745
Pisonia 0. 633
eocaenica 4. 379, 877; 9. 374, 502
Pisoodon gen. 6. 760
Pissadendron 0. 632
clericorum 4. 496; 6. 627
Pistacia 0. 636
Fontanesia 6. 252
Phaeacum 6. 244
Pistazit 0. 552; 1. 155*, 695
Pistosaurus
longaevus 2. 884; 5. 233
Pithecus
maritimus 1. 380; 7. 120
Pithonothon gen. 9. 639!
angustum 9. 640
rostratum 9. 640
Pitoxylon Eggensis 1. 102
Pittinus
ponderosus 5. 76!
Pittizit 6. 83
Pittosporum
Fenzli 4. 379
tenerrimum 4. 379
spp. 6. 244; 9. 253
Pitys ovoidea 2. 894
Placocoenia 2. 117*
irregularis 4. 868
Orbignyana 4. 867
Placocyathus 2. 115*
Placodermata (Pisces) (ordo) 8 248
Placodus gen. 9. 128
Andriani 3. 18, 29 8. 128; 9. 129
bathygnathus 9. 128
bombidens 9. 128
gigas 0. 246!; 3. 18, 29
laticeps 9. 128
Münsteri 3. 18, 29
pachygnathus 9. 128
rostratus 0. 246
spp. 3. 191; 6. 746
Placoidei (ordo) 9. 764!

Placomus 2. 123
Placoparia
gen. 0. 779!, 785; 3. 488; 6. 224
Tourneminei 3. 102; 6. 500; 8. 870
Zippei 5. 98; 7. 638
Placopsilina
Cenomana 4. 867
Placosaurus
rugosus 5. 233; 7. 625
Placosmilia 2. 116*
angusta 4. 867
consobrina 4. 867
cuneiformis 4. 867
Parkinsoni 8. 738
Placosteus
gen. 8. 249
Placothorax
gen. 1. 494; 8. 249
Agassizi 4. 581; 6. 610
Placotrochus 2. 116*
Placuna
armata 1. 486
complicata 2. 229
jurensis 0. 870; 1. 486; 2. 229; 4. 765; 8. 357
placenta 0. 83
Placunomya
spp. 1. 764
Placunopsis
gen. 4. 766!
gracilis 6. 363; 7. 760
jurensis 4. 766
obliqua 6. 363; 7. 760
ornata 4. 766
plana 6. 363; 7. 760
radians 4. 766
Pläner 0. 306; 2. 27*; 3. 495; 4. 643, 847, 866 p.; 7. 788; 9. 744
-Formation 0. 386; 7. 785
in Meklenburg 5. 727
-Gebirge 4. 670
-Kalk 1. 815; 2. 766 p.
-Mergel 1. 481
Plaesiocomia
gen. 3. 487
cordata 3. 128*
Kieneri 3. 102
Plagiostoma
cardiiforme 4. 765
duplicatum 4. 621, 765
giganteum 7. 612; 9. 15
Plagiostoma
Hermanni 6. 743; 9. 15
lineatum 6. 218; 7. 761; 8. 719
ovale 4. 765
pectinoides 4. 765
praecursor 6. 741
punctatum 7. 743
semicirculare 4. 765
striatum 7. 761; 8. 719
subspinosum 2. 44
succinctum 6. 743
Plagiaulacodon 8. 114
Plagiaulax
gen. 8. 113!; 9. 243
Becklesi 8. 114!
minor 8. 114!
Plagioklastische Krystall-Form 4. 598*
Plagiolophus
gen. 0. 748; 5. 226
annectens 5. 373
Fraasi 2. 831
minor 2. 759, 831; 4. 640
ovinus 5. 373
tenuirostris 5. 373
spp. 0. 879; 2. 305
Plagionit 2. 534; 7. 69*
Plagioptychus
spp. 8. 738
Plakodin 2. 490!, 588
Planera
dubia 9. 505, 754
emarginata 9. 502
Ungeri 2. 628; 3. 120, 504; 4. 378, 491, 632; 6. 505; 8. 500; 9. 117, 123, 374, 502, 505, 754
Zelkovae 9. 502
Planeten 2. 343
-Temperatur 7. 188
Planicellaria
gen. 4. 114!
Planites
gen. 4. 853
Planking
(Steine) 0. 869
Planorbis
acuticarinatus 3. 751
amplexus 8. 377
applanatus 0. 799; 4. 249; 5. 768; 8. 586
biangulatus 4. 865
Planorbis
bicarinatus 7. 729
Castrensis 9. 749
cingulatus 7. 623
complanatus 3. 763
convolutus (MH.) 7. 494; 8. 494
corneus 3. 763; 6. 131, 594
corniculum 4. 249; 5. 768; 9. 141
cornucopiae 8. 875
cylindricus 4. 865
crassus 9. 749
declivis 0. 799; 3. 146; 6. 332, 535; 7. 59; 9. 137
depressus 3. 751
discus 4. 865
elegans 4. 865
euomphalus 1. 713; 4. 865
fragilis 8. 377
Hebertanus 7. 623
hemistoma 4. 865
hispidus 2. 44
lens 1. 712, 713; 4. 865; 5. 746; 7. 729
lenticularis 7. 623
leucostoma 2. 637
liasinus 7. 210
Mantelli 2. 765; 6. 332; 8. 515
marginatus 2. 44 ff.; 3. 534; 6. 594
Nebrascensis 8. 494
nitidiformis 5. 768
obesus 8. 875
obtusus 4. 865
oligyratus 4. 865
planatus 9. 749
planulatus 5. 746
platystoma 4. 249, 865; 5. 768
Prevostinus 5. 746
pseudoammonius 0. 799; 2. 765; 4. 249; 5. 768; 6. 131, 332; 8. 586
rotundatus 0. 799; 1. 713; 4. 865; 9. 36
Schulzanus 3. 751
similis 4. 865
solidus 6. 332; 8. 200; 9. 137

Planorbis
Sowerbyi 4. 865
spirorbis 2. 637; 3. 534, 763
subovatus 4. 526
subumbilicatus 7. 494; 8. 494
tenuivolvis 8. 377
Thiollieri 5. 746
tropis 4. 865
vetustus 3. 20
spp. 1. 122; 6. 750; 8. 847; 9. 114
Planorbulina
gen. 5. 755
truncata 7. 280!
Plantae
acrogenae 0. 107
angiospermae 0. 112
gymnospermae 0. 110
Planularia
auricula 7. 497
incurva 7. 497
intermedia 7. 497
Planulina
gen. 5. 755
eusticta 4. 740
lenticulina 4. 737
micromphala 7. 750
Osnabrugensis 7. 498
polysolenia 7. 750
turgida 0. 473
spp. 4. 738ff.
Plasmopora
gen. 6. 113
spp. 7. 104
Plastic-clay 2. 882; 3. 612
Plastischer Thon 3. 189; 5 580!; 7. 230 p., 490, 733; 8. 360
Platacanthus
Ubinoi 3. 759
Plataninium 0. 633
Platanus 0. 633
aceroides 3. 227; 8. 501; 9. 117, 502, 871, 873
cuneifolia 3. 227; 9. 502
digitata 3. 631
grandifolia 3. 47
Guillelmae 3. 227; 9. 502
Herculis 0. 115
Oeynhausenana 3. 227; 9. 502
Pannonica 3. 384
Platanus
rugosa 3. 227; 9. 502
Sirii 9. 375
subintegra 3. 227
Platax
Woodwardi 4. 196
Platemys
gen. 9. 366*
Bowerbanki 1. 79; 2. 379; 9. 366
Bullocki 2. 379; 4. 576
sulcatus 8. 254!
Plateosaurus
Engelharti 5. 757
Platin 1. 351; 4. 69; 7. 830; 8. 328
-Erz 6. 444!; 9. 449*
Metalle einschliessend 5. 836
-Verbreitung 4. 176; 6. 186
-Vorkommen 0. 88; 2. 499; 3. 725; 5. 69!; 6. 441; 8. 860; 9. 448*
Platonyx
Bucklandi 4. 111
Brongniarti 4. 111
Cuvieri 4. 111
minutus 4. 111
Platten-Kalk 5. 49 ff., 81
Platybunus
dentipalpus 5. 124
Platycarcinus
Beaumonti 4. 572; 7. 154
pagurus 4. 572
Platychelys
gen. 5. 740!
Oberndorferi 4. 577!; 5. 740!
Platyceras
gen. 7. 761; 9. 755
Ptatyceros
Roberti 5. 373
Somonensis 5. 373
Platycormus
gen. 9. 494!
Germanus 9. 494
Platycrinidae
(fam.) 6. 761
Platycrinus
Ann-Dixoni 0. 377
anthelíontes 6. 602, 761
antiquus 2. 1000
arenosus 6. 602
Austinanus 6. 602
Platycrinus
brevis 6. 374
coronatus 6. 115
decoratus 6. 256
depressus 2. 108
diadema 1. 748
ellipticus 6. 115, 602
elongatus 6. 761²
fritillus 6. 233; 8. 372
gigas 6. 761
granosus 6. 602
granulatus 6. 602, 761
granulifer 6. 374
granulosus 6. 761
Huntsvillae 0. 377
insularis 5. 865
interscapularis 6. 761
laciniatus 6. 761
laevis 6. 602, 761²
megastylus 1. 748; 6. 115
mucronatus 6. 761
Mülleranus 6. 602
nodosus 6. 233
olla 6. 602
ornatus 6. 602
pentangularis 6. 761²
pileatus 6. 115, 602
planus 6. 602
polydactylus 0. 377
rugosus 6. 761
scaber 6. 374
speciosus 6. 602
spinosus 6. 761
stellaris 3. 228; 5. 865
striatus 6. 761
tabulatus 6. 376
triacontadactylus 6. 602
trigintidactylus 6. 761
tuberculatus 6. 602, 761; 8. 372
ventricosus 6. 631!; 7. 860
vesiculosus 1. 748; 6. 115
spp. 9. 236, 343
Platydactyloidea
(fam.) 9. 867
Platygnathus
Jamiesoni 9. 491
paucidens 9. 491
Platygonus gen. 0. 872!
compressus 0. 872; 5. 112; 7. 483
Platymeris
insignis 6. 620
Platymetopus 6. 224

Platymetopus
illaenoides 9. 121
spp. 4. 493
Platymya
gen. 3. 95!; 6. 246, 251
Rodborensis 3. 96
spp. 1. 382
Platynodus
gen. 3. 487
Platyodon
gen. 5. 225; 7. 876
Platyoptera
gen. 6. 230!
extensa 6. 230
Platyostoma
hemisphaericum 8. 855
Niagarense 7. 762
spp. 3. 343; 5. 248
Platypterna
gen. 9. 867
Deaneana 9. 867
delicatula 9. 867
digitigrada 9. 867
gracillima 9. 867
recta 9. 867
tenuis 9. 867
varica 9. 867
Platyrhynchus
problematicus 1. 753
Platyschisma
glabrata 6. 121
helicoides 6. 121
Jamesi 6. 121
ovoidea 6. 121
tiara 6. 121
spp. 1. 382
Platysolenites
gen. 5. 852; 8. 632, 633
Platysomus
gen. 1. 761!; 3. 118*
Fischeri 3. 759
macrurus 1. 761; 4. 751
parvus 4. 751; 6. 124
striatus 4. 751; 6. 124
Platystoma
gen. Ag. 9. 755
gen. (Hörn., non. Ag.) 5. 501
Suessi 5. 501
Platytrochus 2. 115*
Platyuri (fam.) 9. 766
Plecia 0. 24*
Plectrodus
mirabilis 3. 630; 8. 624, 625
Plectrodus
pliopristis 3. 630
Plectrolepis 3. 744
Plectropterna
gen. 9. 868
angusta 9. 868
gracilis 9. 868
lineans 9. 868
longipes 9. 868
minitans 9. 868
Pleistocän 2. 882
-Bildungen 1. 483; 2. 998p.; 9. 99*
-Fauna 5. 223, 370
-Gebirge 7. 606
-Schichten 8. 584
Pleocnemia
gen. 3. 761
Pleonast 2. 525; 3. 705!; 7. 69
Plerastraea 2. 118*
Plerogyra 2. 116*
Plesiarctomys
Gervaisi 5. 224
Plesiastraea
gen. 0. 763, 764!; 2. 118*
Plesictis
Croizeti 5. 229, 372
elegans 5. 372
genettoides 5. 372
gracilis 5. 372
Lemanensis 5. 372
palustris 5. 372
Pomeli 5. 229
robustus 5. 372
Plesiocomia
vdr. Plaesiocomia
Plesiogale
angustifrons 5. 229, 371
elegans 5. 229
mustelina 5. 371
robusta 5. 371
Waterhousei 5. 371
Plesiomorphismus 3. 844!
Plesiornis
gen. 9. 868
aequalipes 9. 868
pilulatus 9. 868
quadrupes 9. 868
Plesiornithopus 1. 512
Plesiothornipus
Binneyi 1. 512
Plesiosauri (fam.) 6. 760
Plesiosauridae
(fam.) 5. 745
Plesiosaurus gen. 9. 383*
Andium 3. 123
Bernardi 2. 381; 3. 109
brachyspondylus 5. 233
carinatus 5. 233
constrictus 2. 381
dolichodeirus 6. 760
Etheridgei 8. 234
Frearsi 0. 226
gurgitis 4. 375; 9. 123
Lünevillensis 5. 233
Neocomiensis 9. 124
pachyomus 2. 381
pentagonus 5. 233
profundus 3. 16
trigonus 5. 233
spp. 1. 501; 4. 381; 6. 66
Plesiosorex
soricinoides 5. 224, 371
talpoides 5. 224, 371
Plesioteuthis
gen. 9. 369
acuta 9. 370
prisca 9. 370
Plethodus
gen. (pisc.) 3. 109
Plethopora
gen. spp. 2. 125, 126!
Pleuracanthus
gen. 3. 487; 8. 743
arcuatus 7. 626
biserialis 7. 626
dilatatus 7. 626
laciniatus 1. 661
laevissimus 8. 743
stellifer 2. 107
Pleurocardium
compressum 2. 933
Pleurococnia 2. 118*
Pleuroconchae
(ordo) d'O. 6. 119, 656
Pleurocora
gen. 0. 762!; 2. 117*
alternans 0. 762
explanata 0. 762
gemmans 0. 762
Haueri 0. 762; 4. 868
Koninckı 0. 762
ramulosa 0. 762
rudis 4. 868
Pleurocrinus
gen. 6. 115, 602
Pleuroctenium 3. 488
Pleurocystites gen. 9. 636
Anticostiensis 9. 636
elegans 9. 636

Pleurocystites
exornatus 9. 636
filitextus 9. 636
robustus 9. 636
squamosus 9. 636
Pleurodictyum
gen. 2. 120*; 3. 876
Lonsdalei 6. 482, 507!
problematicum 0. 276, 281, 288; 1. 66, 224, 225; 2. 341, 452, 924, 938; 3. 814; 4. 39, 497; 6. 79, 209, 375, 501, 507
Selkeanum 8. 754
stellare 0. 285
Pleurodon
gen. 5. 113; 6. 240; 7. 538
Pleurodontae 5. 742
Pleuromeya 4. 109
Pleuromya
gen. 4. 754!; 6. 249!
Aldouini 4. 851; 7. 133 ff.
decurtata 4. 755, 851; 6. 249; 7. 744
donacina 4. 355
Dunkeri 6. 495; 7. 210
elongata 4. 755, 851; 6. 249
glabra 6. 248
Helena 4. 851
recurva 6. 249
rostrata 4. 851
securiformis 7. 744
sinuosa 4. 851
striatula 4. 851
subrotunda 0. 99
Suevica 8. 354
tenuistria 4. 755, 851; 7. 743
unioides 4. 851; 9. 476
varians 7. 135; 9. 135
Pleuronectites
discites 3. 13, 22
laevigatus 3. 23
pusillus 4. 747
reticulatus 3. 23
Pleuropholis
gen. 8. 237!; 9. 39
attenuatus 8. 237, 238
crassicaudatus 8. 237
longicaudus 8. 237, 238
serratus 8. 237, 238
spp. 9. 381
Pleurophorus
gen. 3. 127; 6. 119, 645
costatus 1. 238; 3. 126; 4. 118, 749; 7. 223
Goldfussi 6. 245! 7. 223; 9. 359
lamellosus 6. 372
Murchisoni 4. 489
occidentalis 8. 349
permianus 8. 766
subcuneatus 8. 349
Pleurophyllia
dichotoma 8. 591
Pleurorhynchus
gen. 6. 120, 865
dipterus 8. 594
minax 2. 108
minor 6. 372
Pleurosaurus
Goldfussi 7. 534!
Pleurosiphonia
affinis 4. 613
gracilis 4. 613
obtusa 4. 613
Pleurosmilia
communis 8. 591
compressa 8. 591
cylindrica 8. 591
elongata 8. 591
graciosa 8. 591
grandis 8. 591
irradians 8. 591
portlandica 8. 591
stylifera 8. 591
Pleurosternum
gen. 4. 753!
concinnum 4. 753
emarginatum 4. 753
Etalloni 8. 119
latiscutatum 4. 753
ovatum 4. 753
Pleurotrema gen. 5. 755
Pleurotoma
acuminata 7. 636
acutangularis 3. 45
angulata 2. 163, 169
asperulata 3. 75
attenuata 7. 636
Belgica 0. 862; 3. 38
Beyrichi 9. 125
brachyura 4. 760
brevirostris 1. 716; 7. 52
carinata 3. 763; 4. 750
cataphracta 3. 75, 76, 370; 6. 93, 739; 7. 51
Pleurotoma
Chersonesi 9. 875
clathrata 2. 163, 169
clavicularis 3. 45, 604, 5. 475 ff.
coccophora 7. 636
comma 1. 716
composita 3. 235
colon 1. 716; 7. 51
concatenata 9. 839
conica 7. 636
conoides 1. 716
conoideum 9. 125
costellaria 0. 862
crassa 7. 636
crassicosta 7. 636
crenatum 9. 125
cymea 7. 636
Cypris 3. 75
dentata 7. 636
denticulata 3. 75
desmia 7. 636
detecta 3. 75
dimidiata 3. 75
Döderleini 4. 760
Duboisi 7. 623
elongata 3. 604
exorta 1. 716; 7. 636
fenestrata 3. 635; 4. 875
flexuosa 3. 38
fusiformis 7. 636
gibberula 3. 76
glaberrima 3. 75
glabrata 2. 44
goniaea 7. 636
goniophora 3. 604
granulato-cincta 4. 760
Heckeli 4. 760
Helvetica 2. 43
helix 7. 636
heptagona 3. 635; 4. 875
inarata 7. 636
inermis 4. 760
interrupta 2. 163, 169
intorta 3. 763
Jouanneti 8. 585
Juliana 4. 760
Keelei 7. 636
Koninckı 3. 45
labiata 3. 370, 604; 6. 93, 739
laevigata 7. 636
lanceolata 7. 636
laqueata 8. 875
Latdorfense 9. 125
laticlavia 6. 535

Pleurotoma
Linkana 4. 750
lyra 4. 573
macilenta 7. 636; 8. 740; 9. 866
marginata 3. 604
monilis 3. 75
microdonta 7. 636
multicostata 3. 45
Neugeboreni 4. 760
nodulosa 3. 763; 4. 750
obeliscus 3. 75; 7. 52
obliterata 3. 45
oblonga 2. 509; 3. 75
obtusangula 7. 52
Ocoyana 7. 242
pannus 3. 75
Penea 4. 750
Perezi 3. 604
permiana 4. 750
planetica 7. 636
Poppelacki 4. 760
porrecta 3. 763
prisca 1. 716; 3. 604; 8. 740; 9. 866
purpurea 3. 763
pyrulata 7. 636
ramosa 2. 43; 3. 370; 6. 93, 739
reticulata 3. 75
rostrata 7. 636; 9. 125
rotata 0. 223; 7. 52
rufa 3. 763
Sandleri 4. 760
scabra 3. 45
Scarboroughi 8. 377
Schreibersi 4. 760
Sedgwickana 4. 750
Selysi 3. 38, 45; 9. 866
semimarginata 3. 75
semicolon 3. 763
spinosa 3. 635
striatula 3. 75
subcostellata 3. 75
subdenticulata 5. 435
subtilis 4. 760
subtuberculosa 5. 594
Suessi 4. 760
sulculosa 7. 636
symmetrica 7. 636
terebra 3 75
terebralis 7. 636
teretrium 7. 636
textiliosa 7. 636
tornata 3. 45
Pleurotoma
transmontana 7. 242
transversaria 7. 636²
trifasciata 4. 760
trochlearis 4. 760
Tunstallensis 4. 750
turbida 3. 45; 9. 125
turricula 0. 223; 3. 45, 763
Vogleri 3. 45
vulpecula 2. 509
Waterkeyni 3. 38
Zimmermanni 3. 45; 7. 53
spp. 4. 760; 6. 479, 750; 9. 498
Pleurotomaria
Agassizi 4. 548
Albertiana 6. 363, 366; 9. 360
alte-vittata 6. 120
Ambrosinii 9. 357
Anglica 2. 343; 6. 456; 8. 643
angulata 6. 120, 372
antiqua 6. 371
antitorquata 9. 847
antrina 4. 118, 489, 750; 6. 120; 7. 223, 638
atomus 7. 374
Bachelieri 3. 102
basilica 4. 850
Beaumonti 2. 107; 6. 371
bicoronata 6. 371
bifida 6. 371
bilineata 6. 372
bilix 5. 253
binodosa 6. 371
Bischofi 6. 371
Bussacensis 5. 98²; 6. 500
Cadomensis 0. 160
caepa 6. 494; 7. 210; 8. 643
calculiformis 6. 371
callosa 4. 370; 6. 120
carbonaria 7. 116; 9. 827
carinata 6. 125
catennlata 6. 371, 500
Chauvini 3. 102
cirriformis 6. 120
clathrata 3. 235
cognata 4. 850
compressa 6. 494
concava 3. 604; 7. 863; 9. 844
Pleurotomaria
conica 6. 120, 125
conoidea 2. 343
consobrina 6. 120
conulus 7. 863
cornu-arietis 6. 371
costato-fasciata 6. 371
costulato-canaliculata 6. 371
crenato-striata 6. 371
crenulata 3. 232; 6. 120
Cypraea 8. 484
Cytherea 8. 484
Daleidensis 1. 666; 2. 929; 6. 371
decipiens 3. 760; 6. 120
decorata 0. 160, 164, 535; 5. 501
decussata 6. 371
Defrancei 2. 107; 6. 371
delphinulaeformis 6. 371
delphinuloides 2. 108
densa 6. 494, 7. 210
dentato-limata 6. 371
Deshayesi 3. 604; 9. 844
discoidea 3. 235
Duboisi 7. 623
elegans 1. 357, 744; 6. 371
erosa 3. 760; 6. 120
euomphalus 6. 371
euryomphalus 6. 371
exsiliens 6. 371
expansa 4. 850; 6. 71, 494; 8. 226
falcifera 6. 371
fasciata 6. 371
Fischeri 6. 758
flammigera 6. 125
funata 2. 228
Gerana 4. 119
gigantea 2. 162, 169, 171
globosa 5. 853
granulata 4. 370
Grayvillensis 7. 116
Griffithi 6. 120
gyroplata 4. 850
Haueri 5. 501
Hausmanni 6. 363
heliciformis 6. 456, 494; 7. 210
helicinoides 6. 120

Pleurotomaria
Hennocquei 6. 495
Hettangiensis 6. 494; 7. 210
Humboldti 4. 80
humerosa 9. 869
humilis 7. 863
imbricata 6 120
incisa 9. 357
intermedia 6. 850
interstrialis 6. 120
laevigata 2. 228
latifasciata 1. 636
Leavenworthana 7. 863
lens 6. 494; 8. 643
lenticularis 6. 120, 371
Leysseri 6. 363
Linkana 4. 119; 7. 638
Lonsdalei 6. 371
macrostoma 6. 371
Malyrensis 9. 847
Meekana 7. 863
Michelini 5. 593
Moorei 1. 636
Mosellana 6. 495
Münsteri 2. 349
Murchisonia 6. 372
mutabilis 4. 850
naticaeformis 6. 371
Neocomiensis 5. 623
Nerei 8. 226
Nerinea 6. 372
nexilis 6. 758
nodulo-striata 7. 863
nodulosa 4. 119; 6.371; 7. 638; 9. 761
nucleus 6. 494
numismalis 6. 494
obesa 3. 235
obliqua 6. 494
Orbignyana 2.108; 6.371
ornata 0. 160; 4. 370; 8. 356, 582
pagodus 3. 235
penultima 1. 101
perspectiva 7. 786
perversa 6. 758
Phine 4. 850
Piasaensis 7. 863
planannulata 6. 371
plicifera 5. 865
Poesneckensis 4. 119
polita 6. 494
principalis 4. 850
pyramidalis 0. 160
quadrata 4. 874
quadricincta 6. 371
Pleurotomaria
quadrilineata 6. 371
reticulata 8. 488
Reussi 6. 758
rotella 6. 371
rotellaeformis 4. 850; 6. 494; 7. 210; 8. 226, 643
rotundata 6. 125, 256, 456; 7. 863
rustica 4. 850
scalaris 2. 929; 3. 234
Sedgwicki 7. 638
septentrionalis 0. 227
Sigaretus 6. 371
similis 8. 643
sphaerulata 9. 827
squamato-plicata 6. 371
strialis 0. 243
striata 2. 163, 169; 6. 120, 371
subangulata 7. 863
subcarinata 6. 371
subclathrata 6. 371
submonilifera 6. 120
subnodosa 4. 548!
subscalariformis 6. 758
subsolarioides 8 643.! 644
subsulcata 6. 371
subturbinata 9. 869
suturalis 6. 494
Swallowana 7. 863
tenui-arata 6. 371
trilineata 6. 371; 7. 863
Triton 5. 501
trochleata 6. 494
Tunstallensis 7. 638
turbinata 4. 548!; 5. 501
turbinea 6. 371
turrita 6. 120
undata 6. 120; 8. 594
undulata 6. 120
Ussensis 9. 847
Verneuili 3. 772; 4.118, 750; 7. 638
virgillata 9. 827
Wanderbachi 6. 494
Wortheni 7. 863
Yvani 6. 120
spp. 1. 382; 5. 248
Plicatula
armata 1. 486; 2. 229
aspera 4. 869
Baylei 6. 496; 7. 210
Caillaudi 3. 605
Plicatula
elongata 2. 229
fistulosa 4. 765
Hettangiensis 7. 207, 210; 8. 643
inflata 7. 785, 786
intus-striata 7. 617, 621, 690; 9. 852
obliqua 3. 167; 4. 830, 835; 6 218; 8. 4
oxynoti 6. 744
papyracea 6. 496
placunea 0. 487; 1.738; 3. 617; 4 250
polymorpha 7. 230
radiola 1. 738
rapa 0. 481
rugosa-plicata 1. 417!, 419; 9. 629
spinosa 0. 149; 3. 617; 4. 370, 851; 5. 364; 6. 496; 7. 10, 130; 8. 552
tuberculosa 4. 765
tubifera 8. 486
ventricosa 6. 454
spp. 4. 250; 8. 384! 9. 123
Pliocän 2. 882
-Alluvium 9. 349
-Fauna 5.223!; 9.246
-Flora 4. 495, 631*
-Formation 3. 332; 8. 509, 584; 9. 824
-Gebirge 3.625; 4.609p.; in England 4. 507p.
-Periode: Flora 0. 115!
-Säugthier-Fauna 8.509
Pliogonodon
gen. 7. 857!
priscus 7. 857!
Pliolophus
gen. 9. 240!
vulpiceps 9. 240!
Pliomera
gen. 6. 224; 9. 121
spp. 4. 493
Pliopithecus
antiquus 5. 224; 7. 119
Pliosaurus
giganteus 5. 766!
Wosinskii 4. 857
spp. 0. 723
Plocarites
gen. 4. 253!
aequi-latus 4. 251
Brongniarti 4 251

Plocarites
cystoseira 4. 251
dictyosiphon 4. 251
globiferus 4. 251
halymenioides 4. 251
latus 4. 251
Lemaneus 4. 251
macrocystes 4. 251
multifidus 4. 251
polymorphus 4. 251
Rodymenia 4. 251
striarius 4. 251
Plumbocalcit 6. 443!
Plum[i]eria 0. 634
nereifolia 6. 505
Plumpe Fels-Kalke 0.170!, 184
Plutonische Bildungen
in Italien 0. 231
Felsarten 6. 470
Gebirge 8. 713
vgl. Urgebirge
Gesteine 1. 29; 3.372; 6. 721; 8. 337², 341, 347
unter hohem Druck entstehend 1. 739
Plutonismus 9. 204, 209
Plymouth
-group 3. 97; 6. 112
Pneumatolytische Metamorphose 1. 863!
Poacites 0. 630
acutus 5. 638
aequalis 2. 995
angustus 3. 503; 5 638
Arundo 2. 995
caespitosus 5. 638
cocoinus 2. 995
durus 5. 638
exasperatus 2. 760; 3. 502; 5. 638
firmus 5. 638
laevis 2. 760; 3. 503; 5. 638
lanceolatus 2. 995
latifolius 2. 995
Nardus 2. 995
Paspalum 2. 995
primaevus 9. 873
pseudo-ovinus 3. 503; 5. 638
recentior 2. 995; 5. 638
repens 5. 638
rhabdinus 5. 638
Poacites
rigidus 5. 638
striatus 2. 995
strictus 2. 760; 3. 503; 5. 638; 9. 122
subtilis 5. 638
tortus 2. 760; 3. 503
zeaeformis 1. 476
spp. 8. 626
Pocillopora 2. 121*
raristella 3. 74
Podabacia 2. 118
Podacarpeae
(fam.) 5. 638
Podocarpites
acicularis 6. 254
Podocarpium
Knorri 2. 761; 3. 506
Podocarpus 0. 632
Apollinis 4. 378
eocaenica 3. 502; 4. 378; 5. 241, 638; 6. 502; 7. 502; 8. 587; 9. 374
Haeringana 4. 378
macrophylla 3. 683
mucronulata 4. 378
taxites 4. 378; 6. 505
Podocarya 0. 631
Bucklandi 2. 994
spp. 2. 1003
Podocratus
Dülmensis 9. 494
Podocyrtis
gen. 6. 127*
Podogonium
gen. 9. 243
Podophora 7. 122
Podophthalmus
Buchi 5. 860
Podopilumnus
n. gen. 0. 121
Fittoni 0. 121
Podostemon
spp. 7. 777
Podozamites
gen. 6. 616, 617!
falcatus 6. 617
gigas 6. 617
lanceolatus 6. 617
longifolius 6. 617
megalophylla 6. 617
Moreaui 6. 617
Schmideli 6. 617
Podura fuscata 5. 125
pilosa 5. 125
pulchra 5. 125
Poebrotherium
gen. 1. 755!; 5. 116!; 7. 869
Wilsoni 1. 755!; 5. 114, 116; 8. 376
Poecilodus 5. 255
aliformis 6. 123
foveolatus 6. 123
Jonesi 6. 123
obliquus 6. 123
parallelus 6. 123
sublaevis 6. 123
spp. 7. 485
Poecilopleurum
Bucklandi 5. 233, 743; 6. 759
Poecilopoda
(fam.) 6. 116
Poecilops
breviceps 5. 374
Pön-Sandstein 5. 50
Poeocera
nassata 6. 620
pristina 6. 620
Pogonias
spp. 1. 225; 7. 155
Polar-Länder 9. 221p. g.
Polarität
im Entwickelungsgang der Organismen 4.607
magnetische, der Gesteine 4. 615
Polemarchus
gen. 9. 868
gigas 9. 868
Polianit 0. 191
Polirte Eindrücke
in Mollasse-Geschieben 3. 797
Felsen 0. 645
Polirschiefer 6. 102; 7. 843; 9. 510
Pollicipes
acuminatus 2. 632
Angelini 2. 632
angustatus 2. 633; 9. 494
antiquus 2. 633
asper 2. 633
Bronni 2. 633; 9. 494
carinatus 2. 632
concinnus 2. 632
conicus 2. 633
dorsatus 2. 633
elegans 2. 633; 8. 620
elongatus 2.632; 9.361
fallax 2. 633

Pollicipes
glaber 2. 633
gracilis 2. 633; 5. 126
Hausmanni 2. 632
laevis 2. 463, 632, 633
liasinus 2. 633
maximus 2. 463, 632; 9. 361
medius 2. 632; 5. 126
Nilssoni 0. 171; 2. 632
oolithicus 2. 632
ornatissimus 2. 633; 9. 361
planulatus 2. 633
quadratus 2. 632
quadricarinatus 2. 632
radiatus 2. 633
reflexus 2. 632
rigidus 0. 171; 2. 463, 633
semilatus 2. 633
solidulus 2. 632; 9. 361
striatus 2. 633
sulcatus 2. 632; 9. 361
uncinatus 2. 633
undulatus 2. 632; 9. 361
unguis 2. 633
validus 2. 633
spp. 1. 228; 7. 491
(gen. cfr. Mitella)
Pollyxenus
caudatus 5. 121
colurus 5. 121
conformis 5. 121
lophurus 5. 121
ovalis 5. 121
Polyadelphit 5. 70!
Polyargit 4. 598!, 601; 9. 565!, 586
Polybasit 3. 475
Polycentropus
affinis 6. 622
antiquus 6. 622
atratus 6. 622
barbatus 6. 622
dubius 6. 622
guttulatus 6. 622
incertus 6. 622
latus 6. 622
priscus 6. 622
vetustus 6. 622
Polycladus
gen. spp. 5. 227
ardeus 5. 373
cladocerus 5. 373
Polycladus
ramosus 5. 373
Polycoelia
gen. 1. 488!; 2. 121*
spp. 2. 990
Polycyphus 7. 122
Deslongchampsi 6. 100
Longchampsi 8. 357
nodulosus 6. 100
Polycystina
(class.) 5. 759; 6. 104, 127
im Seegrunde 7. 111
Polycystinen
-Erden 9. 226
-Gesteine 1. 137; 7. 843
Polydesmus
spp. 5. 121
Polydilasma
gen. 1. 765!
turbinatum 1. 766
spp. 5. 248
Polyeres
gen. 3. 487
Polygastern 0. 489
-Gestein 7. 843; 8. 847
-Lager 6. 101
-Tripel 6. 101
Polygastrica
(ordo) 5. 759; 6. 103
Polygonodon
gen. 7. 856!
vetus 7. 856!
Polyhalit 5. 702!
Polykras 0. 57!; 1. 179; 2. 862!; 5. 513 ff.
Polylepas
(gen. cfr. Mitella)
Polylith 3. 60
Polymerer
Isomorphismus 6. 352
Polymerie 4. 69*, 298, 603; 8. 394
Polymorphina
gen. 5. 749, 755; 7. 377
abavia 8. 632
amygdaloides 7. 498
anceps 7. 498
angusta 7. 290!
avia 8. 632
communis 7. 288!, 309
compressa 7. 498
costata 7. 291!
crassa 7. 498
Polymorphina
cylindroides 7. 498
dilatata 2. 254; 6. 756
gibba 7 288!, 309
granulosa 7. 290!
Humboldti 6. 756!
incerta 7. 286!
insignis 7. 498
lanceolata 2. 254; 6. 756; 7. 498
lata 7. 288!
lingua 7. 498
media 7. 287!
Münsteri 7. 498
ovata 7. 498
ovulum 7. 498
Philippii 7. 498
praelonga 7. 287!
problema 7. 287!, 309
regularis 7. 498
silicea 5. 750, 751
similis 7. 498
spinosa 7. 298!, 309
subdepressa 7. 498
subdilatata 7. 286!
striata 7. 291!
tuberculata 7. 292!, 309
uvula 7. 285!
spp. 2. 511*; 4. 737
Polyparia
(ordo) 2. 248; 3. 875, 877; 9. 67
Turbinoliidae 2. 375!
Polyparien 1. 625, 627
aus den Oolithen 2. 757
Britische 2. 757
s. Korallen
Polypen
-Kalk 7. 469
-Stöcke 2. 375!
Polyphractus
gen. 6. 123
Polyphyllastraea
gen. 0. 765; 2. 118
Polyphyllia 2. 117*, 119
Polypiers
paléozoiques 2. 114
Polypodiaceae
(fam.) 5. 637
Polypodites 0. 628
blechnoides 0. 116
crenifolius 6. 253
elegans 1. 476; 3. 762; 5. 630
linearis 2. 886
Mantelli 2. 886

Polypodites
reticularis 2. 886
Styriacus 1. 634; 3. 762
Polypodium
Fischeri 3. 502
Gessneri 5. 637
Oeningense 2. 760; 3. 762
pulchellum 3. 502
Polypora gen. 8. 616
Biarmica 7. 374
bifurcata 9. 847
dendroides 6. 115
infundibuliformis 7. 374
laxa 6. 374
striatella 6. 374
verrucosa 6. 115
spp. 5. 248
Polypori
(Cidaridae) 7. 121
Polyporus foliatus 8. 498
Polypterus
gen. 3. 117*; 8. 760*
Polyptychodon
continuus 2. 381; 4. 863
interruptus 1. 75; 2. 381; 3. 164, 495; 4. 624!, 863; 5. 623, 742
spp. 1. 312; 7. 109; 9. 124
Polyrhizodus
magnus 6. 123
pusillus 6. 123
Polysiphonia
Sternbergana 4. 743
Polysphärit 2. 533
Polystomatium
gen. 5. 617*
leptactis 6. 608, 609; 7. 750
pachyactis 6. 608, 609; 7. 750
Polystomellida
(fam.) 5. 754 ff.
Polystomella
gen. 5. 749, 755, 617*; 7. 377
angulata 7. 302!
crispa 0. 240; 7. 303!, 309; 8. 874
cryptostoma 7. 301!
flexuosa 2. 254; 7. 303! 309
Josephina 7. 303!, 309
Metensis 9. 371
Ortenburgensis 7. 302!
Polystomella
quadripunctata 7. 502
subcarinata 7. 301!
subnodosa 7. 497
subumbilicata 1. 378
Ungeri 2. 254
Polythalamia
(class.) 5. 615!, 749!, 759
spp. 2. 757
im See-Grunde 7. 111
Polythalamien
Gesteine bildend 8. 630
-Erden 9. 225
-Gesteine 5. 469; 6. 101; 7. 91, 111, 749 p.
-Kalk aus Java 5. 616
Polytomurus
gen. 2. 242; 3. 487
Polytrema
ficulina 5. 653
spongiosa 7. 502
Polytremacis 2. 120*
Bellardii 3. 606
Blainvilleana 3. 582, 718; 4. 869
macrostoma 4. 869
Partschi 3. 582; 4. 869
supracretacea 1. 102
Polytremaria
catenata 6. 121
subseptentrionale 3. 746
subundulatum 3. 746
suburnigerum 3. 746
Polytrypa
elongata 4. 737; 7. 232
Polyzosteria
parvula 6. 620
tricuspidata 6. 620
Pomaderris
lanuginosa 6. 505
Pomatia spp. 8. 507
Pomognathus spp. 3. 109
Pontogeneus
priscus 5. 112
Poonahlit 4. 78
Populites 0. 633
platyphyllus 2. 894
succineus 3. 227
Populus 0. 633
Aeoli 0. 504; 2. 760; 9. 501[2]
alba 4. 627
attenuata 2. 762; 9. 501
balsamoides 3. 227; 8. 501; 9. 117, 501
Populus
betulifolia 3. 384
betulaeformis 2. 754; 6. 505
betuloides 0. 504; 2. 762; 3. 504; 9. 501
Bianconii 4. 762
Brauni 4. 491; 9. 502
cordifolia 2. 672; 9. 501
crassinervis 1. 102
crenata 2. 894; 3. 227; 9. 374, 501
crenulata 9. 501
cuneata 1. 635
dubia 6. 505
emarginata 3. 227; 6. 505; 9. 501
eximia 3. 227; 9. 501
Fraasi 9. 348
Gaudini 9. 501
gigas 2. 762
grandulifera 9. 501
Greimana 9. 122
grosse-dentata 3. 504; 9. 501
Heliadum 9. 501
integerrima 0. 504; 2. 760; 9. 501
lancifolia 3. 504; 9. 501
latior 0. 504; 2. 760, 762; 6. 505; 8. 500; 9. 501[2]
leuce 9. 374, 755
leucophylla 9. 117
melanaria 9. 501
mutabilis 9. 122, 123, 501, 505
nigra 4. 832
oblonga 2. 760; 3. 504; 9. 501
ovalifolia 0. 504; 2. 760; 9. 501
ovalis 3. 504; 9. 501
Pannonica 9. 501
Phaetonis 4. 627
platyphylla 3. 227
producta 3. 227
quadrata 9. 501
rhombifolia 9. 123
rhomboidea 9. 505
serrata 9. 501
styracifolia 2. 754; 4. 491

Populus
transversa 0. 504; 2. 762; 3. 504; 9. 501
tremulaefolia 9. 501
truncata 0. 504; 2. 760, 762
undulata 6. 505
Porambonites
aequirostris 4. 60, 504
deformatus 8. 594
intercedens 6. 117
lima 5 98
reticulatus 4. 504
Ribeiroi 4. 504; 5. 98
Porambonitidae (fam.) 4. 60, 504
Poraraea
gen. 2. 120; 3. 876
Porastraea
gen. 2. 119, 3. 876
Porcelanite 8. 391
Porcellana spp. 6. 753
Porcellia
abnormis 6. 758
Fischeri 5. 501
Puzosi 6. 121
spp. 3. 623
Porcellio
carbonum 2. 467
cyclocephalus 5. 121
granulatus 5. 121
notatus 5. 121
Porellidae (fam.) 4. 115!
Porellina gen. 4. 116!
Porellinidae (fam.) 4. 115!
Porfido rosso 9. 742
verde 9. 743
Poricellaria
gen. spp. 4. 115!
alata 4. 114
Porina gen. 4. 116!
Porinidae (fam.) 4. 114!
Porites gen. (Schafh.) 4. 531!
gen. (Lmk.) 2. 119*, 120
Collegnoana 3. 876
complanatus 2. 251
Deshayesanus 3. 876
elegans 0. 757
incrustans 3. 876
leiophyllus 6. 245; 7. 502; 9. 844
mammillatus 4. 868
polymorphus 7. 502
pyriformis 2. 108, 193; 6. 375
ramosus 7. 233
Porites
stellulatus 4. 868
subdigitatus 2. 251
tuberosus 7. 233
vetustus 2. 120; 3. 876
Poritidae (fossiles) 3. 875!
Porocidaris
gen. 7. 122; 9. 255
serrata 7. 859
Porodragus gen. 5. 633
Poromya
anatinoides 6. 651
granulata 7. 507
spp. 7. 632
Poröse
Quarz-Gesteine 8. 834
Porosoma
gen. spp. 7. 852*
Porospira gen. 5. 755
Porosus
communis 8. 503
marginatus 8. 503
taxoides 1. 102
Porphyr 0. 424, 804; 1. 169!, 335; 2. 496; 3. 737; 4. 210, 302!; 6. 204, 569; 9. 130, 485, 556, 576, 657, 677
blauer 5. 704!
grauer 5. 584
Mandelstein-artiger 1. 559, 563
Quarz-führender 0. 186!; 2. 83!; 5. 199!
s. Quarz-Porphyre
-Aphanit 7. 601
-artige Granite 0. 865
-artiger Trachyt 7. 354!, 357
-Gänge 9. 74
-Konglomerat 9. 682, 698
-Kugeln 8. 655
-Trümmer im Pechstein-Gang 4. 565
Porphyre
glanduleux 2. 199
globuleux 2. 199
zéolithique 1. 354!
Porphyrit 9. 657, 663
Porphyroid 6. 204
Porpita 2. 122
Porpites
hemisphaericus 2. 377
Portage-Sandstein 3. 817
Port[e]it 6. 693!
Portland-Gruppe
Schichtenfolge 4. 353, 356
-Kalk 0. 355; 3. 814; 8. 590; 9. 366 p.
-oolite 7. 469; 8. 488
-stone 0. 173, 185
Portlandien (terrain) 4. 353; 6. 763; 8. 488
Portlockia gen. 1. 507!
apiculata 4. 501, 6. 116
granulata 6. 116
latifrons 6. 116
Stockesi 6. 116
Portoro-Marmor 6. 216
Portosanto-Marmor 7. 595
Portunus
Peruvianus 0. 121
spp. 3. 164
Porzellan-Jaspis 8. 391!
-Spath 2. 535; 4. 600! 5. 174
Porzellanerde:
Lagerstätten 3. 460, 466
Posidonia
vgl. Posidonomya
Posidonomya 5. 613
acuticosta 6. 373
Becheri 2. 104 ff., 279 ff.; 5. 51; 6. 79, 120, 124, 245, 373; 7. 57
Bronni 3. 494; 4. 851; 6. 545, 818; 7. 16, 36, 130, 595, 698; 8. 583; 9. 25, 94, 402
Buchi 6. 852
Clarai 0. 732; 6. 245, 570; 7. 615; 9. 359, 477
concentrica 2. 279
Janus 7. 595
intercostalis 6. 626
keuperina 6. 254
lateralis 6. 120, 373
liasina 9. 95
lineata 5. 501
Lommeli 5. 501
longitudinalis 6. 373
mandibularis 3. 159; 6. 626
marginalis 1. 609
Meriani 5. 480
minuta 3. 313; 4. 123, 413; 5. 95, 212;

Posidonomya
minuta 6. 60, 214, 218, 616; 7. 117, 344, 759, 760; 8. 228², 622, 720! 9. 383²
Münsteri 6. 648
nodoso-costata 8. 373
obliqua 8. 383
obovata 6. 647
orbicularis 6. 850
ornati 8. 484
ovata 7. 253
Pargai 2. 340
parva 7. 253, 698
princeps 8. 643, 644!
radiata 6. 245, 850
socialis 5. 613
striata 9. 506
striato-sulcata 6. 373, 626
sulcata 6. 647
Suessi 6. 852
tenella 0. 579
triangularis 9. 751
tuberculata 6. 120, 373
undata 6. 647
venusta 1. 225, 663; 2. 275 ff.; 3. 159, 523, 4. 46, 454; 6. 209, 373, 625
Wengensis 6. 214; 8. 373
spp. 5. 252, 843
Posidonomyen
-Kalk 9. 402!
-Bett 6. 850
-Schiefer* 0. 180!, 405; 1. 225; 2. 267 ff., 279; 3. 494; 4. 370, 567, 794; 5. 50, 81; 6. 368, 369, 457*; 7. 9 ff., 254; 8. 59 p., 356, 552, 583², 713, 721; 9. 24, 133, 263, 345, 346, 398!
Flora 2. 889
Posoqueria 0. 634
Postemersions
-Systeme 5. 643
Posteri 9. 628
Postpliocän 2. 882
Postpliocäne
Gebilde 9. 496 p.
Postpyrenäische
Tertiär-Gebirge 9. 470
Post-tertiäre
Formation 5. 735, 855
Potamanthus priscus 6. 621
Potamides
carbonarius 0. 401, 410
concavus 3. 189
margaritaceus 1. 714
Potamocarpites
thalictroides 2. 994
Websteri 2. 994
Potamogeton 0. 631
acuminatus 2. 993; 4. 378
Berengeri 2. 994
Bolcensis 2. 994
Bruckmanni 0. 503; 3. 503; 5. 639
cuspidatus 4. 491
densoides 2. 994
dubius 2. 994
foliosus 9. 374
geniculatus 0. 502, 503; 2. 993; 3. 503; 5. 639
grandifolius 2. 994
Morloti 1. 634, 636; 2. 993
multinervis 2. 994
Najadum 2. 994
natans 9. 503
obsoletus 5. 639
ovalifolium 2. 993; 4. 378
Pannonicus 2. 994
Pasinii 2. 994
Sirenum 2. 993
speciosus 2. 994; 4. 378
Tritonis 2. 993
Ungeri 2. 623, 993
vaginatus 2. 994
Potamohippus gen. 1. 502
Potamomya
angulata 1. 714
gregaria 1. 713
Iphigenia 8. 875
plana 1. 713, 714
Sedgwicki 2. 352
Sowerbyi 2. 352
Potamophilus
Valetoni 5. 229
Potamophyllites 0. 631
multinervis 2. 994
Potamotherium gen. 5. 229
Poteria gen. 4. 865
Potericeras 4. 853; 6. 126!
cordiforme 6. 122
cornu-vaccinum 3. 760; 6. 122
ellipticum 6. 122
fusiforme 6. 122
pyriforme 6. 122
spp. 1. 253
Poteriocrinidae (fam.) 6. 762
Poteriocrinus
abbreviatus 6. 762
calyx 6. 602; 9. 759
conicus 6. 602, 762
conoideus 6. 602
crassimanus 1. 748
crassus 6. 602, 762²
curtus 6. 233, 633; 7. 860
dactyloides 6. 762
fusiformis 7. 860
geometricus 7. 860
gracilis 6. 762
granulatus 6. 602; 9. 759
granulosus 6. 115, 762
hemisphaericus 6. 632! 7. 860
impressus 6. 626
isacabus 6. 762
latifrons 6. 762
longidactylus 6. 735, 762; 8. 628
M'Coyanus 6. 602; 9. 759
Meekanus 6. 735
mespiliformis 6. 626
minimus 6. 762
minutus 8. 59²
Missouriensis 8. 628
municipalis 0. 377
nuciformis 1. 748; 6. 115; 7. 373
pachydactylus 8. 371
patulus 8. 372
pentagonus 6. 762
Phillipsanus 6. 602; 9. 759
plicatus 6. 602, 762
quinquangularis 6. 762
radiatus 6. 602, 762
regularis 8. 60
Rhenanus 6. 233; 8. 371

* Nach 3 Posidonomya-Arten benannt, sind von dreierlei Alter.

Poteriocrinus
rostratus 6. 762
spissus 6. 602
tenuis 6. 762
Pothocites 0. 631
Grantoni 2. 994
Poudingue
de Trient 2. 823
de Valorsine 2. 823
Potsdam
-Sandstein 0. 228; 2. 981; 3. 447; 4. 829; 8. 497; 9. 341
Potstone 8, 73
Pradocrinus
Baylei 0. 247!; 2. 340; 7. 860; 9. 635
Praecursores 9. 628
Prairie'n:
Ursprung 0. 82*
Praseolith 2. 522; 9. 567
Prasochrom 0. 313, 682
Prattia
gen. 1. 752
Predazzit
(Marmor) 0. 132; 8. 85
Prehnit 0. 683!; 1. 158*, 354;, 401*. 558!; 2. 524; 3. 843; 4. 423; 5. 186, 822; 9. 84
Prehnitoid 7. 69!; 9. 294!
Preis-Aufgaben:
geologische 3. 637; 9. 768
des Fürsten Demidoff
für 1855: 4. 254
von 1857: 7. 640
der Französischen Akademie 6. 256
der Harlemer Gesellschaft 2. 637; 4. 509; 5. 510; 6. 510; 7. 510; 8. 511; 9. 511
der Utrechter Gesellschaft 6. 640
Preisschrift
über fossile Koniferen 3. 623
Preissleria 0. 631
antiqua 2. 992
Prenaster
gen. 4. 499!; 9. 255
alpinus 4. 120, 121, 499; 7. 859; 9. 844
Prenaster
Helveticus 4. 120
perplexus 4. 120, 499
Primary rocks
nach Sedgwicks Eintheilung 6. 112
Primitiv
-Gesteine 2. 366
Primordial
-Fauna 3. 335!, 446, 580; 6. 225, 500; 8. 871, 361!; 9. 357, 503, 509, 721
Prinos 0. 636
Lavateri 0. 505; 3. 506
obovata 6. 505
polymorphus 9. 503
Priodontes
gen. 4. 111
Prionacanthus
gen. Pand. 8. 113
dubius 8. 113
Prionastraea
gen. 0. 763, 764; 2. 118*
Aegyptiaca 0. 764
aranea 0. 765
confluens 0. 765
diversiformis 0. 765
explanata 0. 765
Guettardana 0. 765
helianthoides 0. 765
Hörnesi 4. 868
irregularis 0. 765; 5. 844; 7. 502, 773
lamellosissima 0. 765
limitata 0. 765
Münsterana 0. 765
polygonalis 0. 765
supracretacea 1. 102
Prionia
globosa 8. 874
Prioniodus
gen. 8. 112
carinatus 8. 112
elegans 8. 112
sulcatus 8. 112
Tulensis 8. 112
Volborthi 8. 112
Prionocheilus
gen. 3. 487
Verneuili 3. 102
spp. 4. 493
Prionodon
antiquus 7. 243!
Prionognathus gen. 8. 112
Prionognathus
Brandti 8. 112
Prionolepis
gen. (Pisc.) 3. 109*; 5. 376
Prionopeltis
gen. 3. 487
spp. 4. 493
Prionopleurus
Bronni 3. 125
Prionotus
convolutus 2. 247; 4. 126
dentatus 2. 246
folium 2. 246; 4. 126
geminus 2. 373
pristis 2. 246; 4. 126
sagittarius 1. 127; 3. 637; 4. 126
scalaris 2. 246
teretiusculus 4. 126
Priscodelphinus
grandaevus 5. 112
Harlani 5. 112
Pritichampsus
gen. spp. 5. 232, 743
Pristicladotus
dentatus 6. 123; 7. 485
Goughi 6. 123; 7. 485
Pristiodon
gen. 6. 760
Pristipoma
furcatum 5. 380
Pristis
Parisiensis
Pritchardia 0. 638
Proboscidia (fam.) 0. 866; 7. 869
Proboscina
Alfredi 5. 634
Ammonitarum 5. 634
Buchi 5. 634
complanata 4. 869; 5. 634
Davidsoni 5. 634
elegantula 5. 634
Eudesi 5. 634
gracilis 5. 634
Jacquoti 5. 634
punctatella 4. 869
Radiolitharum 4. 869
Procän
-Formation 4. 166
Procamelus
gen. 9. 248!
gracilis 9. 249
occidentalis 9. 248

Procamelus
robustus 9. 249
Procyon
priscus 5. 113; 7. 376!
Proetus
gen. 0. 780!, 785; 1. 508!; 3. 487; 6. 224²
concinnus 8. 270, 594; 9. 121
Cuvieri 6. 370, 375
elegantulus 4. 501; 9. 864
Huhayi 3. 102
latifrons 9. 121
Missouriensis 6. 735
pictus 8. 753
pulcher 9. 121
ramisulcatus 9. 121
Swallowi 6. 735
spp. 2. 242; 5. 248
Profil
der Devon-Schichten 6. 368
von Häring 4. 376
des Lias in Franken
der Lombardischen Gebirge 6. 216
Producta s. Productus
Productidae
(fam.) 4. 61!, 504
Productus
gen. 3. 213!
aculeatus 4. 746; 5. 874; 6. 118; 8. 608
aequicostatus 6. 736; 8. 766; 9. 827, 849, 850
alternatus 6. 382
Altonensis 6. 382
antiquatus 2. 108; 4. 746
asperrimus 7. 637
biseriatus 7. 863
Boliviensis 6. 382
Buchanus 6. 382
calvus 4. 746; 6. 382; 9. 827
Cancrini 4. 119, 746; 5. 875; 7. 374, 637; 8. 374, 608, 844; 9. 847
carbonarius 6. 382; 7. 472
Colhaunanus 8. 766
comoides 2. 108
concinnus 2. 108
Productus
Cora 1. 68; 3. 815; 5. 735, 856, 873; 6. 382, 501, 736; 7. 220, 454; 8. 710; 9. 824, 851
corrugatus 6. 118
costatus 1. 608; 6. 118, 382; 9. 849², 850*
elegans 6. 118, 382
expansus 5. 873
fimbriatus 1. 238; 2. 108; 5. 874; 6. 118, 382
Flemingi 5. 719, 873; 6. 118, 382; 8. 710
flexistria 6. 382
fragaria 6. 256
Geinitzanus 4. 489, 746; 7. 381, 382
giganteus 5. 873; 6. 118, 601; 7. 472
gigas 1. 65, 608; 6. 501
Goldfussi 4. 746
granulosus 5. 874; 6. 382
Heberti 7. 220
hemisphaericus 6. 118; 7. 374. 382
Hildrethanus 6. 382
Hoppei 4. 746
horescens 8. 502
horridus 3. 6, 7, 126, 128, 770ff.; 4. 119, 746, 489, 504; 6. 118; 7. 223, 382, 637; 9. 761
Humboldti 5. 873
Indianensis 7. 863
Keyserlinganus 6. 118
lamellosus 5. 491; 6. 374
latirostratus 4. 746; 7. 637
latissimus 0. 732; 5. 873
Leonhardi 4. 60
Leplayi 4. 119; 7. 382; 8. 373, 727
Leuchtenbergensis 6. 382
Lewisanus 4. 746; 8. 374
lobatus 2. 108
longispinus 4. 746
margaritaceus 5. 873; 6. 118, 382
marginalis 6. 118
Productus
Martini 2. 108; 4. 504; 6. 118
Medusa 7. 373, 374
membranaceus 9. 847
mesolobus 5. 874; 6. 118
Morrisanus 4. 746; 7. 637
Murchisonanus 6. 382, 501², 626, 7. 220
muricatus 6. 382; 9. 827, 848, 851
Nebrascensis 6. 382; 9. 850
Neffedievi 7. 374
Norwoodi 8. 716, 766
Nystanus 5. 873
pectiniformis 5. 480
Phillipsi 6. 382
plicatilis 2. 108. 5. 873; 6. 118
Portlockanus 6. 382
praelongus 6. 118
Prattenanus 6. 382
productoides 9. 847
punctatus 1. 608; 2. 108; 5. 873; 6. 118, 382; 8. 710; 9. 827, 850, 851
pustulosus 5. 873; 6. 118 7. 374; 8. 710
reticularis 5. 212
Rogersi 6. 382; 8. 766; 9. 827, 848
rugosus 4. 746
scabriculus 1. 608; 5. 873; 6. 118, 382; 7. 220; 8. 710; 9. 827
Schaurothanus 6. 381, 382
semireticulatus 1. 68; 2. 105ff.; 4. 61; 504; 5. 719, 727, 873; 6. 118, 382, 501; 7. 220, 373, 374, 454, 620; 8. 497, 710, 766; 8. 827, 847, 851
setosus 6. 118
speluncarius 4. 747
spiniferus 4. 746
spinosus 3. 746
spinulosus 2. 108, 192; 6. 118

Productus
splendens 6. 382; 9. 827, 851
striatus 1. 608; 5. 873; 6. 118, 601; 7. 389
subaculeatus 1. 225; 2. 340; 4. 364; 5. 384; 6. 256, 374. 382; 7. 454ff.; 9. 847
subreticulatus 6. 173
sulcatus 9. 222
tortilis 6. 118
tubuliferus 4. 746
tessellatus 5. 873
Twamlyi 3 103
umbonillatus 4. 119, 746; 7. 637
undiferus 6. 382
Verneuilanus 9. 827
Villiersi 6. 382
Wabashensis 9. 827, 849
spp. 1. 382
-Kalk des Zechsteins 3. 772
Proicän-Fauna 5. 223!
Prolagus
Sansaniensis 7. 876
Pronoe
trigonellaris 6. 852
Propagations
-Form der Erdbeben 3. 371
Propalaeoniscus
Agassizi 5. 374
Propalaeotherium 0. 879
Isselanum 5. 226
Propetes
argutus 5. 123
felinus 5. 123
griseus 5. 123
latifrons 5. 123
pumilus 5. 123
Propora
gen. 2. 120*; 6. 113
tubulosa 8. 594
spp. 2. 990;
Proropora spp. 7. 104
Proroporus gen. 5. 755
Propterus gen. 3. 117*
spp. 9. 764
Prorastomus
gen 6. 106!; 7. 869
sirenoides 6 106!
Prosobranchiata
(trib.) 7. 631
Prosocoelus gen. 7. 627!
Prosocoelus
complanatus 7. 628
ovalis 7. 628
priscus 7. 628
Prosopit 4. 189
Prosopon
gen. 7. 556!; 9. 638!
aculeatum 7. 556
aequitatum 7. 556
aequum 7 556
depressum 7. 556
elongatum 7. 556, 557
excisum 7. 556
grande 7. 556
hebes 7. 556
Heydeni 7. 556
insigne 8. 61
laeve 7. 556
lingulatum 8. 61
marginatum 7. 556
obtusum 7. 556
ornatum 7. 556
paradoxum 8. 61
punctatum 7. 556
rostratum 7. 556
simplex 7. 556
spinosum 7. 556
Stotzingense 7. 556
sublaeve 7. 556
torosum 7. 566
tuberosum 7. 566; 9. 640
verrucosum 9. 640
Prosoponiscus
gen. 8. 745!
problematicus 8. 745!; 9. 489!
Prostemma
Oeningense 3. 871, 873
Protamyris 0. 636
eocaenica 3. 506; 9. 375
Protarea 2. 120*
Verneuili 3. 876
vetusta 3. 876
Protaster
gen. 7. 120*; 8. 127!
leptosoma 8. 127
Miltoni 8. 127
Salteri 8. 127
Sedgwicki 6. 115; 7. 747; 8. 127
spp. 9. 236
Protea
linguaefolia 6. 505
lingulata 9. 503
Protaeaceae
fossiles 2. 749!
Protean-Group 3. 345
Protemys
gen. 2. 382!
serrata 2. 381; 4. 575
Proteoides
Radobojanus 2. 750
Proteosaurus
gen. 5. 497
Protoeuryale
Confluentina 4. 39; 6. 233
Protichnites
Scoticus 7. 240
spp. 9. 504
Proto
cathedralis 6. 739
Protocardia
gen. 3. 115; 6. 866
Nicoleti 6. 230
Protocardium
Arcansense 6. 480
spp. 9. 125
Protochoerus
gen. 0. 872!
prismaticus 0. 872; 5. 112; 7. 483
Protococcus
crustaceus 3. 745
Protocoris (Hemipt. g.)
planus 2. 985
Protocrinites
oviformis 4. 233 ff.; 8. 594
Protogyn 2. 232; 4. 837; 5. 453!; 7. 357*, 741; 8. 707
Protohippus
gen. 9. 250!
perditus 9. 250!
Protoholothuria
gen. 8. 623!
annulata 8. 623, 624*
armata 8. 623, 624*
Protokryptogene
Erdrinden-Theile 7. 795
Erhebungen 5. 310
Protomeryx
Halli 7. 854!; 8. 376
Protomyia
brevipinnis 6. 503
Bucklandi 6. 503
elegans 6. 503
gracilis 6. 503
livida 7. 503
lygaeoides 6. 503

Protopelargus gen. 7.634
Protopelicanus
gen. 7. 634
Protophrynus
Arethusae 5. 374
Protophyta 0. 626!
Protopithecus
antiquus 5. 224; 7. 120
Protopitys
Buchana 2. 891
spp. 5. 547
Protoprisma 6. 153
Protopterideae
(fam.) 6. 98
Protopteris
gen. 0. 628; 8. 364!
Cottai 8. 363
confluens 8. 364
microrhiza 8. 463, 364
tenera 8. 364
Sternbergi 3. 735
Protopyramid
-Krystalle 6. 151
Protorchis gen.
monorchis 7. 777
rhizoma 7. 777
Protorhipis
gen. 6. 254!
Buchi 6. 253
Protornis
Glaronensis 6 362
Glarisiensis 7. 634
Protorosaurus
gen. 7. 103
macromyx 6. 330
Speneri 3. 162*; 6.330, 759; 7.103; 8.301; 9. 104
spp. 3. 518
Protoseris 2. 119*
Waltoni 2. 377
spp. 2. 758
Protosphyraena
striata 8. 253
Prototaxites
Logani 9. 755
Prototoma (Coleopt. gen.)
striata 2. 983, 984
Protovirgularia 2. 247
dichotoma 6. 67, 113; 7. 105
Protozoische Gebirge 6. 223
Schöpfung 4. 751
Provinzen:
zoologische 2. 996; 5. 608
Prunocystites
gen. 4. 234 ff.
Prunus 0. 637
acuminata 0. 508; 3. 506; 8. 499
Caroliniana 9. 506
cylindrica 8. 499
echinata 8. 499
Ettingshauseni 8. 499
fragilis 9. 123
juglandiformis 9. 375
nanodes 9. 873
obtusa 8. 499
ornata 8. 499
paradisiaca 1. 128
parvula 8. 499
prinoides 6. 506
pyrifolia 6. 506
rugosa 8. 499
tenuis 8. 499
Zeuschneri 1. 128
Prymnoa 2. 123
Psammechinus 7. 122
Psammite
du Condros 7. 219
Psammitischer
Felsittuff 9. 549!
Psammobia
affinis 6. 859
angustata 7. 643, 647
attenuata 6. 647²
Basteroti 6. 859
compressa 1. 712; 6. 859
costulata 6. 859
decussata 6. 647, 874
Dumonti 6. 859
elliptica 6. 647²
Ferroensis 3. 756, 757; 7. 506
Fischeri 5. 475
florida 6. 859
gracilis 6. 859
Hallowaysi 6. 859
incarnata 6. 859
inconspicua 6. 859
Jonesi 9. 750
Labordei 6. 859; 9. 839
laevigata 1. 486; 2.230; 3. 96; 7. 743
laevis 6. 859
laminosa 6. 859
lyrata 6. 643, 647, 859
muricata 6. 859
obovata 6. 647²
Psammobia
pudica 5. 475; 6. 859
rigida 6. 643, 647
rudis 0. 861; 6. 859
Roemeri 6. 647, 859
rugosior 6. 859
semicostata 6. 859
soleniformis 6.643, 647
solenoides 6. 859
solida 6. 859
subpapyracea 4. 749; 6. 647; 7. 637
tellinella 6.859; 7.506
transversa 6. 647
uniradiata 6. 859
vespertina 6. 859; 7. 506
spp. 6. 248, 250, 599; 859; 8. 616
Psammobiidae
(fam.) 6. 859
Psammocora 2. 120*
Psammodus
canaliculatus 6. 123
cornutus 6. 123
rugosus 6. 123
Psammolepis
gen. 8. 249
Psammopora 2. 120*
Psammosaurus
batrachioides 3. 16
laticostatus 3. 16
tau 3. 16
Psammoseris 2. 119*
Psammosteus
gen. 8. 249
maeandrinus 8. 509
Psarolithen 9. 718
Psaronia
spp. 8. 758
Psaronieae
(ordo) 5. 505!
Psaronius
gen. 5. 505
alsophiloides 5. 506
arenaceus 5.506; 6.98
Asterolithus 5. 506; 8. 503
Augustodunensis 5.506
Bohemicus 5. 506
Brasiliensis 5. 506
carbonifer 5. 506; 6. 98
Chemnitzensis 5. 506; 8. 503
Cottai 5. 506, 576; 8. 503

Psaronius
cyatheaeformis 5. 506
dubius 5. 506
elegans 5. 506,
Freieslebeni 5. 506, 630
giganteus 5. 506
Göpperti 5. 506; 8. 503
Gutbieri 5. 506; 8. 503
Haidingeri 5. 506; 8. 503
Helmintholithus 5.506; 8. 503
hexagonalis 5. 506
Hogardi 5. 506
infarctus 5. 506; 8. 503
intertextus 5. 506
lacunosus 5. 506
macrorhizus 5. 506
medullosus 5. 506
musaeformis 5. 506; 6. 98
Parkeriaeformis 5. 506
pulcher 5. 506; 6. 98
Putoni 5. 506
radiatus 5. 506
Radnicensis 5. 506; 6. 98
Scolecolithus 5. 506
simplex 5. 506; 8. 503
speciosus 5. 506
Ungeri 5. 506
Zeidleri 5. 506; 8. 503
Zwickawiensis 5. 506; 8. 503
spp. 0. 629; 9. 557
Psathura
gen. 8. 616!
spp. 8. 616
Psecadium
ellipticum 7. 378
simplex 7. 378
spp. 9. 865
Pséphite 1. 105
Psephoderma
Alpinum 8. 646!; 9. 629
Psephophorus
gen. 8. 765
Pseudaelurus
gen. 9. 247!
intrepidus 9. 247!
quadridentatus 5. 230
Pseudastraeidae 0. 768; 2. 118
Pseudo-Apatit 3. 184!
-Feuergesteine 9. 459
-Glimmerschiefer 4. 44
Pseudo
-Konglomerate 1. 291
-Macigno 7. 596
-Nephelin 3. 261
-Porphyr 9. 657
Pseudobuccinum
gen. 8. 377!
Nebrascense 8. 377
Pseudocarcinus
gen. 7. 764!
Chauvini 7. 764
Pseudocidaridae 1. 490!
Pseudocoenia 2. 117*
Pseudocrania
gen. 3. 216!
divaricata 3. 216; 6. 116
Pseudocrinites
gen. 4. 233 ff.
magnificus 9. 636
Pseudocrinus 2. 746!
Pseudoculinidae 2. 251!
Pseudocyon
robustus 7. 234, 759
Sansaniensis 5. 229, 372
Pseudodiadema
gen. 7. 122; 9. 255
Bakerae 7. 762
Bailyi 7. 768
depressum 7. 768
hemisphaericum 7. 768; 8. 486
homostigma 7. 768
Kleini 7. 859
magnagramma 7. 768
mammillanum 7. 768
Moorei 7. 768
ornatum 7. 785
Parkinsoni 7. 768
pentagonum 7. 768
placenta 8. 486
superbum 8. 486
vagans 7. 768
versipora 7. 768; 8. 486
spp. 9. 123
Pseudodifflugia
gen. 5. 755
Pseudofungiidae 2. 118
Pseudoliva
elegans 9. 750
Pseudomorphosen 0. 191; 1. 328!, 385!, 577, 585, 604, 710, 819; 2. 513!, 711, 715, 859!, 868;
Pseudomorphosen 3. 181, 461, 464, 467, 475, 596, 600, 601, 602, 681, 695, 700, 701, 708, 711, 837, 843, 844; 4. 69, 76, 93, 174, 184, 187, 189, 191, 344, 346, 403, 415, 448, 450 709, 809, 815; 5. 69, 72, 76, 195, 315, 411*, 565, 688!, 841, 842; 6. 11 ff., 35, 36, 37, 135, 182², 189, 558, 564!, 843, 845; 7. 64, 71, 172, 440, 589, 716, 720, 8. 34 ff., 213, 319, 393!, 399, 572!, 692, 694, 697, 820, 832; 9. 82, 193, 292, 299, 444, 446, 575, 587, 600, 799, 803
v. Feldspath 0. 43! ff.
v. Weissbleierz 1. 92!, 200!
Pseudoniscus
gen. 9. 865!
aculeatus 9. 864
Pseudoperla
gen. 6. 622!
gracilipes 6. 620
lineata 6. 620
Pseudophana
amatoria 3. 874; 6. 503
reticulata 7. 620
Pseudophit 7. 437!
Pseudophora err. typogr. pro Pseudophana
Pseudosciurus
gen. 7. 870!
Suevicus 7. 870!
Psilomelan 1. 397*; 2. 517; 3. 802!; 4. 180!, 593*; 7. 433*; 9. 555
Psilonotus-Bank 6. 742; 9. 14
Psilophyton
gen. 9. 755*
princeps 6. 755
robustius 9. 755
Psilopterygii (fam.) 9. 767
Psilotites 0. 630
lithanthracis 5. 868

Psocus
abnormis 6. 621
affinis 7. 621
ciliatus 6. 621
debilis 6. 621
proavus 6. 621
tener 6. 621
Psoralea
dentata 6. 244
Vivianii 9. 117
Psychomyia
pallida 6. 622
sericea 6. 622
Pteraspis
gen. 8. 716!, 763*; 9. 491
Banksi 8. 716
Lloydi 8. 625
truncatus 8. 716
spp. 8. 716
Pteraster
militaris 8. 127
Pteria
gen. 3. 239
Pterichthys
gen. 1. 493; 8. 249; 9. 491
arenatus 5. 853; 8. 508
cancriformis 6. 124
cornutus 1. 494
elegans 8. 113
Harderi 8. 113
hydrophilus 1. 405
latus 1. 494; 6. 124
major 3. 125
oblongus 1. 494; 6. 124
productus 1. 494; 6. 124
quadratus 1. 495
striatus 8. 113
testudinarius 1. 494; 6. 124
spp. 0. 243
Pterinaea vidr. Pterinea
Pterinea
asperula 6. 119
bifida 6. 373; 8. 745
Boydi 6. 119
clathrata 6. 373
concentrica 2. 925, 932; 6 373; 8. 745
costata 2. 931; 6. 373
costulata 6. 373
crenistria 2. 931
declivis 6. 256
demissa 6. 119
elegans 2. 108
elongata 6. 373
Pterinea
fasciculata 2. 268, 925, 931; 6. 373; 7. 456; 8. 745
Goldfussi 1. 649
hians 6. 119
informis 6. 119
laevigata 6. 119
laevis 2. 931; 6. 373
lamellosa 2. 931; 8. 745
lineata 2. 931; 6. 119, 373
lunulata 6. 119
megaloba 6. 119
orbicularis 6. 81
Osiasia 3. 103
plana 2. 931; 6. 373
pleuroptera 6. 119
polyodonta 3. 24; 6. 363
posidoniaeformis 3. 239*
reticulata 2. 107
retroflexa 6. 119
Sowerbyi 6. 119
striato-costata 8. 753
subsulcata 6. 119
subradiata 6. 626
tenuistriata 6. 119
trigona 2. 932
truncata 2. 932
ventricosa 2. 107, 931; 6. 373
spp. 1. 253, 382
Pteris 0. 628
aquilina 0. 502; 6. 244; 7. 228; 8. 757; 9. 253
blechnoides 3. 502; 5. 637
crenata 2. 753
Gaudini 5. 637
gladiifolia 9. 123
Goepperti 2. 753; 3. 502; 5. 637
inaequalis 3. 502; 5. 637
Kochana 9. 123
Oeningensis 0. 502; 3. 502; 5. 637
Parschlugana 5. 637
Pecchiolii 9. 873
pennaeformis 3. 502; 5. 637; 9. 123
Radobojana 5. 637
Ruppensis 3. 502; 5. 637
Pteris
xiphoides 6. 505
Pterocarpus
spp. 7. 778
Pterocarya
Haidingeri 2. 628
Caucasica 8. 749
Massalongoi 9. 117, 871
Pterocephalia
gen. 0. 103; 2. 962!
Sancti-Sabae 0. 103
spp. 4. 493
Pterocera
gen. 7. 372
acuminata 7. 372
angulata 4. 875
Beatleyi 3. 234
Bervillei 6. 373
bialata 7. 373
bicarinata 8. 740
Bourjoti 7. 373
brevis 7. 373
camelus 7. 372, 373
cirrus 7. 373
Couloni 7. 373
decussata 3. 635; 4. 875
dubia 6. 495
flammifera 7. 373
Gothica 7. 373
Gousseti 7. 373
granulosa 7. 373
hamus 7. 373
Haueri 3. 635; 4. 875
Heberti 7. 373
ignobilis 3. 234
inaequistriata 7. 373
incerta 1. 743
inornata 7. 373
laevigata 7. 373
minuta 6. 852
multistriata 7. 373
musca 8. 488
Oceani 0. 735; 3. 494; 4. 355; 6. 818
pectinata 7. 373
Pelagi 3. 329, 330
Ponti 8. 488
radix 3. 370; 6. 93
rotunda 7. 373
Simonis 7. 373
striata 7. 373
strombiformis 8. 488
subtilis 3. 635; 4. 875
Terquemi 7. 373
tribrachialis 7. 373
tricuspidata 7. 373

Pterocera
tridigitata 7. 373
turrita 7. 373
vespa 7. 373
vespertilio 8. 488
Viquesneli 7. 373
Wrighti 3. 234
spp. 9. 498
Pteroceras vdr. Pterocera
Ptérocérien,
(Gestein) 4. 353 !
Pterochirus
gen. 1. 511
Pterocoma
longipinna 9. 365
Pterodactyli
(fam.) 6. 760
Pterodactylus 5. 620;
8. 61; 9. 112!
Banthensis 2. 1005;
6. 850; 8. 116, 508;
8. 638
brevirostris 4. 53*;
6. 760; 7. 535;
9. 112, 355
Bucklandi 9. 112, 355,
638
Cirinensis 9. 355
compressirostris 2. 382;
3. 106*; 9. 111
conirostris 2. 382;
9. 111!, 355
crassipes 7. 535; 9. 112,
355
crassirostris 4. 53*ff.;
6. 760, 827; 9. 112,
355
Cuvieri 2. 382; 3. 106;
9. 111
Diomedeus 3. 106
dubius 4. 53*; 8. 62;
8. 355
euchirus 9. 110!, 112
Gemmingi 5. 328!;
9. 638
giganteus 2. 382; 3. 106;
9. 111, 355
gracilis 2. 1005
grandipelvis 9. 355
grandis 8. 369*; 9. 112,
355
hirundinaceus 8. 62,
369*
Kochi 4. 52*ff.; 6. 826;
7. 535; 9. 112,
355
liasicus 8. 507; 9. 355
Pterodactylus
longicollis (-lum) 4. 52!;
7. 535; 9. 111;
112, 155
longipes 4. 55; 7. 535;
9. 112, 355
longirostris 0. 199;
4. 52*; 5. 334*,
809; 6. 760; 7. 535;
9. 112, 355
macronyx 2. 1005;
7. 536; 8. 509;
9. 112, 638
medius 4. 52; 9. 112,
355
Meyeri 4. 55*ff.;
7. 535; 9. 112;
355
micronyx 6. 827;
7. 535; 9. 355
Münsteri 8. 62
primus 9. 112
propinquus 8. 366!;
9. 111, 112, 355
Redenbacheri 7. 535;
9. 112
rhamphastinus 4. 52*;
7. 535; 9. 112
scolopaciceps 9. 355
secundarius 4 55;
5. 335; 7. 535;
8. 368; 9. 112,
355
Suevicus 5. 614!, 809;
7. 535; 8. 368;
9. 112
vulturinus 8. 367!;
9. 110, 112
Württembergensis 7. 112
Württembergicus 4. 570!;
5. 614!, 809; 7. 535;
9. 355
spp. 2. 832; 5. 233;
6. 494; 7. 634;
8. 645
Pterodictyum
gen. 6. 628!
annulatum 6. 626
Pterodon
brachyrhynchus 5. 230
Coquandi 5. 374
Cuvieri 5. 230, 374
dasyuroides 3. 115;
5. 230, 374
leptorhynchus 5. 230
Parisiensis 3. 115;
5. 230
Pterodon
Requieni 0. 498, 878;
5. 230
Pterodonta
inflata 1. 743
Pterogorgonia 2. 123
Pteronites
persulcatus 3. 238;
6. 119
subradiatus 6. 119
Pteroperna
gen. 2. 230!; 4. 766!
costulata 4. 765
emarginata 4. 765
gibbosa 2. 229
plana 7. 743
pygmaea 4. 765
spp. 6. 495
Pterophyllum
gen. 0. 630; 6. 616,
617!
abietinum 2. 887
acutifolium 2. 983;
6. 617
angustifolium 5. 613
Buchanum 2. 887
Carnallanum 6. 617,
618
Caucasicum 8. 741
Cottaeanum 6. 618;
8. 503
crassinerve 6. 618
cuspidatum 3. 242;
6. 253, 617
difforme 2. 750
Dunkeranum 6. 253², 617
Dunkeri 2. 887
Ernestinae 7. 622; 8. 365
Fittonanum 2. 887
Göppertanum 2. 887
Hartiganum 6. 618
Humboldtanum 2. 887;
6. 617
Jaegeri 4. 204; 6. 617,
618, 737; 7. 691
imbricatum 3. 242;
6. 253, 618
inflexum 1. 510
longifolium 3. 167*;
6. 253, 617, 618,
820
Lyellanum 2. 887;
5. 623
majus 6. 618; 8. 139
Meriani 6. 617, 618
minus 6. 618; 8. 139*

Pterophyllum
Münsteri 6. 618
nervosum 2. 887
Nilssoni 6. 618; 8. 139
Oeynhausenanum 6. 617, 618
propinquum 6. 617
rigidum 6. 253
Schaumburgense 2. 887; 6. 618
Pteropoda, silurische 4. 1
Pteropora gen. 7. 633
Pteropus
Vampyrus 5. 619; 9 355
Pterorhiza 2. 121
Pterospermum
dubium 2. 628
ferox 2. 628
Pterozamites 6. 616, 617!
abbreviatus 6. 617
angustus 6. 617
decussatus 8. 358
Hogardi 6. 617
Jaegeri 6. 617
inconstans 6. 617
longifolius 6. 617; 8. 358
Meriani 6. 617
propinquus 6. 617
spatiosus 6. 618
Pterygocephalus
gen. 3. 123*
Pterygophycus n. g.
spectabilis 7. 777
Pterygotus
gen. 1. 505; 3. 629!; 7. 118!; 9. 761
Anglicus 1. 506; 3. 630; 5. 865, 867*; 8. 625; 9. 338; 9. 603
leptodactylus 1. 506; 3. 629
problematicus 3. 629; 6. 81
pustuliferus 3. 630
Seraphim 7. 118
spp. 4. 1; 6. 355; 8. 355
Ptilichnus
gen. 9. 868
anomalus 9. 868
hydrodromus 9. 868
pectinatus 9. 868
typographus 9. 868
Ptilodictya
acuta 6. 114
costellata 6. 114
explanata 6. 114
Ptilodictya
fucoides 6. 114
lanceolata 6. 114, 797; 8. 267
pavonia 7. 104
Ptilorhachis dubia 6. 98
Ptychina
gen. 6. 863
biplicata 6. 863
Ptilopora pluma 9. 847
Ptilorhachis 0. 628
Ptychacanthus
Faujasi 5. 234
Ptygmatis 0. 639!
Bruntrutana 0. 639
Ptychoceras
gen. 4. 853; 6. 316*
Emericanum 1. 358
laeve 1. 738
Mortoni 8. 377
Puzosanum 2. 885
Ptychodes
Feldmanni 0. 243
globosa 0. 243
Ptychodus
decurrens 5. 234, 622, 623; 8. 383
latissimus 0. 734; 2. 167, 170, 171; 5. 622, 623; 8. 383
mammillaris 5. 622
polygyrus 0. 746; 5. 622
Whippleyi 8. 709
spp. 3. 109
Ptychogaster
abbreviatus 5. 374
emydoides 5. 232, 374
Vandenbeckei 5. 374
Ptycholepis
gen. 3. 117*
Bollensis 0. 322
curta 5. 870
Raiblensis 9. 40
Ptychomphalus
gen. 6. 120
Ptychomya
gen. 2. 227*; 6. 251!
Agassizi 2. 230
depressa 2. 230
detrita 2. 230
formosa 2. 230
orbicularis 2. 230
plana 6. 251.
sulcato-striata 2. 230
Ptychoparia gen. 3. 486
Ptychophyllum
gen. 2. 122*; 5. 631
Ptychophyllum spp. 7. 104
Ptychopleurus
Fayjasi 5. 234
Ptychopteris 0. 628
macrodiscus 5. 630
Ptychopyge gen. 6. 224
spp. 4. 493
Ptychotrochus
gen. 2. 766!
conulus 2. 766
tenuiplicatus 2. 766
turbinatus 2. 766; 7. 471
Ptyela carbonaria 6. 620
Puccinites
lanceolatus 4. 378
Pudding 5. 580
-Steine 8. 106
Pugiunculus
elegans 7. 639
fasciculatus 6. 372
rimulosus 6. 372
striatulus 4. 3; 7. 639
teres 7. 639
unguiformis 6. 372
sp. 2. 930; 3. 336, 337; 9. 504
Pugmeodon
Schinzi 5. 492
Pukingerit 0. 614!
Pullastra
antiqua 6. 648
arenicola 6. 860
bistriata 6. 648
Brongniarti 6. 860
complanata 6. 648², 860, 870
Cornuelana 6. 860
crassissima 6. 648
decussata 6. 860
Dupinana 6. 860
elegans 6. 648
elliptica 6. 648, 860², 870
fragilis 6. 860
Genei 6. 860
geographica 6. 860
laevis 6. 648³, 860, 870
modesta 6. 860
modiolaris 6. 648
nana 6. 860
oblita 6. 495, 860; 7. 743
ovalis 6. 648
peregrina 0. 723; 6. 860
perovalis 4. 506; 6. 860
recondita 7. 743; 6. 860
Ricordea 6. 860
Robinaldina 6. 860

Pullastra speciosa 6. 648
striatella 2. 43; 6. 860
texturata 6. 860
tricuspis 6. 860
vetula 2. 43; 6. 860
virginea 4. 506; 6. 860
spp.
Pulmonata, tertiäre, von England 4. 864
Pulvinites
argenteus 9. 498
Pungamia
protogaea 7. 778
Punicites
Hesperidum 6. 505
Pupa
Anglica 0. 869
dolium 3. 534; 9. 475
helicoides 7. 494; 8. 494
linearis 5. 508
marginata 0. 869; 9. 199
muscorum 7. 155
oryza 4. 864
perdentata 4. 864
quadridentata 4. 249
5. 768
umbilicata 0. 869
spp. 3. 512; 9. 114
Pupilla spp. 9. 114
Purbeck
-Schichten 1. 354!
4. 620; 5. 237 p, 746p, 870p; 6. 110p; 8. 113 p, 847
-strata 8. 488
Purpura
bicincta 7. 866
folosa 3. 236
glabra 7. 866
Lapierrea 7. 865
lapillus 3. 763
minax 7. 866
Moreausia 7. 865
tetragona 3. 763
spp. 2. 978; 4. 626; 6. 479
Purpurina
gen. 3. 236*; 7. 865, 866!
actaeoniformis 7. 866
Battus 7. 865
Belia 7. 865
Bellona 6. 852; 7. 865
bellula 8. 380
Bianor 7. 865
bicincta 7. 866
buccinoides 7. 866
Purpurina
costellata 7. 866
Davousti 7. 865
Dumonti 8. 380
granulosa 7. 866
Lapierrea 7. 865
Moreausia 7. 865
ornata 7. 865
Patroclus 7. 865
Philiasus 7. 865
plicata 7. 866
striata 7. 866
subangulata 6. 852
Thorenti 3. 236; 7. 866
Purpuroidea
gen. 0. 869!; 3. 236!; 7. 865
glabra 0. 869; 3. 234; 7. 866
Moreausia 3. 234; 7. 866
nodulata 0. 869; 3. 234
Reussi 6. 384
rugosa 0. 869
Pustulipora
interporosa 7. 374
ramosa 7. 232
spp. 2. 125
Putizze 7. 606
Putoriodus
gen. 5. 230
antiquus 5. 624
Erminea 1. 679
Putorius
fossilis 5. 371
gale 5. 371
incertus 5. 229
macrosoma 5. 371
microgale 5. 371
Sansaniensis 5. 229
vulgaris 6. 624
Pychnophyllum sp. 7. 766
Pychopteris
macrodiscus 1. 476
Pycnacanthus sp. 3. 125
Pycnodontae
(fam.) 5. 482!, 614; 9. 382*, 766
Pycnodus
gen. 3. 117*; 5. 487!
Achillis 1. 183; 5. 486
angustatus 5. 486
Bernardi 4. 382
complanatus 4. 375; 8. 382; 9. 124
Couloni 8. 382; 9. 124
cretaceus 7. 625; 9. 361
cylindricus 8. 382*
Pycnodus
cylindricus 9. 124
Dutemplei 8. 869
Egertoni 4. 382
faba 8. 298
formosus 5. 486
gibbus 5. 487
gigas 2. 167, 170, 171
grandis 1. 183; 5. 486
Hugii 5. 486
Itieri 4. 382; 5. 486
Mantelli 5. 486
Münsteri 4. 375; 8. 382* 9. 124
Muralti 1. 378; 5. 486
obliquus 8. 382; 9. 124
orbicularis 5. 487
ovatus 8. 869
parallelus 9. 361
platessa 5. 388, 487
rhombus 1. 183; 5. 234, 486
rhomboides 5. 486
robustus 9. 378
rugulosus 5. 485; 6. 610
Sauvanausi 4. 382; 5. 486
splendens 6. 745
Toliapicus 4. 196; 5. 487
triasicus 3. 17; 6. 745
umbonatus 5. 486
Wagneri 4. 382
Pycnosterinx
dorsalis 3. 108, 632
discoides 3. 108
Heckeli 3. 108
Russeggeri 3. 632
Pygaeus gigas 5. 380
Pygaster
agariciformis 8. 357
caudatus 8. 357
conoideus 8. 357
costellatus 7. 852, 859
orbicularis 7. 852, 859
patelliformis 2. 229
semisulcatus 8. 357
umbrella 7. 852; 8. 486
Pygaulus spp. 9. 123
Pygocephalus
gen. 8. 115!
Cooperi 8. 115
Pygopterus
gen. 3. 117*
angustatus 7. 626
armatus 8. 239
incurvus 7. 626

Pygopterus
lancifer 7. 626
latus 4. 751
lucius 0. 380; 8. 239
mandibularis 4. 751; 6. 123
sculptus 4. 751
scutellatus 7. 626
spp. 0. 246!
Pygorhynchus
Cuvieri 2. 152, 168, 170; 3, 86; 4. 120, 121
Delbosi 7 859
Desori 7. 859
Grignonensis 4. 120
heptagonus 7. 859
latus 7. 859
scutella 3. 606; 7. 859
Sopitianus 7. 859
subcylindricus 3. 86
subrotundus 7. 859
Vassalli 6. 101
Wrighti 7. 859
Pygurus
Davoustanus 7. 852
depressus 7. 852
Hausmanni 6. 95
jurensis 4. 355
Montmollini 4. 646!
orbiculatus 7. 852
productus 4. 652
rostratus 4. 311, 646, 652; 5. 845; 8. 850
Royeranus 6. 95
Pyknit 8. 789
Pyralites
obscurus 6. 503
Pyrallolith 6. 352
Pyramia
gen. 1. 382, 383
Pyramidella
laeviuscula 3. 764
plicosa 4. 515
terebella 4. 515
spp. 6. 750
Pyramidellidae
(fam.) 6. 121
Pyrargillith 2. 522
Pyrargyrit 2. 532; 3. 466*, 595*
Pyrenäisches
Hebungs-System 7. 371
Pyrenomoeus
gen. 5. 253!
cuneatus 5. 248, 253
Pyrenomycetes
(fam.) 5. 637
Pyrgia 2. 121*
spp. 2. 990
Pyrgom 9. 204!
Pyrgoma
Anglicum 7. 117
Pyrgopolon
Mosae 3. 231
Pyriflustrella
gen. 4. 117!
Pyriflustrina
gen. 4. 117!
Pyrifusus gen. 9. 498!
subdensatus 9. 498
Pyrina
Atatica 7. 859
castanea 7. 748
depressa 7. 748
Freucheni 1. 101
pygaea 0. 230; 4. 648! ff.
Pyripora gen. 4. 117!
Pyrit 2. 520; 3. 475, 476; 6. 188*; 7. 838
-Bildung: junge 2. 619
Pyritonema
gen. 6. 124
fasciculus 6. 113; 7. 105
Pyrochlor 2. 209!, 862!
Pyroklasit 8. 314*
Pyrola
uniflora 3. 747
Pyrolusit 0. 191; 1. 388*; 2. 520; 3. 696; 5. 823
Pyromelan 8. 568!
Pyromelin 3. 836!
Pyromerid 2. 881*
Pyromorphit 0. 270; 1. 329, 390*; 2. 66*, 515 ff., 526; 3. 174, 475, 695, 700*; 6. 135*; 7. 171*; 9. 191!
Pyrop 1. 405*; 2. 516, 523; 3. 476; 8. 395
Pyrophyllit 2. 703!, 848; 5. 315; 9. 302*
Pyropissit 0. 338
Pyrosiderit 3. 600; 4. 814
Pyrosklerit 2. 77!
Pyroxen 1. 575; 2. 615; 3. 467*; 9. 81!
-Gesteine 1. 837! ff.; 7. 737*, 742, 9. 660
Alter 2. 975
Pyrrhotin 3. 595*; 5. 350; 6. 189
Pyrula
acclinis 7. 509
Bairdi 8. 494
cingulata 7. 420
clava 9. 839
condita 6. 93, 739
Greenwoodi 1. 716
nexilis 0. 861; 1. 716, 764; 7. 229
penita 6. 753
reticulata 3. 763; 4. 515; 5. 603; 7. 420, 509, 783
Richardsoni 6. 480
rusticula 7. 692; 9. 839
singularis 7. 53
trochiformis 6. 480
spp. 3. 753; 6. 477, 479, 750
vidr. Pirula
Pyrulina
gen. 5. 753
gutta 7. 498
s. Pirulina 2. 511*
Pyrus
Euphemes 9. 376
minor 3. 506; 6. 505; 9. 375
ovatifolia 9. 123
Saturni 6. 505
Theobroma 6. 505; 9. 376
troglodytarum 1. 634; 3. 506; 4. 627; 9. 376
Pythonissa
affinis 5. 122, 123
ambigua 5. 122
bipunctata 5. 122
discophora 5. 122
glabra 5 122
sericata 5. 122, 123
villosa 5. 122
Pyxidicula
actinocyclus 6. 103
apiculata 6. 103
appendiculata 6. 103
crispa 2. 349
Pyxidocrinus
gen. 7. 860, 861!
Baylei 7. 860
moniliformis 7. 860
Prumiensis 7. 860

Q.

Quader 0. 133
-Florula von Blankenburg 6. 640
-Formation 0. 306
-Gebirge 0. 395; 1.62; 2. 895p; 3. 31; 4. 201
von Aachen 0. 290
von Regensburg 0. 727
Gliederung 2 459
-Kohle 0. 134
-Mergel 0. 134 ff.; 9. 743
-Sandstein 3. 495; 7. 622p.; 9. 743
Gliederung 2. 451
Gebirge in Deutschland 0. 134!; 0. 190!
Quadricellaria gen. 4. 114!
Quartär
-Bildungen 5. 223; 6. 451; 7. 844; 9. 852
-Formation 5. 719; 9. 99*, 315
-Gebirge 7. 606
des Rheinbeckens 1. 728
Quarz 0. 430, 451, 467; 1. 9*, 73*, 155*, 170, 330, 393*, 394*, 395*, 399*, 401*, 404*, 405*, 429, 433, 596, 820*; 2. 519 ff., 875, 879; 3. 262, 389ff., 461, 470, 475, 695, 843, 844; 4 349*, 404, 445, 818; 5. 197, 201, 411 ff., 822, 6. 39, 146!, 190, 555, 556; 7. 72*, 720, 832, 838; 8. 72*, 310; 9. 300*, 446*, 686, 799
künstlich 5. 215
auf nassem Wege 2. 866
pseudomorph nach Zinkspath und Kieselzinkerz 0. 704
Quarz
-Bildung auf nassem Wege 2. 294; 8. 610
-Bildungsart 4 213, 219,
-Fels 6. 204
-führende Porphyre (s. Quarz-Porphyre) 0. 186!; 1. 31; 2. 83!, 199, 366; 9. 89, 478
blaue 2. 366
rothe 2. 366
um Lyon 0. 75*
-führender Trachyt 6.350!
-Gänge 3. 463, 572, 8. 610
Gold führend 2. 497
-Geschiebe mit Eindrücken im Vogesen-Sandstein 6. 63
-Gestein (Süsswasser-) 0. 788
poröses 5. 733; 8. 834
-Krystalle mit Einschlüssen 4.189
in Wacke 0. 67*
-Massen feuer-flüssigen Ursprungs 2. 966
-Porphyr 2. 83!, 356, 366; 5.199!; 7.608; 9. 89, 312
-Sand, organischer 9.464
-Überzüge auf Zinkspath 0. 704
-und Glimmer-Trachyt 7. 354!, 357*
-Vierlinge 4. 306
Quarzit 1. 36; 2. 238; 3. 363; 5. 364
-Krystall 3. 174*
-Schiefer 3. 363
Quecksilber 3.725; 5.823; 6. 48; 8. 314, 328
-reiches Fahlerz 7.67!
-Bergwerk zu Almaden 0. 497
-Erze 7. 461, 465!, 471!
-Formation von Almaden 6. 471
Quecksilber-Formation von Idria 6. 466
-haltiger Eisenkies 4. 823*
-Hornerz 0. 451
-Lagerstätten 1. 675; 7. 171
-Oxydul, antimonsaures 2. 468
-Vorkommen 4. 717; 7. 330
in der Lüneburger Haide 4. 323, 560!
Quellen 5. 208; 7. 589; 9. 200, 510, 621
deren Aufsuchung 2. 729
heisse 9. 829
warme 5. 195; 8. 734
Jod-haltige 1. 161
im Kreide-Gebirge 2. 626
von Schwefelsäure 9. 199
-Absätze 5. 33, 711; 9. 199
-Analysen 5. 711; 8. 311, 575, 696; 9. 821
-Bäder bei Wien 2. 729
-Bildung 2. 742; 6. 711
-Erzeugnisse vom Alexisbad 0.346!
von Island 0. 344
-Gebilde 5. 467
-Niederschläge 9. 510
-Temperatur 5. 80
vgl. Salz-Quellen 2. 494
Quenstedtia gen. 7. 744!
laevigata 7. 743; 8. 357
oblita 6. 852; 7. 743
Quercinium 0. 633
compactum 5. 577
Rossicum 7 363
Quercites Meyeranus 3. 226, 747
Quercus 0. 633
acrodon 4. 252
acuminata 3. 226

Quercus
agrioides 3. 747
agriaefolia 3. 747
amphiodon 4. 252
Apollinis 9. 502
argute-serrata 9. 502
aspera 3. 226, 503; 4. 632; 9. 502
attenuata 3. 216
Benzoin 9. 505, 754
Blumeana 3. 434
Buchi 2. 753; 3. 503; 9. 502
Capellinii 9. 873
castaneoides 3. 434
Charpentieri 9. 502, 871, 873
chlorophylla 3. 503: 9. 501
commutata 9. 502
coriacea 2. 894; 3. 226
crassinervis 3. 226; 9. 505[2]
cruciata 0. 503; 3. 503; 9. 502
cuneifolia 3. 226
cuspidata 1. 102; 9. 122
cuspiformis 3 503; 9. 502
Cyri 9. 374
Daphnes 3. 503; 9. 502
deformis 4. 378, 627
densiflora 9. 505
Desloesi 9. 502
deuterogona 6. 633
distans 3. 747
drymeia 3. 503; 4. 627; 6. 252; 8. 501, 587, 740; 9. 117, 374, 502, 873
elaena 2. 760; 5. 503; 9. 502
elongata 2. 894; 3. 226
emarginata 3. 226
Ettingshauseni 6. 505
Evansi 9. 505
fagifolia 3. 221; 9. 122
firma 9. 502
furcinervis 1. 102, 128; 9. 502
Gaudini 9. 505, 754, 873
Gigantum 4. 491
gigas 3. 226
glans-Saturni 1. 635; 3. 383
Gmelini 0. 503; 3. 503; 8. 501; 9. 117, 502
Goepperti 2. 753; 4. 378
grandidentata 1. 128; 2. 753; 4. 491
griphus 4. 252
Hagenbachi 3. 503; 9. 502
Haidingeri 2. 628; 3. 503; 9. 502, 873
Hamadryadum 3. 503; 9. 502
Heeri 3. 503; 9. 122, 501
heterodon 4. 252
ilicites 2. 753; 4. 491
ilicoides 3. 503; 9. 502
integrifolia 3. 226
Laharpei 9. 873
laurophylla 3. 434
lignitum 1. 128; 2. 751. 753, 760; 6. 252; 9. 501, 503
var. integrifolia 2. 761
limnophila 1. 635; 3. 383
lonchitis 2. 753; 3. 226, 328; 5. 241; 8. 587; 9. 374, 502
Lucumonum 9. 873
Mammuthi 9. 348
Mandraliscae 9. 117
Mediterranea 4. 491, 627; 9. 502, 873
Meneghinii 8. 501, 502
Meriani 9. 502
Meyerana 3. 226, 747
microphylla 3 286
modesta 9. 502
multinervis 9. 505, 754
Müreti 9. 502
myrtifolia 9. 506
myrtilloides 3. 503; 4. 627; 8. 587; 9. 123, 502, 873
neriifolia 0. 503; 2. 760; 3. 503; 8. 500; 9. 501, 505
Nimrodis 2. 750; 8. 740; 9. 374, 502
Oreadum 2. 753; 9. 502
ovalis 3. 226; 9. 501
ovata 3. 226
Papiensis 4. 627
Parlatorei 8. 501; 9. 117
parvifolia 3. 384
platanoides 3. 226; 9. 502, 505
platinervis 9. 505
platyphylla 3. 226
producta 3. 226
pseudo-castanea 2. 894
pseudo-prinos 3. 226
pseudo-alnus 3. 384; 4. 491
Reussana 9. 122
roburoides 9. 873
Rottensis 6. 505
rotundata 3. 226; 9. 502
Saffordi 9. 505
sclerophyllina 9. 502
Scillana 9. 873
scutellata 6. 505
Senogalliensis 4. 627
semielliptica 3. 226; 9. 502
serra 3. 503; 4. 252, 627; 9. 502[2]
serraefolia 9. 117
serrata 3. 747
serrifolia 8. 501
Seyfriedi 2. 761; 3. 503; 9. 502
Simonyi 3. 120
subacutifolia 3. 747
succinea 3. 226, 747
subrepanda 3. 747
subrobur 3. 226; 9. 502
subtriloba 3. 226
subundulata 3. 226
tenerrima 2. 753; 6. 505
tenuinervis 6. 505
tephrodes 3. 503; 4. 252; 9. 502
Titanum 4. 252
toxotes 4. 252
triangularis 3. 226
ulmifolia 7. 614
undulata 2. 753; 8. 500; 9. 505
Ungeri 2. 753: 3. 503, 6. 505; 9. 502
urophylla 3. 226; 4. 627; 6. 252; 9. 374
venosa 3. 226
Valdensis 9. 502

Quercus
Wesseli 6. 505
Zelkovaefolia 4. 627; 9. 502
Zoroastri 4. 252
Quinqueloculina
gen. 5. 755
Aknerana 3. 673!; 7. 498
angusta 7. 498
Brauni 3. 674!
cognata 6. 757
cribrosa 7. 273!
Quinqueloculina
Ermani 6. 757
Gosa[va]e 4. 867
Haidingeri 7. 272!, 309
Hauerana 3. 674!
impressa 2. 254; 5. 435; 6. 757
incerta 7. 502
Klipsteini 3. 674!
Mayerana 3. 673!
oblonga 7. 498
ovalis 6. 757
ovata 7. 498
Quinqueloculina
Philippii 7. 498
praelonga 7. 272!
punctata 3. 675!
Sandbergeri 3. 674!
saxorum 4 737; 7. 272!, 309, 750
secans 7. 498
speciosa 7. 498
tenuis 1. 378; 2. 254; 6. 757
triangularis 3. 673!
spp. 4. 738

R.

Radiolites
gen. 3. 240!; 5. 377*, 378*
acuticostatus 3. 718; 6. 753
Aimesi 6. 481
angeoides 4. 869
angulosus 6. 753; 9. 466, 857
Austinensis 5. 379
calceoloides 3. 382
cornu-pastoris 3. 240; 6. 753!
crateriformis 3. 382; 6. 753
cylindricus 2. 133
dilatatus 4. 541
hexagonus 6. 59
Hoeninghausi 5. 377*!
Jouanneti 6. 384, 753; 9. 177
lamellosus 6. 481
Lapeyrousei 9. 177
maeandrinoides 4. 541
mammillaris 3. 718; 4. 869
Mantelli 5. 379
Mortoni 5. 379
Mutinianus 4. 541
Neocomiensis 3. 166, 329
Ormondi 6. 481
Pailletteanus 4. 541
radiosus 7. 204
Rouyanus 9. 177
rugosus 3. 165
sinuatus 4. 541
socialis 9. 466, 857
Trigeri 8. 744
turbinatus 6. 59
Radiolites
undulatus 6. 481
spp. 6. 206; 7. 756
Radiolitidae
(fam.) 3. 240!
Radiopora gen. 5. 653
Radula
dilatata 3. 745
Rag 1. 485
Rag-stone 0. 870; 2. 226; 8. 355
Raibler
-Schichten 6. 738; 8 345, 504; 9. 860
Raja aculeata 7. 53
platyptera 6. 487
Ralligen-Schichten 8. 586
Ramalina
calycaris 3. 745
Ramalinites 0. 626
Rana
Aquensis 5. 233; 8. 203
Danubiana 8. 203!
diluviana 2. 57
fossilis 5. 374
gigantea 5. 233
Jaegeri 1. 78!
laevis 5. 233
Luschitzana 2. 832; 3. 164
Meriani 3. 163!; 9. 724
pygmaea 5. 233
rugosa 5. 233
Salzhausensis 2. 467
Sansaniensis 5. 233
Troscheli 2. 466; 3. 163
Rapella
Maclurei 6. 753
Rapella
marginata 0. 223
Poppelacki 3. 507
pygmaea 7. 509
spp. 3. 507; 6. 479
Raniceps
gen. 9. 126!
Lyelli 9. 126!
Ranina
Aldrovandi 2. 166, 170, 302; 4. 572; 7. 154; 9. 844
Fabri 4. 538
palmea 2. 1000
Ranocchiaia
(Gestein) 7. 601
Ranunculus
spp. 6. 333
Rapa gen. 9. 498
supraplicata 9. 498
Rapakivi 2. 972; 9. 310
Raphidia
erigena 6. 622
Raphidium
Brephos 5. 747
Raphiophorus 6. 224
Raphiosaurus
subulidens 2. 381
spp. 3. 109
Raphitoma Juliana 4. 760
textilis 4. 760
Raphoneis
Oregonica 0. 96
Rapilli 7. 26
Raricostaten-Lager 9. 21
Raricostatus-Bett 6. 454!
Rasenerz 2. 589
Rastrites
gen. 1. 124!; 2. 245 f., 374; 4. 127; 8. 765*

Rastrites
Barrandei 6. 67
fugax 1. 125
gemmatus 1. 125; 4. 127
Linnaei 1. 125; 4. 127
peregrinus 1. 125; 3. 636; 4. 127; 9. 875
triangulatus 3. 241, 636; 9. 875
Rat d'eau fossile 6. 489
Rauchwacke 4. 743; 7. 617
Raumeria 0. 630
Rauschgelb 0. 699!
schlackiges 0. 349!
Rautenschupper (Fische) 9. 763
Rautenspath 3. 535
Reading
series of strata 7. 503 p.
Realgar 0. 694!; 1. 596; 2. 515; 5. 824; 7. 549
Receptaculites
Neptuni 1. 225; 3. 816, 817
orbis 5. 852
spp. 9. 342. 635
Receptakuliten-Schiefer 1. 225; 3 818
Reckur affinis 6. 367
Red-ash-coal 9. 380
Red Crag 1. 477; 4. 505p., 507; 6. 491 p.; 9. 747²
-Sandstone 5. 875
Redonia gen. 3. 103! 5. 99
Bohemica 7. 639
Deshayesana 3. 102; 5. 98; 6. 500
Duvalana 3. 102; 5. 98 6. 500
Reduvius sp. 5. 747
Regent (Diamant) 3. 697
Regentropfen:
fossile 2. 110; 7. 239, 404!; 9. 105, 869
-Eindrücke 5. 863, 864
-Löcher 0. 251; 9. 106
Regionen:
der Meeres-Tiefe 2. 996; 3. 755
Regur (Gestein) 5. 855
Reibung
der Gesteine 8. 82
Reibungsflächen:
im Gestein 2. 450
Reichsanstalt,
geologische 0. 194
Reiflander Gneiss 4. 41
Reihen-Vulkane 4. 95!
Reihenfolge successiver Mineralbildungen 3. 388!ff; 6. 718
Reliefs (künstliche)
von Gebirgsgegenden 4. 227; 8. 843
Remopleurides 6. 224
gen. 0. 777; 785; 1. 509; 3. 486; 6. 224; 9. 358
Colbi 4. 502; 9. 358
dorsospinifer 4. 502; 9. 338
laterospinifer 4. 502; 9. 358
longicostatus 4. 502
nanus 9. 358!
obtusus 4. 502
platyceps 4. 502
radians 4. 502
spp. 2. 242
Remopleurididae (fam.) 9. 358!
Renilla 2. 123
Requienia 3. 240
Lonsdalei 3. 617; 5. 377
Repertoire des Trilobites 4. 45
Repräsentirende Arten 0. 755
Reptaria
gen. 1. 810!
Orthoceratum 1. 813!
stolonifera 1. 814!
sp. 2. 939
Reptelectrina gen. 4. 114!
Reptescharella
gen. 4. 116!
Reptescharellina
gen. 4. 116!
spp. 3. 678
Reptescharipora
gen. 4. 117!
Reptil von Liestal 7. 152
Reptilien 6. 758!; 7. 105, 850; 9. 354
Britische 2. 379!, 380!
Frankreichs 5. 742!
der Steinkohlen-Formation 4. 422; 7. 340
-Fährten 3. 753
Reptilien-Fährten
in Buntsandstein 2. 895
in Potsdam-Sandstone 2. 981
Reptocelleporaria 4. 115
Reptoflustra gen. 4. 113!
Reptoflustrella
gen. 4. 117!
Reptoflustrina gen. 4. 117!
Reptolunulites gen. 4. 115!
Reptomulticava
corallina 5. 653
gradata 5. 653
Reptomultisparsa
diluviana 5. 634
microstoma 5. 634
Reptomulticrescis
subincrustans 5. 653
Reptonodicava
globosa 5 653
Reptonodicrescis
marginata 5. 653
Reptoporellina
gen. 4. 116
Reptoporina
gen. 4. 116!
Reptotubigera gen. 5. 634
Retelea transversa 5. 634
Retepora gen. 4. 115!
Bischofi 8. 754
Brauni 8. 754
elegans 4. 116
Ehrenbergi 4. 489
flustracea 4. 744
flustriformis 6. 626
Goldfussi 2. 109
Hisingeri 2. 128; 6. 114
Lonsdalei 4. 744
truncata 2. 126
virgulacea 1. 489; 4. 744
spp. 5. 248
Reteporina gen. 6. 114
Reticulipora
dianthus 5. 634
Reticulites porosus 2. 109
Retinasphalt 2. 985
Retinit 3. 176; 7. 354!, 357*, 360!, 361! 737*; 8. 77, 609; 9. 85
Retinodendron
pityoides 2. 894
Retinoxylon 0. 632
Retiolites
gen. 1. 124!; 2. 246!, 374!, 402; 4. 126; 8. 765*

Retiolites
Geinitzanus 2. 246*, 406!; 9. 603
grandis 2. 246, 407!
rete 4. 126
Rettenstein-Kalk 0. 521, 557
Retzia Adrieni 4. 504
ferita 4. 504; 6. 373
lepida 6. 373, 381
novemplicata 6. 373
ovalis 6. 373
radialis 7. 620
trigonella 6. 730; 9. 359
Verneuilana 7. 863
Reussia
gen. 5. 859!
Buchi 5. 860
granosa 5. 859
granulosa 5. 860
Revinien
(terrain) 1. 105; 7. 219
Rezbanyit 9. 734!
Rhabdacanthus
gen. 8. 113
truncatus 8. 113
Rhabdinopora gen. 7. 633
Rhabdocarpus
gen. 0. 630; 8. 627!
amygdalaeformis 5. 631; 8. 626
Beinertanus 5. 243, 631; 8. 626
Bockschanus 8. 626
clavatus 5. 631; 8. 626
conchaeformis 5. 243
lineatus 5. 631; 8. 626
Naumanni 5. 243; 8. 626
navicularis 8. 627
orientalis 8. 626
ovalis 8. 627
truncatus 8. 626
tunicatus 8. 626
spp. 4. 34; 9, 379, 381
Rhabdocidaris
gen. 7. 122; 9. 255
copeoides 7. 851
maxima 7. 768
Moraldina 7. 768, 859
nobilis 7. 859
Orbignyana 8. 488
Tournali 7. 859
Wrighti 8. 357
Rhabdogale antiqua 5. 371
Rhabdoidea
(fam.) 5. 754! ff
Rhabdolepis
gen. 8. 612!
spp. 8. 614!
Rhabdolithis intexta 6. 105
Rhabdonema
arcuatum 0. 473
Rhabdophyllia 2. 117*
Salsensis 5. 592
tenuicosta 4. 868
sp. 2. 758
Rhabdopora
gen. 2. 121*
spp. 2. 990
Rhabdotus 0. 631
verrucosus 2. 993; 5. 631; 6. 99
Rhacheosaurus
gen. 5. 425
gracilis 5. 107; 6. 759
sp. 8. 202
Rhachiopterideae
(fam.) 5. 240; 6. 98, 628!
Rhacoglossum
dentatum 0. 117
heterophyllum 0. 117
Rhagatherium
gen 4. 640!
Waldense 4. 640; 5. 615
Rhamnus 0. 636
acuminatifolia 2 755; 3. 506; 9. 873
aizoides 4. 491
aizoon 2. 755
alphitonioides 9. 375
Augustini 2. 628
brevifolia 0. 506; 3. 506
colubrinoides 4. 380
conchaeformis 2. 891
Decheni 2. 755; 3. 384, 506; 9. 117, 122
deleta 3. 506
dilatata 3. 435
ducalis 9. 117, 871, 873
Eridani 9. 374
juglandiformis 9. 375
lalifolia 6. 244
Oeningensis 0. 506; 3. 506
parvifolia 6. 505
pomaderroides 4. 380
Rösleri 3. 510
Rossmaessleri 3. 506 9. 754
subsinuata 2. 894; 3. 228
terminalis 9. 503
Rhamphorhynchus
gen. 5. 620!; 9. 112
Banthensis 9. 113, 638
Bucklandi 9. 494
crassipes 7. 537
crassirostris 9. 113
curtimanus 9. 111!, 113
Gemmingi 5. 328, 809, 8. 62; 9. 111, 113, 355, 638
hirundinaceus 8. 62, 369*; 9. 113
longicaudus 4. 55*; 9. 113, 355
longimanus 9. 111!, 113
macronyx 4. 55*; 7. 536; 9. 113, 355
Münsteri 9. 111, 113
Suevicus 5. 614!, 809
Vampirus 9. 335
spp. 2. 1005
Rhaphiophoridae
(fam.) 4. 493
Rhaphiophorus
(spp.) 4. 493
Rhaphoneis sp. 6. 103
Rhätizit 0. 552
Rhein-Schlamm 2 385!
Rheinisches
Grauwacken-Gebirge 0. 275
Hebungs-System 1. 94, 104; 3. 206!
Schichten-System 3. 267 g., 370; 5. 320p.; 6. 367!gp.
Rhinechis sp. 5. 233
Rhinobatus spp. 9. 764
Rhinoceroides
Alleghaniensis 5. 113
Rhinoceros
gen. 4. 243; 5. 118!; 7. 867, 869
Africanus 5. 225
Americanus 5. 115; 7. 247; 8. 376
antiquitatis 5. 225
Aymardi 5. 373
de l'Auvergne 4. 244
bicornis 0. 880
brachypus 2. 999; 4. 245!, 756!, 758!; 5. 225
Brivatensis 2. 999; 5. 225
Cimogorrensis 2. 999; 4. 732; 5. 225

Rhinoceros crassus 9.251!
Croizeti 5. 372
elatus 2. 999; 4. 609; 5. 225, 372; 9. 166
eurydactylus 6. 601
Gannatensis 4 246
Goldfussi 1. 502; 9. 427
hemitoechus 9.870, 871
incisivus 1. 75, 76, 678; 2. 360; 3.251, 439; 4. 244 ff., 756!, 758!; 5. 225, 372; 6. 331, 420, 604; 7. 248, 491, 845; 9. 166
Kirchbergensis 2. 999
Laurillardi 5. 225
Lemanensis 5. 372
leptorhinus 1. 505; 2. 999; 4. 246, 757!, 495, 609; 5. 225, 372; 8. 379; 9. 116, 118, 348, 349, 870, 861
Lunelensis 2. 998; 4. 248!, 757; 5. 225
megarhinus 1. 492; 2. 998, 999; 4. 246, 495, 757!; 5. 225, 372
Merki 1. 730; 2. 999; 4. 248; 9. 166
mesotropus 4. 832
minutus 1. 502, 503, 504; 2. 999; 3. 378; 4. 245!, 756!, 758!; 5. 225; 9. 220
Monspessulanus 2. 999; 4. 247!, 757; 5. 225
de Montpellier 2. 999
Nebrascensis 5. 115, 118!; 7. 247; 8. 376
occidentalis 5. 115, 118!; 8. 376
pachygnathus 5. 375; 7. 235, 370, 759
Pallasi 5. 225
paradoxus 5. 372
pleuroceros 4. 244!, 756!
protichorhinus 4. 247!, 757
Radanensis 4. 756!
Sansanensis 2. 999; 4. 244!, 756!, 758!; 5. 225; 7. 759
Schleiermacheri 1. 502, 503;
Rhinoceros
Schleiermacheri 4. 244, 756, 758, 638; 5. 372, 375; 6. 491; 7. 235, 315, 370, 759; 9. 166
Simorrensis 4. 245!; 5. 225
Steinheimensis 1. 503, 504; 4. 758!
tapirinus 2. 999; 5. 372
tetradactylus 2. 999; 3. 106; 4. 244!; 5. 225; 9. 166
tichorhinus 0. 88, 880; 1. 78, 505, 728, 730, 760; 2. 767, 999; 3. 378, 534, 686; 4. 247!, 473, 609, 637, 757; 5. 225, 373, 375, 624; 6. 111, 574; 7. 155, 222; 8. 379; 9. 100, 116, 202, 204, 348, 349, 870, 871
spp. 8. 510
Rhinopora gen. 1. 765!
tubulosa 1. 765
verrucosa 1. 765
spp. 5. 248
Rhinosaurus 0. 754!
Rhipidogyra 2. 116*
Lucasana 6. 740
Occitanica 4. 867
undulata 4. 867
Rhipidolith 0. 692!; 7. 171!
Rhipidophora
Oedipus 0. 473
Rhizangia
gen. 0. 767; 2. 118*
Brauni 0. 767
brevissima 0. 767; 5. 475
Martini 0. 767
Michelini 4. 868
Sedgwicki 4. 868
Rhizocorallium
Jenense 3. 27
spp. 3. 614
-Dolomit 3. 27
Rhizodus gen. 9. 491
gracilis 6. 124
Hibberti 6. 124
Rhyzogena
(Vegetabilia) 2. 504!
Rhizolithes 0. 638
Rhizonium 0. 631
orchideiforme 2. 993
Rhizophila
thinophila 4. 380
Rhizophora
thinophila 4. 380; 9. 375
Rhizopoda
(class.) 5. 751!
cfr. Foraminifera
Rhizosolenia
Americana 6. 103
calyptra 6. 103
Rhizotrochus 2. 116*
Rhizoxenia 2. 123
Rhodanien 5. 473, 474
Rhodaraea 2. 120*
Raulini 3. 876
Rhodea 0. 627
dichotoma 5. 629
fasciaeformis 6. 99
Gutbierana 5. 629
elatior 5. 622
Rhodeus
exoptatus 4. 623
latior 5. 622
Rhodium 5. 69, 837
Rhodochrom 0. 313, 682; 2. 850!; 3. 62; 5. 198!
Rhodochrosit 5. 431
Rhodocrinus bursa 9. 635*
crenatus 3. 238
gonatodes 6. 233, 374
stellaris 6. 602
tesseracontadactylus 8. 268
uniarticulatus 6. 602
verus 5. 212
spp. 9. 343
Rhododendron 0. 634
retusum 3. 227
rugosum 3. 227
Saturni 3. 510
Uraniae 9. 376
Rhodomelites 0. 626
Rhodonit 0. 447!; 3. 176!; 8. 684, 701!
Rhodope gen. 6. 224
spp. 4. 493
Rhodophyllit 5. 198!
Rhoidium 0. 636
Ungeri 7. 363
Rhomben
-Porphyr 4. 300!, 302
Rhomboeder 6. 151, 153, 155

Rhombus
Kirchberganus 1. 80*
minimus 5. 380
Rhopalocoma
gen. 8. 127!
pyrotechnica 8. 127
Rhopalodon 7. 539
Murchisoni 0. 874; 4. 497
Wangenheimi 0. 874; 4. 497
Rhotomagensis -Schichten 7. 786
Rhus 0. 636
ailanthifolius 2. 755
cassiaeformis 4. 380
degener 4. 380
fraxinoides 4. 380
Herthae 1. 128
hydrophilus 9. 375
juglandogene 4. 380
Lesquereuxanus 9. 873
malpighiaefolius 5. 755
Meriani 3. 506
Neeggerathi 2. 755; 4. 252
obliquus 2. 762; 3. 506
Oeningensis 3. 506
orbicularis 3. 506
paulliniaefolius 4. 491
priscus 4.380, 491; 9.375
pteleaefolius 2. 755; 6. 505; 9. 122
punctatus 0. 506; 2. 761; 9. 502
Pyrrhae 0.506; 2.755; 3. 506; 6. 505
Scheuchzeri 2. 762; 3. 506
Stygius 3. 506; 4. 380
Ziegleri 6. 244
Rhyacophila
occulta 6. 622
Rhyakolith 4. 598!
vdr. Ryakolith
Rhynchaenus
Solieri 1. 759
Rhynchocodes
gen. 1. 184!
Scacchii 1. 183
Rhyncholithus
hirundo 0. 99; 3. 13, 19; 6. 746
pusillus 3. 609
Rhyncholophus
bifrons 5. 124
foveolatus 5. 124
Rhyncholophus
illustris 5. 124
incertus 5. 124
longipes 5. 124
procerus 5. 124
rostratus 5. 124
Rhynchomya
gen. 6. 246
Rhynchonella
gen. 3. 256!; 4. 64*
acuminata 4. 504; 5. 873, 874; 6. 374
acuta 4. 852
acuticosta 6. 852
alata 8. 874
Amalthei 6. 456
amphitoma 6 487
anceps 4. 852
angulata 6. 852; 8. 357
antidichotoma 7. 659, 676
Austriaca 4. 764; 9. 629
Badenensis 8. 482; 9. 135
bellula 8. 753
bidentata 6.812; 8.269
Bischofi 8. 753
Boonensis 6. 736
borealis 9. 67
Buchi 4. 852
compressa 4. 869; 7. 483; 9. 228
concinna 7. 132, 133; 8. 357
Cooperensis 6. 736
cornigera 4. 87, 88, 764; 9. 620
costellata 8. 643
cuboides 5. 874
cuneata 8. 753; 9. 67, 222
Cuvieri 7. 483
cynocephala 6. 852; 8. 357
Danica 1. 101
Davidsoni 4. 852
decorata 8. 357
decurtata 9. 359
deformis 4. 869
depressa 7. 483
difformis 0. 379!
dilatata 5. 502
Edwardsi 4. 852
Fischeri 0. 254!
fissicostata 4. 87, 764; 7. 617; 9. 629
Rhynchonella
furcillata 8. 357
Geinitzana 7. 375!, 381, 382
Gibbsana 7. 483
glans-fagi 9. 758
Grasana 7. 483
Grosvenori 7. 863
Hanburyi 5. 384
inaurita 6. 374
inconstaus 4. 355; 7. 133; 8. 488
incurva 1. 101
Kurri 8. 484
lacunosa 8. 486
laevis 5. 502
Langleti 4. 852
lata 3. 617
latissima 7. 785², 786, 483
limbata 7. 483
lineolata 7. 483
longicollis 5 502
Loxiae 0. 254, 255
loxia 4. 60, 504
macra 7. 863
Mansoni 4. 86
Mantellana 7. 483, 785², 786², 787; 9. 228
Martini 7.483, 786³, 787
Mentzeli 6. 730
Missouriensis 6. 736
Morieri 8. 482
mutata 7. 863
nigricans 3. 256
Niobe 4. 852
nucella 8. 594
nucula 8. 715
nympha 8. 753
obliqua 8. 753
obsoleta 4. 852; 8. 482
obtusifrons 4. 764
octoplicata 4. 504; 7. 483, 787
oolithica 8. 357
Oppeli 8. 484
Orbignyana 8. 484
Osagensis 8. 766
oxynoti 6. 454
Pallas 4. 852
papyracea 6. 374
parallelepipeda 6. 374
parvirostris 7. 483
paucicosta 0. 380!; 7. 785
pectiniformis 8. 874

Rhynchonella
pedata 4. 764; 7. 618; 9. 629
phaseolina 5. 509
phoca 4. 85, 86; 9. 222
pila 6. 374, 381; 8. 753
pinguis 8. 582²
pisum 7. 786
pleurodon 5. 873, 874
plicatilis 7. 471, 483, 787²
psittacea 3. 256; 4. 504, 507
pugnus 5. 873, 874; 6. 374
quadriplicata 6. 58
quinqueplicata 6. 456
retrocita 5. 502
rhomboidea 5. 874
ricinula 7. 863
rimosa 6. 456; 8. 583²
scalpellum 6. 456
Selcana 8. 753
spathica 8. 484
spinosa 7. 133 ff.; 9. 134
spinulosa 8. 486
strigiceps 6. 374
Stuifensis 6. 852
subcuboides 8. 753
subcuneata 7. 863
subdentata 5. 873, 874
sublepida 4. 86
subpentagona 7. 130
subreniformis 6. 374
subrimosa 4. 764; 7. 617, 618; 9. 629
sulcata 7. 483
tenuistriata 6. 374
tetraedra 4. 852; 6. 456
Thalia 6. 456
Thurmanni 7. 135; 9. 135
triangularis 7. 483
triplicata 0. 254
triplicosa 8. 484
unciformis 7. 483
variabilis 4. 87, 852; 6. 496
varians 3. 347; 7. 132 ff.; 8. 583; 9. 135
ventilabrum 5. 874
Wilsoni 6. 81; 8. 594², 753
Woodwardi 7. 483
Wortheni 7. 863
Rhynchonella
Yennamensis 5. 384
spp. 4. 250; 9. 123
Rhynchonellidae (fam.) 3. 256!; 4. 60!, 504; 6. 117
Rhynchoplecta
punctata 4. 738!
Rhynchora
Koninckı 5. 239
plicata 5. 239
Rhynchosaurii (fam.) 5. 745
Rhynchosaurus gen. 5. 758
spp. 3. 754
-Fährten 1 512
Rhynchospira gen. 5. 755
Rhynchota (class.) 3. 862!, 874!; 6. 765
Rhynchoteuthis
antiquatus 8. 873
Astieranus 1. 738
fragilis 9. 124
minimus 9. 494
Monasteriensis 9. 494
Quenstedti 9. 124
Sabaudianus 9. 124
Rhysmotes 2. 122*
Rhysophycus vdr. Rysoph.
Rhytidolepis (plant. gen.)
dubia 5. 631
fibrosa 5. 631
undulata 5. 631
Rhytidolepis (pisc. gen.) vdr. Rytidolepis
Rhytidophloyos 0. 629
tenue 6. 98
Rhytidosporum
gen. 6. 235!
ovulum 6. 235!
Rhytina 7. 869
Rhytisma
populi 5. 637; 9. 123
Ribeiria gen. 5. 99!
pholadiformis 5. 98; 6. 500
vdr. Ribeiroa
Ribeiroa
pholadiformis 7. 639
cfr. Ribeiria
Richtung
der Hebungs-Systeme 4. 385 ff.
Ridements 1. 100
Riesen-Knochen 3. 751
-Töpfe 0. 646; 4. 145!
-Vogel 2. 995
Riff (Korallen) 2. 88; 4. 460
-Bildungen 4. 199!, 223!, 226!; 8. 107
-Gestein
des Zechsteins 3. 778!, 783
Riffstein
-Bildung 4. 226; 7. 179
Rimella
curvilyrata 9. 498
laqueata 9. 234
Rimula
Bloti 2. 228; 3. 235
clathrata 1. 487; 3. 235
minutissima 2. 228
quadrata 2. 228
tricarinata 2. 228; 3. 235; 8. 356
Rimularia
viridis 1. 229
Rimulina gen. 5. 755
Rimulus gen. 3. 237*
Rinden-Bildung
der Erde 5. 291!ff., 641, 769 ff.
Ring-Riffe 4. 224
Ringelerz 4. 842
Ringelwürmer 3. 380
Ringicula
Archiacana 0. 728
buccinea 3. 74, 763; 4. 515
striata 3. 74
ventricosa 3. 763
Verneuili 5. 593
spp. 2. 630; 3. 627; 6. 479
Ripidolith 1. 595; 3. 62*; 5. 9!
s. Rhipidolith
Ripple-marks 0. 251
Rissoina
acuta 3. 234
cancellata 3. 234
duplicata 3. 234
laevis 3. 234
obliqua 3. 234
obliquata 2. 229
obtusa 2. 229
tricarinata 3. 234
Rissoa
acutata 7. 761; 9. 360
Adela 3. 74
Carolina 5. 475
confinis 3. 764
conica 9. 360
conulus 2. 352

Rissoa
costifera 9. 360
costulata 3. 764
crassistriata 3. 764
dubia 7. 760; 9. 360²
Dunkeri 9. 360
elegantula 8. 380
frumentum 7. 209
Gaillardoti 9. 360
Geinitzana 7. 223
genuina 7. 760
Gibsoni 4. 750; 7. 223, 638
Goepperti 9. 360
gracilior 9. 360
gracilis 7. 223, 638
Grateloupi 3. 74
gregaria 7. 760; 9. 360
Lachesis 3. 74
laevis 1. 487; 2. 229
Leighi 4. 750
Michaudi 0. 860
minutissima 4. 750
obliquata 1. 487; 2. 229
obsoleta 3. 764
obtusa 4. 750; 7. 223, 638
percostata 9. 360
permiana 7. 223, 638
punctata 3. 764
pulchella 3. 764
pusilla 4. 750
reticulata 3. 764
scalata 7. 761
semicostata 3. 764
soluta 7. 509
striata 3. 764
Strombecki 7. 761; 9. 360
subcochlearella 3. 74
supracostata 3. 764
Swedenborgana 7. 223
Theodorii 9. 360
thermalis 7. 509
turbinea 9. 360
turbo 7. 760; 9. 360
varicosa 3. 74
velata 3. 634; 4. 873
Venus 3. 74
vitrea 3. 764
Zetlandica 3. 764
spp. 6. 750
Rittingerit 2. 956!
Robertina
gen. 5. 755
Robertina
Austriaca 2. 254
Robinia 0. 637
atavia 4. 491
constricta 3. 506
Hesperidum 3. 47
heteromorphoides 6. 506
latifolia 0. 508; 2. 761; 3. 506
Regeli 3. 506
subcordata 6. 506
Robulina
gen. 5. 616*, 755; 7. 377
acutimargo 2. 253
angustimargo 6. 756
Beyrichi 6. 756
clypeiformis 2. 893
compressa 6. 756! 7. 297!
Comptoni 4. 672
cultrata 2. 508
declivis 6. 756
deformis 2. 253; 6. 756
depauperata 2. 253; 6. 756
depressa 7. 502
dimorpha 2. 253 6. 756
echinata 7. 497
galeata 2. 253; 6. 756
incompta 2. 253; 6. 756; 7. 497
inornata 6. 756; 7. 297!, 309, 497
integra 6. 756
intermedia 7. 497
lepida 4. 867
limbata 6. 756
Metensis 9. 371
navis 6. 756
neglecta 2. 253; 6. 756
nitidissima 2. 253; 6. 756
obtusa 2. 254
radiata 6. 756
subnodosa 7. 497
trigonostoma 2. 253; 6. 756
umbonata 2. 253; 6. 756
spp. 2 511*
Roc (Vogel) 1. 375
Roches
d'ébauchemeut 2. 733
globuleuses 2. 691!; 3. 619!; 6. 466!
pennines 2. 969!
Roche
pétrosiliceuses 1. 431
Roemeria 2. 120*
Roemerit 8. 829!; 9. 83!
Roe-stone 1. 484
Röttisit 9. 184!
Rohwand 0. 539; 8. 832!
Roméin 6. 688!
Ronzotherium (Pachyd.)
gen. 4. 831*
Rophalis
amissa 7. 622
relicta 6. 622
Rorqual-Art 6. 751
Rorqualus[lis] gen.
australis foss. 5. 113
Cortesii 6. 752
Cuvieri 6. 752
spp. 2. 998; 5. 231
Rosa 0. 637
basaltica 9. 123
canina 6. 244
dubia 2. 755
Nauticoes 6. 506
Rosacilla
gen. 5. 634
Rosalina
gen. 5. 749, 755; 7. 377
arcuata 2. 254
Beccarii 1. 228; 2. 508
canaliculata 4. 867
complanata 2. 254
concava 4. 867
conica 9. 371
crenata 7. 279!, 498
horrida 7. 278!
laevigata 1. 228; 7. 277!
laevis 0. 473
lenticularis 9. 371
Lorneina 1. 228
marginata 4. 867
obtusa 7. 498
Osnabrugensis 7. 498
patella 7. 278!
punctulata 0. 473
simplex 7. 278!, 809
squamiformis 4. 867
Viennensis 7. 277!, 309
spp. 2. 511*; 3. 671
Roselan 4. 598! 601
Rosenquarz 5. 822
Rosenspath 3. 600*, 695
Rosit 9. 565!, 586
Rossfeldener
Schichten 6. 847
Rossia gen. 4. 852

Rostellaria
gen. 7. 372!
affinis 1. 764; 7. 229
amoena 7. 866
ampla 3. 604
antiqua 7. 760
Apisidis 1. 764; 7. 229
biangulata 7. 492; 8. 494
bispinosa 0. 722
calcarata 3. 634; 4. 870
caudata 9. 34
columbaria 7. 229; 9. 844
columbata 1. 764
composita 3. 634
constricta 3. 635; 4. 275
costata 3. 634; 4. 874
Corbierensis 5. 593
crebricosta 3. 635; 4. 875
dentata 3. 75
depressa 3. 635; 4. 875
digitata 3. 635; 4. 875
digona 1. 764; 7. 229
dubia 7. 210
extensa 6. 229
fissurella 1. 764; 3. 331, 604, 807; 5. 369; 7. 229; 8. 586, 740; 9. 866
fusiformis 7. 864; 8. 494
gibbosa 3. 634; 4. 875
gigantea 0. 737
goniophora 3. 604
gracilis 2. 229
granulata 3. 634; 4. 875
Hehli 7. 760
laevigata 3. 634; 4. 874
laeviuscula 5. 593
Lamarcki 6. 230
laqueata 9. 234
levis 3. 604
macroptera 1. 716 8. 740; 9. 866
macropteroides 3. 604
macrostoma 1. 744
Margerini 0. 862
monilifera 4. 876
multiplicata 1. 764; 3. 604; 7. 229
Nebrascensis 8. 494
obsoleta 7. 760², 761
Orbignyana 0. 293
ornata 0. 294
Parkinsoni 0. 293
Partschi 3. 635
passer 3. 634; 4. 875
Rostellaria
pes-pelecani 1. 624; 3. 96; 7. 236
planulata 1. 764; 7. 229
pinnipenna 3. 633, 634; 4. 875
plicata 3. 635; 4. 875
plurimacosta 3. 763
Pyrenaica 5. 593
Reussi 0. 293
rimosa 1. 716, 717
scalata 0. 485; 7. 761
simplex 2. 229
solida 2. 229
Sowerbyi 0. 862; 8. 740 9. 866
spinigera 2. 229
staminea 6. 230
stenoptera 3. 634
subcostata 4. 874
subpunctata 4. 370; 9. 29
unicornis 2. 229
Uttingeriana 3. 96
velata 6. 230; 9. 234
vespertilio 0. 294
spp. 1. 382; 4. 626; 6. 479
Rostellites
gen. 6. 480!
Texanus 6. 480
Rosthornia 0. 633
Rostrotrema gen. 0. 870!
Rotalia (=Rotalina)
gen. 5. 616*, 749, 755
Aknerana 7. 497
antiqua 7. 633
aspera 4. 737, 738
Baileyi 7. 863
Brongniarti 7. 497
contraria 7. 497
Dutemplei 7. 497
Girardana 7. 497
globulosa 0. 249, 473
Haueri 7. 497
palaeoceros 8. 632
palaeotetras 8. 632
palaeotrias 8. 632
Partschana 7. 497
perforata 0. 473
propinqua 7. 497
Roemeri 7. 497
senaria 4. 738
septenaria 4. 738
stellata 7. 497
trochus 7. 497
Rotalia
turgida 0. 473
umbilicata 7. 750
umbonata 7. 497
spp. 4. 737 ff.
Rotalida (fam.) 5. 754 !ff
Rotalina (=Rotalia)
gen. 7. 377
affinis 1. 378
aculeata 7. 274!, 309
Aknerana 2. 253; 6. 756
anomphala 7. 275!
Badensis 1. 378
Bouéana 2. 253; 6. 756
Brongniarti 7. 274!, 309
bulimoides 2. 253; 6. 756
conoidea 1. 378
contraria 2. 253; 6. 756
cryptomphala 2. 254; 7. 277!, 309
discigera 7. 277!
Dutemplei 7. 274!, 309
Girardana 2. 253; 6. 756
granosa 2. 253; 6. 756
Haidingeri 7. 275!
incrassata 4. 738
Kalenbergensis 7. 273!, 309
nana 2. 254
orthorapha 7. 275!
Partschana 2. 253; 6. 756
patella 2. 254
propinqua 7. 275!, 309
reticulata 1. 378
scaphoidea 2. 254
semiporata 7. 275!
semipunctata 7. 275!
spinimargo 2. 254
stelligera 4. 867
taeniata 6. 756
Terquemi 9. 371
turbinoidea 9. 371
umbilicata 2. 512
umbonata 2. 253; 6. 756
Ungerana 2. 253; 6. 756
spp. 2. 511*
Rotella
bicarinata 3. 634; 4. 874
Defrancei 3. 74
expansa 6. 494
helicinaeformis 2. 108
lanceolata 5. 596
polita 6. 494
Röth 3. 614; 6. 25, 819; 9. 168

Röthelschiefer-Gruppe 2. 59
Rotheisenerz 0.338; 3.837; 5. 76; 7. 64 ff.
Rother Ammoniten-Kalk 4. 456; 8. 88, 89
Gneiss 4. 39!, 44
Marmor 2. 456; 3. 406
Porphyr 1.422!; 2.356, 368; 5.585; 7.741; 9. 532
Sandstein 3.737; 6. 82, 125, 207; 8. 603
Rothes Arseniksilber 1. 597
Rotheisenstein 0. 431; 1. 387*, 390, 391, 596; 4. 20; 5. 823
Rothgüldigerz 1. 386*; 3. 475, 843; 6. 443*
Rothkupfer-Erz 0. 451; 1. 385*, 386, 463; 2. 332; 5. 351; 6. 182²
Rothliegendes 3. 4; 5. 505 p.; 6. 56 p., 432; 7. 195, 347², 629; 8. 474, 502 p., 758 p.; 9. 144, 485, 532, 671, 681
Kupfergehalt 3. 728!
Rothtodtliegendes 8. 608
Rotularia
asplenioides 5. 629
cuneifolia 5. 629
dichotoma 5. 629
Rotularia
major 5. 629
marsileaefolia 5. 629; 6. 97; 8. 625
oblongifolia 5. 629
polyphylla 5. 629; 6. 97
pusilla 5. 629; 6. 97
saxifragaefolia 5. 629; 6. 97
Rouge-lave (Gestein) 4. 355
Rubbly Oolite 1. 484
Rubellan 2. 521
Rubiacites
asclepioides 6. 505
asperuloides 6. 505
Rubien (élage) 9. 470
Rubin 5. 826; 8. 578*
Rubinglimmer 6. 48
Rücken 8. 101
Rudistae (fam.) 7. 755; 8. 744
Rudisten-Kalk 4. 357
-Zone 0. 474; 4. 847
Rugosa (Coralliaria) 2. 121*
Ruinen-Marmor 7. 598
Ruminantia 7. 867!
Rumpfia gen. 9. 255
Runt (Thier) 7. 868
Rupelien (terrain) 2. 359, 882; 3. 625; 4. 89, 90; 6.755 p., 7.503 p., 8. 714
Rupicapra
spp. 5. 227; 8. 598
Ruppia 0. 631
brevifolia 2. 993
Pannonica 2. 993
Styriaca 2. 993
Rusa
ambigua 5. 373
Etueriarium 5. 373
Pardinensis 5. 373
rusoides 5. 373
Rusophycus
gen. 5. 249!
spp. 5. 248
cfr. R[h]ysophycus
Russ-Kohle 5. 626
Ruthenium 5. 837
Ruthiodon
Carolinensis 8. 359
Rutil 0. 451, 551; 4. 26ff., 453; 5. 181, 823; 7. 808; 8. 560*; 9. 424*
Rutschflächen 4. 606
Rutschwall
des Basalts 7. 32
R[h]yakolith 1. 444; 3. 262
R[h]ysophycus
bilobatus 8. 621
Deslongchampsi 8. 621
pudicus 8. 621
cfr. Rusophycus
R[h]ytidolepis
(pisc. gen.) 8. 112
Quenstedti 8. 112
R[h]ytinia gen. 7. 869

S.

Sabal
Lamanonis 5. 638; 8. 586; 9. 374, 505
major 5. 639; 9. 873
oxyrhachis 6. 633
rhapifolia 4. 321
spp. 9. 238!
Sables
de Beauchamp 3. 77; 4. 613; 7. 490, 503 p.
de Fontainebleau 3. 77
inférieures 7. 503 p.
moyens 2. 882
du Soissonnais 0. 861 2. 882
Sablonville 3. 64
Saccharit 1. 444; 4. 599!, 601
Saccocrinus
gen. 5. 251!
speciosus 5. 248, 251
spp. 9. 236
Saccocoma 4. 231
Sacheria
gen. 6. 100!; 9. 804
asplenites 6. 98
Safflorit 5. 561
Sagenaria
aculeata 2. 891
acuminata 2. 801, 889
attenuata 2. 891
Bischoffi 2. 891
caudata 5. 243
Sagenaria
Chemungensis 2. 891
concatenata 2. 891
confluens 0. 265
crassifolia 2.891; 6. 375
crenata 5. 631
cyclostigma 2. 891
depressa 2. 280, 891; 6. 375
dichotoma 5 631
elliptica 2. 891
geniculata 2. 891
Göppertana 5. 631; 6. 98
Jugleri 2. 891
obovata 0. 265
polyphylla 5. 243

Sagenaria
remota 2. 891
rimosa 5. 631
Roemerana 2. 891
transversa 2. 891
truncata 2. 891
Veltheimi 2. 280
Veltheimana 2. 801, 889; 5. 243; 6. 255; 9. 131
sp. 2. 939
Sagenarien-Kohle 5. 626, 627; 6. 476
Sagenella
gen. 1. 767!
membranacea 1. 767
Sagenit 4. 257*
Sagenopteris 0. 629
elongata 6. 253
Münsteri 9. 45
Phillipsi 4. 34
Sagr[a]ina gen. 5. 755
Salamandra
Goussardana 5. 233
laticeps 8. 203!
Ogygia 8. 203
Sansaniensis 5. 233
Salamandroide Fische 8. 760!
Salda exigua 6. 620
Salenia 7. 122
clathrata 7. 786
folium-querci 4. 654
gibba 7. 747
personata 7. 747, 859
petalifera 7. 747, 786²
Prestensis 7. 859
scutigera 7. 747
spp. 9. 123
Saleniidae (fam.) 7. 767
Salicinium 0. 633
Salicites
angustus 2. 750
crassifolius 0. 736
dubius 2. 894; 3. 227
Hartigi 6. 640
Petzholdtanus 0. 736
stenophyllus 4. 378; 9. 503
Salicornaria gen. 4. 114
Salicornia (Flustr.)
gen. 4. 114
Salinen 3. 70; 5. 678
-Gebirge 5. 208
Salisburya 0. 632
gen. 5. 861
adianthoides 4. 627;
Salisburya
adianthoides 9. 505
polymorpha 9. 505, 754
Salit 3. 271; 8. 700*
Salix 0. 633
abbreviata 3. 227; 9. 112, 123
acutissima 3. 227; 9. 501
alternata 2. 762
angusta 0. 504; 2. 762; 3. 504; 7. 502; 9. 122, 501
angustifolia 9. 501;
angustissima 2. 762; 3. 504; 9. 501
arcinervia 2. 754; 3. 504; 4. 491; 9. 501
arcuata 3. 227; 9. 501
arguta 3. 227
attenuata 3. 504, 747; 9. 501
brevipes 3. 227
Bruckmanni 0. 504; 2. 760; 3. 504; 9. 501
castaneaefolia 3. 227
cinerea 9. 348
cordato-lanceolata 0. 504; 3. 504; 9. 501
densinervis 9. 505
dentata 0. 504; 2. 760
denticulata 3. 504; 9. 501
elongata 2 754; 3. 504; 4. 491; 9. 501
grandifolia 2. 754; 3. 504
Hartigi 9. 501
Holzhausenensis 9. 123
inaequilatera 3. 227
integra 3. 227; 9. 501, 117
Irlandica 9. 505, 754
lancifolia 0. 504; 9. 123, 501
latifolia 4. 627
Lavateri 0. 504; 3. 504; 9. 501²
leuce 1. 635
linearifolia 3. 227
lingulata 3. 227
longa 0. 504; 3. 504; 9. 501
longissima 6. 505
Lowei 6. 244
macrophylla 2. 896; 3. 504; 9. 501, 505, 754
Salix
media 0. 504; 3. 504; 9. 117, 122, 123, 501
myricoides 0. 504
myrsinoides 2. 760
myrtifolia 3. 747
paucinervis 0. 504; 3. 504; 9. 501
rugosa 3. 227
squamaeformis 3. 747;
tenera 0. 504; 3. 504 9. 501
trachytica 3. 384
varians 3. 227; 8. 500; 9. 501, 873
Vivianii 4. 627
Wimmerana 3. 227; 9. 501
Salmacis 7. 122
gen. 4. 763
Vandenheckei 3. 606
Salmiak:
Entstehungs-Weise 2 502
Salmien (terrain) 1. 105; 7. 219
Salmo gen. 3. 118*
Salpeter 1. 690; 2. 795, 803
(-Bildung) 8. 688
-Distrikte, (Gewinnung) Ungarns 4. 216
-Erzeugniss 1. 44, 45
Salpetersaures Natron 2. 795
Salpingina (Bryozoa) 2. 124, 127!
Salsola
crenulata 9. 502
Moquini 9. 502
Oeningensis 9. 502
Saltator
gen. Hitchc. 8. 868
bipedatus 9. 868
caudatus 9. 868
Salz-Bohrversuche in der Schweitz 3. 65!
-Brunnen 7. 452
-führende Thone u. Kalke 9. 467
-Gehalt des Kaspischen Meeres 6. 592
der Lösungen in verschiedenen Niveaus 3. 722
-Lager 5. 357

Salz
-Lagerstätten 5. 735; 6. 361
-Quellen 1.736; 2.494; 7. 459
-See'n 1. 601; 4. 844
-Stock 4. 557
in d. Kirgisen-Steppe 0. 76*
Salzsäure
-Ausströmungen 1. 866
-Exhalationen 2. 501
-Fumarolen 1. 865
Salzsaures
-Ammoniak 2. 803
-Kali 2. 794
-Kupfer 2. 224*
Salzthon 0. 706!; 5. 208; 6. 847
Salzwasser 5. 195!
-Analyse: Kuwu 3.602!
Samarskit 2. 75!, 862!
Sambucus
celtifolia 6. 505
Samen-Regen 2. 767
Sammlungen
in Breslau 6. 326
L. v. Buch's 4. 127
in Dresden 2. 459
Lavizzari's 1. 337
Leuchtenberg'sche 7. 503
Link's 3. 578
Mandelsloh's 4. 768
Massalongo's 7. 813
v. Münster's 1. 510
Oppel's 7. 815
Sack's 2. 459
Struve's 2. 586
Teyler's 4. 168
in Turin 9. 60
Zeiler u. Wirtgen's 2. 452
de Zigno's 7. 811
Samyda 0. 635
borealis 9. 374
Sanct-Cassian
-Formation 4. 835
-Schichten 9. 628
Sand
von Beauchamp 3. 189
Erz-führender 2. 499
tönender 9. 626
Sandbänke-Entstehung 0. 78*
Sandroserrus
Rebouli 5. 235
Sands
of the Inferior Oolite 8. 354!
Sandstein
von Fontainebleau 0. 862
krystallinischer 6. 344
von Täbingen 9. 628!
-Kugeln in Sandstein u. Mergelschiefer 4. 674; 5. 172
Sanguinolaria
gen. 6. 643, 647
aequalis 6. 626
angustata 6. 647, 859
arcuata 6. 643, 647
attenuata 6. 647, 859
carinata 6. 647
compressa 6. 647
concentrica 6. 647
dilatata 7. 743
dorsata 6. 647
elegans 6. 859
elliptica 6. 120, 647, 859
gibbosa 6. 645, 647
Hallowaysi 4. 529
laevigata 6. 643, 647
Lamarcki 6. 859
lamellosa 6. 647
lata 6. 859
lyrata 6. 643, 647, 859
maxima 6. 647
oblonga 2. 230; 6. 647
obovata 6. 647², 859²
phaseolina 6. 643, 647
plicata 6. 644, 647
punctata 2. 230
pygmaea 6. 647
Roemeri 6. 647, 859
soleniformis 6. 643, 647, 859
striata 2. 287; 6. 647, 864
sulcata 6. 625, 644, 647²
tellinaria 6. 643, 647
transversa 6. 644, 647
tricostata 6. 647
trigona 6. 647
truncata 6. 643, 647
tumida 6. 643, 647
undata 6. 644, 647
undulata 6.858; 7. 743
Ungeri 6. 647, 870
unioniformis 6. 372, 647
Sanguinolaria
vetusta 6. 859
spp. 6. 643, 647
Sanguinolites gen. 6. 644
angustatus 6. 643
anguliferus 6. 120
clava 3. 238; 6. 120
contortus 6. 844
costellatus 6. 643
curtus 6. 644, 645
decipiens 3. 232; 6.120
discors 6. 643, 644
elegans 4. 749
inornatus 6. 120
iridinoides 6. 120, 644, 645
lunulatus 6. 120, 644. 647
Pellicoi 6. 500
plicatus 6. 644, 647
radiatus 6. 644, 645
striato-lamellosus 6. 120
subcarinatus 3. 238; 6. 120
sulcatus 6. 120, 644, 645
transversus 6. 644, 647
tricostatus 6. 120, 644, 647
tumidus 6. 643
undatus 6. 644
variabilis 3.238; 6.120
spp. 1. 253
Sanidin 6. 423; 8. 53
-Porphyr 9. 744
-Quarzporphyr 8. 651!; 9. 214
Sansino
(Gestein) 9. 870!
Sanson-machai
(Knochenhöhle) 3. 752
Santalum
Acheronticum 4. 379, 491, 877; 9. 374
microphyllum 4. 379; 9. 374
Osyrinum 4. 379, 877; 9. 374
salicinum 4. 379, 877; 9. 374, 503
Sao
gen. 0. 779!, 785; 3. 487; 6. 224
spp. 9. 504
Sapheosaurus
Thiollierei 0. 196; 2. 832; 5. 233; 744

Saphir 5. 826; 7. 444; 8. 579
Saphirin 0. 343!
Sapindus 0. 635
falcifolius 2. 761; 3. 505; 4. 491; 8. 712; 9. 117
Haszlinszkyi 4. 491
longifolius 3. 505
undulatus 2. 761
Saponit 6. 184; 8. 387; 9. 295!
Sapotacites
ambiguus 4. 379, 877
Daphnes 4. 877
lanceolatus 4. 379; 9. 503
minor 4. 379, 491; 9. 375, 871
Mimusops 4.379; 9.375
parvifolius 4. 379
sideroxyloides 4. 379; 9. 375
truncatus 4. 379
Ungeri 9. 375
vaccinioides 4. 379, 877; 9. 375
Sapoteites
Ackneri 6. 252
Sarcinula
gen. 2. 117*, 122³
acropora 0. 763
alvaria 7. 233
angulata 7. 233
annulata 7. 233
astroides 0. 243, 764
caespitosa 7. 233
concordis 0. 764
conversa 7. 233
crispa 7. 233
elegans 0. 757
fascicularis 0. 757
favosa 0. 764; 7. 233
geometrica 0. 767
gratissima 0. 767; 8. 336
intermedia 7. 233
longissma 0. 757
mirifica 0. 764
organum 0.757; 5.853ff.; 6. 114; 8. 267, 594
Phillipsi 6. 114
placenta 6. 114
punctata 2. 251
tuberosa 6. 114
Sarcodictyon } 1. 762
Sarcodictyum } 2. 123
Sarcolith (Sarkolith) 3.262; 4. 440
Sarcophytum 2. 123
Sardinioides gen. 9. 492!
microcephalus 9. 492!
Monasterii 9. 492!
Sardinius gen. 9. 492!
Cordieri 9. 492!
macrospondylus 9. 492!
Sargassites 0. 626
Partschi 2. 886
Rechsteineri 8. 640
Studeri 8. 640
Sarginites gen. 1. 184!
pygmaeus 1. 183
Sargodon
tomicus 1 505; 8. 352, 354; 9. 12
Sargus armatus 5. 235
incisivus 5. 235
serratus 5. 235
Sioni 8. 869
Sassafras
Aesculapi 9. 503
Ferrettianum 9. 873
Sassolin 5. 700*
Sätersbergit 5. 561
Säuerlinge:
Eisen-haltige 0. 464
Sauerquellen 8. 696; 9. 46, 821
Säugthiere 7. 759, 854; 8. 509
fossile in Württemberg 1. 501
geologische Vertheilung 8. 765
Klassifikation 5. 876
tertiäre, Südamerika's 6. 231
-Arten in Bolivia 3. 751
-Fauna 3. 377
der Braunkohle 1.75*
eocäne 4. 640
Schlesiens 3. 121
successive 5. 223
Säulen-Basalt 7. 185
-Bildung des Basalts 7.41
Saum-Riffe 2. 88!
Saure (kieselige) Gestein-Gruppe 7. 357!
Saurian-bed 9. 18
Saurichnus acutus 4.860!
Saurichthys
acuminatus 8. 352, 354
apicalis 1.680; 4. 840; 6. 745
Saurichthys
costatus 6. 616
longidens 8. 550
Mougeoti 0. 246!; 3. 18; 6. 745; 8. 615
tenuirostris 0. 246!; 1. 679; 3. 18, 30
Saurier
der Kreide Amerikas 2. 762
des Muschelkalks 2. 883!; 3. 11, 13; 5. 366!
der Trias 5. 755
des Zechsteins 0. 874
-Dolomit 2. 911
-Fährten 7. 878
-Kalk 2. 911
Saurillus
gen. 6. 110!
obtusus 6. 110!
Saurocainus
Gervaisi 5. 232
Saurocephalus
Albensis 8. 381; 9. 124
dispar 9. 361
inflexus 8. 381; 9 124
lanciformis 7. 625; 8. 376
spp. 5. 235
Saurochampsa
Camperi 6. 760
Saurochampsae
(fam.) 6. 760
Saurodipteridae
(fam.) 6. 124
Saurodon
Leanus 8. 253²; 9. 361
Sauroide Fische 8. 761
Sauroidei
(fam.) 9. 766
Sauroides
(fam.) 9. 382*
Sauroidichnites
abnormis 9. 868
Baileyi 9. 868
Deweyi 9. 867
Emmonsianus 9. 868
heterodactylus 9. 868
Jacksoni 9. 868
minitans 9. 868
palmatus 9. 868
polemarchius 9. 868
tenuissimus 9. 868
Sauromorus
ambiguus 5. 374
lacertinus 5. 374

Saurophidii
(ordo) 5. 742
Sauropsidium
gen. 1. 184!
laevissimum 1. 183
Sauropsis
gen. 3. 117*, 119
spp. 9. 764
Sauropus
primaevus 0.251; 6.488!
Saurorhamphus
gen. 3. 117, 118*
Freyeri 2. 980
Saurus gen. 3. 118*
Saussürit 1. 444; 4. 440; 7. 601,
Savigny[i]a
gen. 7. 122; 9. 255
Savit 6. 689; 7. 176, 600!
Saxicava
abrupta 7. 242
antarctica 7. 223
arctica 5.796; 6. 860; 7. 223, 507
arenicola 6. 495
carinata 7. 507
elongata 6. 860
fabacea 6. 495
fragilis 7. 507
Helvetica 2. 43
Pholadis 1.623; 7. 507
rhomboidalis 7. 507
rugosa 1. 473, 621 ff.; 4.86; 5.796; 6.860; 7. 248, 507
rustica 7. 502
Sinemuriensis 9. 456
Slovenica 8. 585, 587²
sulcata 1. 621
spp. 6. 860
Saxicola
nitida 6. 495
rotundata 6. 495
Scaglia 0. 735, 738; 6. 215
Scalaria
acuta 1. 717
canaliculata 1. 744
cancellata 3. 764
cerithiiformis 7. 492; 8. 494
clathrata 3. 764
crispa 3. 370; 6. 93, 739
decussata 3. 370; 6. 93, 739
Deshayesana 7. 623
Scalaria
Duciei 6. 101
fimbriata 3. 764
fimbriosa 3. 764
foliacea 3. 764
frondicula 3. 764
frondosa 3. 764
Groenlandica 3. 764
hamulifera 3. 764
interrupta 1. 717
marginostoma 7. 623
nassula 6. 230
obtuse-costata 3. 764
ornata 7. 369
pygmaea 2. 229
reticulata 1. 717
semicostata 1. 717
striata 3. 74
subulata 3. 764
subspinosa 3. 74
terebralis 3. 74
Trevelyana 3. 764
varicosa 3. 764
spp. 6. 750
Scaldenien 3. 625
Scaldesien 2.882; 7.503p.
Scaldia
Kickxana 3. 231
Lambotteana 3. 231
Scalpellum gen. 8. 620
angustum 2. 632
arcuatum 2. 632
Beisseli 8. 620
cretae 2. 632
Darwinanum 5. 126
Darwini 4.764; 8.620; 9. 361
elongatum 5. 126; 8. 620; 9. 494
fossula 2. 632; 9. 361
Gallicum 9. 361
gracile 5. 126; 8. 620
Hagenowanum 5. 126
Hagenowi 8. 620
hastatum 2. 632
lineatum 2. 632
magnum 2. 632
maximum 2. 632, 633; 5. 126; 8. 620; 9. 361, 494
pulchellum 5. 126; 8. 620
pygmaeum 5. 126; 8. 620; 9. 494
quadratum 2. 632
quadricarinatum 2.632
radiatum 5. 126; 8. 620
Scalpellum
semiporcatum 2. 632
simplex 2. 632
solidulum 2. 632; 9. 361
striatum 9. 361
trilineatum 2. 632
tuberculatum 2. 632
spp. 2. 633
Scaphander
Fortisi 7. 229
Grateloupi 3. 74
sublingnarius 3. 74
Scaphiocrinus
gen. 9. 343
Scaphites
gen. 4. 853; 6. 316*
aequalis 8. 505; 9. 847
binodosus 0. 244, 293
comprimus 8. 494
Conradi 1. 357; 8. 494
constrictus 8. 874
Geinitzi 6.817; 7.787²
gigas 7. 480
Iris 9. 498
larvaeformis 8. 497
Mandanensis 8. 494
multinodus 8. 505
Nicoleti 8. 494
nodosus 8. 494
tridens 4. 64
Yvani 0. 735; 2. 885
-Schichten 7. 787, 788
Scapolith
(Skapolith) 4. 596
Scapophyllia
gen. 0. 758, 760; 2. 117*
Scarabaeites 5. 613
Scarus tetrodon 5. 235
Scatophagus
frontalis 5. 380
Scelidotherium
gen. 6. 232, 241!; 8. 120
Bucklandi 6. 241
Cuvieri 6. 241
leptocephalum 3. 752; 4. 111; 6. 241; 7. 379
minutum 6. 241
Scesa plana 4. 835
Schaaf:
geolog. Verbreitung 4. 112
Schaalen-Ausfüllung der Gastropoden 5.38

Schaalen-Struktur der Brachiopoden 5. 382
Hippuritiden 5. 376. 377
Schaalstein 1.565; 4.454*; 5. 584; 6. 368; 7. 163!
Schaalthiere (Konchylien) tertiäre 1. 122
Schall-Stärke 5. 359
Schaum-Kalk 0. 484, 485; 2. 53, 915; 3. 11, 614; 6. 364, 558
Scheelit 0. 346!; 1. 330, 391*; 2. 518, 526; 3. 838; 4. 347!; 6. 552
Scheelsaures Blei 6.350*
Scheererit 5. 564
Scheibenschupper (Fische) 9. 763
Scherbenkohle 5. 626
Schicht
-Gebirge 0. 731
-Gebirgs-Profil der Loire 4. 831
Schichten
der Avicula contorta 9. 628!
von St. Cassian 0. 733, 738
von Seiss 0. 732
-Blätterung 7. 89
-Folge
in Italien 8. 88
in Luxemburg 9. 345
in Westphalen 9. 346
-Profil
der Ardennen 7.219
der Bains de Rennes 5. 591
in Bolivia, Chili und Peru 7. 731
in Italien 7. 204
im Jura 7. 845
in Kärnthen 7. 614, 615
in Kentucky 7. 729
der Lombardei 6. 216
in Nassau 6. 368
in New-York 5. 247
in Tyrol 7. 616, 619, 691
-Störungen 1. 800; 4. 356, 362; 6. 571; 8. 736, 835
Schichten-Störungen
im Rhone-Thal 5.464
im Eocän-Gebirge 5. 894
-System
Rheinisches 2. 370
Schidiosteus
gen. 8. 112
Mistelensis 8. 112
Schiefer
von Lodève 5. 353p.
vom Taunus 1. 345!
graue 2. 238
grüne 2. 238
krystallinische 0. 517; 2. 232!; 5. 97, 584
lithographische 3. 72
-Gebilde 3. 571
-Gebirge 1. 617; 4.325, 833; 5. 81; 9. 480
-Gefüge 0. 476; 8. 840
Schieferkohle 9. 346
Schieferungs
-Blätterung 7. 89
Schildkröten 9. 366
-Fährten 2. 982; 3. 107
Schilfglaserz 8. 818!
Schilfsandstein 9. 3
Schillerspath 1. 204; 9. 84
Schimperites
leptotichus 5. 577
Schismope
gen. 7. 254!
striatula 7. 254
Schistes
alunifères 1. 105
bitumineux 0. 152, 181
et Marnes de Grandcour 8. 355
Schistopleurum
gen. 6. 107!
gemmatum 6. 108
tuberculatum 6. 108
typus 6. 108
Schizaeaceae (fam.) 5. 637
Schizaster
acuminatus 7. 859
ambulacrum 7. 859
Beludschistanensis 7. 859
Desori 6. 101
Djalfensis 3. 606
eurynotus 6. 101; 7. 859
Genei 7. 502
Schizaster
Leymeriei 7. 859
Parkinsoni 6. 101
rimosus 4. 627; 7. 859
Scillae 7. 859
Studeri 3. 606
d'Urbani 4. 761
vicinalis 7. 859
Schizodesma
spp. 6. 752
Schizodus (King)
gen. 3. 126; 6. 119; 7. 627!, 760
cloacinus 7. 93, 94; 8. 352, 353; 9. 629
devonicus 9. 847
dubius 6. 643; 7. 223
inflatus 7. 627
obscurus 3. 126; 4. 118, 489, 749; 8. 766
ovalis 7. 627
parallelus 4. 749
parvus 4. 749
rhomboideus 7. 627
Rossicus 6.651; 7. 374; 8. 502, 766
rotundatus 6. 651
rotundus 4. 749
Schlotheimi 3.126, 128, 772ff.; 4. 118, 489, 749; 6. 651; 7. 223, 637, 722
triangularis 8. 766
trigonus 7. 627
truncatus 3. 772; 4. 118, 489, 749; 6. 651; 7. 627, 637
undatus 4. 749
Schizolepis 0. 632
Schizoneura 0. 631
paradoxa 2. 994
Schizopteris gen. 0. 627
adnascens 5. 629
anomala 5. 629
flabellata 5. 630
Gutbierana 5. 629
lactuca 1. 476; 5. 629; 6.97; 8.201; 9. 149, 379
spp. 9. 380
Schizopyga gen. 7. 853!
Californiana 7. 853
Schizostoma
gracile 5. 501
tricinctum 6. 371
Schizothaerus
Nutalli 7. 242

Schizotreta 0. 369, 373
gen. 6. 116
elliptica 0. 373, 374
Schizoxylon gen. 6. 629!
taeniatum 6. 627
Schlacken:
der Azoren 0. 5 ff.
krystallisirte 5. 129!
-Lava 7. 24
Schlackiger Basalt 7. 43!
Schlagende Wetter 5. 598
Schlamm des Nils 7. 168!
des Plattensee's 7. 183!
des Rheines 2. 385!
-Ausbrüche 2. 963
-Gehalt des Donau-Wassers 3. 722
-Proben des Atlantischen Ozeans 3. 374
-des Meeres 7. 111
-Vulkane 4. 98, 718; 5. 94, 460, 466; 6. 715
Schlangen 2. 465
Schleidenites 0. 638
Schlotheimia
dubia 5. 628; 6. 97
tenuifolia 5. 628; 6. 97
Schmelz-Punkt vom Luftdruck abhängig 8. 492
chmelzbarkeit unter hohem Druck 9. 733
Schmetterlinge 0. 24*
Schmidites vasculosus 5. 576
Schnee-Grenze:
in Norwegen 5. 730
Schneiderit 6. 349!; 7. 176, 600!
Schneidestein 8. 73!
Schnürl-Kalk 0. 717
Schöpfungen, verschiedene 7. 107
Schörl 8. 37
Schorlamit 0. 618!; 3. 452!
Schrambacher-Kalk 2. 455
-Schichten 6. 847
Schratten 3. 166; 7. 84
-Kalk 0. 305, 738; 3. 166; 4. 204; 8. 850
Schreibersit 1. 697; 2. 214, 615; 6. 266; 7. 830
Schrift-Diorit 8. 37
-Granit 3. 366; 6. 184, 358; 7. 174! 8. 36
Schrift-Granit um Lyon 0. 73*
Schwarzbleierz 0. 270
Schwarze Blende 5. 417
Porphyre 1. 33
Schwarzer Glimmer 8. 825!
Granit 5. 838!
Jura 6. 851; 9. 13
Schwarzerde 0. 350! 2. 344p., 345; 5. 582; 6. 74*; 7. 473!
Schwarzes Gold 5. 827
Schwarzkohle 0. 339!; 7. 611
Schwarzkupferoxyd 1. 587!
Schwarzmanganerz 1. 572
Schwefel 0. 449, 852, 854; 1. 604, 372*; 2. 793; 3. 263, 273!!, 73. 837!; 4. 701
-Bäder 2. 683
-Berg 2. 683
-Bildung 3. 562
-Dämpfe 9. 829
-Fumarolen 1. 865
-Gruben 3. 695
-haltiges Bleierz 5. 808
-Lager 1. 731; 5. 359
-Metalle 1. 596; 6. 197, 725; 8. 852
-Quellen 3. 289; 4. 72, 86; 7. 324,!; 8. 896; 9. 102
warme 5. 721, 722 g.
-See'n 4. 98
-Verbindungen 4. 86
-Vorkommen 4. 836; 7. 459
-Wasser 3. 474, 475
Schwefelantimon 1. 597, 707
-Silber 1. 707
Schwefelarsen 0. 698; 4. 818!
-Silber 1. 707
Schwefeleisen 1. 597, 707; 3. 838; 6. 267; 7. 335
-Absätze aus Quellen 5. 35, 40
Schwefelige Säure 2. 683
und Schwefel-Säure der Vulkane 0. 492
Schwefelkies 3. 475; 6. 192*
-Lager 5. 715
Schwefelkobalt 1. 597
Schwefelkohlensaurer Baryt 4. 347
Schwefelkohlensaures Blei 4. 453!
Schwefelkupfer 1. 597, 694, 707, 731
Schwefelmangan 1. 597
Schwefelnatrium 5. 722
Schwefelnickel 1. 597
Schwefelsaure
Dämpfe: wirken auf Hornblende-Gestein 2. 962
Kalkerde 9. 819
Magnesia 2. 798
Quellen 1. 199!
Talkerde 4. 702 ff.
Wasser: Wirkung auf Tachyt 5. 363
Schwefelsaures
Eisenoxydul 4. 703 ff.
Kupfer 2. 799
Kupferoxyd 4. 705 ff.
Manyanoxydul 4. 704ff.
Natron 2. 794, 797, 806
Strontian 1. 708; 3. 175; 4. 75; 7. 329
Zinkoxyd 4. 702 ff.
Schwefelsilber 1. 707; 6. 440
Schwefelspiessglanz 2. 788
Schwefelwasserstoffgas-Ausbrüche 3. 105
-Ausströmungen 0. 493
Schwefelwasserstoffsäure verändert Gesteine 2. 864
Schwefel-Wismuth 1. 597, 707
Schwefelzink 1. 707
Schwefelzinn 2. 789
Schweine 8. 232
Schwerspath 1. 698 ff.; 2. 220!, 223!; 3. 475, 476, 535; 5. 714
fleischfarbiger 6. 664!
-Absätze, neue 4. 683!
Schwimmende
Bänke todter Seefische 6. 89
Insel 8. 345
Scincus Croizeti 5. 233, 374
Scintilla gen. 9. 126!
spp. 9. 125
Scirpus
deperditus 5. 638
dubius 5. 638

Scirpus
lacustris 9. 347
protogaeus 5. 638
tuberosus 2. 760
spp. 0. 503
Scissurella gen. 7. 254!
striatula 7. 254
crispata 3. 765
Scisti galestrini 7. 597*
varicolori 6. 575; 7. 596
Scitaminites
musaeformis 5. 506
Sciurus ambiguus 5. 371
Chalaniati 5. 371
Feignouxi 5. 224, 371
fossilis 5. 224
Gervaisanus 5. 224
minutus 5. 224
priscus 7. 871
Sansaniensis 5. 224
spp. 3. 378; 6. 599
Scleretinit 6. 349!
Sclerocephalus Haeuseri 0. 104, 105; 4. 431
Sclerodus pustuliferus 3. 630
Sclerohelia 2. 249!, 250
Sclerosaurus gen. 7. 136!
armatus 7. 136!, 532
Sclerotium
minutulum 5. 637
populinum 0. 501; 2. 760
populicola 5. 637
pustuliferum 5. 637; 8. 500
seminiforme 3. 745
Scolecit 1. 354!
Scolecolithus linearis 2. 890
Scolecopteris 0. 629
Scolicia gen. 1. 753!
prisca 1. 753
Scoliostoma
conoideum 6. 372
crassilabrum 6. 372
Dannenbergi 6. 372
expansilabrum 6. 372
fasciatum 6. 758
gracile 6. 372
megalostoma 6. 372
moniliifrum 6. 758
Scolites linearis 9. 106
Scolithus linearis 7. 239; 8. 352
spp. 9. 504
Scololithus spp. 5. 248
Scolopendra proavita 5. 121
Scolopendrites spp. 9. 379, 380
Scolopendrium solitarium 6. 253
Scolopodus
gen. 8. 112
costatus 8. 112
inaequilateralis 8. 112
quadratus 8. 112
semicostatus 8. 112
striatus 8. 112
sublaevis 8. 112
Scrobicularia piperata 7. 506
Scrobodus gen. 3. 117*
spp. 9. 764
Scutella depressa 7. 747
hemisphaerica 7. 747
Lyelli 7. 91
Paulensis 7. 859
pyramidalis 7. 748
subrotunda 3. 74; 6. 101²
subtetragona 7. 859
striatula 6. 101
Scutum spp. 6. 750
Scymnus occidentalis 7. 242!
Scyphia angulata 2. 349
angustata 2. 766
articulata 2. 349
capitata 2. 109
cariosa 4. 514
cellulosa 4. 514
clathrata 2. 349
Cockburni 8. 873
compressa 7. 233
constricta 6. 375
cribrosa 2. 766
cylindrica 2. 349
furcata 8. 873
intermedia 2. 349
isopleura 7. 471
Oeynhauseni 8. 873
Portlocki 8. 874
procumbens 0. 243
Sacki 8. 873
striata 2. 349
tuberculata 4. 743
ventricosa 0. 226
Scyphien-Kalke 0. 168!; 8. 726
Scytophyllum
gen. 6. 618!
Bergeri 6. 618
dentatum 6. 618
Scytopus Ocoyanus 7. 242
Sechsfüsser: des Lias 2. 983
Sedgwickia
gen. 6. 645
attenuata 6. 643, 645
bullata 6. 643, 645
corrugata 6. 643, 645
gigantea 6. 643, 645
globosa 6. 643, 645
minima 6. 643, 645
Sediment-Gesteine 7. 592
Sedum ternatum 3. 748
See'n: von Liegnitz 0. 483
unterirdische 2. 353
Seefelder-Schiefer 0. 591
Seegras-Schiefer 6. 850
Seegrund bevölkert 7. 111
-Proben 9. 225!
Seeigel 6. 128; 7. 852
See-Salme 7. 829
Seesalz 3. 185!
Seeschwämme, silurische 1. 757
Seespiegel, allgemeiner 5. 219
-Wechsel 9. 627
Seesterne 1. 380
See-Strömungen 2. 224!
geolog. Wirkungen 0. 78*
See-Wasser 7. 581
-Gehalt 0. 492
chemische Beschaffenheit oben und in der Tiefe 5. 87
Seewer-Kalk 0. 305, 735, 738; 3. 329; 4. 204; 5. 42, 473; 7. 481; 8. 850
Segestria cristata 5. 123
cylindrica 5. 123
elongata 5. 123
exarata 5. 123
nana 5. 123
pusilla 5. 123
sulcata 5. 123
tomentosa 5. 123
undulata 5. 123
Seifen-Gebirge 2. 499; 5. 205
Seifenstein 9. 295!
Sejus bdelloides 5. 124
Sekundäre Ablagerung der Gesteine 8. 508
Ablagerung der Organismen in Löss 7. 609
Krystall-Formen: Ursachen 7. 74
Lagerstätte fossiler Reste 3. 608
von Petrefakten 4. 322

Sekundär-Formationen 7. 612, 614
-Gebirge in Chile 0. 480
in Luxemburg 4. 850
in Portugal 0. 478
Selagines ordo 5. 240
Selaginites 0. 629
Erdmanni 1. 476; 5. 243, 631
Selen-Quecksilber 3. 601
Selenochlaena 0. 628
gen. 1. 115
Selenopeltis gen. 3. 487
Selenopleura spp. 6. 223
Selenopteris 0. 628
involuta 6. 98
Radnicensis 6. 98
Selenosoma gen. 3. 487
Semblis gen. 6. 621, 622
Semicelleporaria 4. 115
Semicytis sp. 5. 653
Semieschara gen. 4. 115!
Semiescharella gen. 4. 116!
Semiescharellina gen. 4. 116!
Semiescharinella gen. 4. 116!
Semieschariпora gen. 4. 117!
mumia 9. 228
Semiflustra gen. 4. 113!
Semiflustrella gen. 4. 117!
Semiflustrina gen. 4. 117!
Seminula
elongata 6. 117
ficus 3. 211; 6. 117
hastata 6. 117
juvenis 6. 117
sacculus 6. 117
seminula 6. 117
sufflata 6. 117
virgoides 6. 117
Semionotus
gen. 3. 117, 118*
Bergeri 4. 321; 9. 12
curtulus 1. 183
latus 8. 6
striatus 8. 6
spp. 4. 869; 8. 748
Semiporina gen. 4. 116!
Semitubigera gen. 3. 348*
Semnopithecus
major 7. 370
Monspessulanus 1. 492; 2. 998; 5. 224; 7. 120
Semnopithecus
Pentelicus 7. 120, 370
Senarmontit 8. 822!
Sendelia 0. 637
Ratzenburgana 3. 227, 747
Senftenbergia 0. 629
Senkrechter Baumstamm in Baden 7. 100
Senkung des Landes 7. 217
Skandinaviens 2. 87!
Senkungen 3. 612; 5. 361
des Bodens 7. 465; 8. 101; 9. 1. 469
der Schweitz 0. 221
Senkungs-Achsen 4. 463
-Felder der Erd-Rinde 5. 306, 641 ff., 769 ff.
Senonien 3. 633; 4. 204, 508, 847, 866 p.; 9. 107
Sepia (Os Sepiae) 2. 855*
gen. 4. 852
antiqua 5. 613; 9. 370
Blainvillei 4. 853
caudata 9. 370
Cuvieri 4. 853
gracilis 5. 613
hastiformis 5. 608, 613 9. 370
longirostris 4. 853
longispina 4. 853
obscura 5. 613; 9. 370
Parisiensis 4. 853
regularis 5. 613
sepioidea 4. 853
venusta 5. 613; 9. 370
spp. 9. 370
Sepialites gen. 9. 369
Sepiaria (fam.) 9. 368!
Sepiola gen. 4. 852
Sepioloidea gen. 4. 852
Sepioteuthius gen. 4. 852
Sepites gen. 4. 572
Septaria Mediterranea 6. 857
Septarien-Thon 2. 252 p., 359; 3. 482, 625; 5. 436; 6. 535, 755 p.; 7. 495; 8. 102, 498, 609; 9. 122, 865 p.
Septastraea 2. 118*
gen. 0. 763, 767
Forbesi 0. 767
hirtolamellata 0. 767
Septastraea
multilateralis 0. 767; 3. 74
ramosa 0. 767
subramosa 0. 767
Septifer gen. 6. 238!
Séquanien 0. 173
Sequoia 7. 364!
Langsdorfi 5. 638; 8. 500, 740; 9. 117, 873
sempervirens 9. 505
Sequoinium
gen. 7. 364!
Fritscheanum 7. 363
Sequoianum 7. 363
Seraphs convolutus 1. 716
Serapis-Tempel 8. 223
Seriatoporn 2. 121*
cribraria 7. 233
Sericostomum hyalinum 6. 622
Seriola lata 5. 380
Sericit 1. 346!; 9. 567
Sernf-Schiefer 0. 732
Serpentin 0. 418, 453!, 494; 1. 30, 204*, 555ff., 604*; 2. 78, 238, 366, 521, 711!, 859!, 879; 3. 699; 4. 181, 189, 221, 344, 451!; 5. 45ff., 565*, 822; 6. 72, 722!; 7. 359*, 361!, 737*, 742; 8. 92, 341, 473, 836, 846; 9. 88, 445²!, 472, 630, 632
krystallisirt 0. 458
im Kija-Gebirge 0. 88
um Lyon 0. 75*
-Gebirge 7. 593
-Krystalle 8. 394
-Steatit 7. 437!
Serpentino
nero antico 7. 599
verde di Prato 7. 599
Serpula ammonia 6. 370
amphisbaena 3. 231; 4. 672; 5. 728
ampullacea 6. 361
antiquata 4. 375
articulata 0. 225
carbonaria 9. 125
cincta 4. 375
circum-carinata 9. 356
coacervata 0. 400ff.
colubrina 6. 496

Serpula
conformis 7. 134
convoluta 8. 357
corniculum 6. 370
corrugata 1. 712
crassa 1. 717; 7. 229
cristata 9. 361
devonica 9. 847
discus 4. 739
epithonia 5. 384
Etalensis 8. 643
exigua 8. 354
filaria 4. 852; 8. 357
filiformis 0. 728; 3. 231; 4. 375, 870
filograna 2. 855*
filosa 3. 165
flaccida 6. 496; 8. 357
flagellum 1. 357, 744
gigantea 3. 312
gordialis 3. 165; 9. 361
grandis 8. 357
heptagona 9. 361
hexagona 0. 291
implicata 9. 361
incurvata 3. 764
intestinalis 3. 235
laevigata 2. 229
limax 4. 852; 6. 496
lineata 0. 225
lituites 9. 361
lophioda 0. 291
Lumbricus 9. 361
lyrata 6. 370
macropus 9. 361
minuta 5. 865
minutissima 5. 853
Noeggerathi 4. 538; 9. 361
oblique-striata 3. 235
omphalodes 2. 340; 9. 847
philastarte 4. 354
Phillipsi 5. 161, 162; 6. 818; 7. 480, 659, 672, 676
planorbites 4. 118; 7. 223
plexus 4. 870; 9. 361
plicatilis 3. 235; 8. 357
pusilla 3. 772; 4. 118, 489, 745; 9. 761
quadrilatera 7. 134; 8. 357
quinquangulata 4. 375
Schubarthi 5. 498
septaria 9. 125
Serpula
semiplicata 6. 370
septemsulcata 3. 231
serpentina 3. 19; 9. 361
socialis 1. 485; 2. 229; 3. 231; 4. 375, 852; 6. 496; 7. 132; 8. 357, 643; 9. 134
Spirulaea 0. 486, 736; 1. 41; 2. 166, 170; 3. 85 ff., 606; 4. 627; 9. 844
strangulata 6. 496
sulcata 3. 235; 8. 357
sulcataria 3. 231
tenuicarinata 8. 377
tenuis 1. 712, 714
Texana 3. 165
tortrix 2. 166, 170
triangulata 0. 163
tricarinata 4. 852
tricostata 7. 229
tricristata 3. 530
triquetra 2. 855*
undulata 6. 370
Valvata 3. 19
vertebralis 0. 723
vertebrata 6. 821
volubilis 6. 496
spp. 2. 929
Serpularia
centrifuga 6. 372
serpula 7. 220
Serpulit
(Gebirgsart) 0. 400
Serpuliten-Kalk 7. 196
Serpulites
coacervatus 1. 355
depressus 8. 753
dispar 6. 115
longissimus 6. 115
Maccullochi 9. 338
perversus 3. 630
Serranus
occipitalis 3. 119*; 5. 380
rugosus 5. 381
Styriacus 8. 585, 587²
ventralis 5. 380
Sesquioxyde
de chrome magnésoboraté 1. 693*
Sesquisilicate
of Manganese 0. 448
Sestien (Etage) 6. 502
Sexloculina gen. 1. 378!
Haueri 1. 378
Seybertit 2. 848
Shelly
Freestone 1. 484, 485
Shepardia
gen. 9. 868
palmipes 9. 868
Shoharie
-Sandstein 3. 817
Sialium
Sypilus 5. 747
Sickleria
labyrinthiformis 6. 737
Siderastraea
gen. 0. 763!, 765; 2. 118*
agaricites 0. 765
concentrica 0. 766
crenulata 0. 765
cristata 0. 766
funesta 0. 765
incrustata 3. 876
Italica 0. 765; 3. 74
maeandrinoides 2. 378
Parisiensis 0. 765
Websteri 3. 876
Siderina
gen. 0. 765!; 2. 118*
Siderit 6. 49*; 9. 187
Sideroferrit 4. 446
Siderolina
gen. 5. 755
liasina 9. 371
Siderolith
-Gebirge 7. 845
Sideroplesit 9. 184*
Sideropora 2. 251
sexradiata 2. 252
Siderotantalit 2. 863!
Siderotherium
spp. 1. 502
Sideroxylon 0. 634
Siedepunkt
plutonischer Massen 1. 739
Siegenit 8. 682!
Siga
citrina 5. 121
Sigaretus
amplus 7. 229
arctatus 6. 753
bilix 6. 753
canaliculatus 4. 515; 6. 753
clathratus 9. 839
declivis 6. 753
excavatus 3. 765
fragilis 6. 753

Sigaretus
Mississippiensis 6. 753
subcanaliculatus 3. 74
spp. 1. 382; 6. 650
Sigillaria
gen. 0. 629; 1. 754; 5. 848; 9. 804
acerosifolia 5. 868
acuminata 5. 868
alternans 1. 476, 754; 5. 243, 631, 868; 9. 804
alveolaris 5. 868; 6. 99
Arzinensis 8. 401
Brardi 1. 476; 5. 868
Brochanti 5. 868
Brongniarti 5. 631
canaliculata 5. 868
Candollei 5. 868
catenulata 5. 631, 868
Cisti 5. 630
coarctata 5. 868
Cortei 5. 631, 712, 868
cyclostigma 5. 631, 868
Defrancei 5. 868
densifolia 2. 891
Deutschana 5. 868
diploderma 5. 868; 6. 99
distans 5. 243, 631
Dournaisi 1. 476; 5. 868
dubia 0. 265
elegans 1. 476; 4. 565; 5. 868; 6. 99; 8. 401, 402
elliptica 5. 868; 8. 401
elongata 1. 476; 5. 868
geminata 5. 868
gigantea 5. 631
gracilis 5. 868
Graeseri 5. 868
hexagona 6. 99
ichthyolepis 5. 868; 6. 99; 8. 401, 402
intermedia 5. 638, 868
Knorri 5. 868
laevigata 5. 868
lepidodendrifolia 1. 476; 5. 868
macrodiscus 5. 630
mammillaris 5. 868
Menardi 5. 631, 868
microstigma 5. 868
minima 5. 868
minutissima 2. 891
notata 5. 868
notha 5. 240
Sigillaria
obliqua 5. 868
oculata 5. 631², 712
orbicularis 5. 868
organum 1. 609; 5. 243, 868
ornata 5. 868; 6. 99
ovulata 8. 201
pachyderma 4. 565; 5. 868
parallela 0. 662
peltigera 5. 630
pes-capreoli 1. 476; 5. 631, 712, 868
plana 5. 243
Polleriana 5. 868
pyriformis 5. 868
reniformis 1. 476; 4. 565; 5. 631, 868
rhomboidea 5. 243, 868
rugosa 5. 868; 8. 401, 402
rhytidolepis 5. 868; 6. 99
Schlotheimana 5. 868
scutellata 5. 868
Sillimani 5. 631, 868
spinulosa 1. 476
striata 5. 868
subrotunda 5. 631, 868
tessellata 5. 631, 868
undulata 2. 891; 5. 868
Utschneideri 5. 868
Vanuxemi 2. 891
venosa 5. 868
Voltzi 2. 891; 4. 565
Zwickawiensis 5. 631
spp. 0. 672; 4. 109, 743; 8. 625; 9. 379, 381
Sigillarieae (fam.) 5. 240
Sigillarien
-Kohle 5. 626, 627; 6. 476
Silber 1. 199. 387*; 2. 519, 532; 6. 48, 82, 667; 8. 566; 9. 198
(Gediegen) 1. 596; 5. 349; 7. 314
in Seewasser u. Organismen 0. 352
-Bergbau 2. 498
-Beschlag 6. 440
-Erze 6. 462; 7. 838; 8. 328
Silberglanz 1. 330, 396*; 3 475, 843; 6. 434
Silberglaserz 3. 475
Silber
-Krystalle künstlich 3. 703
-Vorkommen 5. 74, 81
Silberhaltiger Bleiglanz 7. 352
Siliceous
Basalte 8. 391
Silicifikation 5. 730
Silicit 4. 598!
Silicium 6. 693*
Silikate 1. 695; 8. 697
künstliche 5. 214; 8. 579*
Siliqua spp. 7. 632
Siliquaria
biplicata 9. 498
lima 1. 764; 7. 229
spp. 6. 750
Sillimania 0. 638
gen. 2. 962!
Texana 2. 962!
Sillimanit 6. 37
Silphidium
gen. 4. 253!
Proserpinae 4. 252
Visianicum 4. 251
Silphium
Proserpinae 4. 252
Visianicum 4. 251
Silur-Becken
Christiania's 5. 467
-devonische
Grenz-Schichten 8. 624!, 625, 715; 9. 63, 507p.
-Fauna (I., II., III.) 3. 335; 6. 225, 611. 614; 8. 596
New-York's 5. 247
-Formation 1. 475; 4. 221; 6. 206, 219!, 255 p., 353, 469, 499, 795; 7. 104p., 607, 638p., 700, 847; 8. 110p., 335, 350, 474, 593, 604, 630p., 717, 751p.; 9. 57, 105, 120, 221, 232, 235p., 339, 341, 467, 504p., 602, 635p., 864p.
in N.Amerika 1. 499p.
in Portugal 0. 98; 5. 95

Silur-Formation
Parallel-Gliederung 3. 345
-Gebirge (Mans) 1. 65; 4. 1 p., 846
mittles 5. 247p.
-Gesteine 2. 581
-Schiefer 9. 875
-System 0. 731; 2. 344!; 4. 486; 6. 735; 9. 825
in Böhmen 3. 482 p.
-Versteinerungen 4. 85
in Böhmen 2. 204
Silurian
Series of Strata 6. 112
Silurien 1. 104; 7. 219
Silurische
Beyrichia-Arten 5. 876!
Simosaurii
(fam.) 5. 745
Simosaurus
gen. 3. 507
Gaillardoti 5. 233, 346
Guilielmi 5. 367
Mougeoti 5. 233
spp. 3. 161
Simulidium
priscum 5. 747
Sinapis inflata 8. 499
Dorheimensis 8. 499
primigenia 8. 499
Sinemuria
atrata 3. 230
Sinémurien 4. 850; 6. 749; 9. 94
Sinter-Bildung 5. 71
Sinupallia
(fam.) 6. 656, 657
Siphon d. Cephalopoden:
Ausfüllung 5. 385
Siphonella gen. 4. 117
Hagenowi 3. 609
pulchella 3. 609
spp. 2. 125, 128!
Siphonia
cervicornis 2. 29
ficus 2. 766
globularis 3. 165
pistillum 2. 29
praemorsa 7. 389
pyriformis 7. 233
subfusiformis 7. 233
tetragona 7. 233
spp. 9. 123
Siphonina
gen. 5. 755
Siphonina
fimbriata 2. 254
Siphoniotyphus
gen. 5. 634
Siphonodendron 2. 122
aggregatum 6. 114
fasciculatum 6. 114
sexdecimale 6. 114
Siphonodus
Panderi 3. 125
Siphonophyllia 2. 121
Siphonophyllum
gen. 6. 114
Siphonotreta 0. 369, 372, 373
aculeata 0. 370, 373
Anglica 0. 374; 4. 504; 6. 116
conoides 0. 373
fissa 0. 373
fornicata 0. 372
micula 3. 216; 6. 116
spiriferoides 3. 216
tentorium 0. 373
unguiculata 0. 243, 371, 372; 4. 61. 504
verrucosa 0. 373; 4. 504
spp. 1. 382
Siphonotreteae (fam.) 0. 369
Sirenia (fam.) 7. 869
Sismondia
gen. 9. 255
Sismondin 2. 702; 7. 170!
Sisserskit 5. 69
Sisyra
amissa 6. 622
relicta 6. 622
Sitona
margarum 1. 759; 6. 503
Sitta
Cuvieri 5. 231
Sivalarctos gen. 4. 752
Skalenoeder 6. 149
Skandinavische
Geschiebe 8. 270
Skapolith 1. 404*; 2. 866, 879; 4. 440!; 5. 196!
Skiddaw
Slate 6. 112
Skleretinit 6. 349!
Skogbölit 8. 831!
Skölar (Schaalen-Gestein) 3. 68
Skolezit 1. 354!; 6. 196!; 9. 446*
Skolopsit 1. 445!
Skorodit 5. 71*, 821; 6. 351; 9. 196, 822
Skripautz
(-Sandstein) 0. 717
Skye 8. 823 m.
Slimonia gen. 6. 598
Sloanit 6. 689!; 7. 600!
Smaragd 5. 827; 6. 566*; 7. 710; 8. 308!, 569
künstlich 5. 215
-Gruben 8. 308
Smaragdocalcit 2. 224*
Smektit 0. 691!
Smerdis
aduncus 3. 683; 4. 734
analis 3. 683; 4. 734
Beaumonti 5. 235
Budensis 6. 481*
elongatus 1. 80
macrurus 5. 235; 6. 421; 7. 554*
micracanthus 5. 380; 6. 828; 7. 554*
minutus 3 683; 4. 251, 734; 7. 554*
pygmaeus 1 80; 6. 828
Smilaceae (fam.) 5. 638
Smilacites 0. 631
affinis 4. 552
cordatus 2. 993
deperditus 4. 252
grandifolius 2. 753, 993; 3. 47
Haidingeri 2. 993
hastatus 2. 753, 992; 3. 47
integerrimus 4. 252
intermedius 2. 992
macrolobus 4. 252
majanthemum 2. 993
nymphaeoides 4. 252
pulchellus 4. 252
sagittatus 2. 993; 5. 638
Salcedanus 4. 252
Smilax
angustifolia 5. 638
grandifolia 5. 638
obtusifolia 5. 638; 6. 505
ovata 6. 505
parvifolia 2. 762; 3. 503; 5. 638
remifolia 6. 505
sagittata 3. 503
sagittifera 5. 638

Smilax
Targionii 9. 873
Weberi 6. 505
spp. 1. 382
Smillium gen. 5. 126
Smilodon
gen. 5. 230, 372, 757
spp. 8. 121
Smilotrochus 2. 115*
Smirgel 0. 214, 681!; 1. 589*; 4. 453; 6. 559
Smithia 2. 122*
Hennahi 6. 255, 375
spp. 4. 497
Smynthurus
brevicornis 5. 125
longicornis 5. 125
ovatulus 5. 125
Soda 1. 90!; 4. 446!; 6. 42!
Sodalith 1. 198!, 403*; 2. 535; 3. 262; 4. 174!
v. Neapel, Krystall 0. 69*
Soffioni 0. 493; 5. 834; 7. 606
Sohlenstein 2. 93
Solanderia 2. 123
Solariella
maculata 3. 765
Solarium
canaliculatum 1. 716
Cotswoldiae 2. 229
Danae 1. 101
diadema 2. 229
disculus 3. 234
flexistriatum 8. 494
granosum 4. 250
lenticulare 6.494; 8.643
liasinum 7. 210
Orbignyi 3. 634; 4.874
ornatum 1. 312, 314; 3. 495; 4. 202; 7. 476*, 659
pentangulatum 6. 125
plicatum 1. 717
polygonium 3. 234
pulchellum 7. 369
quadratum 3. 634; 4. 874
simplex 3. 370; 6. 93, 739
striatum 7. 210
textile 3. 634: 4. 874
varicosum 3. 234
Solarium
variegatum 3. 382
spp. 6. 750
Soldania
elegans 2. 349
Solea
antiqua 1. 80; 7. 110
Kirchbergana 1. 80*; 5. 808; 7. 110
Solecurtus
appendiculatus 3. 605
candidus 6. 857
elongatus 3. 605
Lamarcki 6.857; 8.740; 9. 866
legumen 6. 857
striatus 3. 605
strigillatus 6. 857
spp. 1. 382; 7. 632
Solemya
abnormis 7. 637
Biarmica 6. 643, 646; 7. 637²; 8. 766
devonica 3. 231
normalis 7. 637
Phillipsana 4. 748
spp. 1. 382
vgl. Solenomya
Solen
aequalis 0. 293
antiquatus 6. 857
Biarmicus 4. 118
Burdigalensis 6. 857
caudatus 8. 125
coarctatus 6. 857; 9. 839
constrictus 2. 933
costatus 6. 372, 646, 652
cultellatus 2. 161, 169
Dakotensis 8. 377
Deshayesi 6. 495
ensiformis 7. 507
ensis 6. 857; 7. 507²
gladiolus 7. 507
garcilis 1. 715
Hausmanni 7. 507
Helveticus 5. 848
legumen 2.43; 6.857; 9. 838, 839
Lustheidi 6. 646, 653
papyraceus 6. 861
Parisiensis 6. 857
pelagicus 2. 933; 6. 643, 646
pelagius 2. 192
pellucidus 8. 756
Solen
permianus 8. 766
pinnaeformis 4. 118, 489, 743; 6. 653; 8. 374
rimosus 3. 605
siliquoides 6. 646, 653
siliqua 6. 857; 7. 507
strigillatus 2. 43; 6. 857
subplicatus 7. 492; 8. 495
tenuis 7. 507
uniradiatus 1. 765; 7. 229
vagina 2. 43; 6. 65, 857³; 9. 839
vaginalis 6. 857
vaginoides 6. 857
vetustus 6. 646, 864
spp. 7. 632
Solenastraea
gen. 0. 763! 764; 2. 118*
gibbosa 0. 764
tenuilamella 0. 764
Turonensis 0. 764; 5. 844
Solenella
gen. 6. 871
orbitosa 3. 231
scalpellum 3. 231
Solenhofener
Schiefer 0.184; 3.402; 4. 210
Solenichnus
gen. 9. 868
breviusculus 9. 868
falcatus 9. 868
Solenimya pro Solenomya
abnormis 4. 748
normalis 4. 748
primaeva 6. 120, 124
Puzosana 6. 120
Soleniopsis
linzoides 4. 251
Solenolithus
antiquus 8. 630
simplex 8. 630
Solenomya vgl. Solenimya
abnormis 6. 646
Biarmica 6.646; 8.502
normalis 6. 646²
Phillipsana 5. 498; 6. 646
primaeva 6 646, 651
Puzosana 6. 646

Solenomya
subplicata 8. 495
Voltzi 6. 850
Solenopleura 4. 493
Solenopleuridae
(fam.) 4. 493
Solenopsis
gen. 6. 646
minor 6. 643
pelagica 6. 646
Solenorhynchus
gen. 5. 380!
elegans 5. 380
Solenostrobus 0. 632
Solfatara 1. 589; 2. 662; 3. 285; 4. 95
des Cerro Azul 2. 662
Solidula
attenuata 8. 497
Solidulus
gen. 9. 498
linteus 9. 498
Solitaire
(Vogel) 5. 489
Somma 8. 826 m.
Sommervill[e]it 3. 261; 4. 440
Sommit 3. 261
Sonnenrisse 9. 869
der Schichten 9. 105
Sonnenstein
(Mineral) 4. 594!
Soole 0. 614!
von Reichenhall 1. 203!
von Wittekind b. Halle 0. 63!
-Quellen 2. 494; 3. 70; 5. 435, 733; 6. 711; 7. 463; 8. 696
Analyse 0. 453!
in Java 3. 602!
-Wasser 9. 46
Sophora 0. 637
Europaea 3. 510; 4. 380, 491; 9. 376
Sordavalit 9. 310
Sorex
ambiguus 5. 371
antiquus 5. 371
araneus fossilis 5. 224, 371
coniformis 9. 430
Desnoyersanus 5. 224
exilis 5. 371
fodiens 5. 224
fossilis 5. 371
Sansaniensis 5. 224
Sorex
similis 6. 489
Sorictis
elegans 5. 229
lepthorhyncha 5. 229
Soritida
(fam.) 5. 754! ff.
Soritina
(fam.) 5. 618!
Sorites
gen. 5. 617, 618!, 755; 7. 227
complanatus 4. 737
orbiculus 5. 617
Soroidea
(fam.) 5. 754! ff.
Sosibyus major 5. 123
minor 5. 123
Sotzka 1. 740
Soulèvements 1. 100
Sowerbya
gen. D'O. 6. 495, 497; 8. 128
crassa 3. 115; 8. 486
Spadait 1. 204*
Sparganum
gen. 6. 628!
aneimioides 6. 626
giganteum 6. 626
maximum 5 240; 6 626
minus 5. 240; 6. 626
Spalacodon 1. 713
Spalacotherium
gen. 4. 620; 9. 243*
tricuspidens 5. 238!
Spalax diluvii 9. 862
typhlus 6. 111
Spalten-System
der Erdrinde 5. 303!ff., 641 ff., 769 ff.
Spaltungs-Thäler 1. 798
Spaniodon
gen. 3. 108
Blondeli 3. 108
elongatus 3. 108
Sparganium 0. 631
Acheronticum 2. 760, 994; 3. 503; 5. 638, 639
Brauni 5. 639
latifolium 0. 503; 2. 760, 994; 3. 503
latum 2. 753, 994; 3. 503
Oeningense 0. 503; 2. 760; 3. 503; 5. 638
Sparganium
stygium 5. 639
Valdense 5. 639
Sparnodus
elongatus 5. 380
macrophthalmus 5. 380
micracanthus 5. 380
ovalis 5. 380
Sparsiporina
gen. 4. 116!
Spartocerus
insignis 3. 873
maculatus 3. 873
Spatangen
-Kalk 0. 305, 486
-Kalkstein 4. 357
Spatangidae
(fam.) 7. 767
Spatangus
acuarius 4. 762
ananchytoides 7. 748
argillaceus 4. 655
bicordatus 7. 852
Bituricensis 7. 748
bufo 0. 293
canaliferus 7. 859
carinatus 4. 35
cor-anguinum 0. 297; 1. 709; 5. 42; 7. 748²
cor-marinum 7. 748
cor-testudinarium 7. 748
cordatus 4. 762
cordiformis 3. 380
crassissimus 6. 101
depressus 7. 747; 8. 874
Desmaresti 6. 101
excentricus 3. 380
fossarius 3. 380
gibbus 7. 748, 859
Hoffmanni 3. 348; 6. 101
intermedius 4. 310
De Koninckl 6. 101
laevis 0. 392
neglectus 4. 763
Omali[us]i 4. 761
ovalis 0. 170; 7. 852
placenta 4. 762
punctatus 7. 748
purpureus 3. 104; 4. 762, 763
pusillus 4. 761, 762
pustulatus 4. 526!

Spatangus
regina 3. 104; 4. 762
Requieni 7. 748
retusus 0. 230, 392, 490, 735; 3. 192; 7. 481
rostratus 7. 748
suborbicularis 3. 86
ungula 3. 165
Spatheisenstein 1. 702, 703; 4. 809*
-Lager 5. 715
pathobatis
Bugesiacus 4. 382
mirabilis 7. 367
spp. 9. 764
Spathodactylus
gen. 8. 381!
Neocomiensis 8. 381!; 9. 372
Speckstein 0. 707!; 1. 204*, 390*, 401*, 404, 406; 2. 521; 4. 70, 180!, 346; 9. 587
pseudomorph nach Feuerstein 1. 710
-Knollen 1. 709
-Lager 5. 200
Specular schist 9. 741*
Speerkies 6. 192*
Speeton-clay 3. 811; 4. 508, 642; 5. 159; 7. 480, 659, 671
Speise (Mineral) 2. 491
Speiskobalt,
faseriger 1. 590; 5. 70! 71!, 79; 6. 43!, 443!
Spelearctos gen. 5. 228
Spermophilus
Ponticus 9. 862
superciliosus 5. 224, 371
sp. 6. 599; 7. 872
Spessartin 8. 77!
Sphaera gen. 6. 864
corrugata 1. 738
Madridi 1. 486; 2. 230; 4. 766
Sphaerapus
gen. Hitchc. 9. 869
larvalis 9. 869
magnus 9. 869
Sphaerechinus gen. 7. 122 9. 255
Sphaereda 0. 638
Sphaerexochus
gen. 0. 779, 785; 1. 508; 3. 488; 6. 224
cephaloceras 9. 121, 864
clavifrons 1. 508; 4. 501
conformis 9. 121
cranium 9. 864
deflexus 9. 121
hexadactylus 9. 121
juvensis 4. 501; 6. 116
minutus 9. 121
mirus 4. 501; 9. 121
pseudo-hemicranium 9. 864
spp. 4. 493
Sphaeria areolata 6. 757
atomica 9. 873
Brauni 5. 637; 9. 122
ceuthocarpoides 5. 637
increscens 3. 502; 5. 637
interpungens 5. 637
intumescens 3. 502
Italica 9. 117
Kunkleri 5. 637
muricata 3. 745
Populi-ovalis 3. 502; 5. 637
Populi-transversae 2. 760; 3. 502
punctiformis 3. 502; 5. 637
Secretani 5. 637
Trogi 5. 637
spp. 0. 502; 6. 331
Sphaerites 0. 626
microstigma 3. 225
perforans 3. 225
regularis 2. 753
scutatus 6. 637
Sphaerococcites 0. 626
alcicornis 4. 378
Bollensis 6. 545
caespitosus 8. 640
chondriaeformis 2. 886
cornutus 0. 116
dentatus 2. 890
flabelliformis 3. 510
globiferus 7. 777
lichenoides 2. 276, 890; 6. 375
membranaceus 3. 510
Meyrati 8. 640
Sphaerococcites
Mohli 0. 116
serra 2. 890
Sphaerococcus crispiformis 5. 637
Sphaerocrinus
gen. 3. 238!
geometricus 3. 238; 6. 374; 7. 860
Sphaerocystites
gen. 9. 236!
spp. 9. 236
Sphaerodus
gen. 3. 123*
angulatus 8. 869
annularis 1. 183
cinctus 1. 183
gigas 1. 183
globulosus 9. 124
Kergomardius 8. 869
Lejeuneanus 8. 869
lens 8. 869
minimus 8. 352
neocomiensis 5. 234; 8. 382; 9. 124
poliodon 2. 999
truncatus 8. 869
spp. 9. 764
Sphäroedrisch 4. 769
Sphäroide von Sandstein in Sandstein 5. 172
Sphaeroidina
gen. 5. 755
Austriaca 2. 255; 7. 273!, 309, 498
variabilis 7. 498
Shaeroma Gastaldii 2. 1000
Sphaeronites
aurantium 4. 234; 5. 852
Leuchtenbergi 4. 233ff.
militarius 4. 378
pomum 4. 238
tessellatus 6. 115; 7. 766
Sphaerophorum
coralloides 3. 745
Sphaerophthalmus
spp. 4. 493; 6. 223
Sphärosiderit 1. 391*, 398*, 558, 564; 2. 56, 517, 528, 847!; 3. 142; 5. 166*; 6. 185, 579; 7. 77; 8. 468!
thoniger 2. 768

Sphärosiderit
zerlegt 2. 331!
Sphärulit 6. 195!
Sphaerulites
gen. 1. 758!, 3. 240*
calceoloides 1. 757!
Faujasi 8. 744
foliaceus 6. 384
Hoeninghausi 9. 177
Sphagebranchus
formosissimus 5. 380
Sphagodus gen. Eichw. (non Ag.) 8. 113
obliquus Eichw. 5. 865; 8. 113
pristodontus 3. 629
Sphalmopteris 0. 628
Sphargis pseudotracion 1. 493; 3. 628; 5. 232
Spheconia brevipes 5. 123
Sphen 2. 877, 879; 3. 262, 680; 4. 276 ff.
Sphenia gen. 6. 858
angulata 7. 507
cylindrica 7. 507
spp. 7. 632
Sphenocephalus fissicaudus 9. 494
Sphenocrinus 7. 633
Sphenoderia
gen. 5. 755
Sphenodon gen. 4. 111
Sphenodus
longidens 1. 184
planus 8. 383
Sabaudianus 8 383; 9. 372
spp. 5. 234; 9. 361, 764
Sphenoglossum
quadrifolium 9. 752
Sphenomit 2. 615
Sphenophora crassa 7. 776
Ettinghauseni 7. 776
gracilis 7. 776
Sphenophyllites
oblongifolius 1. 476
Schlotheimi 1. 476; 6. 97
Sphenophyllum 0. 627
angustifolium 1. 476; 5. 629
bifidum 1. 476; 5. 629
dentatum 5. 629; 6. 97
emarginatum 5. 629; 6. 97
erosum 5. 629; 6. 97
fasciculatum 9. 752
Sphenophyllum
fimbriatum 5. 629; 6. 97
furcatum 5. 243
longifolium 1. 476; 5. 629
majus 5. 629
microphyllum 5. 629
oblongifolium 5. 629
quadrifidum 5. 629
saxifragaefolium 1. 476; 5. 243, 629; 6. 97
Schlotheimi 1. 476, 609; 3. 121; 5. 97, 629[3]; 6. 97[2]
speciosum 9. 752
taxifolium 8. 159
spp. 9. 379, 380
Sphenopterideae (fam.) 5. 240; 9. 380!
Sphenopteris 0. 627
acuta 5. 629
acutiloba 6. 97
acutifolia 6. 97
Aegyptiaca 9. 751
alata 5. 629
allosuroides 5. 629
ambigua 5. 630
anthriscifolia 1. 610; 2. 890
artemisiaefolia 0. 91 7. 113
Asplenites 5. 629
asplenioides 5. 629; 6. 97
Beyrichana 2. 890; 5. 243
bidentata 5. 629
bifurcata 6. 98
bipinnata 8. 503
botryoides 6. 97
Bronni 5. 629
caryophylloides 5. 629
caudata 5. 629
confluens 5. 630
coralloides 5. 629
cristata 5. 629
debilis 6. 97
delicatula 6. 97
devonica 5. 240; 6. 626
dichotoma 6. 544; 6. 666
dissecta 9. 131
distans 5. 243
Dubuissoni 5. 629
elegans 5. 243; 5. 629[3]; 6. 97
flexuosa 5. 629
formosa 5. 629
Sphenopteris
furcata 5. 629
geniculata 5. 629
Göpperti 0. 112; 2. 886
Gravenhorsti 5. 629
Gutbierana 5. 629
Gutbieri 6. 97
Haidingeri 3. 121
Hallana 2. 890
Hoeninghausi 5. 243, 629; 6. 97
hymenophylloides 7. 113
imbricata 1. 610; 2. 890; 5. 240; 6. 626
integra 1. 476
intermedia 3. 121; 9. 849
irregularis 5. 629; 6. 97; 8. 201
Jugleri 2. 886
Kirtlandi 9. 826
laciniata 5. 629
lanceolata 5. 629; 6. 97
latifolia 1. 476; 5. 629
Lesquereuxi 9. 826
linearis 6. 97
lobata 5. 629
longifolia 2. 886
macilenta 5. 629
Mantelli 2. 886
meifolia 6. 97
membranacea 5. 629
microphylla 5. 629
minuta 5. 629
nummularia 5. 629
Naumanni 8. 503
obtusiloba 2. 890; 6. 97, 253, 254
opposita 5. 629
pachyrrhachis 2. 280, 890, 6. 375
parviflora 9. 826
petiolata 2. 280, 890; 5. 240; 6. 375, 626
Phillipsi 0. 112; 2. 886
platyrhachis 7. 113
quadridactylites 5. 629
refracta 2. 890; 3. 161; 5. 240; 6. 626
rutaefolia 5. 629
Schlotheimi 5. 629
Sillimani 2. 886
simplex 9. 826
stipulata 5. 629
stricta 7. 113

Sphenopteris
tenuifolia 5. 629
tenuissima 6. 97
tetradactyla 5. 629
trichomanoides 5. 629
tridactylites 0. 667; 5. 629; 7. 113
trifoliata 3. 121; 5. 629
uncinata 9. 826
virgularis 9. 149
spp. 1. 382; 5. 488; 9. 379, 380
Sphenosaurus
clavirostris 0. 746
Sternbergi 5. 756
Sphenothallus
angustifolius 2. 890
latifolius 2. 890
Sphenotrochus 2. 115
flabellum 4. 867
Sphenozamites gen. 6. 617
Sphinctolobium simile 6. 506
Sphinx Schroeteri 0. 19*
Sphyraena Bolcensis 5. 380
maxima 5. 380
speciosa 7. 856!
Sphyraenodon major 7. 115
Sphyraenodus sp. 9. 749
Sphyrna denticulata 0. 868
lata 0. 868; 1. 254
plana 9. 361
prisca 0. 868; 1. 183
Rameti 8. 870
Spiculae 8. 451
Spiegel-Höhe der Meere 5. 472
Spiessglanz-Oxyd 2. 788
Spinatus-Bett 6. 456
Spinax major 5. 255
marginatus 9. 361
primaevus 3. 108
rotundatus 9. 361
Spilit 1. 565; 2. 366; 3. 456!; 5. 177; 7. 357*; 9. 657
Spinell 0. 457!; 1. 692*, 694, 696; 2. 521 ff., 877, 879; 3. 263; 5. 826
künstlich 5. 215
Spinigera gen. 3. 235!
longispina 6. 852
Spinnen 6. 764
fossile 1. 375
Spinopora
gen. 3. 109
Spiraea 0. 637
Spiricella gen. 7. 761
Spirifera Sow. vidr. Spirifer
Spirifer aculeatus 6. 373; 508; 7. 220
acuticostatus 4. 764
acutus 5. 874
aequali-aratus 6. 373
alatus 4. 489, 504, 747; 6. 117; 7. 223, 381, 382; 8. 608
ambiguus 6. 117
Anossoffi 9. 847
aperturatus 0. 379!; 2. 192; 7. 220
Archiaci 0. 243; 1. 68, 609; 4. 504; 5. 384; 6. 373, 508; 8. 738; 9. 847
arcticus 9. 222
Arduennensis 6. 508
auriculatus 6. 373
Baptistai 3. 103
beta-calcis 6. 744
Beyrichanus 5. 873
bifidus 1. 225; 6. 373
biforatus 6. 117
bilobus 3. 344
Bischofi 8. 753
bisulcatus 5. 873; 6. 117, 601
Blasiusi 7. 382
Bouchardi 0. 857; 1. 68; 2. 340; 3. 103, 816; 6. 501
Cabanillasi 2. 340
Cabedanus 2. 340
calcaratus 3. 813, 814; 6. 368, 373; 8. 738
cameratus 8. 766; 9. 824, 827
canaliferus 0. 379!; 6. 508
carinatus 6. 508
curvatus 2. 936
Cedarensis 6. 373
Chechiel 5. 384
cheiropterus 5. 874
Chilensis 0. 481; 3. 210
Clannyanus 7. 223
comprimatus 3. 817
concentricus 6. 117, 508
connivens 6. 508
convolutus 4. 747
costato-concentricus 5. 873
Spirifer
crassus 6. 601
crispus 2. 108; 3. 344; 4. 85; 5. 873, 874; 6. 117, 508; 8. 753
cristatus 3. 128, 778; 4. 119, 747; 6. 117; 7. 382; 8. 727
cultrijugatus 2. 340, 928, 936; 3. 817; 6. 79, 205, 209, 373, 508; 7. 456; 8. 753
curvatus 6. 508
curvirostris 7. 382
cuspidatus 1. 409, 419; 3. 309; 5. 874; 6. 117; 508, 606; 7. 57, 342
cyrtaena 6. 117; 8. 594; 9. 66
Davidi 3. 102
Davidsoni 6. 508
decorus 6. 117, 125
deformatus 5. 852
dentatus 6. 117
disjunctus 0. 243; 3. 813, 814; 5. 322 ff., 384; 6. 209, 210, 373
distans 5. 874
duplicosta 5. 873
duplicostatus 6. 117
ellipticus 6. 117
Emmrichi 4. 87, 764; 9. 629
euryglossus 6. 508
expansus 6. 117
Ezquerrai 2. 340
fallax 8. 753
fasciculata 3. 211; 6. 117
Forbeseyi 7. 116; 9. 827
fragilis 0. 99; 5. 479; 6. 245; 9. 359
Gailloni 6. 373
giganteus 6. 373
glaber 1. 382, 608, 609; 2. 108; 3. 815; 4. 504; 5. 873, 874; 6. 117, 508; 7. 594
glabristria 6. 117
globularis 6. 117
grandaevus 6. 117
grandicostata 3. 211; 6. 117
Greeni 3. 103
gregarius 6. 117

Spirifer
Homaliusi 3. 103
Hartmanni 3. 210
Haueri 4. 764; 6. 456; 9. 629
Hercyniae 8. 753
heteroclytus 2. 192, 340, 936; 3. 103; 6. 117, 373, 501, 508; 8. 738, 754
hystericus 4. 747
Ilminsterensis 3. 210
imbricato-lamellosus 6. 373
imbricatus 3. 310!, 318; 5. 874; 6. 117; 9. 629
insculptus 5. 873; 6. 117
insularis 6. 117
intermedius 6. 508
Jonesanus 7. 381, 382
Jungbrunnensis 4. 764
Kentuckyensis 6. 736; 9. 827, 849²
laevicosta 6. 117, 508; 8. 753
laevigatus 2. 192
Lamarcki 9. 847
laminosus 6. 117
Leidyi 7. 116
lineatus 5. 873, 874; 6, 117; 8. 711; 9. 827, 849, 850*, 851
linguifer 6. 373
linguiferoides 0. 481; 3. 210
Lonsdalei 6. 373
lynx 2. 981; 3. 340; 5. 853; 6. 117; 7. 387, 388, 608; 8. 269, 271
macropterus 0. 276, 281, 282; 1. 105, 224; 2. 108, 581, 583, 925, 936; 3. 817; 6. 79, 309, 373, 508; 7. 220², 456
macrorhynchus 6. 508
Marionensis 6. 736
medianus 6. 730
Mentzeli 6. 245; 9. 359
mesolobus 3. 210
mesogonius 5. 873
Meusebachanus 0. 102;

Spirifer
Meusebachanus 7. 491; 8. 493; 9. 849, 850*, 851
micropterus 2. 192
minimus 6. 117
minutus 4. 746
Mosquensis 0. 243; 1. 608; 7. 220, 373, 374, 472, 620
mucronatus 0. 857
multiplicatus 7. 381, 382; 4. 747
Münsteri 3. 210; 4. 87, 88, 764; 5. 219; 6. 456; 7. 617; 9. 629, 852
muralis 6. 373
Murchisonanus 5. 384
Murchisoni 5. 489
Norwoodanus 7. 863
nudus 6. 256, 373, 508
oblatus 2. 108
octoplicatus 3. 210 4. 747, 764; 5. 874; 6. 117, 508, 736
oolithicus 7. 483
Orbelianus 8. 738
ornithorhynchus 6. 117
ostiolatus 2. 192, 925, 936
ovalis 5. 719; 6. 117; 7. 342
Paillettei 2. 340
paradoxus 6. 117, 373, 501, 508
paucicostata 3. 211; 6. 117
peculiaris 6. 736
pectinifer 6. 117; 8. 766
Pellicoi 2. 340, 936
percrassus 6. 117
permianus 4. 747; 7. 381, 382
pinguis 3. 210; 6. 117
pisum 3. 344
plano-convexus 6. 736; 8. 766; 9. 849
plebejus 6. 508
plicatus 2. 108
pollens 8. 753
punctatus 3. 210
pyramidalis 3. 310!, 318; 4. 764; 6. 373, 508
quadriplicatus 6. 373

Spirifer
radiatus 3. 344; 6. 117 8. 855
reclinatus 3. 308!, 318
recurvatus 6. 117
rectinatus 9. 629
regulatus 7. 382
resupinatus 2. 108
reticulatus 3. 210
rhomboidalis 6. 117
Rojasi 2. 340; 6. 501
De Roissyi 6. 117
rostratus 0. 99, 149, 243; 1. 337; 2. 343; 3. 210, 617; 4. 87, 88; 546, 764, 852; 6. 208, 217, 496, 730; 7. 210; 8. 226; 9. 629
rotundatus 4. 546; 5. 873; 7. 220
Rousseaui 3. 103, 617
rugulatus[osus] 5. 873, 874, 875
Saranae 7. 373
Schrencki 7. 374, 382
Selkeanus 8. 753
sella 6. 256
semicircularis 5. 873; 6. 117
Semenowi 8. 738
semiplicatus 9. 850
semireticularis 6. 79
sericeus 6. 256; 8. 753
sexradialis 6. 117
similis 6. 117
simplex 2. 192; 6. 373
sinuatus 3. 344
speciosus 2. 108, 192, 581, 936; 3. 814; 6. 117, 209, 373, 508; 8. 753
spinosus 7. 116, 863
spurius 6. 226; 8. 753
squamigerus 6. 117
Strangwaysi 7. 373
striatulus 0. 284, 508
striatus 0. 380; 1. 609; 4. 60, 504; 5. 727, 873; 6. 117, 601; 8. 710
striolatus 2. 108
subconicus 5. 874; 6. 508
subcuspidatus 2. 936; 6. 508
sublaevis 6. 256

Spirifer
subradiatus 1. 382
subrotundatus 6. 117
subsinuatus 6. 256; 8. 753
subspeciosus 2. 340; 3. 103; 6. 501
subspurius 6. 117
sulcatus 3. 344; 6. 226
symmetricus 6. 117
tenticulum 6. 373, 501
Tessoni 6. 456
trapezoidalis 6. 117², 226, 508
triangularis 5. 873
Trigeri 6. 501
trigonalis 5. 873; 6. 117
trisulcosus 5. 873
tumidus 0. 481; 1. 316, 337; 3. 210; 4. 82; 6. 117, 208, 217; 8. 226; 9. 17 ff.
uncinatus 2. 285, 288; 3. 167; 4. 204, 555, 764; 5. 176, 178; 9. 629
undecimplicatus 6. 256
undifer 6. 373
undiferus 2. 192; 6. 508
undosus 6. 508
undulatus 3. 128. 770; 4. 119, 747; 7. 223, 382
unguiculus 2. 108
Urei 5. 874; 6. 117
Verneuili 1. 225; 2. 340; 3. 817; 4. 364; 5. 322ff., 384, 489; 6. 117, 209, 373, 501, 508; 7. 220, 454ff.; 8. 738
verrucosus 0. 150; 2. 285, 288; 3. 210; 4. 764; 6. 742; 7. 6, 10, 11; 9. 23
Walcotti 0. 591; 2. 92, 285, 288; 3. 210, 309; 4. 370, 852; 6. 208, 217; 7. 210
Walferdini 3. 103
spp. 5. 252
Spiriferen-Kalk (des Zechsteins) 3. 770!
Spiriferen -Sandstein 1. 224; 2. 585; 3. 817; 6. 255, 368, 369
Spiriferidae (fam.) 3. 256!; 4. 60!, 504
Spiriferina
cristata 4. 504; 7. 637
Davidsoni 5. 509
fragilis 6. 730; 9. 359
gregaria 7. 615; 9. 477
Hartmanni 4. 764
Mentzeli 6. 730
multiplicata 7. 637; 9. 761
Münsteri 4. 504; 5. 509
octoplicata 3. 210; 4. 764
rostrata 4. 60, 504, 764
concentrica 4. 60, 504; 6. 373
Deslongchampsi 5. 502
gracilis 6. 373
hirsuta 7. 863
nux 5. 502; 9. 629
oxycolpos 4. 87, 764; 5. 219; 7. 617; 9. 629
pectinifera 4. 504 7. 223, 637; 8. 727
plano-sulcata 5. 873
radialis 5. 874
Roissyi 4. 504; 5. 873, 874
squamigera 5. 873
Stockmayeri 5. 502
Tessoni 4. 504
trigonella 3. 222; 6. 245, 730
undata 6. 381
Spirigerina
cuneata 6. 117
desquamata 6. 117
didyma 8. 594
Mantiae 6. 117
marginalis 6 117
ovalis 6. 373
radialis 6. 117
reticularis 6. 117, 374; 8. 594²; 9. 66
Spirilla spp. 6. 477
Spirillina
pusilla 9. 761
spp. 4. 744
Spirocerium gen. 8. 632*
Spirocerium
priscum 8. 632
Spirodus
gen. 8. 509!
regularis 8. 509
Spiroidina
variabilis 6. 757
Spirolina
gen. 5. 755; 7 377
spp. 2. 511*
vdr. Spirulina
Spiroloculina
gen. 5. 755
alata 3. 671!
cretacea 4. 867
limbata 6. 757
rostrata 2. 255
Sandbergeri 3. 671!
spp. 5. 755
Spiropitys
gen. 2. 895!
Zobelana 2. 894, 986; 3. 226
Spiroplecta gen. 5. 755
Americana 7. 750
profundissima 5. 471
Spiropleurites
spp. 4. 611
Spiropora
abbreviata 5. 634
Bajocensis 5. 635
bathonica 5. 635
Bessinensis 5. 635
caespitosa 5. 634
Calloviensis 5. 635
capillaris 5. 634
compressa 5. 635
elegans 5. 634
laxipora 5. 635
rhomboidalis 5. 635
Sarthacensis 5. 635
straminea 5. 634
subirregularis 5. 635
Tessoni 5. 634
tetragona 5. 635
tetraquetra 5 635
Thorenti 5. 475
Spirorbis
ammonius 2. 929; 6. 370
anfractus 2. 166, 170, 171
annulatus 7. 863
globosus 4. 745
gracilis 6. 370
helix 4. 745
Hoeninghausi 5. 384
laevigatus 9. 361

Spirorbis
lituites 9. 361
nodulus 6. 496
omphaloides 4. 745; 5. 384
orbiculostoma 8. 766
permianus 4. 118, 745; 7. 223
planorbiformis 2. 166, 170
subcarinatus 2. 166. 170
tenuis 6. 115
Valvata 6. 245; 8. 766; 9. 170, 359
Spirula gen. 4. 852
Spirulina
denticulata 1. 496
grandis 4. 867
Humboldti 2. 253; 5. 435
irregularis 4. 867
simplex 7. 497
sulcata 1. 496
Spirulirostra
gen. 4. 853
n. spp. 1. 576!
Spodumen 3. 53!: 8. 685, 703!; 9. 586
Spondylis
spp. 3. 105
Spondylobolus
gen. 3. 216!
craniolaris 3. 216; 6. 118
Spondyluri
(Pisces) 3. 116!
Spondylus
affinis 2. 168
Aonis 1. 101
asperulus 2. 155; 3. 86, 369, 606; 6. 93, 739; 8. 874
bifrons 3. 606; 7. 502; 9. 125
Brunneri 4. 250
comatus 9. 359
cisalpinus 0. 736; 3. 606
comptus 0. 99; 2. 229; 3. 26; 6. 245, 363
dumosus 0. 724
Dutempleanus 1. 730
Estrellensis 7. 853
gibbosus 2. 155, 168, 171
Spondylus
Goldfussi 4. 746; 7. 637; 8. 373
horridus 3. 606
inaequistriatus 4. 355
liasinus 6. 496; 8. 643
limoides 3. 606
lineatus 5. 728; 7. 787
multistriatus 3. 606
orbicularis 3. 318
obliquus 4. 555, 830, 835; 6. 218; 7. 617, 690, 695; 8. 4
paucispinatus 3. 606
Quadalupae 0. 101
quinquecostatus 5. 595
radula 3. 606; 9. 844
rarispina 1. 764; 3. 369, 606; 6. 93, 739; 7. 229
subspinosus 2. 154
spinosus 1. 420, 139, 140; 2. 154, 168, 171; 4. 557; 5. 364, 591, 623; 7. 787; 8. 850, 874
striatus 7. 785; 8. 474; 9. 228
tenuistriatus 1. 415, 419
tertiarius 1. 759
tuberculatus 2. 229
velatus 1. 486; 2. 229, 349; 4. 765
spp. 4. 250; 8. 384
Spongarium 6. 114
aequistriatum 6. 114
Edwardsi 6. 114
interlineatum 6. 114
interruptum 6. 114
Spongia
arteriaeformis 0. 728
floriceps 0. 170
inciso-lobata 1. 757
Ottoi 2. 896
Saxonica 1. 140; 2. 896
-Nadeln: Fels-bildend 0. 472
Spongiae 9. 464
Spongiaria 7. 230, 233
Spongien 7. 89
Spongiolithis (Spongol.)
avicularis 0. 249
fustis 0. 249
robusta 0. 249
trianchora 0. 249
Spongiten-Kalk 7. 155
Spongites 2. 860*
irregularis 4. 514
radiciformis 5. 613
Saxonicus 6. 640
Spongitien
(étage) 8. 726
Spongodiscus spp. 4. 611
Spongolithen 8. 847
Spongolithis 9. 225, 464
acicularis 0. 473; 4. 613, 739; 5. 471; 6. 104
aculeata 6. 104
acus 0. 473; 6. 104
amblyogongyla 6. 104
amphioxys 6. 104
St. Andreae 6. 104
anchora 6. 104
anthocephala 6. 104
annulata 6. 104
apiculata 6. 104
aspera 0. 473; 4. 613; 6. 104
binodis 6. 104
caput-serpentis 6. 104
cenocephala 0. 473; 5. 471; 6. 104
clavus 6. 104
cornu-cervi 6. 104
crassipes 6. 104
crux 6. 104
eruca 6. 104
fistulosa 6. 104
flexuosa 6. 104
foraminosa 6. 104
fustis 0. 249, 473; 5. 471; 6. 104
gigas 4. 739; 6. 104
gladius 6. 104
hamus 6. 104
inflexa 6. 104
ingens 6. 104
jaculum 6. 104
lacustris 6. 104
malleus 6. 104
mesogongyla 4. 613; 6. 104
Neptunia 6. 104
nodosa 6. 104
obtusa 0. 473; 6 104
palus 6. 104
Philipp[in]ensis 4. 613
polyactis 6. 104
quadricuspidata 6. 104
ramosa 6. 104
robusta 0. 249; 4. 739; 5. 471; 6. 104

Spongolithis
septata 6. 104
setosa 6. 104
stellata 6. 104
trachystauron 6. 104
trianchora 0. 249; 6. 104
triceros 0. 473; 5. 471; 6. 104
uncinata 0. 473; 6. 104
uncus 6. 104
unguiculata 6. 104
vaginata 6. 104
verticillata 6. 104
spp. 4. 738; 8. 634
Spongophyllum 2. 122*
spp. 4. 497
Sporotrichites 0. 626
densus 3. 745
divaricatus 3. 745
heterospermus 3. 225, 745
intricatus 3. 745
Sportella
gen. 9. 125!
spp. 9. 125
Spreustein 3. 465; 6. 181*
Sprödglanzerz 1. 398*; 2. 532
Sprödglaserz 3. 475
Sprudelstein 1. 587!
Spur-Stein (Fährten) 4. 569!
Squalidae: Zähne 3. 110
Squalodon sp. 5. 632
Grateloupi 1. 493; 2. 998; 5. 231; 7. 110
Squalus
cornubicus 3. 81; 9. 361²
Squamulina
gen. 5. 749, 755
Squatina
acanthoderma 6. 486!
alifera 6. 487; 7. 367!
angelus 5. 614
(platyptera) 6. 487
speciosa 6. 825
spp. 9. 764
Staarsteine 5. 503!, 576
Stagonolepis
gen. 9. 875!
Robertsoni 3. 107; 9. 875!
Stahl 5. 694*
-Kobalt 1. 590*; 3. 182!
Stalagmium
gen. 6. 873
Stalagmium
aviculoides 3. 605
grande 3. 605
Stalaktiten 9. 417!
Stämme: versteinte 4. 862; 8. 90, 754
Stangeria
paradoxa 6. 606
Starhemberger
-Schichten 4. 87, 456, 763; 6. 747
Stassfurtit 7. 73!
Stauden-artige Structur von Kalk-Gebilden 0. 224
Stauria 2. 121*
Stauridae (fam.) 4. 497
Staurocephalus 6. 224²
gen. 0. 779, 785; 3. 488
Murchisoni 1. 509; 6. 116
spp. 4. 493
Staurogmus gen. 3. 487
Staurolith 0. 452; 2. 521ff.; 5. 181
Stauroneis
phoenicocenteron 0. 473
Zealandica 1. 229
Stauroptera
construens 4. 613
Staurotid 8. 579*
St. Cassian
-Formation 1. 328, 680; 2. 109; 3. 308
-Schichten 1. 134; 2. 456; 3. 168; 4. 456; 6. 361; 8. 88
s. Cassian-Schichten
Steatit 5. 822; 7. 836
Steffensia 0. 627
Silesiaca 5. 630
Steganodictyum
gen. 6. 125
gen. coral. 3. 110
Carteri 3. 110
Cornubicum 3. 110!
Stegilla
poacitarum 5. 637
Steginopora gen. 4. 117!
Steginoporidae (fam.) 4. 115!
Steguri (Pisces) 3. 116!
Stein-bildende Quellen 9. 510
Stein-bohrende Thiere 6. 999
Stein-Regen 3. 460!
Steine: wachsen 9. 446
Steinhaueria 0. 632
globosa 0. 115
oblonga 2. 753; 9. 501
subglobosa 1. 635; 3. 383
sp. 6. 506
Steinkohlen 2. 996p.; 4. 834; 6. 79, 446!; 7. 605, 716; 8. 78! 95, 361
Analysen 2. 329!
bildende Pflanzen 4. 243
in Koaks verwandelt 2. 85
im Erzgebirge 5. 600
der Perm-Zeit 8. 358
der Trias-Periode 8. 358, 741
des Unteroolithes 8. 597!
-Fauna 0. 103; 6. 108
-Felder 8. 587
-Flora 0. 257, 873; 5. 241; 9. 379²
um Saarbrück 5. 867
Sachsens 5. 628
von Stradonitz 3. 120
-Florula von Radnitz 6. 96
-Formation 0. 89, 732; 1. 475. 477; 2. 968; 3. 623, 760; 4. 73, 124p., 564; 5. 625; 6. 69, 79, 353, 368!, 446, 458, 474!, 542, 572, 583, 601p., 765; 7. 96, 194, 373p., 454, 459, 472, 590, 615², 620, 626p., 729, 835, 862gp.; 8. 92, 98, 115p., 159, 172, 201, 229, 239p., 334, 344, 350, 374p., 375p., 400p., 474, 493, 497, 555, 603, 612p., 625p., 710, 713; 9. 126p., 131, 148, 215, 220, 341, 343, 346, 379?506p., 532, 671, 683, 824, 825, 869p.
Amerika's 0. 711
der Apalachen 9. 848
Australiens 1. 726
in Bas-Rhin 3. 737

Steinkohlen
-Formation in Britisch -Amerika 9. 834
in Neuschottand 3. 511
in Illinois 9. 848
in Kentucky 9. 848
in Missouri 9. 849
der Nahe 3. 217
Rocky Mountains 3. 613
im Selke-Thal 0. 91
zu Stockheim 3. 1
-Fossilien zwischen krystallinischen Gesteinen 1. 238
-Gebilde 1. 350; 2. 72
-Gebirge 2. 98!; 3. 574 ff.
Russlands 1. 607
Spaniens 1. 37
-Insekten 2. 768
-Lager 1. 466; 3. 324
Nordamerikas 5. 528!
am Ural 5. 460
-Lagerstätten 7. 590
-Reptilien 4. 422
-Verbreitung 4. 107
Steinmark 1. 202!; 2. 535; 6. 48; 7. 719!; 9. 563!, 586
Steinmannit 9. 306!
Steinöl 2. 298
Steinsalz 0. 482ff., 614!; 2. 515; 3. 65, 721!; 5. 74!; 6. 692!, 714, 845; 7. 463, 500
-Bildung 4. 845
-Krystalle 3. 682
-Lager 1. 325; 2. 14; 3. 324, 382; 5. 207, 365; 6. 692, 697
in Polen 5. 463
in Sachsen 5. 477
-Lagerstätten 2. 972; 6. 88
-Vorkommen 7. 500
in Serbien 8. 87
Stellaster spp. 3. 109
Stelleriden 9. 365
Stellipora
gen. 2. 120; 5. 635
gen. sp. 2 125, 126!
Bosquetana 2. 126
formosa 2. 126
Huotiana 2. 126
Stellipora
lichenula 2. 126
Stellit 8. 471*
Stellocavea
bipartita 9. 120
cultrata 9. 120
Francquana 9. 120
trifoliiformis 9. 120
Stellonia rubens 4. 762
Stelloria 2. 117*
Stemmatodus
gen. 5. 486!
rhomboides 5. 486
rhombus 5. 486
Stemmatopteris 0. 628
peltigera 1. 476; 5. 630
Stenacanthus
nitidus 6. 609!; 7. 368!
Stenaster gen. 9. 636
pulchellus 9. 636
Salteri 9. 636
Steneodon gen. 5. 230
Steneofiber
castorinus 5. 224, 371
Eseri 5. 371
Larteti 5. 371
Nebrascensis 7. 115, 246!; 8. 376
Nouleti 5. 371
Viciacensis 5. 224
spp. 8. 877
Steneosaurus
Bronni 5 495*
elegans 5. 426, 767; 9. 109, 110
rostro-major 9. 109
rostro-minor 5. 233, 743
Steneotherium
gen. sp. 5. 224
Stenoceras gen. 6. 371
Stenochelus
triasicus 8. 504
Stenodactyus
gen. Hitchc. 9 868
curvatus 9. 868
Stenodon gen. 5. 230, 372
Stenonia
gen. 0. 632; 9. 255
Ungeri 2. 753
Stenopelix Valdensis 7. 533!
Stenopora 2. 120
columnaris 4. 119, 744; 5. 498
crassa 4. 744; 5. 498; 7. 374
Stenopora
fibrosa 6. 113
granulosa 6. 113; 7. 105
incrustans 4. 744; 5. 495
indepedens 4. 744; 5. 498
inflata 6. 113
Mackrothi 4. 119, 489, 744
spinigera 5. 498; 7. 374
tumida 6. 113
Stenorhynchus sp. 5. 621
Stenosaurus (richtiger) statt Steneosaurus
Stenostoma
gen. pisc. 3. 109
crassum 8. 766
spinigerum 8. 766
Stenus prodromus 6. 503
Stephanida
gen. 6. 628!
duplicata 5. 240; 6. 626
gracilis 5. 240; 6. 626
spp. 6. 627
Stephanocoenia
elegans 5. 475 ff.
formosa 3. 582; 4. 867
gibbosa 2. 250
Meyeri 2. 250
Stephanocrinus
gen. 1. 496!
angulatus 1. 496
spp. 5. 248; 9. 236
Stephanodon
Mombachiensis 2. 303; 5. 229; 9. 427
Stephanometopon
gen. 5. 128!
granulatum 5. 127
Stephanophyllia 2. 119
sp. 1. 627
Stephanopyxis
apiculata 6. 103
appendiculata 6. 103
hispida 6. 103
Stephanoseris 2. 119*
Stephanosira
Europaea 0. 250
Steppen 8. 212
Sterculia acerites 4. 627
Labrusca 4. 877; 9. 375
laurina 9. 375
modesta 3. 505
tenuinervia 3. 505
Vindobonensis 2. 628

Stereocalamaeae (fam.) 6. 628!
Stereoceras
gen. 4. 248
Galli 4. 248
typus 4. 248, 757!
Stereodelphis
gen. sp. 5. 231
brevidens 2.998; 7.110
Stereognathus
oolithicus 7. 109, 383
Stereopsammia 1. 627; 2. 119*
Sternberger
Kuchen 3. 608p., 625; 7. 495
Sternbergia
gen. 8. 871*
transversa 6. 99
Sternschnuppen 2. 343
Sternsteine 5. 505
Sterope 0. 20*
Steropezoum
elegans 9. 867
ingens 9. 867
Stichostegia (fam.) 7.376
Stichopora
gen. 4. 115!
spp. 2. 125
Stichopteris
gen. 8. 503!
Ottonis 8. 503
Stictopora gen. 6. 114
Stigmaria
gen. 0. 629; 9. 804
anabathra 1.476; 2.891; 5. 631, 868; 6. 96, 99; 5. 240; 6. 627
conferta 6. 99
ficoides 0. 110, 257; 1. 608, 609; 2. 270, 891; 4. 243!; 5. 243, 631, 712, 868; 6. 96, 99, 375, 627; 8. 759; 9. 367!, 381
inaequalis 5. 243
sigillarioides 2. 891
stellata 1. 608
spp. 3. 511; 9. 379, 381
Stigmarieae (fam.) 5. 240
Stigmatocanna
gen. 2. 891!
Volkmannana 2. 890
Stigmatodendron
Ledebouri 1. 608
Stigmolepis gen. 8. 112
Oweni 8. 112
Stilbit 0.336!, 455!; 1.405*, 820*; 2. 526, 534; 4. 28*; 5. 184; 6. 11, 47!; 0. 94, 77!, 653
Stilpnomelan 0. 705!; 3. 174; 6. 347!
Stilpnosiderit 0 273; 2. 530; 4. 814
Stinkkalk 8. 608
Stinkstein 4. 449, 743
Stiperstones 9. 106, 339
Stipite 8. 597!
Stirechinus gen. 9. 255
Stockhorn-Kalk 4.356, 456
Stomatia
Buvignieri 3. 235
compressa 5, 501
spp. 6. 753
Stomatopora
antiqua 5. 633
Bouchardi 5. 634
Calloviensis 5. 634
compressa 1. 414, 419
Desoundini 5. 634
dichotoma 5. 633
dichotomoides 5. 633; 8. 358
intermedia 5. 634
pachystoma 6. 245
Terquemi 5. 634
Waltoni 5. 633
Stomechinus
gen. 7. 122; 9. 255
gyratus 8. 486
perlatus 8. 486
pyramidatus 7. 852
serialis 8. 486
Stonesfield-slate 8. 482
Stortodon
gen. 6. 364!
Liskaviensis 6. 363
Stotzen (Stein) 7. 86
St.-Peters-Sandstein 9. 341
Strahlkies 1. 391*. 398*, 399*; 5. 412, 824
Strahlstein 2. 521ff.; 4. 258; 8. 684; 8. 701!; 9. 84
Strakonitzit 4. 353!
Stramonita petrosa 7. 242
Strand-Gebilde 0. 80*
-Sandsteine 2. 91! 4. 201
Strangerites
gen. 6. 616, 618!
marantaceus 6. 618
obliquus 8. 358
vittatus 6. 618
Straparollus
acutus 6. 121
calyx 6. 121
carbonarius 6. 121
catillus 6. 121
costellatus 3. 760; 6 121
crotalostomus 6. 121
Dionysi 6. 121
glabratus 4. 850
nodosus 6. 121
pentangulatus 6. 121
pileopsideus 6. 121
planorbites 7. 223
pugilis 6. 121
subaequalis 5. 501
tabulatus 6. 121
Strassen 4. 850
Stratigraphie: Beziehungen zur Paläontologie 4.616
Stratiolites Najadum 5.639
Stratipes gen. 9. 868
latus 9. 868
Stratopeit 3. 61!
Streplopteria
gen. 3. 238!
laevigata 6. 119
pulchella 6. 119
Streichen der Gänge 9.216
Streifung der Gesteine 2. 350; 8. 82
Strephodes 2. 121
Austini 4. 85
gracilis 2. 989
Pickthorni 4. 85
pseudoceratites 2. 128
trochiformis 2. 128
undulatum 6. 255
Strephodus gen.
Craigensis 6. 114
gracilis 6. 114
helianthoides 6. 114
multilamellatus 6. 114
pseudoceratites 6. 114
trochiformis 6. 114
vermicularis 6. 114
vermiculoides 6. 114
Strephona Piedroana 7.242
Strephopteris 0. 628
ambigua 5. 630
Streptastraea
gen. 6. 376
longiradiata 6. 375

Streptelasma 2. 121*
gen. 6. 114
corniculum 8. 267, 594
spp. 5. 248
Streptorhynchus
pelargonatus 4. 119, 746; 7. 382
Streptospondylus
Geoffroyi 5. 233
Jurinei 5. 233
major 3. 214*
Streptothrix spiralis 3, 225, 745
Striata-Kalk 3. 11, 13, 23
Striatopora
gen. 1. 767!
flexuosa 1. 767
spp. 5. 248
Stricklandia
gen. 9. 758
brevis 9. 758
Canadensis 9. 758
Gaspiensis 9. 758
spp. 9. 758
Strictopora spp. 5. 248
Strigilla spp. 9. 125
Stringocephalen-Kalk 1. 225, 226, 4. 454; 6 209: 368
-Kalkstein 3. 817
-Schichten 6. 255
Stringocephalidae (fam.) 4. 60!, 504
Stringocephalus
brevirostris 6. 374
Buchi 3. 812, 814
Burtini 1. 225; 2. 108, 192; 3. 380!, 817, 4. 60, 504; 5. 322; 6. 79, 209, 373, 501, 508; 7. 457
dorsalis 6. 373
giganteus 4. 504; 6. 117, 373
hians 6. 373
Strobilites Bucklandi 2. 887
Strobilodus
gen. 3. 117, 118*
spp. 9. 764
Stroganowit 4. 440
Stromatopora 6. 113
concentrica 0. 731; 3. 344; 5. 854; 6. 374; 8. 262
dichotoma 4. 744
placenta 6. 113, 225
Stromatopora
polymorpha 2. 108, 192; 6. 113, 255; 7. 386, 455ff.; 8. 262
ramosa 8. 113
striatella 7. 386; 8. 262
verticillata 2. 989; 6. 113
spp. 5. 248
Strombastraea 2. 122
Strombites scalatus 3. 20; 6. 207; 7. 761
Strombodes 2. 121, 122*
emarciatum 6. 114
floriforme 6. 114
helianthoides 2. 122
incurvus 7. 232
Wenlockensis 6. 114
spp. 7. 104
Strombus
ambiguus 7. 635
arescens 3. 807
Bartoniensis 1. 716; 3. 604
Bonellii 3. 75; 9. 839
densatus 9. 498
dubius 7. 635
Fortisi 3. 604
giganteus 2. 163
gigas 4. 717
luctator 7. 635[3]
ventricosus 4. 874
spp. 6. 479
Ströme (Flüsse) 1. 455
Strömungen (See-) 2. 224!
Strongyloceros
intermedius 5. 373
Issiodorensis 5. 373
macroglochis 5. 373
Perrieri 5. 373
spelaeus 1. 680; 5. 373
Strontian
schwefelsaurer 1. 708; 3. 175; 7. 329
-Apatit 9. 191!
-Formiat 7. 76
-Schwerspath 1. 353!
Strontianit 2. 223! 4. 178* 5. 75; 6. 48
Strophalosia gen. 6. 636
gen. et spp. 6. 118
Cancrini 7. 223, 381, 382, 637; 8. 373, 374
excavata 4. 61, 119, 504, 746; 7. 381, 382, 637; 8. 373, 374
Strophalosia
Gerardi 4. 504
Goldfussi 4. 746; 7. 223, 382, 637; 8. 373[2], 374
horrescens 7. 382
lamellosa 8. 373[2]!
Leplayei 8. 844
Morrisana 4. 119; 504, 746; 7. 223, 381, 382 637; 8. 374
parva 4. 746; 7. 223, 381, 382; 8. 373
tholus 7. 374
Whitleyensis 7. 381
Stropheodonta
gen. 5. 252!
prisca 5. 248, 252
cfr. Strophodonta
Strophoconus
gen. 5. 755
oliva 4. 738
teretiusculus 4. 737; 7. 292!, 309
Strophodonta gen. 3. 213!
Strophodus
angustissimus 3. 17; 6. 745
elytra 6. 745
subreticulatus 5. 234; 8. 383
Strophomena
gen. 3. 212*
gen. et spp. 6. 118
aculeata 4. 746
alternata 4. 504; 8. 855
analoga 4. 504; 5. 873
depressa 6. 374; 8. 753, 855[2]; 9. 66
Donneti 4. 85; 9. 222
gigas 3. 111
laticosta 6. 374
nobilis 3. 111
obovata 8. 745
pecten 8. 594
piligera 6. 374
planumbona 4. 61, 504
simulans 3. 216
spinifera 4. 746
subarachnoidea 6. 374
taeniola 6. 374
ziczac 6. 374
Zinkeni 8. 753
Strophomenidae (fam.) 4. 60!, 504
Strophostoma
tricarinatum 3. 532

Strophostoma
spp. 8. 507
Strophostylus gen. 9. 755
Strosipherus gen. 8. 113
indentatus 8. 113
laevis 8. 113
serratus 8. 113
Struktur
der Gesteine 5. 829
-Gesetze: der Erde 7. 790
Struthiolaria
straminea 1. 229
Struveit 1. 51!; 7. 175*
Strygocephalus
vdr. Stringocephalus
Stubensandstein 9. 4
Stufenweise Entwicklung
der organischen Reiche
1. 628!, 631!, 633!
Sturio gen. 8. 760*
Sturzwälle
der Basalte 7. 28
Stylaraea
gen. 2. 119*; 3. 876
Stylaster gen. 2. 116*;
249!, 250
Stylastraea 2. 122
basaltiformis 6. 114
Stylaxis 2. 122*
Flemingi 6. 114
irregularis 6. 114
major 6. 114
Stylemys Nebrascensis
5. 115; 8. 376
Niobrarensis 9. 252!
Stylina 2. 117*
Bucheti 8. 591
crasso-lamella 0. 757
Grayensis 8. 591
Haimei 8. 591
inflata 8. 591
intricata 8. 591
Maillei 8. 591
Perroni 8. 591
Provincialis 0. 757
Renauxi 0. 764
speciosa 8. 591
striata 0. 764
tecta 7. 233
thyrsiformis 0. 764;
7. 233
spp. 2. 758
Stylocoenia 2. 117*
emarciata 3. 606;
5. 475; 7. 230
lobato-rotundata 6. 740
portlandica 8. 591
Stylocoenia
Taurinensis 6. 245
Vicaryi 3. 606
spp. 1. 627
Stylocrinus
gen. 6. 376!; 7. 860
scaber 6. 374
Stylocyathus
gen. 2. 115*; 7. 499!
turbinolioides 7. 499
Stylogyra 2. 116*
Stylolithen 0. 484, 485;
1. 819; 2. 21, 49;
3. 27
-Kalk 3. 13
Stylonurus gen. 9. 507
Pororiensis 6. 598
Stylophora 2. 251!
contorta 3. 606
raristella 2. 251
rugosa 2. 251
Stylophyllum
gen. 4. 872
polyacanthum 3. 582;
4. 869
Stylopora 2. 251
Stylosmilia 2. 116*
Stypticit 7. 582!
Styracodus gen. 7. 485
Styrax 0. 634
pristinum 2. 628;
3. 384
Styrechinus 7. 122
Subangularis-Bank 6. 742
Subapennin (das) 3. 73
Subapenninen
-Formation 0. 476;
3. 332; 9. 230
Subcarboniferous
limestone 7. 729
Subclymenia gen. 8. 617
Subfossile
Organismen 7. 183
Subherzynische
Gebirge 4. 201
Kreide-Formation 7. 641
Sublimirte
Mineralien 8. 218
Submarine
Hebungssysteme 5. 643
Subspezies
der Mineralien 3. 843
Substitution der orga-
nischen Formen 4. 607
Substitutions-Erscheinun-
gen: bei Gesteins-Meta-
morphosen 4. 262
Subulites gigas 8. 594
ventricosus 3. 343
spp. 5. 248
Succession der Mineral-
Bildungen 3. 388ff.
Succinea
amphibia 1. 760; 9. 475
elongata 8. 590
imperspicua 4. 864
minima 4. 249
Nagpurensis 9. 750
oblonga 3. 763; 4. 166;
9. 37, 199
Pfeifferi 5. 768
putris 3. 763
Süd-Amerika:
Geologische Karte 5. 90
Sudis gen. 3. 118*
Südstern (Diamant) 6. 842
Suessia gen. 5. 509!
costata 5. 509!
imbricata 5. 509!
Suessonien 3. 607;
5. 223 p.
Suillii (fam.) 0. 867
Sulcator arenarius 9. 874
Sulfoantimoniure
de nickel 6. 555
Sulphat-Silikat 1. 445
Sulphatischer
Eisensinter 8. 693!
Sumpferz 4. 721
Sumpfgas 1. 871
Sundvichit 8. 313*
Superga 9. 118
Supranummuliten
-Kalk 7. 501
Supranummulitische
Sandsteine 9. 470
Surface Geology 8. 81
Surfusion 4. 731!; 5. 454;
6. 588
Surirella
bifrons 0. 473; 4. 613
craticula 4. 613
euglypta 0. 473
gemma 0. 473
librile 0. 491; 4 613
multifasciata 0. 473
rhopala 4. 613
sigmoidea 0. 473
solea 0. 473
splendida 0. 473;
4. 613
striatula 0. 473
undata 4. 613
spp. 4. 737

Sus gen. 7. 867, 869; 8. 232!
Aethiopicus 8. 233
Americanus 5. 112; 6. 109; 8. 233
antediluvianus 5. 228; 8. 233
antiquus 6. 491; 8. 233
armatus 8. 232
Arvernensis 1. 504; 5. 228, 373
Belsiacus 5. 228; 8. 233
choeroides 3. 617; 5. 228; 8. 232; 9. 871
choerotherium 5. 228; 8. 232
collaris 8. 233
Doati 5. 228; 8. 232
Erymanthinus (Geoffr.) 4. 638; 5. 375; 7. 235, 370, 759; 8. 232
fossilis 4. 473
Hysudricus 8. 233
larvatus 1. 492; 5. 228; 8. 232
lemuroides 5. 228; 8. 233
leptodon 8. 232
Lockharti 5. 228; 8. 232
major 5. 228; 8. 233
mastodonteus 8. 233
ogygius 8. 232
palaeochoerus 0. 203; 1. 502; 3. 617; 6. 491; 7. 375; 8. 233
Papuensis 8. 232
penicillatus 8. 232
priscus 2. 998; 5. 228, 373, 624; 8. 233²; 9. 640
Provincialis 1. 492, 493; 2. 998; 5. 228, 373; 8. 233
Serresi 2. 998
scrofa 1. 502; 3. 766; 5. 228, 624; 8. 232
Simorrensis 5. 228; 8. 232
Sivalensis 8. 233
Soemmeringi 8. 233
Tapirotherium 5. 233; 8. 233
Sus
tener 8. 233
trux 8. 233
Wylensis 9. 430
Suspension 3. 805
vgl. Rhein- u. Donau-Schlamm
Süsswasser
-Bildungen
in der Jura-Formation 1. 466
tertiäre 1. 712
-Formation
tertiäre 4. 248
-Gebilde 4. 846; 5. 357; 9. 216
unter der Kreide 8. 847
zwischen Portland u. Neocomien-Formation 0. 490
-Jurabildungen 8. 597*
-Kalk 0. 355; 1. 43, 122, 503 p., 735; 2. 637 p.; 3. 130, 134!, 146; 9. 853
-Konchylien 2. 765; 3. 751
-Mergel, biolithischer 4. 612
-Mollasse 5. 636 p.; 6. 109
-Quarz 4. 213; 7. 636 p.
-Quarzgestein 0. 788
Sutton (Knochen) 0. 90
Suzanit 4. 353
Sycotypus
penitus 6. 753
Syenit 0. 495; 2. 357, 652, 863; 3. 552; 4. 301!, 302; 7. 357*, 361!, 737*; 8. 85, 339², 839; 9. 482
um Lyon 0. 74*
-Granit 7. 360!, 737*; 8. 339²
-Porphyr 4. 302!; 7. 357*, 361!, 737*
(Zirkonsyenit) 2. 712
Sylvanit 5. 347!
Symbolophora
microhexas 6. 103
micropentas 6. 103
microtetras 6. 103
microtrias 6. 103
Symmetrie
-Gesetz 4. 177
Symplocos
Casparyi 8. 498
elongata 8. 498
globosa 8. 498
Symphyllia
gen. 0. 758!; 2. 117*
bisinuosa 0. 759
macroreina 0. 759
Symphysurus
gen. 0. 778!, 785; 3. 487; 6. 224²
spp. 4. 493; 9. 504
Sympodium 2. 123
Synaphodus
gen. 5. 228; 6. 638
brachygnathus 5. 373
Gergovianus 5. 373
Synapta 8. 239
Synastraea
gen. 0. 763!, 765; 2. 118
agaricites 0. 765, 766; 3. 718
ambigua 0. 766
arachnoides 0. 766
Aransiaca 0. 766
boletiformis 0. 766
composita 0. 765; 3. 718
concentrica 0. 766
concinna 0. 766
conferta 0. 766
conica 0. 765
decipiens 0. 765
Defranceana 0. 766
discoides 0. 766
Firmasana 0. 765
flexuosa 0. 766
Genevensis 0. 766
geometrica 0. 766
Hennocquei 7. 210
lamello-striata 0. 766
Leunisi 0. 765
lobata 0. 766
Ludovicina 0. 766
media 0. 765
pseudomaeandrina 0. 766
Requieni 0. 766
rotata 0. 766
Savignyi 0. 766
superposita 0. 766
Teissierana 0. 766
tenuissima 0 766
textilis 0. 766
velamentosa 0. 766
Synbathocrinus
conicus 6. 115, 602, 762

Synbathocrinus
granulatus 0. 377
tabulatus 6. 233, 376; 7. 860
Tennesseae 0. 377
Syncardia
gen. 6. 628!
pusilla 6. 626
Syncladia
hypnoides 5. 93; 6. 500
Lusitanica 5. 98
virgulacea 4. 744; 6. 115; 8. 766
Syndosmya
alba 6. 859; 7. 506
prismatica 6. 859
spp. 6. 752; 7. 632; 8. 616
Synedra
acuta 4. 613
aequalis 0. 473
amphirhynchus 0. 473
Armoricana 0. 473
capitata 4. 613
entomon 0. 250; 4. 613
Gailloni 0. 473
lineata 6. 103
notata 0. 473
oxyrhynchus 0. 473
spectabilis 4. 613
tenuis 0. 473
ulna 0. 491; 4. 613; 6. 103
virginalis 0. 473
spp. 4. 739
Syngnathus
anguineus 6. 89
opisthopterus 5. 380
Synhelia 2. 116*, 249!, 250
gibbosa 2. 250; 4. 867
Meyeri 2. 250
Sharpeana 2. 250
spp. 1. 627
Synocladia
gen. 1. 489!
Synodontis
priscus 8. 587
Synthese
der Mineralien 9. 210
Syodon
Biarmicum 0. 874
Syphax gen. 5. 123
fuliginosus 5. 123
gracilis 5. 123
hirtus 5. 123
megacephalus 5. 123
radiatus 5. 123
Syphax thoracicus 5. 123
Syphoniotyphus
(Bryoz.) gen. 3. 109
Syringodendron 0. 629
complanatum 5. 631
cyclostigma 5. 631; 8. 401
pachyderma 5. 631
pes-capreoli 5. 631; 6. 99; 8. 401
striatum 6. 99
spp. 9. 381
Syringophyllum 2. 122
organum 8. 267
spp. 4. 497; 7. 104
Syringopora 2. 120*
bifurcata 6. 113; 8. 265
cancellata 7. 386; 8. 266
catenata 6. 113
fascicularis 8. 266
filiformis 8. 263
flabellata 7. 233
geniculata 6. 113; 9. 222
parallela 7. 373
ramulosa 6. 113
reticulata 8. 265; 9. 222
reticulosa 6. 113
spp. 2. 990; 5. 248; 7. 104
Syromastes
affinis 3. 873
Buchi 3. 873
coloratus 3. 873
Seyfriedi 3. 865, 873
System
der Fische 9. 381
der Haupt-Alpen 1. 94
des Hunsrück's 1. 94, 104; 3. 204!
der Niederlande 1. 96, 104
des Rheines 1. 94, 104; 3. 206!
der West-Alpen 1. 94
Systeme
der Gebirgsketten 4. 385 ff.
(Hebungs-) 3. 204!
-Nord-Englands 1. 94, 104
der Tatra 1. 94; 3. 208!
der Thiere 9. 363
Système
Ahrien 7. 219
Alaricien 0. 487 ff.
Système
des Alleghany's et des Monts Ozarks 5. 354
du nord de l'Angleterre 3. 206!
des Alpes occidentales 3. 209!
des Alpes principales 3. 209!
du Bocage 3. 205!
Bolderien 1. 620
des Ballons 3. 205!
des Belchens 1. 94, 104
Bruxellien 1. 620
calcareux inférieur 1. 105
calcareux supérieur de Tournay 1. 105
Campinien 1. 620
du Coast Range de Californie 5. 355
Coblenzien 7. 219
Condrosien 5. 719; 7. 219, 457
de la Côte d'or 1. 94; 3. 206!
des Deux-Montagnes et de Montmorency 5. 354
Devillien 7. 219
Diestien 1. 620
Eifelien 7. 219
épicrétacé 9. 470
de l'Erzgebirge 3. 206!
de l'Étna 3. 209!
du Finistère 1. 94; 3. 204!
du Forez 1. 94, 104, 238; 3. 205!
fucoidien 9. 470
Gédinien 7. 219
de l'Hèmus 3. 208
Hesbayen 1. 620
de l'île de Corse 3. 208!
de l'île de Sardaigne 3. 208!
de l'île de Wight 3. 208!
Landenien 1. 620
du Longmynd 1. 94, 104; 3. 204!
des Montagnes Laurentines 5. 354
des Montagnes rocheuses et de la Sierra Madre 5. 355

Système
des Montagnes vertes au méridien de la Nouvelle Angleterre 5. 354
de Montréal 5. 354
des Monts Katskill 5.354
des Monts Nôtre-Dame 5. 354
du Mont-Pilas 3. 206!
duMont-Viso 1.94; 3.207!
du Morbihan 1. 94, 104; 3. 204!
du Morvan 3. 206!
des Pays-Bas 3. 206!
du Pinde 3. 207!
de la Pointe Keewenaw et du Cap Blomidon 5. 355
Système
des Pyrenées 1. 94; 3. 208!
quarzo-schisteux inférieur 1. 105
quarzo-schisteux supérieur 1. 105
Revinien 7. 219
du Rilo Dagh 3. 208!
Rupelien 1. 620
Salmien 7. 219
du Sancerras 1. 94
Scaldisien 1. 620
de la Sierra de Mogoyon ou Blanca 5. 355
de la Sierra Nevada 5.355
de la Sierra de San Francisco et du Mont Taylor 5. 355
Système
du sud du pays de Galles 3. 206!
Taconic 5. 593!
du Ténare 1.94; 3.209
du Thüringer Walde 1. 94; 3. 206!
Tongrien 0. 95, 860; 1. 620
de la Vendée 1. 94; 3. 204!
du Vércors 3. 209!
du Vesuve 3. 209!
de Westmoreland-Hunsrück 1. 104, 106; 3. 204!
Ypresien 1. 620

T.

Täbinger
Sandstein 7. 93; 9. 7
Tabulata
(Coralliaria) 2. 120
Tachyaphaltit 3. 595!
Tachydrit 7. 715!
Tachylith 3. 174
Taconic
Slate 4. 124
System 5.593!; 6. 171
Taeniaster
gen. 9. 636
cylindricus 9. 636
spinosus 9. 636
Taeniodon
gen. 4. 755; 6. 249*
Ewaldi 6. 60; 9. 9
Taeniodus (Glir.)
curvistriatus 5. 371
Taeniopteris 0. 629
abnormis 8. 503
affinis 4. 252
asplenioides 6. 253
Bertrandi 7. 231
crassicosta 4. 252
crassipes 8. 741
Eckharti 8. 503
intermedia 6. 253
marantacea 8. 140
Münsteri 6. 353; 9. 45
scitaminea 6. 253
vittata 6. 253, 618; 8. 140, 741
Zoebingana 2. 887
Taeniopteryx
ciliata 6. 621
elongata 6. 621
Tafelspath 8. 700*
Tákehé (Vogel) 1. 256
Talantatos
gen. 7. 634
Talanteus
gen. 7. 634
Talcheer
-Stock 9. 752
Talk 0. 69!; 1. 204*, 389*, 403*; 2. 522, 879; 4. 70, 404; 5. 822
Talkapatit 6. 561
Talkdiallag 4. 71
Talkerde
-Hydrat 2. 66*
-Silikate 1. 203!
Talkeisendiallag 4. 71
Talkglimmer 8. 699!
Talkgneis 9. 482
Talkschiefer 0. 475, 517, 537, 541; 2. 731
Talkspath 0.552; 1.587!; 3. 535!; 5. 821*
Talkwagnerit 9. 191!
Talkiger
Schiefer 1. 91!
Talorthosit 2. 83, 731, 732
Talpa
acutidens 5. 371
Talpa
acutidentata 5. 224, 371
antiqua 5. 224, 371
condyluroides 5. 371
Europaea 1. 679; 3. 164; 5. 224
fossilis 5. 224, 371
minuta 5. 224
Sansaniensis 5. 224
telluris 5. 224
vulgaris 5. 224
Talpina
spp. 3. 758; 5. 376
Talzit 2. 848
Tamiosoma gen. 7. 853!
gregaria 7. 853
Tammela
-Tantalit 2. 863!; 8. 831!
Tamniscus
dubius 4. 119, 744
Tancredia
gen. 2. 227!; 4 112!; 6. 495, 496
angulata 7. 743
axiniformis 6. 852; 7. 743
brevis 7. 743
curtansata 7. 743
donaciformis 2. 227, 230; 4. 112!
extensa 2. 227; 4. 112; 7. 743

Tancredia
Marcignyana 9. 452 ff.
planata 7. 743
securiformis 6. 454
sulcata 2. 227
triasina 7. 760
truncata 2. 227; 7. 743
Tang
als Düngmittel 2. 338
-Bänke, fossile 2. 338!
Tantal-Erze 2. 861
Tantalit 2. 215!, 863!; 7. 332!; 8. 830!; 9. 76!
Tantalsäure
-haltige Mineralien 9. 76!
-Krystalle 1. 693*
Tantalus
Bresciensis 7. 634
fossilis 5. 231
Tanystropheus
gen. 4. 52ff.
Taonurus
gen. 8. 639!
Brianteus 8. 640
flabelliformis 8. 640
liasinus 8. 640
Tapes
aureus 4. 506
decussatus 7. 510
diversus 7. 242
lineatus 7. 853
perovalis 4. 506
pullastra 7. 510
subundatus 5. 316; 6. 245; 9. 360
texturatus 4. 506
virgineus 4. 507
spp. 8. 616
Tapiroporcus gen. 2. 359
spp. 1. 502
Tapirotherium
gen. 0. 879; 5. 226
Blainvilleanum 5. 226
Blainvillei 7. 249*
Larteti 5. 226
spp. 8. 233
Tapirulus
hyracinus 0. 499; 5. 226
Tapirus
gen. 7. 869
Americanus 5. 112; 9. 496
Arvernensis 5. 225, 373; 9. 116
Tapirus
elegans 5. 373
Haysi 5. 112; 6. 109
Helveticus 1. 75, 76. 503; 2. 303; 9. 429
Indicus 5. 373
mastodonteus 5. 112
minor 1. 492; 2. 998; 5. 225
Poirieri 5. 225, 373
priscus 1. 504; 2. 360; 6. 491
pusillus 1. 504
suinus 1. 504
spp. 1. 502
Tarandus
priscus 6. 111
spp. (foss.) 5. 227
Tarnowizit 8. 691*
Tarsichthys
gen. 4. 623!
tarsiger 4. 623
Tarsodactylus
caudatus 9. 868
Tassello
-Gestein 0. 715; 9. 738
-Mergel 9. 318
Tatusia
punctata 4. 111
Taunus-Schiefer 1. 345!
Taunusien (terrain) 1. 105
Tauriszit 5. 152!
Tauroceras
tiara 4. 551!
Taurus gen. 5. 226
Tautoklin 5. 842!
Taxites gen. 0. 632
affinis 2. 894; 3. 226
Aykei 2. 753, 894, 987; 3. 226
Langsdorfi 1. 128, 635; 2. 753; 3. 120, 502; 4. 491, 627;
Pannonicus 4. 491
ponderosus 2. 894, 986; 3. 226
protolarix 2. 987
Rosthorni 6. 633
Taxocrinus
gen. 3. 238*; 6. 602
affinis 6. 631*; 7. 860
d'Orbignyi 6. 115
polydactylus 3. 238
Rhenanus 6. 374; 8. 370
tuberculatus 6. 115, 631; 8. 370
Taxodinium
gen. 7. 364!
distichum 7. 363
Taxodites 0. 632
Bockanus 3. 226, 746
dubius 2. 762; 4 627, 632
Europaeus 3. 226, 746; 4. 631
flaccidus 3. 226
Münsteranus 3. 241
Oeningensis 3. 120
pinnatus 1. 634; 4. 627
Strozziae 9 873
Tournali 5. 638
Taxodioxylon
Göpperti 1. 102; 2. 753
Taxodium gen. 7. 364!
distichum 0. 502; 2. 760; 4. 632; 5. 638
vgl. Cupressus disticha
dubium 2. 762; 3. 502; 5. 638; 8. 498, 500, 740; 9. 754, 873
Europaeum 5. 638
Fischeri 5. 638
Oeningense 0. 502; 5. 638
Rosthorni 2. 760; 3. 502; 5. 638
spp. 1. 382
Taxodon
Sansaniensis 5. 229
Taxotherium
Parisiense 5. 230, 373
Taxoxylon 0. 632
Aykei 1. 102; 2. 894
Göpperti 1. 635; 3. 383
priscum 4. 863
Taxus nitida 8. 498
tricicatricosa 8. 498
Tectura
fulva 3. 765
parvula 3. 765
virginea 3. 765
Tegel 5. 223p.; 6. 716p., 751; 8. 860p.
-Gebirge:
Schichtenfolge 1. 360
Tegenaria
gracilipes 5. 122
obscura 5. 122
virilis 5. 122

Teig
der Gesteine 1. 556 ff.
Teleodiodontae(fam.)8.240
Teleosauri
(fam.) 6. 760
Teleosaurus
gen. 5. 105; 7. 122; 8. 759!
Bollensis 5. 424, 425*
Cadomensis 5. 233, 494, 743; 6. 760 8. 760!
Chapmani 0. 152, 319; 5. 107, 424ff., 495*; 8. 760!
Egertoni 8. 760!
latifrons 8. 760!
longidens 5. 494*
megistorhynchus 5. 233
Portlandi 2. 759
temporalis 5. 233
typus 5. 424*
Teleosti
(Pisces) 3. 115!
Telephidae
(fam.) 4. 493
Telephorium
Abgarus 5. 747
Telephus
gen. 3. 488, 489!; 6. 224
fractus 3. 489; 6. 224
spp. 4. 493
Telerpeton
gen. 3. 106!
Elginense 3. 106*
Telestho 2. 123
Tellina
aequilatera 8. 495
aequilateralis 7. 492
affinis 6. 647
ambigua 1. 715
ampliata 6. 859
balaustina 6. 859; 7. 506
Balthica 1. 621 ff.; 5. 854; 6. 730, 859; 7. 506; 8. 595; 9. 260
Benedeni 1. 764; 3. 605; 7. 229, 506
biangularis 3. 605
bipartita 6. 859
biplicata 6. 752
calcarea 1. 483; 6. 859; 7. 506
Canalensis 9. 360
Tellina
Carteroni 6. 859
Cheyennensis 7. 492; 8. 495
clathrata 6. 648
complanata 6. 859
concentrica 6. 859
congesta 7. 242
corbuliformis 6. 858
costata 6. 858
costulata 0. 294
crassa 6. 859; 7. 506
depressa 6. 859
Diegoana 7. 242
digitaria 4. 506
distorta 6. 859
donacialis 3. 605
donaciformis 7. 506
donacilla 7. 506
donacina 3. 756; 6. 859; 7. 506
Dunelmensis 4. 749; 7. 637
edentula 6. 363
elliptica 3. 74
ephippium 2. 509
faba 6. 859
fabula 7. 506
Ferroensis 6. 859
fragilis 2. 43; 5. 592
fusca 6. 869
gibba 7. 507
Goldfussi 6. 859
gracilis 7. 492
Groenlandica 3. 495; 7. 248, 506
Haimei 5. 475
Hantoniensis 1. 715
Hebertana 6. 534; 9. 138
incarnata 6. 859
incerta 3. 816; 7. 743
inflata 6. 648, 870; 7. 627
inversa 6. 858
lacunosa 6. 859; 9. 854
lactea 6. 864
laevis 1. 715
lamellulata 1. 715
Lantivyi 6. 859
lata 7. 506
Morauxi 6. 859
Mortilleti 5. 475
muricata 6. 649
nitida 6. 859
Nysti 6. 859
Tellina
obliqua 6. 648, 859²; 7. 506
obtusa 7. 506
occidentalis 8. 495
Ocoyana 7. 242
ovalis 6. 859; 7. 506
ovaloides 7. 506
ovata 6. 643, 648; 7. 506
papyracea 6. 859
pellucida 7. 506
Piedroana 7. 242
plana 4. 870
planata 6. 859; 9. 839
Pondicherryensis 6. 859
praelonga 3. 605
praetenuis 7. 506
prisca 6. 647; 8. 269
Prouti 7. 492; 8. 495
proxima 1. 473²
pulchella 6. 859
radians 6. 859
Raulinana 6. 859
Renauxi 6. 859
reticulata 1. 764; 7. 229
Rippleyana 9. 498
Roemeri 6. 858
rugosa 6. 858
scalaroides 1. 715
scitula 7. 492; 8. 495
Senegalensis 6. 859
serrata 6. 859
solidula 1. 473; 4. 89; 7. 506
squamula 1. 715
stricta 7. 506
strigata 0. 294
strigosa 6. 859
subdecussata 6. 859
subelliptica 7. 492; 8. 495
subrotunda 6. 859; 7. 506
subtortuosa 8. 495
sulcata 6. 868
tenuilamella 7. 506
tenuis 1. 483; 6. 859
tenuistria 3. 605
triangularis 7. 506
tumida 6. 859
Venei 5. 592
Woodwardi 9. 750
zonaria 3. 74; 6. 859; 7. 506
spp. 1.382; 6.859; 8.616

Tellinidae
(fam.) 6. 859
Tellinites
affinis 6. 120, 647
dubius 4. 749; 6. 643; 648
spp. 1. 253
Tellinomya
gen. 6. 642, 645; 9. 635
anatiniformis 6. 642
dubia 6. 642
gibbosa 6. 642
lingulicomes 6. 119
nasuta 6. 642
sanguinolaridea 6. 642
spp. 1. 253; 5. 252
Tellure
natif bismuthifère 2. 701
Tellursilber 6. 689*
Tellurwismuth 2. 698!; 7. 439!
Temnechinus
gen. 4. 762; 7. 122
excavatus 4. 761
globosus 4. 761
melocactus 4. 761
turbinatus 4. 761
Temnopleurus
excavatus 4. 761
Woodi 4. 761
spp. 7. 122
Temperatur
der Erde 5. 104, 217; 6. 846
äussere 7. 188
der Luft
(sekulärer Wechsel) 5. 455
in Braunkohlen-Werken 3. 743
-Abnahme der Erde 5. 851
-Regionen des Meeres 3. 755
-Verhältnisse der Quellen 5. 80
-Vertheilung über die Erde 3. 197!
-Wechsel der Erde 2. 721
der Länder: durch Höhen-Wechsel 4. 618
-Zunahme im Boden 7. 471; 8. 102
Templetonia
retusaefolia 6. 506
Tempskya
gen. 1. 115
microrhiza 6. 96, 98
Schimperi 2. 887
spp. 0. 628
Tennantit 9. 294!
Tentaculifera
(Acephala) 4. 853
Tentakuliten
-Schichten 3. 622; 4. 634
Tentaculites
gen. 4. 633!
acicularis 6. 256
acuarius 4. 635
annulatus 2. 584, 585; 4. 635; 6. 115, 626; 9. 66
cancellatus 4. 635
conicus 4. 635
curvatus 7. 362
Geinitzanus 4. 635
gracillimus 6. 372
incurvus 6. 735
infundibulum 4. 635
laevis 4. 635; 6. 256; 8. 753
multiformis 6. 372
ornatus 6. 115; 7. 362
pupa 4. 635
rugulosus 4. 635
scalaris 2. 452; 4. 634; 6. 372, 500
striatus 4. 465, 634; 6. 626
subcochleatus 6. 372
subconicus 4. 635
sulcatus 4. 635; 6. 372, 626
tenuis 4. 634, 635; 6. 115, 372
tenuicinctus 1. 225; 6. 372
tuba 4. 635; 6. 626
typus 4. 634, 635; 6. 626
spp. 5. 248
Tentyridium
Peleus 5. 747
Tephrin-Lava 7. 607
Tephroit 0. 448!, 453
Terebella
liasica 6. 496
spp. 2. 19 ff.
Terebellaria
Antilope 5. 634
gracilis 5. 634
ramosissima 0. 163, 722; 5. 634
tenuis 5. 634
spp. 2. 125
Terebellopsis
Brauni 3. 604
Terebellum
Carcassonense 3. 604
convolutum 3. 604
fusiforme 1. 717
spp. 3. 627
Terebra
canalis 3. 763
cinerea 7. 420
coronata 3. 635
Dutempleana 4. 250
heterostropha 3. 763
inversa 3. 763
nodosa 7. 866
pertusa 0. 223
plicatula 7. 420
portlandica 0. 174, 185
spp. 2. 978; 4. 626; 6. 479
Terebratella gen. 3. 254!
Algoensis 3. 254
Asteriana 0. 379!
Bouchardi 3. 254
Chilensis 3. 254; 4. 504
Coreanica 3. 254; 4. 504
cornigera 4. 764
Cumingi 3. 254
crenulata 4. 254
dorsata 3. 254; 4. 60, 504
Evansi 3. 254
Fleurieausa 3. 222
flexuosa 3. 254
hemisphaerica 3. 210; 8. 482
Humboldti 7. 116
Labradorensis 3. 254
loricata 8. 486
Menardi 0. 379; 4. 508; 7. 482
oblonga 4. 509
pectita 4. 508; 7. 482
pulchella 7. 116
rubicunda 3. 254
sanguinea 3. 254
Sowerbyana 3. 254
transversa 3. 254
Zelandica 3. 254
spp. 9. 123

Terebrateln-Kalk 3. 614; 4. 482
-Schicht des Muschelkalks 3. 10, 11
Terebratula
gen. 3. 253!; 4. 503; 5. 382*
aculeata 3. 223; 6. 730
acuminata 0. 380; 6. 374, 508; 9. 847
acuta 0. 149, 150, 231, 392, 490
Adrieni 2. 340, 936
aenigma 0. 481
affinis 6. 508
alata 0. 379!; 1. 730, 743; 4. 81; 8. 474
amphitoma 4. 764
ampulla 0. 378!
amygdala 2. 192; 9. 359
amygdalina 6. 508
amygdaloides 9. 359
angularis 6. 374
angulata 0. 379!
angulosa 6. 374, 508
angusta 0. 99; 1. 357, 744; 5. 479; 6. 245; 9. 359
anomopleura 2. 108
antinomia 0. 378!
antiplecta 0. 734; 1. 367; 2. 622
antiqua 6. 508
aprinis 3. 344
aptycha 0. 226; 6. 508
Aquensis 3. 86
Archiaci 1. 66, 67, 68; 2. 340, 926, 937; 6. 500, 508
articulus 0. 380!
ascia 1. 133; 2. 287; 4. 546; 5. 177; 6. 821
aspera 0. 857; 3. 103; 5. 853; 6. 500, 508; 7. 455; 9. 222, 847
auricularis 6. 818
auriculata 4. 508; 7. 785
Austinensis 0. 102
Australis 3. 254; 4. 509
Bakerae 3. 210
Baugieri 8. 486
Becksi 6. 817!; 7. 786
belemnitica 6. 743
Bentleyi 3. 210; 7. 134; 8. 482
Bernardina 8. 486
Terebratula
bicanaliculata 4. 35
bidentata 3. 344; 6. 205; 7. 387; 8. 269, 753
Bieskidensis 8. 505
bifida 4. 764
Bilimeki 8. 505
biplicata 0. 160ff., 169, 378!, 392, 535; 1. 357, 415, 743, 744; 2. 44?, 92, 288, 349, 451; 3. 312, 318, 494; 4. 81, 205; 5. 176, 848; 6. 71; 7. 482. 786²; 8. 873
birostris 0. 378!
Bischoffi 8. 753
bisinuata 0. 378!; 4. 507
bisuffarcinata 8. 486, 505
Blacki 3. 103
Bloedeana 0. 243
Bouchardi 3. 103
Bordiu 2. 340
borealis 6. 508
Bouei 0. 589, 590
brevirostris 7. 220
Bronni 4. 508
Buchi 4. 508
bucculenta 3. 210! 4. 852; 9. 136
Buckmani 3. 210
bulla 4. 81
bullata 0. 160; 2. 343; 3. 210
Caiqua 6. 508
Californiana 3. 254
Calloviensis 8. 484
Campomanensis 2. 340
canalifera 0. 379!
canalis 7. 373
Capensis 3. 255
Capewelli 0. 374
capillata 4. 509; 7. 482
caput-serpentis 3. 86; 4. 507; 6. 739
cardium 0. 379; 3. 210; 8. 482
carinata 0. 378!; 3. 210; 7. 133
carnea 0. 378!; 1. 140, 420; 2. 152, 168, 170, 296, 298, 462; 3. 85ff., 315; 4. 509, 538, 557, 869; 6. 809, 817; 7. 482, 614,
Terebratula
carnea 7. 786², 872; 8. 739, 874; 8. 847, 866
Carteri 7. 483
cassidea 4. 747; 6. 218, 508
Causoiana 4. 852
Causoniana 6. 454
Chilensis 4. 509
chrysalis 0. 296; 2. 462
cincta 0. 148
coarctata 0. 163, 379!, 722; 2. 287; 3. 210; 8. 482
Colletii 2. 340
compressa 0. 380, 1. 743; 6. 226
concava 0. 378!; 4. 508
concentrica 0. 243; 1. 66, 68; 2. 108, 192, 340, 937; 4. 62, 747; 5. 875; 6. 373; 500, 508; 7. 220, 374; 9. 847
concinna 0. 163, 183, 367, 379! 380, 481, 602, 723, 734; 1. 138, 145, 367; 2. 349, 622; 3. 312, 318; 4. 205, 544!, 545; 6. 71
Conradi 3. 103
contorta 4. 534!
cor 0. 378!
cornigera 1. 407!; 419; 2. 286, 288; 3. 318; 9. 629
cornuta 0. 379!; 4. 87, 764; 7. 617²; 9. 629
corymbosa 4. 746; 7. 637
costellata 7. 210
cranium 3. 254
crassa 7. 785
cristata 4. 747
cristellula 4. 507
cuboides 3. 811, 816, 817; 6. 508
cuneata 3. 344; 6. 226
curviceps 9. 22
cyclogonia 7. 154*
cynocephala 0. 380
Daleidensis 0. 282, 284; 1. 67; 2. 936; 6. 374, 508

Terebratula
decemcostata 3. 240; 4. 508
decipiens 8. 874
decorata 0. 379;! 7. 846²
decurtala 0. 99; 6. 245; 9. 359
decussata 0. 379;! 3. 210
deflexa 6. 226
Defrancei 3. 86ff.; 4. 508
Delmontana 8. 486
deltoidea 0. 378!; 3. 760
depressa 0. 231, 378!; 3. 255; 5. 160; 6. 818; 7. 483, 785
Deslongchampsi 0. 151
desquamata 6. 508
detruncata 3. 255
difformis 0. 379!; 3. 431
digona 0. 150ff., 162, 163, 180, 181, 183, 378!, 722; 1. 367; 3. 210; 4. 620; 8. 482
dilatata 3. 254
dimidiata 0. 379!
diphya 0. 178, 378!, 587, 589, 734, 735; 3. 760; 4. 35, 504; 8. 874
diphyoides 0. 378!, 734; 3. 760; 8. 380; 9. 124, 372
diptycha 8. 482
disparilis 4. 509
dividua 6. 373, 508
Domeykana 0. 481; 4. 81
dorso-plicata 8. 484
dubia 4. 764
Dutempleana 4. 509
Duvali 4. 508
Edwardsi 3. 210
Eifliensis 6. 508
elegans 4. 508
elliptica 6. 508
elongata 2. 937; 3. 103, 126, 128, 776, 777, 817; 4. 119, 747, 489; 5. 873, 874; 6. 373; 7. 223, 374, 637; 8. 608, 727; 9. 827, 847
emarginata 0. 482; 3. 210
Terebratula
Eugenii 0. 244
Ezquerrai 2. 340
faba 7. 653
Faujasi 4. 508
ferita 2. 192; 6. 373, 508
Ferron[es]ensis 2. 340; 6. 508
ficoides 0. 481
fimbria 0. 870; 1. 484, 486; 2. 230; 3. 210
Fischerana 0. 226
Fischeri 0. 254
fissuracuta 0. 243
flabellata 8. 873
flabellum 3. 210: 8. 482
Fleischeri 8. 482; 9. 135
Fontanei 3. 223
formosa 6. 508; 8. 505
fornicata 6. 508
fragilis 4. 507
furcata 0. 379!; 3. 210
furcillata 0. 380; 7. 698
galeata 8. 753
Galiennei 7. 135; 9. 135
Geinitzana 4. 119; 5. 875; 7. 223, 374; 8. 373, 844
Geisingensis 8. 484
Gervilleana 4. 508
Gervillei 4. 508
gigantea 0. 378!; 4. 507, 4. 627
Gisii 0. 296
globata 0. 378!; 2. 349; 3. 210; 4. 205, 852; 6. 71; 9. 133
globosa 3. 254
globulina 3. 210; 4. 747
Goldfussi 6. 508
gracilis 0. 296; 2. 462; 9. 847
grandis 0. 378!; 4. 89. 507, 514
granulosa 0. 380!
Grayi 3. 254
gregaria 4. 764; 9. 629, 852
Grestenensis 4. 764
Grevillei 4. 507
grossulus 4. 764; 9. 629
Gryphus 2. 108; 6. 373
Gualteri 1. 228
Terebratula
Haidingeri 8. 505; 9. 629
hamifera 0. 374
Harlani 8. 360
hastaeformis 5. 873
hastata 2. 286, 288; 6. 125
Hebertana 4. 508
hemisphaerica 3. 210
Henrici 6 256; 8. 753
Herculea 4. 62
hexatoma 6. 508
hippopus 7. 652*, 659
Hispanica 2. 340
homalogaster 6. 852
horia 4. 764; 9. 629
Humbletonensis 4. 746; 7. 637
humeralis 8. 488
Huotina 6. 374; 9. 847
Jamesi 8. 873
Ignaciana 0. 481
immanis 7. 154*; 8. 505
impressa 0. 168, 184, 378!; 3. 210; 7. 135; 8. 486, 582; 9. 135
inaequalis 6. 256
[?] inaequivalvis 6. 71
Inca 4. 81*
incisa 1. 101
inconstans 0. 172, 175, 184; 2. 349, 759; 4. 551
incurva 1. 101
indentata 0. 378!; 1. 415!, 419; 3. 210; 4. 764; 9. 629
inflata 4. 747
insignis 0. 172, 185; 3. 210; 4. 35, 551; 7. 135, 154; 8. 505, 722; 9. 136
insquamosa 6. 374, 508
intermedia 0. 254, 379, 722; 3. 210; 4. 620, 747; 7. 132ff.; 8. 726, 482
Kleini 0. 379!; 3. 210
lacrymosa 4. 509
lacunosa 0. 169, 184, 185, 482, 602, 735; 1. 145, 146; 2. 349, 451; 3. 431; 6. 217
laevicosta 0. 379!
laeviuscula 5. 853

Terebratula
lagenalis 0. 150, 151, 181; 2. 286, 289, 343, 349; 3. 210; 4. 620; 7. 133; 8. 482, 583; 9. 134, 135, 190
lampas 3, 210; 7. 204
lata 3. 210
latilinguis 6. 508
latissima 0. 379
lens 3. 86
lenticularis 3. 254
lepida 6. 373, 381, 508
lima 1. 743; 4. 508
Liskaviensis 6. 363
Livonica 2.584; 6. 374; 9. 847
longa 0. 390, 392; 7. 653
longiplicata 8. 484
loricata 2. 349
Lycetti 3. 210; 7. 130
lyra 0. 379!; 4. 508
macrorhyncha 6. 508
magasiformis 7. 155*
Maltonensis 9. 136
Mantellana 0. 295; 9. 866
Mariana 6. 501
marginalis 6. 226
marmorea 8. 482
maxillata 0.722; 3. 210; 4. 504; 7. 133ff.; 8. 482
media 0. 379!, 380; 3. 431
melonica 8. 753
Menardi 0.379!; 1.743; 4. 508
Mentzeli 0. 99; 3. 167
Meyendorffi 0. 243
microrhyncha 2. 192; 6. 508
millepunctata 7. 863
minor 0. 296
miocaenica 6. 739
mitis 8. 505
Moorei 3. 210
Moravica 8. 505
Moutonana 7. 653*, 659 ff.; 8. 637
mucronata 2. 340
multicarinata 0. 379!
multiformis 0. 230, 231, 390, 392, 396; 2. 189
multiplicata 3. 431; 4. 489; 7. 637
mutica 0. 378!
Natalensis 3. 255
Nerviensis 0. 378!; 4. 81; 7. 785
Noszkowskiana 7.154*; 8. 505
novemplicata 6. 373
nucella 6. 256
nuciformis 1. 357, 744
nucleata 2. 349; 8.486
numismalis 0. 149, 181, 378!; 3. 210, 531; 4. 370; 6.456, 742; 7. 5, 6, 10, 11, 210, 212; 8.583*, 873; 9. 23, 345
nympha 6. 256; 8. 753
obesa 4. 509; 7. 482
obliqua 8. 753
oblonga 0. 230, 746; 4. 509; 5. 160; 7. 482
obovata 0. 722; 3. 210; 4. 620; 6. 625; 8. 482
obsoleta 0. 379!, 722
octoplicata 0. 388, 407, 727; 1. 311; 9. 847
Oliviani 2. 340; 6. 501, 508; 7. 220
orbicularis 0. 379!; 3. 210
Orbignyana 1. 68; 2. 340; 6. 501, 508; 7. 220
ornithocephala 0.378!, 481, 723; 2. 152, 168. 230, 285 ff., 343, 349; 3. 210, 309, 318; 4. 81, 546. 551, 620; 6.217; 7. 133
ovalis 0. 378!
ovata 0. 378!; 4. 509; 7. 482
ovatissima 9. 17
ovoides 3. 210; 4. 88
oxynoti 6. 744; 9. 21
oxyptycha 0. 226
pala 0. 734; 2. 622; 5. 177; 8. 484
palmetta 3. 210
papyracea 6. 374
parabolica 9. 359
parallelepipeda 2.936; 6. 374
Paretoi 6. 500
passer 4. 62
Paueri 9. 629
pectinata 4. 508
pectinifera 4.119, 489, 747; 8. 489, 727
pectiniformis 0. 746
pectita 0. 379!; 1.742; 4. 508
pectoralis 6. 818; 7. 785
pectunculoides 0. 735; 2. 349, 759
pedata 4. 764; 9. 629
Pedemontana 0. 370!
Pelaphyensis 2. 340
pentagonalis 0. 184; 4. 508; 5. 613
pentangulata 4. 508
pentatoma 1. 608; 7. 220
peregrina 0. 379!
perforata 7. 210; 8. 643
Perieri 8. 484
perovalis 0. 160, 182, 183, 481; 2. 343, 349; 3. 210; 4. 81, 205, 504, 852; 6.71, 210, 821; 7. 133; 8. 505, 873
phaseolina 0. 378!; 1. 742
Phillipsi 3. 210; 6. 210
picta 3. 254
pila 2. 928, 936; 6. 374, 508
pinguis 5. 848
piriformis
vdr. pyriformis
pisum 0. 295; 1. 357; 2. 29, 462; 6. 817; 7. 471
planosulcata 7. 373; 8. 710, 738
plica 4. 747
plicata 0. 379!; 1. 486; 3. 210; 8. 357
plicatella 0. 163; 2. 462
plicatilis 1. 743
plicatissima 8. 552
Pomeli 6. 256; 8. 753

Terebratula
praelonga 0. 378!; 7. 482
primipilaris 2. 192, 936; 6. 374, 508²
princeps 6. 205, 320
prisca 0. 243, 278; 1. 225, 609; 2. 107, 108, 192; 5. 853; 6. 508; 7. 455; 8. 753
prominula 6. 508
prunulum 6. 508
psittacea 2. 855*; 3. 223; 4. 507
pugnoides 6. 508
pugnus 0. 102; 6. 374; 7. 455
pumila 0. 296, 380!; 4. 508
pumilio 6. 256
punctata 0. 378!; 3. 210; 6. 456
Puschana 0. 747; 7. 373
pygmaea 3. 210
pyriformis 4 764; 7. 617, 618; 9. 629
Quadalupae 0. 102
quadrata 4. 509
quadrifida 0. 150, 181, 379!; 1. 317; 3. 210
quadriplicata 0. 161; 6. 217
Qualeni 4. 747
quinquangulata 9. 359
radiata 0. 380!
Ramsaueri 5. 502; 7. 615; 9. 477
recurva 4. 508
Repelinana 8. 505
resupinata 0. 378!; 2. 230; 3. 210; 4. 35, 546; 7. 204
reticularis 0. 163, 380, 857; 1. 68; 2. 287, 340, 349, 937; 3. 103, 210; 6. 226, 500, 508; 7. 220
reticulata 0. 379!;, 747; 3. 210
retusa 4. 507
rhomboides 9. 359
rigida 4. 508; 7. 482
rimosa 0. 149, 181, 380; 2. 343; 3. 531; 6. 742, 818; 7. 612, 698²; 9. 23
Terebratula
Robertsoni 7. 483
Roemeri 7. 482
Rogerana 0. 225
Roissyi 1. 138!; 5. 875
Roissyana 7. 374²
rostrata 3. 431
rotunda 6. 625
rotundata 6. 625; 8. 873
Royerana 8. 484
Roysi 2. 288
rubella 3. 254
rugulosa 4. 509; 7. 482;
Sabinae 0. 102
sacculus 5. 873, 874
Saemanni 8. 484
salinarum 4. 764; 9. 629
Salteri 8. 738
Sayi 8. 360
scalprosa 2. 192
Schafhäutli 9. 629
Schlotheimi 3. 123; 4. 119, 489, 746; 5. 875; 7. 637
Schnuri 6. 508
Schulzi 2. 340
sella 0. 230, 231; 5. 160; 6. 818; 7. 482
semiglobosa 0. 296, 378!, 388; 1. 168, 311; 2. 295; 6. 817; 7. 482, 786³, 787²; 8. 739, 874
seminulum 3. 255
senticosa 2. 349
serrata 6. 451
sexradiata 4. 508
silicula 6. 626
simplex 1. 486; 2. 230; 3. 210; 8. 357
simplicissima 8. 505
Smithi 8. 484
socialis 0. 723
spathica 0. 379!
sphaera 6. 803
sphaerica 3. 216
sphaeroidalis 3. 210; 4. 32
spinosa 0. 161, 182, 379!, 734
spinulosa 4. 508
spirifera 0. 380!
squamifera 6. 374, 508
squamosa 4. 509; 7. 482
Terebratula
Steiningeri 2. 937
striata 7. 785, 786, 787
striatula 0. 296; 2. 349; 3. 86; 4. 507, 508
Stricklandi 2. 936; 6. 508
strigiceps 2. 924, 936; 6. 374, 508
Stroganoffi 8. 873
sub-Bentleyi 3. 210
subbucculenta 4. 852; 8. 482; 9. 133
subcanaliculata 8. 484
subcanalis 8. 505
subconcentrica 2. 340
subcordiformis 6. 508
subcurvata 6. 625
subdigona 6. 456
subdilatata 9. 359
subdimidiata 4. 764; 9. 629
subferita 2. 340
sublagenalis 3. 210; 4. 620
sublepida 6. 381
submaxillata 3. 210; 8. 357
subovoides 6. 456; 8. 873
subplicata 0. 295; 3. 210; 7. 483
subplicatella 0. 379!
subpunctata 3. 210; 4. 852; 8. 357
subregularis 2. 152
subreniformis 6. 374, 508
subrimosa 1. 409, 412!, 416, 419; 2. 285, 288; 3. 312; 4. 554; 5. 177
subsella 4. 355; 8. 488, 582
subsimilis 2. 349
subsinuata 9. 359
substriata 2. 349
subtetragona 6. 508
subtilita 7. 491; 8. 493, 502, 710, 766; 9. 827, 849², 850*, 851
subtriquetra 3. 210
subundata 0. 378!; 6. 818
sub-Wilsoni 1. 66, 67; 6. 374

Terebratula
sufflata 6. 214
sulcifera 6. 245; 7. 482; 9. 359
sulcisinuata 5. 873
superstes 3. 128, 778; 4. 119; 7. 637
tamarindus 1. 140, 420; 2. 152, 168, 174, 295, 298; 3. 315; 7. 653
tenuissima 4. 508
tenuistriata 5. 853
tetraedra 0. 254, 379!, 481, 1. 316; 2. 349; 4. 81, 205, 545; 6. 71, 208, 217; 7. 698
tetratoma 6. 508
Theodorii 0. 182
Thibeaulti 3. 102
Tischaviensis 8. 505
Toreno 2. 340
Tornacensis 7. 482, 785
trachyptycha 6. 508
triangulus 0. 378!, 734; 3. 760
trigonella 0. 99; 2. 943; 3. 167, 222!; 4. 64
trigonelloides 2. 222!; 5. 316; 6. 730
trilineata 3. 210
trilobata 0. 175; 2. 349
trinuclea 7. 863
tripartita 7. 698
triplicata 2. 343; 3. 348; 6. 217, 744; 7. 142; 9. 17
triquetra 0. 378!; 3. 210, 760; 4. 34
truncata 0. 379!; 4. 508
tumida 1. 138; 2. 283, 285; 3. 305; 4. 62; 6. 226
turgida 7. 863
Turneri 9. 20
umbonella 0. 378!
undata 6. 500; 7. 220
undulata 2. 937; 4. 747
uva 3. 254
variabilis 0. 243; 1. 316, 337; 4. 507; 6. 71, 217, 744; 7. 210; 8. 226; 9. 23
varians 0. 161, 164, 165, 182, 225, 380; 2. 349; 3. 347
Terebratula
ventrosa 6. 508
venusta 5. 491; 6. 374, 508
vespertilio 0. 379!
vetusta 6. 508
vicinalis 0. 149, 150, 180, 181; 1. 316!, 337; 2. 343; 3. 210, 531; 4. 544, 764; 6. 208, 217; 7. 142; 8. 874
vitrea 3. 254; 4. 59, 504; 8. 874
Voltzi 6. 374
vulgaris 0. 99, 246, 378!, 484, 485, 535; 1. 649; 2. 19 ff., 53, 909, 913 ff., 943; 3. 10, 11, 13, 21, 29, 223, 309, 318, 567, 614; 4. 480 ff.; 5. 479; 6. 214, 245, 363, 737, 818; 7. 617, 621, 693, 760; 8. 4; 9. 144, 359, 753
Wahlenbergi 0. 282; 2. 192; 3. 103
Waltoni 3. 210; 6. 852
Waterhousei 3. 210
Wilsoni 3. 103; 6. 226; 8. 753
Wirtgeni 6. 508
Yennamensis 5. 384
zonata 6. 374, 508
spp. 1. 382; 4. 250; 9. 123
Terebratulidae (fam.) 4. 59!, 504
Terebratulina
gen. 3. 254!; 4. 61
abyssicola 3. 254
biauriculata 7. 652
cancellata 3. 254
caput-serpentis 3. 254; 4. 59, 504, 507; 7. 604
cristata 7. 637
Cumingi 3. 254
Davidsoni 7. 116
Gisei 7. 116
gracilis 4. 504, 508; 7. 116, 482, 787
Japonica 3. 254
locellus 7. 116
Martiniana 7. 652
ornata 7. 116
Terebratulina
pentatoma 9. 827
septentrionalis 3. 254
striata 4. 508; 7. 116, 482; 8. 873
striatula 4. 507; 6. 809; 7. 116, 786, 787
substriata 4. 504; 8. 486
spp. 4. 250
Terebratulites
alatus 4. 747
aperturatus 6. 508
chrysalis 4. 508
communis 4. 747
complanatus 4. 747
cristatus 4. 746
excisus 6. 374
explanatus 6. 508
galeatus 6. 508
giganteus 4. 507
lacunosus 4. 747
latus 4. 747
ostiolatus 6. 508
pecten 4. 747
pelargonatus 4. 746; 7. 637
priscus 6. 508
sufflatus 4. 747
tenuissimus 4. 508
trigonellus 6. 730
Terebripora gen. 4. 115!
antiqua 5. 653
Terebrirostra 0. 244
Arduennensis 4. 250
lyra 4. 60, 504, 508; 7. 482
plicata 5. 239
spp. 4. 250; 9. 123
Teredina
antenautae 6. 857; 7. 370
Austriaca 9. 383
bacillum 6. 857
lignicola 9. 847
personata 6. 857
spp. 7. 632
Teredo
anguinus 6. 534
Antenautae 6. 857
antiquus 6. 642, 653
Argonnensis 2. 161, 169, 171
bacillum 6. 857
Burtini 3. 231; 6. 857
calamus 6. 480
Deshayesi 5. 592
divisa 3. 231
globosus 8. 497

Teredo
navalis 5. 795; 6. 857
Norwegicus 7. 507
Requienanus 2. 144
Tournali 3. 370, 605; 6. 739; 9. 844
spp. 1. 382; 7. 632
Termatosaurus Albertii 9. 12
Termes
affinis 6. 108, 621; 8. 374
antiquus 6. 621
Berendti 6. 621; 8. 374
Bremii 6. 621
Decheni 6. 108; 8. 374
formosus 6. 108; 8. 374
gracilicornis 6. 621
gracilis 6. 621
Haidingeri 0. 853
Heeri 6. 108; 8. 374
obscurus 6. 621
Picteti 6. 621
Terminalia 0. 636
elegans 3. 505
Fenzlana 9. 375
miocaenica 2. 755; 3. 384; 4. 491
Radobojensis 3. 505
Tallyana 4. 491
Ungeri 4. 380
Termiten 0. 21*
Termitidium ignotum 5. 747
Termophyllit 9. 310
Termopsis Bremii 6. 621
Haidingeri 2. 996
spectabilis 2. 996
Ternicellaria
gen. 4. 114!
Ternstroemia producta 9. 375
Terra miraculosa 9. 546!
Terrain à chailles 0. 168
Alaricien 0. 487ff.; 9. 470
anthraxifère 1. 105, 617; 2. 101!; 6. 719; 7. 219
Aptien 1. 737
Aquitanien 7. 623
Ardennais 1. 105; 7. 219
ardoisien 1. 105; 5. 321
Argovien 0. 168, 184
cénomanien 1. 742
Terra
crétacé supérieur 0. 486
Danien 1. 100, 792!
Dertonien 7. 624
épicrétacé 0. 486, 487
Helvétien 7. 624
hippurito-nummulitique 0. 486
houillier 1. 105; 7. 219
Ibérien 0. 486
pisolithique 1. 100; 9. 107
Placentien 7. 624
Pyrenéen 0. 486
Rhenan 7. 219
Rhodanien 5. 473, 474
Tongrien 7. 624
Valanginien 4. 310
Terrains 7. 467
Sevalien 4. 608
Terrassen 0. 856
-Bildung 5. 462
Tertiär-Becken:
Englands 7. 635p.
Mainzer 5. 187
Österreichs 2. 630p.
von Paris 7. 631p.
Wiens 2. 112p.; 3. 96p.; 4. 760p.; 5. 768p.
-Fauna 5. 370
Frankreichs 2. 979
Russlands 2. 757
Wiens 4. 760
-Flora 0. 114; 1. 634; 4. 138, 490, 494!, 631*, 877; 5. 368, 369; 6. 450; 8. 739, 757; 9. 115, 118, 121, 122, 253, 373, 500, 505, 870
Java's 3. 433; 4. 628
Italiens 4. 626; 8. 501
Schlesiens 2. 892!
der Schweitz 3. 497; 4. 320; 5. 546, 636, 637
-Florulen
von Breslau 2. 634
von Häring 4. 376
von Heiligenkreutz 3. 383
von Köflach 8. 499
Monte Promina 3. 509
Norditaliens 3. 46
Ostalpinische 8. 586
Österreichische 2. 627
Tertiär
-Forulen
von Prevali 6. 633
von Wieliczka 3. 382, 383
von Wildshut 3. 120
-Formation 1. 745; 5. 844, 849; 6. 65, 451, 460, 479p., 533p., 609p., 719, 750p.; 7. 204, 214, 383, 404, 493p., 495, 500, 503p., 598, 613, 614, 723, 844, 858p.; 8. 62*, 102, 350, 360, 493, 496, 506p., 509, 584, 589p., 602, 608, 635, 713, 717, 765p., 860, 874; 9. 35, 114p., 125p., 137, 141, 216, 219, 258, 365p., 607, 837gp., 843, 846p., 852, 866p
Parallelgliederung 2. 881; 3. 482, 625
Profile 4. 733
Antwerpens 4. 88
Bayerns 4. 517!
Brandenburgs 4. 89
in Cilizien 5. 594
Englands 4. 507p.
in England u. Frankreich 3. 189!
im Gironde-Becken 3. 71
von Gorinchem 4. 196
von Häring 4. 376
in Java 5. 603
von Mainz 2. 433; 3. 38, 129, 481!, 670p.
Nordeutsche 3. 624p.
Ostindiens 5. 855
Piemonts 3. 335, 369
der Rhön 3. 437
im Rhone-Becken 2. 363
in Spanien 1. 41
am Vogelsberg 3. 141
auf Wight 4. 82
-Gebirge 0. 852, 856, 860; 1. 619, 711; 2. 345; 5. 357; 6. 27, 354, 477p.; 9. 749
(oligocänes) 3. 624!; 4. 626

Tertiär
-Gebirge:
Gliederung 2. 621, 988, 997; 4. 608; 5. 223
im Loire-Becken 4. 831
im SW. Frankreich 3. 73!
-Konchylien 2. 978!; 8. 616, 635
-Mollusken um Wien 3. 753
-Periode: Flora 0. 114!
-Pulmonaten 4. 864
-Sandsteine 9. 211
-Schichten 3. 45p.
-Thone, obere 2. 358
-Versteinerungen 2. 461, 508
als Geschiebe 3. 608
auf sekundärer Lagerstätte 2. 971
Norddeutsche 3. 445
Teschener-Schiefer 0. 735
Tesseral-Kies 1. 179*, 180*
-System 2. 618
Tesserale Krystalle 9. 293
Testacella Deshayesi 5. 746
Zelli 4. 249
Testudo gen. 5. 118
antiqua 7. 30
Canetotiana 5. 232
Culbertsoni 5. 116, 119!; 8. 376
Duncani 3. 753
Escheri 5. 615; 7. 624
eurysternum 5. 232
Frizacana 5. 232
gigantea 5. 232, 374
gigas 5. 232
Graeca 5. 232
hemisphaerica 5. 115, 118; 8. 376
hypsonota 5. 374
Lamanoni 5. 232
Larteti 5. 232
lata 5. 116, 119!; 8. 376
Lemanensis 5. 232, 374
media 5. 232
minuta 5. 232
Nebrascensis 5. 115, 118; 8. 376
Niobrarensis 9. 252!
Oweni 5. 116, 119!; 8. 376
Testudo
plana 2. 379
pygmaea 5. 232
Serresi 5. 232
spp. 7. 624; 8. 747
Tetartin 4. 220; 6. 440
Tetartoedrie 5. 11; 6. 147 ff.
Tethya asbestella 3. 876
Tethys sp. 9. 372
Tetrabranchiata ord. 8. 617!
Tetrachela
Raiblana 9. 504; 9 860
Tetracoenia 2, 121
Tetracus
(Echin. gen.) 4. 831
nanus 5. 223, 371
Tetradactyla 9. 867
Tetradium gen. 7. 236!
apertum 7. 237!
columnare 7. 237!
fibratum 7. 237!
laxum 7. 237!
minus 7. 237!
Tetradymit 2. 701; 4. 445!; 7. 439; 9. 302*
Tetraedrit 2. 220
Tetragonis Danbyi 6. 115
Tetragonolepis
gen. 3. 117*; 6. 754*
Bouei 8. 6
cyclosoma 6. 755
discus 6. 755
droserus 6. 755
Egertoni 5. 862
semicinctus 6 755
subserratus 6. 755
Tetralophodon
gen. 7. 486; 8. 765
Arvernensis 8. 379; 9. 116, 870
mirificus 9. 252!
Tetrapsellium gen. 1. 509!
Tetrapteris 0. 635
Harpyiarum 9. 375², 376
Tetraspis gen. 3. 487
fimbriatus 6. 116
seticornis 4. 502; 6. 116
Tetronychus
brevipes 5. 124
gibbus 5. 124
Tettigometra
debilis 3. 867, 874
Tettigonia antiqua 3. 874
morio 3. 874
proavia 6. 620
terebrans 6. 620
Tetyra Hassei 3. 873
Teudopsis gen. 4. 852
Sismondae 8. 226
cfr. Teuthopsis
Teufelsmauer (Fels) 4. 787
Teuthopsis
gen. 9. 369, 370
oblonga 9. 369!
piriformis 9. 370
princeps 9. 379!
Sismondae 6. 71; 8. 226
Textilaria
gen. 5. 749, 755; 7. 377
abbreviata 7. 293!, 309
aciculata 0 473
acuta 2. 255; 7. 498
Americana 7. 750
articulata 1. 228
aspera 0. 473
attenuata 2. 254; 6. 757
Bronnana 7. 498
carinata 7. 498
concinna 4. 867
conulus 4. 867
costata 4. 738
cuneata 7. 633
cuneiformis 4. 744; 6. 504
deltoidea 2. 255
dilatata 0. 473
elongata 1. 228
euryconus 7. 750
eximia 7. 633
globosa 1. 228; 4. 613
globulosa 0. 249, 473; 4. 737 ff.; 7. 750
gracilis 7. 498
initiatrix 8. 632
lacera 2. 254; 5. 435; 6. 757; 7. 498
liasica 9. 371
linearis 4. 737
Mayerana 7. 498
Metensis 9. 371
pala 1. 378; 7. 498
Partschi 1. 378
pectinata 2. 255
perforata 0. 473
praelonga 1. 378; 4. 867
striata 0. 473; 7. 750
striato-punctata 7. 294!
subangulata 7. 293!. 309
subregularis 7. 498
trilobata 7. 750

Textilaria
triquetra 4. 867
triticum 4. 744; 6. 504
turris 4. 867
spp. 2. 511*; 4. 737ff.
Textilarida
(fam.) 5. 754! ff.
Textularia vdr. Textilaria
Textrix
funesta 5. 122
lineata 5. 122
Thal-Bildung 3. 70, 196; 6. 668; 9. 91!
Thalamocenia 2. 118
Thalassemys
gen. 9. 366*
Thalassictis
incerta 5. 230
robusta 7. 370*; 9. 862
Thalassiten-Bank 8. 552!, 583
Thalassites
concinnus 0 146, 180
depressus 6. 742; 8. 551
Listeri 0. 146
securiformis 0. 146
Thalassocharis
Bosqueti 4. 229
Mülleri 0. 117; 2. 993
Thalit 3. 466!; 6. 184!
Thaleops
gen. 3. 487
Thallops
ovatus 7. 380
Thallogena
(Vegetabilia) 2. 504!
Thallophyta
(Vegetabilia) 0. 626!; 2. 504!
Thamnasteria
gen. 0. 766
gigantea 0. 766
Lamourouxi 0. 766; 1. 412; 2. 284, 288; 9. 629
Thamnastraea
gen. 0. 763!, 766; 2. 118*
acutidens 4. 868
affinis 0. 766
agaricites 3. 582; 4. 868
arachnoides 8. 873
Bolognae 9. 359
Bouri 8. 591
Cadomensis 0. 766
Thamnastraea
composita 3. 582; 4. 868
confusa 3. 582; 4. 868
Defranceana 8. 358
dendroidea 0. 766
Dumonti 4. 852
dumosa 8. 591
exaltata 4. 868
exigua 4. 868
fungiformis 8. 358
gigantea 0. 766
laganum 0. 765
Lamourouxi 0. 766
Maraschinii 9. 359
media 3. 582; 4. 868
Mettensis 8. 358
micrantha 0. 766
multiradiata 4. 868
Perroni 8. 591
Portlandica 8. 591
procera 3. 582; 4. 868
scyphoidea 0. 765
Terquemi 8. 358
spp. 2. 758; 9. 123
Thamniscidae (fam.) 1.489!
Thamniscus
gen. 1. 489!
dubius 4. 489; 8. 502, 766
Thamnopora 2. 120
Thanet
sands 7. 503 p.
Tharsis
gen. 3. 118*
Thaumas
alifer 6. 418, 487; 7. 367!
fimbriatus 6. 487
speciosus 6. 418, 825; 7. 367
spp. 9. 764
Thaumatopteris 0. 627
gracilis 6. 496
Thaumatosaurus
oolithicus 6. 330; 7. 109
Theca
Beirensis 5. 98
Forbesi 6. 120; 8. 715
Kirkbyi 7. 638
triangularis 6. 500
Vitriaea 3. 102
spp. 1. 382; 4. 3; 6. 225, 372
Thecia 2. 121*
multiseptosa 6.255;8.754
Thecia
Swinderenana 8. 266
spp. 7. 104
Thecidea (cfr. Thecidium)
gen. 3.239!, 240, 255!; 4. 254
Bouchardi 3. 210
Dickinsoni 3. 210
digitata 4. 254
Haidingeri 4. 87, 764
Mediterranea 3. 256
Moorei 3. 210
papillata 4. 254
radiata 0. 380
prisca 3. 41; 6. 508
rustica 3. 210
triangularis 3. 210; 8. 357
vermicularis 4. 254
Wetherelli 3. 758; 4. 508
Thecideidae
(fam.) 3.239!; 4.60!, 504
Thecidium (cfr.Thecidea)
Bouchardi 6. 334; 7. 830
corrugatum 7. 116
digitatum 4. 504
dorsatum 4. 504
duplicatum 7. 483
Klipsteini 4. 504
papillatum 7. 116
productiforme 5. 498
radiatum 4. 60, 504
septatum 7. 483
serratum 7. 483
Wetherilli 7. 482
Thecocyathus 2.115*, 758
Thecodontosaurus
gen 0. 252; 5. 757
antiquus 4. 751!
Thecophyllia
gen. 0. 758!; 2. 117*
Beaumonti 0. 759
cyclolithoides 0. 759
decipiens 0. 759
Guettardi 0. 759
patellata 0. 759
ponderosa 0. 759
spp. 6. 496
Thecosmilia
annularis 8. 873
deformis 4. 868
gregaria 8. 358
spp. 2. 758
Thecostegites 2. 120*
auloporoides 2. 341

Thecostegites
parvulus 2. 341
Thelodus
gen. 8. 113
parvidens 3. 629, 630; 6. 122
Themse-Wasser 1. 353!. 591!; 2. 215
Thenardit 1. 453; 2. 219, 221!, 223!; 4. 449
Theobroma 0. 635
Theone
clathrata 2. 126
Theonoa
Bowerbanki 5. 635
clathrata 5. 635
distorta 5. 635
Therea
hispida 5. 123
petiolata 5. 123
pubescens 5. 123
villosa 5. 123
Thereva
carbonaria 6. 757
carbonum 1. 677
Theridium
alutaceum 5. 122
bifurcum 5. 122
clavigerum 5. 122
chorius 5. 122
crassipes 5. 122
detersum 5. 122
granulatum 5. 122
hirtum 5. 122
ovale 5. 122
ovatum 5. 122
setulosum 5. 122
simplex 5. 122
Theridomys gen. 4. 831
antiquus 5. 371
aquatilis 5. 225, 371
Aubery 5. 371
Blainvillei 5. 225
breviceps 5. 225, 371
Cuvieri 5. 371
dubius 5. 371
Jourdani 5. 225, 371
Lembronica 5. 225
siderolithicus 5. 615; 6. 599
Vaillanti 5. 225
Vassoni 5. 371
Theridosorex
gen. 5. 224
Thermen 1. 726; 6. 731; 8. 575, 734, 859; 9. 102, 132, 510
Thermoelektrizität 9. 293
Thermophyllit 9. 82!
Therosaurii
(fam.) 6. 759
Therosaurus
gen. 6. 759
Thespesius
gen. 8. 255!
occidentalis 8. 255!, 376
Thetis
laevigata 6. 861
major 0. 393; 1. 357, 744; 6. 861
minor 0. 393; 1. 357, 744; 6. 861
Sowerbyi 0. 393
trigona 6. 646, 651; 7. 627
spp. 2. 977
Thier-Arten:
Zahlen in den geologischen Perioden 5. 218
-Fährten 5. 871, 875; 7, 877!; 9. 756!, 867!, 875
alluviale 5. 862
in Buntsandstein 3. 753; 4. 858
sogenannte 3. 150
-Geographie 0. 509
ursprüngliche 5. 605
jetzige 5. 608, 624
-Leben in heissen Quellen 9. 510
in Meeres-Tiefen 7. 111
-Welt:
Australiens 8. 535
ihre Provinzen 5. 608
Thinnfeldia
gen. 3. 241!
Münsterana 3. 241
parvifolia 3. 241
rhomboidalis 3. 241; 6. 253
speciosa 3. 241; 6. 253
Thjorsanit 0. 447; 2. 317!; 4. 598!, 601
Tholodus
Schmidi 0. 246!; 3. 18, 29
Thomsonit 3. 257; 5. 707!; 6. 36!, 446!
Thon 4. 708!, 709!; 9. 258, 260
Thon
feuerfester 2. 329!, 768
plastischer 3. 189
von Limoges 0. 355
-Konkrezionen 4. 475
Thoneisengranat 4. 183
Thoneisenoxydhydrat 1. 388*
Thoneisenstein 1. 388*; 2. 134 ff., 521, 847!; 3. 389 ff., 841!; 4. 404; 9. 183!
körniger 7. 346
der Oolith-Formation 3. 324
-Lager 6. 579
Thonerde
-Bisilikat-Krystalle künstlich 5. 145
-Hydrosulphat 8. 819!
-Kalksilikate 6. 842!
-Silikat, Wasser-haltiges 4. 192
Thonglimmerschiefer 7. 81; 9. 753
Thonige Gesteine, durch Trappe metamorphosirt 8. 390
Thonporphyr 0. 355; 9. 550*
Thonporphyroid 6. 204
Thonschiefer 0. 521. 682!, 730; 2. 873ff.; 4. 303!, 324; 8. 594; 9. 89
Metamorphose 6. 595!
Versteinerungen 0. 465
Thonstein 4. 348!; 9. 534! ff., 574
-Porphyr 8. 651; 9. 550*, 680
Thon-und-Kalkerde
-Hydrophosphat 3. 598
Thoracoceras
gracile 1. 491
ibicinum 0. 243
Thoracopterus
gen. 8. 21!
Niederristi 8. 18!
Thorit 4. 447!
Thracia
gen. 6. 250
Agassizi 6. 858
alta 6. 858
convexa 6. 858
corbuloides 6. 858

Thracia
costata 7. 229
curtansata 7. 743
depressa 8. 488
elongata 0. 393; 6. 858
Frearsana 6. 858
gibbosa 6. 858
glabra 6. 858
gracilis 8. 495
Gresslyi 6. 858
jurensis 8. 488
lata 6. 852, 858
lunulata 6. 250
mactropsis 7. 853
Murchisoni 6. 858
Nicoleti 6. 858
papyracea 6. 858
phaseolina 3. 756; 6. 534, 858; 7. 507
Phillipsi 0. 393, 415; 5. 161, 162; 6. 818, 858; 7. 480, 659, 672
pinguis 6. 858; 8. 486
plicata 6. 858
pubescens 6. 858; 7. 507
Robinaldina 6. 858
rugosa 3. 605
Studeri 7. 743
subrugosa 6. 495
tellinoides 6. 858
ventricosa 7. 507
spp. 1. 382; 2. 977; 6. 599, 858; 7. 632
Thraulit 0. 705!
Thrips
antiqua 6. 503
Thrissonotus
gen. 8. 237!
Colei 8. 237
Thrissops
gen. 3. 118*
cephalus 1. 768
spp. 4. 382; 9. 764
Thrissopterus
gen. 6. 481!
Catulloi 6. 481
Thuites s. Thuyites
Thuioxylon s. Thuyoxylum
Thulit 1. 92!
Thuringit 0. 58!, 705!
Thurmannia (Coleopt. gen.:)
punctulata 2. 984
Thurseodus
gen. 9. 378
acutus 9. 378
Thuya gen. 7. 364!
occidentalis 3. 746
Thuyites 0. 632
Breynanus 3. 226, 746
expansus 6. 254
Germari 2. 888; 6. 253, 254
gibbosus 3. 746
Gravesi 2. 888
heterophyllus 3. 746
Hoheneggeri 2. 888
imbricatus 2. 888
Kleinanus 3. 226, 746
Klinsmannanus 3. 226, 746
Kurranus 2. 887
longirameus 3. 242
Mengeanus 3. 226, 746
ocreatus 3. 242
rhomboideus 3. 746
Ungeranus 3. 226, 746
Thuyinium
gen. 7. 364
Kiprijanowi 7. 363
Thuyoxylon 0. 632
Thuyoxylum
ambiguum 8. 336
Americanum 2. 962
gypsaceum 2. 894
Hlinikianum 1. 635
juniperinum 1. 635; 8. 336
Thyelia
anomala 5. 122
convexa 5. 122
fossula 5. 122
marginata 5. 122
pallida 5. 122
pectinata 5. 122
scotina 5. 122
spinosa 5. 122
tristis 5. 122
villosa 5. 122
Thyestes gen. 8. 112
verrucosus 5. 865, 867!; 8. 112
Thylacoleo
gen. 9. 756
carnifex 9. 756
Thylacotherium
gen. 9. 243*
Thymallus
gen. 3. 118*
Thynnus
propterygius 5. 380
Thyrsitocephalus
gen. 9. 863!
Thyrsitocephalus
Alpinus 0. 862
Thysanocrinus
gen. 5. 250!
spp. 5. 248; 9. 236
Tichogonia
Brardi 2. 432 f.; 6. 535
carinata 6. 239
Chemnitzi 6. 239
Tiefe des Meeres bevölkert 7. 111
der Urmeere 6. 125
des Wassers:
Einfluss auf Gesteins-Bildung 0. 140
-Regionen im Meere 2. 996; 3. 755
Tigillites gen. 4. 222!
Danieloi 4. 221
Desfontainei 4. 221
Dufrenoyi 4. 221
Tilesia distorta 5. 635
Tilestones 1. 104; 8. 624, 625, 715*; 9. 67, 507 p.
Tilia 0. 635
permutabilis 2. 894; 3. 228
prisca 9. 502
Scharffana 9. 122
Till 1. 483!, 484
Timpel-Borazit 4. 780
Timpling 4. 769
Tinca furcata 5. 622
leptosoma 5. 622
Tingis
obscura 3. 870, 873
quinquecarinata 6. 620
Tinodes
prisca 6. 622
Tinte-Regen 1. 237
Tiphys spp. 6. 477
Titan 3. 175*
metallisches 2. 702
-haltiger Chrysolith 7. 325!
-Oxyd 6. 345
Titaneisen 0. 552; 1. 558, 559; 4. 181, 453; 5. 513ff.; 6. 800; 7. 835
Titaneisenstein 4. 20
Titanit 0. 552; 3. 175, 262; 4. 29*, 272*ff., 351*, 825!; 5. 184, 186, 823; 6. 13*; 8. 820*; 9. 424*

Titansäure 3. 186
-Krystalle 1. 693*
Titanomys
trilobus 5. 225; 7. 876
Visenoviensis 6. 330; 7. 876; 9. 173
Weissenauensis 1. 75, 5. 225
Titanotherium
gen. 5. 118!; 7. 247!
Prouti 5. 115, 118; 7. 247; 8. 376
spp. 7. 115
-Schicht 9. 824
Tithymalites
biformis 6. 98
striatus 5. 628
Tiza
(Mineral) 1. 204; 6. 563
Toarcien 4. 850; 6. 208, 749, 850; 9. 94
Todtes Meer:
Wasser 3. 63!
Todtliegendes 4. 743
Tolypelepis
gen. 8. 113
undulatus 8. 113
Tolypeutes
gen. 4. 111
Tombazit 7. 175*
Tönender Sand 9. 626
Tongrien
(terrain) 0. 860; 2. 350, 882; 3. 73, 612, 625; 4. 83; 6. 477; 7. 496, 503p.; 8. 712, 714, 717
Topas 0. 452; 1. 700, 710*; 2. 522, 535; 4. 21, 787, 820*; 5. 702*, 826, 827; 6. 43. 688; 9. 187
Topasfels 4. 787
Töpferthon 4. 709
Topfstein 8. 73!
Topographie
Deutschlands 9. 107
(Mineral-)
Grossbritanniens 9. 186!
Topographische
Mineralogie 5. 704
Verbreitung der Seethiere 3. 755
Torf 2. 31; 3. 44; 4. 208; 8. 77, 280!
Torf
Wachsen desselben 1. 363
-Bildung 9. 347
-Insel 4. 208; 8. 345
-Kohle 8. 281
-Lager 1. 729; 8. 659 ff.
-Moore 3. 191; 4. 94; 6. 202; 8. 284
-Pechkohle 8. 278!
Tornatella
Beaumonti 5. 593
Buvignieri 7. 210
Charpentieri 5. 593
conica 3. 634
gigantea 3. 634; 4. 873; 5. 87
inermis 7. 210
inflexa 8. 875
Lamarcki 0. 366; 3. 634
milium 7. 210
minuta 8. 875
Nysti 6. 534
secale 7. 210
simulata 6. 534; 8. 740; 9. 866
subglobosa 3. 634; 4. 874
triticum 7. 210
voluta 3. 634
spp. 9. 498
Torquilla
spp. 9. 114
Torulosus
-Bett 6. 852
Tosca-Gestein 8. 837
Tourtia 0. 134, 298; 2. 459; 4. 508; 6. 818; 7. 474 ff., 659, 785 p., 788; 9. 107
Toxaster
Brunneri 8. 850
Campechei 4. 312, 645*, 652
complanatus 0. 230, 392, 474; 3. 166, 329; 4. 643!; 5. 162, 364, 473; 6. 818; 9. 372
cuneiformis 4. 645*
gibbus 4. 653
oblongus 3. 166, 328, 329; 4. 652; 5. 473
Sentisianus 5. 578; 8. 850
subquadratus 4. 652
Toxaster
Texanus 0. 101; 3. 165; 7. 458
Toxobrissus gen. 9. 255
Toxoceras gen. 4. 853; 6. 316*; 8. 617
longicorne 9. 124
Royeranum 1. 738; 7. 651, 659
Toxodon gen. 6. 232*; 7. 224, 869
Toxodontia
(fam.) 3. 757; 7. 869
Toxopneustes 7. 122
Trachelacanthus
gen. (pisc.) 3. 125
Trachelomonas
laevis 6. 103
Trachodon
mirabilis 7. 114!; 8. 376
Trachyaspis gen. 4. 577
Lardyi 6. 330; 7. 110*, 624; 8. 747
Sanctae-Crucis 9. 124
Trachyderma
carbonarium 6. 115
laeve 3. 380; 6. 115
squamosum 6. 115
spp. 9. 504
Trachydolerit 2. 292; 7. 357*, 361!, 737*
Trachylepis gen. 8. 112
formosa 8. 112
Trachyphyllia
gen. 0. 758!, 760; 2. 117*
Trachypora 2. 121*
Trachyt 0. 3 ff, 233, 355; 2. 292, 369, 591, 962; 3. 193, 259, 841!; 4. 99; 5. 170, 352, 363; 6. 24, 350!, 564, 706, 7. 347*, 349, 460, 606, 713!, 737*; 8. 220, 548, 840*; 9. 468, 487, 803, 828, 831, 835, 841!, 851, 854
-Dolerit 7. 357*, 361!
vgl. Trachydolerit
-Gesteine 0. 790; 1. 837! ff. 2. 666 ff.
-Konglomerate 3. 194
-Laven 7. 357*, 360!, 734, 737*

Trachyt
-Porphyr 5.585; 7.360!, 737*; 9. 304!, 740, 836
-Sandstein 3. 383 p.
-Ströme 4. 567
Trachytherium
Raulini 5. 231
spp. 8. 233
Trachyteuthis
ensiformis 9. 368, 370
Tragos
Binneyi 4. 743
juglans 1. 757!
moschatus 1. 757!
rugosus 1. 757!
semicircularis 7. 57
Tunstallensis 4. 743
Tragulotherium
gen. 5. 373
Transmutation
der Gesteine 9. 205, 209
Trapa 0. 636
natans 4. 36
Trapelocera
gen. 3. 487; 6. 224
spp. 4. 493
Trapezoeder 6. 149, 153, 159
Trapp 1.199!,473,477,487, 555ff.; 2. 271, 352, 366; 3. 271; 7. 79, 340; 8. 229; 9. 641, 656, 666
-Formation 2. 496; 8. 605, 839*
-Gebilde 0. 231
-Gesteine 1. 725; 8. 385; 9. 749
-Grünstein 7. 459
-Porphyr 9. 656
Trappische
Felsarten 8. 95
Trappit 9. 657
Trass 0. 314!
Traversellit 9. 204!
Travertin 0. 232; 7. 460, 606; 9. 870*
Treib-Eis 2. 717
Treib-Holz
(im Meere) 6. 464
Tremadoc
-slate 3. 97; 6. 112
Trematis 0. 374
cancellata 4. 504
terminalis 4. 61, 504
Trematoceras
gen. 6. 126!; 8. 238!
elegans 2. 109; 8. 124
spp. 8. 238
Trematopora
gen. 1. 766!
aspera 1. 767
coalescens 1. 767
granulifera 1. 767
ostiolata 1. 767
punctata 1. 767
solida 1. 767
sparsa 1. 767
spinulosa 1. 767
strata 1. 767
tuberculosa 1. 767
tubulosa 1. 767
spp. 5. 248
Trematosaurus 0. 752!, 754
Albertii 5. 757
Brauni 0. 754; 5. 756
ocella 8. 555
Tremocoenia 2. 117*
Tremolit 2. 879; 3. 271; 8. 701!
Trenton
-Kalkstein 2 981; 9. 341, 635 p.
Trepanodon
vdr. Drepanodon
Tretaspis
gen. 1. 509!
fimbriatus 4. 502
seticornis 4. 502
spp. 4. 502
Tretoceras
gen. 9. 508!
bisiphonatum 9. 508
Tretosternon
gen. 4. 575
Triacrinus
gen. 9. 759
polyodontus 6. 256
Triaenopus
gen. 9. 868
Baileyanus 9. 868
Emmonsanus 9. 868
leptodactylus 9. 868
Triarthrus
gen. 0. 100, 105, 779!, 785; 3. 487; 6. 224²
Beckei 0. 100, 105
Trias 1. 104; 4. 356 ff.; 5. 315, 364, 585, 806, 817: 7. 464; 8. 622p; 9. 750!
Trias
-Gliederung
in Tyrol 2. 355
in Ostindien 5. 735
-Florula
von Raibl 8. 128
-Formation 0. 732; 1.335, 641p.; 2.867, 967; 3. 158, 738; 4.203; 5.856; 6.64, 736!, 757 p., 818, 825; 7. 195, 342, 459, 481, 594, 615², 620, 691, 760 p.; 8. 1 gp., 124, 344, 358, 383 p., 445, 603, 608, 710, 713, 719, 725, 741, 767, 850; 9. 39p., 104, 132, 144, 219. 350ff., 356p., 359p., 476, 753
in den Alpen 4.455
im Teutoburger Wald 0. 406
zu Lugano 5. 480
im Felsgebirge 5.726
-Gebirge 2. 53
Gliederung 2. 622
Tricarpellites 0. 638
Triceratium
acutum 6. 103
carinatum 6. 103
favus 0. 473; 6. 103
flos 6. 103
megastomum 6. 103
pileolus 6. 103
pileus 6. 103
reticulum* 6. 103
striolatum 0. 473
undulatum 6. 103
spp. 4. 739
Trichalzit 9. 194!
Trichechus
rosmarus 5. 113; 8. 628
Virginianus 5. 113! 8. 628
Trichites gen. 3. 219!
nodosus 2.230; 3.220; 4. 765
undatus 3. 220
Trichocrinus
gen. 6. 632!
altus 6. 632!; 7. 860
depressus 6. 632!; 7. 860; 8. 372

Trichoides
gen. 6. 67!
ambiguus 6. 67
Trichomanes
radicans 6. 244
Trichomanites 0. 627
gyrophyllus 2. 891
Kaulfussi 5. 629
Trichoniscus
asper 5. 121
Trichopteris 0. 627
Trichostomum
proavum 6. 622
subcanescens 3. 746
subpolystichum 3. 746
substrictum 3. 746
Trichotropis
borealis 3. 764
cancellaria 9. 493
Triconodon
gen. 9. 243*
Tridacophyllia
gen. 0. 758!, 760; 2. 117*
Tridactyla 9. 867
Tridentipes
gen. 9. 867
elegans 9. 867
elegantior 9. 867
ingens 9. 867
insignis 9. 867
Triforis
bitubulatus 7. 623
Triebsand-Stein 2. 91!; 4. 201
Trigonal
-Prisma 6. 164
-Pyramide 6. 158
-Trapezoeder 6. 159
Trigonaspis
gen. 6. 375!
cornuta 6. 370
laevigata 6. 370
spp. 2. 927. 929
Trigonella
piperata 6. 859
plana 7. 506
spp. 6. 859
Trigonellites
lamellosus 5. 613
pes-anseris 3. 24
problematicus 5. 613
solenoides 5. 613
Theodosiae 8. 873
vulgaris 3. 24
Trigonia
gen. 1. 512; 3. 877*
Trigonia
affinis 1. 743; 6. 871
aliformis 0. 102, 292, 728; 1. 358, 744; 3 165; 4. 80; 6. 871; 8. 850
angulata 2 230; 3 878
antiqua 6. 871
arcuata 8. 517
aspera 6. 871
cardissoides 0. 484, 485; 1. 649; 2. 20; 3. 25; 5. 245
carinata 6. 871
clavellata 0. 167, 169, 170, 174, 405, 723; 1. 486; 4. 621; 5. 848; 6. 871²; 7. 350, 469; 8. 486, 721
clavo-costata 2. 230; 3. 878; 8. 356
concentrica 0. 184
conjungens 4. 766
Constantii 1. 139; 2. 157
costata 0. 160, 164, 182, 183, 405, 871; 1. 484, 486; 2. 349; 3. 878; 4. 621, 766, 851; 5. 213, 734, 848, 856; 6. 871; 7. 133; 8. 356, 583, 721; 9. 31
costatula 2. 230; 3. 878; 6. 871; 8. 356
crassatellina 6. 871
crenulata 1. 743
curvirostris 2. 20; 6. 818
cuspidata 4. 766
daedalaea 1. 743; 6. 871
decorata 3. 878; 7 743; 8. 356
Delafossei 0. 482
divaricata 0. 393
duplicata 3. 878; 4. 766; 8. 356
elegans 7. 369
elongata 6. 871
exigua 3. 878²; 8. 356
Falki 1. 496
flecta 4. 766
gemmata 3. 878
gibbosa 0. 174; 3. 814; 6. 871; 8. 488
Goldfussi 1. 649; 2. 109; 4. 766; 6. 871
Trigonia
Hanetana 3. 45
harpa 0. 733; 6. 871
hemisphaerica 3. 878
Herzogi 6. 871
imbricata 4. 766
impressa 4. 766
incurva 0. 174; 8. 488
Junioi 1. 496
Kefersteini 6. 737; 8. 21, 125
laevigata 6. 818
limbata 6. 871²; 8. 850
lineata 0. 535
lineolata 2. 230; 6. 871
litterata 6. 850, 871²
lyrata 6. 871
major 6. 871
maxima 6. 871
Meriani 6. 871
Moretani 4. 766
muricata 8. 488
navis 0. 155, 156, 182; 1. 412, 491; 6. 852, 871; 8. 583², 721
-Bett 6. 852
nodosa 6. 871
nodulosa 6. 871
ovata 2. 20 f.; 3. 13
palmata 6. 871
pennata 6. 871
Phillipsi 3. 878; 4. 766
plicata 0. 184
postera 6. 741; 9. 629
pulchella 6. 852, 871²; 9. 29
pullus 0. 163; 4. 766; 6. 871
Puschi 6. 871
quadrata 6. 871
quinquecostata 3. 878
Raiblana 0. 733; 3. 167
Ramsayi 8. 356
Roemeri 6. 871
rudis 6. 871
rugosa 6. 871
scabra 4. 840; 6. 871; 7. 613
septaria 3. 45*
signata 3. 878; 4. 851; 6 852
similis 5. 2 13; 6. 852, 871
simplex 1. 647
sinuata 6. 871
spectabilis 6. 871
spinosa 1. 742; 4. 840; 6. 871

Trigonia
spinifera 8. 486
striata 2. 230; 3. 878; 6. 852; 8. 356
subcrenulata 6. 871
subexcentrica 6. 871
subglobosa 3. 878; 4. 766
subpulchella 6. 871
sulcata 6. 871
sulcataria 1. 742; 6. 871
suprajurensis 6. 871; 8. 488
tenuicosta 3. 878
thoracica 6. 871
Toquaymana 6. 871
transversa 6. 616
tripartita 2. 352
tuberculata 6. 852
tuberculosa 2. 230; 3. 878
Vcostata 2. 230; 8. 356
Voltzi 8. 488
vulgaris 1.649; 2. 19ff., 53; 6. 60, 218; 8. 125
Whatleyae 0. 733; 3. 167; 8. 125
spp. 2. 977; 6. 871; 7. 623
Trigoniaceae 7. 627
Trigonien-Bank 3. 614
-Grit 1. 484
Trigonocarpum
gen. 0. 630; 5. 860!; 8. 627!
amygdalinum 8. 626, 627
areolatum 8. 626, 627
cylindricum 8.626, 627
Dawesi 5. 631; 8. 626, 627
dubium 8. 626, 627
ellipsoideum 2. 891; 5. 243
elongatum 8. 626, 627
laeviusculum 8. 627
Mentzelanum 5. 631; 8. 626, 627
Noeggerathi 5. 631; 8. 626, 627
oblongum 8. 626, 627
olivaeforme 8. 626, 627
ovatum 8. 626, 627
Trigonocarpum
Parkinsoni 5. 631; 8. 501, 626, 627
pedicellatum 8. 627
Schulzanum 8. 626, 627
ventricosum 8. 627
spp. 9. 379, 381
Trigonoceras
gen. 6. 126!
paradoxum 6. 122
Trigonocoelia
gen. 6. 873
emarginata 6. 872
pella 6. 872
Trigonodon
Oweni 2. 999
Trigonoeder 6. 158
Trigonosemus 0. 244
elegans 4. 60, 504, 508; 7. 482
incertus 4. 508; 7. 482
lyra 4. 508
Trigonotreta
acute-lobata 6. 374
alata 4. 119, 747 7. 637
cristata 4. 119, 746, 747
fragilis 2. 907
granulosa 4. 764
Jonesana 7. 637
Jonesia 4. 747
multiplicata 4. 747
permiana 4. 119, 747; 7. 223, 637
undulata 4. 119, 747
Trilobitadae 1. 506!
Trilobitae 1.255; 2.257!; 3. 335!, 446, 486, 579; 4. 45, 47; 9. 120, 864
Klassifikation 0.49, 769!
Böhmische 4. 1
Britische 4. 500
Schwedische 2. 242!; 4. 492
Trilobiten-Faunen 2. 257!
Trilobites
acuminatus 9. 864
Buchi 7. 381
caudatus 7. 380
coniocephalus 4. 501
intercostatus 3. 489
mutilus 4. 1
problematicus 4. 498; 8. 745*
Triloculina
gen. 5. 755; 6. 608; 7. 377
anceps 2. 255
angusta 7. 498
Austriaca 7. 271!
circularis 6. 757
consobrina 7. 271!
decipiens 2. 255
dichotoma 2. 255
elongata 4. 737
enoplostoma 2. 254; 6. 757
gibba 7. 271!
laevigata 6. 757
liasina 9. 371
microdon 2. 255
Moguntiaca 3. 672!
nitens 2. 255; 7. 498
oblonga 7. 498
obotritica 7. 498
orbicularis 7. 498
turgida 2. 254; 6. 757
valvularis 2. 254; 6. 757
Trilophodon
gen. 7. 58, 486; 8. 765
Borsoni 8. 379; 9. 870
Trimerocephalus
gen. 1. 507!
laevis 6. 116
Trimerus
gen. 3. 487; 6. 116
spp. 4. 493
Trimorphismus 2. 224
Trinema gen. 5. 750, 755
Tringa
Hoffmanni 5. 231
minuta 5. 862
Trinkwasser,
Aufsuchung 2. 730
Londoner 0. 847!
Trinodus
gen. 1. 510; 3. 488
agnostiformis 6. 116
tardus 6. 116
Trinucleus
gen. 0. 780!. 785; 1. 509!; 3. 487; 6. 224²
asaphoides 7. 381
Bucklandi 1. 509; 4. 502; 6. 225
Caractaci 4. 502; 6. 116
concentricus 4. 502; 5. 593

Trinucleus
fimbriatus 4. 502
gibbifrons 1. 509; 4. 502; 6. 116
Goldfussi 4. 502; 6. 500
granulatus 4. 501; 6. 807
laevis 1. 507; 6. 625
latus 4. 502; 6. 116
Lloydi 4. 501
nudus 7. 381
ornatus 4. 502
Pongerardi 5. 98
Reussi 7. 638
radiatus 4. 502; 6. 116
seticornis 1. 509; 4. 502; 6. 225
Spaski 9. 121
Sternbergi 4. 502
Thersites 4. 502
spp. 4. 493; 5. 97
Trionyx
Amansi 5. 232
Backwelli 4. 576
Barbarae 1. 713; 2. 379
circumsulcatus 1. 713; 2. 379
Doduni 5. 232
foveatus 7. 115; 8. 256!, 376
Henrici 1. 713; 2. 379
incrassatus 2. 379
Laurillardi 5. 232
Lockharti 5. 232
marginatus 1. 713; 2. 379
Maunoir 5. 232
Parisiensis 5. 232
Partschi 6. 484!
planus 1. 713; 2. 379
pustulatus 2. 379
rivosus 1. 713; 2. 379
spinosus 8. 251
Styriacus 6. 485*
Vindobonensis 6. 484!
vittatus 5. 232
spp. 1. 76; 6. 485[5]; 7. 624; 8. 747
Tripel 7. 843
aus Polygastern 6. 101
Triphan 1. 575!; 2. 852!
Triphyllocoenia 2. 117*
Triplasia Murchisoni 4. 867
Triplopterus
Pollexfeni 9. 491
Triplosporites 0. 629
Tripneustes 7. 122
Tripodiscus
Argus 0. 473
Triphyllin 2. 517; 3. 700; 4. 177!
-Baryt 6. 687
Triquetra
aequorea 6. 752
rectilinearis 6. 752
Tristichius
arcuatus 5. 374
Tritomit 1. 352; 8. 566!
Triton affinis 7. 420
argutus 1. 716
basalticus 9. 355, 431
buccinoideus 3. 236
corrugatus 7. 420
crassidens 6. 753
Lucasaniensis 5. 233
Noachicus 2. 466
parvulus 7. 421
Sansaniensis 5. 233
Spengleri 1. 229
varians 7. 420
spp. 6. 750
Tritonium 3. 96
antiquum 2. 855*
argutum 6. 534
cribriforme 3. 635; 4. 875
doliare 3. 75
femorale 2. 509
Flandricum 6. 534[2]; 9. 125, 866
Gosauicum 3. 635; 4. 875
heptagonum 3. 763
loricatum 3. 635; 4. 875
Norwegicum 7. 509
rugosum 9. 138
subclathratum 3. 76
spp. 6. 477, 479
Trochalia 0. 639!
grandis 0. 639
Eudesi 3. 234
Trochictis
carbonaria 9. 428*
Trochidae
(fam.) 6. 121
Trochiliscus gen. 8. 630, 632
Trochilisken 8. 110
Trochilites antrinus 4. 749
helicinus 7. 638
Trochita
alta 6. 230
Trochita Diegoana 7. 242
Trochiten-Kalk 0. 484, 485; 4. 482
des Muschelkalks 3. 13
Trochites antrinus 4. 750
helicinus 4. 749
Trochoceras
gen. 5. 285*; 6. 316*
serpens 6. 371
turbinatum 3. 343
spp. 4. 3 ff.; 5. 248
Trochocrinus
Gottlandicus 8. 704
Trochocyathus 2. 115*
alpinus 3. 606
carbonarius 4. 867
cornutus 3. 606
cyclolithoides 3. 606
lamellicostatus 4. 867
latero-cristatus 6. 740
sinicosus 3. 606
Vandenheckei 3. 606
spp. 1. 627[2]; 2. 758
Trochocystites spp. 9. 504
Trocholites (Trocholithes)
anguiformis 6. 122
planorbiformis 6. 122
Trocholithes gen. 8. 617
Trocholithidae
(fam.) 8. 617!
Trochophyllum 2. 121*
Trochopora gen. 4. 117!
conica 3. 74
Trochoseris 2. 119*
distorta 2. 377; 6. 245
lobata 4. 868
Trochosmilia 2. 116*
Basochesi 4. 867
bipartita 4. 867
Boissyana 4. 867
complanata 3. 582; 4. 867
compressa 7. 613
corniculum 3. 606
Dumortieri 5. 592
elongata 4. 867
fimbriata 3. 608
granifera 5. 592
inflexa 4. 867
irregularis 5. 475
multilobata 3. 606
multisinuosa 3. 606
Salzburgana 4. 867
subinduta 4. 867
tifauensis 5. 592
varians 4. 867
vertebralis 3. 606

Trochosmilia sp. 1. 627²
Trochotoma
gen. 0. 870; 3. 237!
acuminata 3. 235
calyx 2. 228
carinata 2. 228; 8. 356
clypeus 6. 494
conuloides 3. 235
discoidea 3. 235
depressiuscula 2. 228
extensa 3. 235
funata 2. 228
obtusa 3. 235
solarium 2. 228
tabulata 3. 235
vetusta 6. 494
Trochurus
gen. 1. 509; 3. 488
nodulosus 6. 116
spp. 4. 493
Trochus
acuminatus 4. 850; 7. 210; 8. 644
Adansoni 3. 764
affinis 2. 228
agglutinans 0. 861; 1. 717
Albertianus 3. 13; 6. 245
Albertii 0. 485
Albertinus 0. 485; 6. 363; 7. 761
Allionii 9. 557
alternans 2. 228
Ambrosinii 9. 357
Amedei 3. 74
Andersoni 8. 875
anceus 3. 234
anti-carinatus 9. 357
Araonis 3. 74
asperus 3. 764
Audebardi 3. 74
Basteroti 9. 361
Beaumonti 8. 875
Blainvillei 8. 875
bicariniferus 3. 764
biarmatus 2. 463
bicingendus 2. 228
Bunburyi 3. 234
caelatulus 6. 121
Cainalli 9. 357
calliferus 0. 861
capitaneus 0. 155
catenulatus 2. 108
cinerarius 3. 764
cineroides 3. 764
cingillato-serratus 2, 228
Trochus
cingulatus 5. 796
coarctatus 3. 634
constrictus 4. 547!; 6. 121
conulus 3. 764
convexus 6. 821
Cordieranus 8. 875
costatus 7. 866
crenularis 3. 764
decurrens 4. 548!
Deshayesi 5. 475; 6. 494
ditropis 3. 764
dubius 2. 167, 169
Dunkeri 3. 234
duplicatus 0. 155; 7. 130. 613; 9. 29, 94, 95
fasciatus 1. 146
Fedrighinii 9. 357
Fenonianus 8. 875
formosus 3. 764
Gabrielis 1. 101
gemmatus 2. 228
Generellii 9. 357
geniculatus 6. 821
giganteus 8. 874
gregarius 7. 760
Haimei 9. 361
Hausmanni 0. 99; 2. 943; 6. 245, 363
helicinus 3. 128; 4. 118, 489, 750
helicites 6.121; 7.760; 8. 715*; 9. 340, 507
Hommairei 8. 875
Ibbetsoni 3. 234
incisus 9. 357
inflatus 7. 509
infundibuliformis 2. 228
infundibulum 2. 167, 169
intermedius 4. 850
Juliani 6. 494
Kickxi 3. 764
Koninckı 6. 758
labiatus 9. 357
Lapeyrousei 5. 593
Leckenbyi 3. 235
levissimus 3. 604
Lucasanus 5. 475
Lygonii 8. 875
magus 7. 509
millegranum 3. 764
minimus 4. 548!
Trochus
monilifer 1. 716
monilitectus 0. 164; 1. 487; 2. 228; 3. 235; 6. 852
Montacuti 3. 764
Moorei 6. 121
Moscardii 9. 357
multigranus 3. 764
multispira 6. 372
Murchisoni 8. 875
Nicensis 3. 604
nitidus 6. 494; 7. 210
nudus 3. 759
obconicus 3. 764
obsoletus 3. 234
octosulcatus 3. 764
ornatus 4. 370; 6. 217
Pageanus 8. 875
papillosus 3. 764
Pasinii 9. 357
patulus 0. 223; 3. 74; 4. 515; 7. 783; 9. 839, 854
pictus 7. 421
pileolus 3. 234
pileus 2. 228
Pillae 9. 357
plicato-granulosus 3. 634; 4. 874
plicatus 3. 234
Podolicus 7. 421
polyphyllus 1. 101
pulchellus 8. 875
pseudoconoides 2. 43
pusillus 3. 128, 772; 4. 750; 7. 638
Rhenanus 6. 534; 9. 138
rugosus 4. 370
sinistrorsus 6. 494. 758; 7. 210
Southerlandi 8. 875
speciosus 3. 759
spiniger 3. 634
spiralis 3. 234
squamiger 3. 234
strobiliformis 6. 758
subexcavatus 3. 764
subsulcatus 2. 162, 169
subturgidus 3. 74
Thomsonanus 7. 638
tricariniferus 3. 764
tricinctus 6. 256
triqueter 3. 634
tubicola 6. 494
tumidus 3. 764

Trochus
turbinatus 2. 162, 169
turgidulus 3. 764
undulatus 0. 182
Vesuntius 0. 155
villicus 3. 764
vulgatus 4. 869, 874
zizyphinus 3. 764
spp. 1. 253; 5. 768
Trogontherium
gen. 5. 371
Trogosita
emortua 1. 759
sp. 3. 105
Trombidium
clavipes 5. 124
crassipes 5. 124
granulatum 5. 124
heterotrichum 5. 124
saccatum 5. 124
scrobiculatum 5. 124
Trona 4. 447!, 449!; 9. 446
Troodon
formosus 7. 114!; 8. 376
Troost's Tod 1. 74
Troostit 0. 342!; 3. 69*
Tropfstein
-Bildung 5. 465; 6. 537
-Drusen 0. 848
Trophon
altum 3. 763
alveolatum 3. 763
antiquum 3. 763; 7. 509
consociale 3. 763
contrarium 7. 509
costiferum 3. 763
elegans 3. 763
Fabrici[us]i 7. 509
gracile 3. 763
gracilius 3. 763
imperspicuum 3. 763
muricatum 3. 763
Norwegicum 7. 509
paululum 3. 763
propinquum 7. 509
scalariforme 3. 763
Turtoni 7. 509
Tropidaster gen. 7. 748!
pectinatus 7. 747
Tropidocyathus 2. 115*
Tropidonotus
atavus 5. 337; 9. 175*, 724
Tropidonotus
Oweni 5. 337
Tropifer
gen. 8. 115!
laevis 8. 115!
Troxites
Germari 6. 108
Trümmer-Achat 8. 820
Truncatula
gen. 2. 125, 126!
Truncatulina
gen. 5. 755
communis 7. 498
lobatula 7. 279!, 309, 498
tumescens 7. 279!
spp. 2. 511*
Trygorhina
gen. 5. 380
de Zignoi 5. 380
Trymohelia
gen. 2. 116*, 249!, 250
Tscherno-sem 0. 350!; 2. 344 p.; 6. 74*
Tscherno-sjom 7. 473!
Tschornoi-zem 5. 582
Tubastraea 2. 118
astroites 0. 764
Tuberculaten
-Bank 9. 17
-Bett 6. 451!
Tubicaulis
gen. 0. 630; 1. 115
angulatus 1. 110
dubius 8. 503
primarius 8. 503
ramosus 1. 110; 8. 503
Schemnitziensis 1. 115
solenites 8. 503
Tubicellaria
gen. sp. 4. 114!
Tubulicladia
spinigera 4. 744
Tubifer
gen. Pictte 7. 210!, 865, 866!
actaeoniformis 7. 866
bicinctus 7. 866
bicostatus 8. 380
Gerandoseus 7. 866
Heberti 7. 210
nudus 7. 866
Petri 8. 380
plicatus 7. 866
striatus 7. 210
Tubipora 2. 123
Tubiporidae
(fam.) 6. 113
Tubulipora sp. 2. 125
Tubulosa
(Coralliaria) 2. 121*
Tuff 5. 45
vulkanischer 8. 846
-Gestein 7. 459
-Konglomerate 9. 312
Tuffeau 5. 364
Tully
-Kalkstein 3. 817; 6. 368
Turbinaria 2. 119*
Turbinella
Dujardini 4. 760
ovoidea 2. 509
Wilsoni 2. 509; 6. 229
spp. 4. 760; 6. 479, 750
Turbinites
dubius 0. 99; 1. 649; 5. 501
Turbinolopsis
elongata 2. 938
Turbinoida
(fam.) 5. 745! ff.
Turbinolia
gen. 2. 115*
appendiculata 7. 232
Batthyani 7. 232
Berica 7. 232
Bowerbanki 1. 716
Castellinii 7. 232
caulifera 6. 230
Celtica 0. 243
cistella 7. 232
conulus 2. 146, 167, 170
cyathus 6. 230
Delmontana 8. 486
dispar 0. 170
Donatiana 1. 488; 4. 744
duodecimcostata 2. 43
exarata 3. 369; 6. 93
firma 1. 716
Fredericiana 1. 716
Geoffroyi 0. 760
humilis 1. 716
inflata 7. 232
lingula 7. 232
lunulitiformis 6. 230
mutica 7. 232
plana 7. 232
praelonga 3. 369; 6. 93
Pulghensis 7. 232
pyramidalis 2. 121
subinflata 7. 232

Turbinolia
sulcata 7. 499; 9. 125
turgidula 7. 232
unisulcata 7. 232
spp. 1. 627
Turbinoliidae
(fam.) 2. 375!; 6. 114
Turbo
acinosus 3. 634
angulatus 6. 494
arenosus 3. 634; 4.874
atavus 4. 850
Bervillei 9. 361
bicostatus 6. 256
biserialis 6. 121
Buchi 3. 609
Buvignieri 4. 850
canaliculatus 0. 238
capitaneus 2. 228; 3. 234; 6. 852; 8. 356; 9. 29
Cheltensis 2. 228
concinnus 4. 672
costellatus 6. 494
crebristria 6. 121
cyclostoma 4. 850; 5. 254
Czjzeki 3. 634
decoratus 3. 634; 4. 874; 5. 501
dentatus 3. 634; 4. 874
depressus 6. 758; 9. 356
ditior 4. 850
dubius 7. 760
elaboratus 2. 228; 3. 234
funiculatus 9. 499
gemmatus 6. 494; 7. 210
gibbosus 6. 852
globosus 3. 634
Gomondei 3. 234
Gosauensis 4. 874
gracilis 1. 741
granosus 6. 372
Gravesi 1. 101
gregarius 0. 484, 485; 2. 19ff.; 7. 760²
Haidingeri 4. 869
Hamptonensis 3. 234
Hausmanni 6. 363
helicinaeformis 2. 108
helicinus 4. 749; 6. 121; 7. 223
helicites 7. 760²
Turbo
hordeum 9. 356
Imperatii 9. 499
incertus 6. 245; 7. 760
iniquilineatus 6. 372
insculptus 4. 850
Johannis Austriae 9. 499
lamellosus 3. 764
Mancuniensis 4. 749; 7. 638
Menkei 7. 760
Meyeri 4. 749
minax 4. 850
minutus 4. 749; 7. 638
Nebrascensis 7. 492; 8. 494
nodiferus 7. 866
Nysti 4. 850
obtusus 3. 234
Palinurus 6. 852
paludinaeformis 6. 456
paludinarius 4. 370
permianus 4. 750; 7. 638
Philemon 7. 93; 8. 643
Philenor 6. 494; 7. 865
Phillipsi 3. 235
plicatus 0, 860, 861
princeps 2. 228; 4. 354
pugilator 9. 356
punctatus 3. 634; 4. 874
pygmaeus 3. 234
pyramidalis 3. 236
quadratus 9. 356
Quirini 9. 499
rotundatus 6. 494
rugosus 2. 43
rupestus 6. 125
Sedgwicki 6. 850
selectus 4. 850
semiornatus 5. 254
Sharpei 3. 234
socialis 7. 760
solarium 7. 210
spiniger 3. 634; 4. 874
sphaeroideus 3. 764
squamifer 6. 372
Stabilei 8. 383
subcoronatus 6. 758²
subcrenatus 9. 455
subduplicatus 6. 852
Suessi 6. 758
Tayloranus 3. 126; 4. 119, 489, 750; 7. 722
tenuilineatus 7.492;8.494
Turbo
tenuis 3. 634; 4. 874
thermalis 7. 509
Thomsonanus 4. 750; 7. 638
Tunstallensis 4. 749
turbilinus 7. 760
varicosus 2. 228
vestitus 3. 634; 4. 874
vix-carinatus 9. 356
Williamsi 6. 121
spp. 1. 253, 382; 5. 768
Turbonilla
Altenburgensis 3. 772; 4. 118, 489; 7. 638
conica 9. 360
cylindrella 3. 764
dubia 2.909. 910, 943; 3. 19, 29; 6. 245; 7. 760; 9. 360
elegantior 3. 764
filosa 3. 764
Geinitzana 4. 489
gracilior 5.316; 6.245, 363; 7. 760, 761; 9. 360
gregaria 7. 760, 761
multistriata 3. 75
nodulifera 6. 363, 366; 9. 360
obsoleta 2. 943
parvula 7. 761
pseudo-acicula 3. 74
Roessleri 4. 118, 489
scalata 2. 943; 3. 20, 30; 6. 363; 7. 761
Strombecki 7. 761²; 9. 360
subacicula 3. 74
subulata 3. 764
terebra 6. 363, 366
tritonina 3. 75
turbinea 9. 360
varicula 3. 764
Zeckelii 6. 363
spp. 6. 750
Turgit 4. 814
Türkis 8. 560*
Turmalin 1. 390*, 595!, 699 ff.; 2. 522 ff., 706, 853*; 3. 843*, 844; 4. 787; 5. 181, 823,826,827; 7.832; 8. 310; 8. 444
(-Familie) 8. 699!
-Krystalle in Wacke 0.67*

Turmalin künstlich 5. 215
-Granit 7. 602
Turneri-Mergel 6. 492
-Thone 0. 180; 6. 742
Turonien
(terrain) 1. 603, 742; 3. 633, 716; 4. 508, 847, 866p.; 7. 788; 8. 553; 9. 107
Turrilites
gen. 4. 853; 6. 316*
alternatus 6. 480
Bechei 7. 640
Bergeri 3. 329; 7. 640
bifrons 7. 640
Brazoensis 0. 102
Cheyennensis 8. 494
Cocchii 7. 597
cochleatus 8. 497
costatus 0. 386; 1. 311; 5. 364, 457; 6. 817; 7. 630, 786
Desnoyersi 7. 630
Essensis 7. 785
giganteus 7. 630
Gravesanus 7. 630
Mantelli 7. 630
Morrisi 7. 630
Nebrascensis 8. 494
Puzosanus 7. 476*, 630, 659
Scheuchzeranus 7. 630, 785
triplicatus 7. 630
tuberculatus 2. 28*; 3. 495; 5. 457; 6. 817; 7. 630², 785²
umbilicatus 8. 497
undulatus 7. 730
varicosus 7. 630
Wiesti 7. 630
Turrilithes vdr. Turrilites
Turris (Rumpf)
Rippleyanus 9. 498
Turritella
absoluta 3. 759; 5. 501
acutata 9. 360
Aegyptiaca 1. 764; 7. 229
altilis 9. 498
alveata 6. 230
Andii 0. 481; 4. 80
angulata 7. 229; 8. 740; 9. 866
Arduennensis 8. 380
asperula 3. 331; 5. 369
Bavarica 4. 515
Turritella
biformis 3. 634
bilineata 0. 238
bimarginata 6. 493
biseriata 7. 242
Bolognae 5. 316; 6. 245; 9. 360
Bouei 7. 369
Brocchii 4. 515
cancellata 5. 501
Caroli 9. 361
cathedralis 3. 74; 9. 839
clathratula 3. 764
columna 3. 634; 4. 873
communis 3. 764
convexa 7. 492; 8. 494
convexiuscula 3. 634; 4. 873
Coquandana 3. 634
costifera 7. 209; 9. 360
deperdita 6. 761
Deshayesia 6. 494; 7. 209
difficilis 3. 634; 4. 873
disjuncta 3. 634; 4. 873
Dunkeri 6. 494; 7. 209; 8. 643
duplicata 2. 44
echinata 0. 164
Eichwaldana 3. 634
extincta 7. 761
fasciata 1. 764; 7. 229
fastigiata 6. 480
Fittonana 3. 634
fluens 8. 380
gradata 6. 716; 8. 585; 9. 839
granulata 4. 566; 5. 728
Hagenowana 0. 293, 297; 3. 634
Hartmannana 6. 493
Haueri 9. 356
Hörnesi 8. 861
Humboldti 0. 481, 482; 4. 80
hybrida 9. 356
imbricataria 0. 487, 736, 737; 1. 764; 2. 162, 169; 3. 370, 604, 764; 5. 473, 475; 6. 93, 739; 7. 229
inaequicincta 6. 493
incisa 3. 370; 6. 93, 739
Turritella
incrassata 3. 764; 5. 595
irrorata 6. 480
laeviuscula 3. 634
marginalis 2. 162, 169; 7. 52
Meadei 7. 369
Meudonensis 9. 361
mille-millia 4. 354
moniliformis 5. 501
Moreauensis 7. 492; 8. 494
multilineata 0. 293
multistriata 0. 293, 297
muricata 0. 723
Noeggerathana 0. 297
nodosa 0. 297
nuda 9. 356
obliquata 3. 759
obliterata 6. 363; 7. 761
obsoleta 6. 363; 7. 760
Ocoyana 7. 242
Partschi 6. 716; 8. 861
percostata 9. 360
Phillipsi 4. 750; 7. 638
planispira 3. 764
praelonga 9. 750
Prevosti 5. 593
punctata 9. 356
quadricincta 0. 297
quadriplicata 3. 74, 370; 6. 93
Renauxana 3. 636; 4. 840; 7. 369, 370, 613
replicata 7. 204
Requienana 3. 634
rigida 3. 634
rosea 1. 229
scalaris 7. 761
scalata 0. 484, 485; 2. 20; 6. 818; 7. 761²
Schroeteri 7. 761
secta 6. 480
seriatim-granulata 0. 102
sexlineata 0. 297; 1. 744
Staszycii 2. 348
strangulata 2. 43, 359; 5. 596; 6. 93, 451, 739; 7. 52; 8. 740; 9. 866
subgranulata 4. 547!
subornata 4. 547

Turritella
supracretacea 1. 101
tenuis 5. 480; 9. 356
terebra 1. 483; 2. 43
terebralis 2. 162, 169; 3. 74
Theodorii 4. 413; 7. 761; 9. 360
Thetis 3. 74
Tippahana 9. 498
triplicata 5 595, 796
trochiformis 7. 623; 8. 380
trochleata 6. 372
Tunstallensis 4. 750; 7. 638
turris 3. 74; 5. 594
unicarinata 8. 643
Uvasana 7. 242
vermicularis 1. 741; 9. 854
Verneuilana 7. 613
Vindobonensis 6. 716; 8. 861
vittata 7. 229
Turritella
Zenkeni 6. 494; 7. 209; 8. 643
spp. 1. 382; 5. 768
Turritellites
oblitteratus 7. 761
scalatus 7. 761
Tylodon
Hombresi 0. 878; 5. 229
Tylostoma 0. 375!
globosum 0. 376
ovatum 0. 376
Torrubiae 0. 376
Tympanophora 0. 638
spp. 4. 34
Typha
latissima 0. 503; 2. 994; 3. 503; 5. 639
stenophylla 0. 503; 2. 994; 3. 503; 5. 639
Typhaeloipum 0. 631
Tiphaeloipum
gracile 6. 252
Thiphaeloipum
Haeringanum 2. 994; 4. 378, 877; 5. 638
lacustre 2. 994; 7. 636
latissimum 3. 503
maritimum 2. 994; 4 378, 877; 5. 639
Sagoranium 2. 994
Spadae 7. 777
Typhis fistulosus 1. 717
horridus 2. 359
pungens 1. 717
cfr. Tiphys
Typhlocyba
Bremii 3. 868, 870, 874
encaustica 6. 620
resinosa 6. 620
Typopus gen. 9. 868
abnormis 9. 868
gracilis 9. 868
Typotherium gen. 8. 121!
Tyrit 5. 517; 8. 74!; 9. 305!, 732

U.

Übergangs
-Gebirge 6. 198; 7. 219
Entstehungs-Weise 1. 799!
Flora 0. 257; 2. 838; 5. 547
in Griechenland 5. 719
in Kleinasien 5. 719
in Norwegen 1. 269
-Kalkstein 4. 492
-Sandstein 4. 492
-Schiefer 7. 81*
-Thonschiefer 4. 492
Über-Quader 0. 133 ff.
Überrindungen
kalkige 5. 711
Überstürzte
Lagerung 0. 474; 7. 552
Ufer-Facies
der Gesteine 0. 140
Uigit 8. 823!
Ulastraea
Edwardsi 4. 868
Ullmannia
Bronni 3. 124, 128; 8. 503, 758
frumentaria 2. 991; 3. 124, 128; 8. 503, 758, 844
Ullmannia
lycopodioides 2. 991; 3. 125; 8. 844
polypodioides 8. 758
selaginoides 8. 503
Ulminium 0. 633
Ulmites
Bronni 2. 987
Ulmus 0. 633
affinis 4. 627.
Atlantica 3. 504
bicornis 3. 227
Brauni 9. 502
Bronni 2. 753; 3. 503; 6. 252; 8. 501; 9. 117, 502, 873
campestris 4. 627, 832
carpinoides 3. 227
castaneaefolia 3. 227
Cocchii 9. 117
crenata 3. 227
dentata 3. 227
elegans 3. 227
Europaea 6. 252; 9. 502
Fischeri 9. 502
gypsacea 4. 627
laciniata 3. 227
legitima 3. 227
Ulmus
longifolia 3. 227, 503
Massalongoi 9. 502
minuta 3. 227; 9. 117, 502
parvifolia 0. 505; 1. 128; 3. 227, 503; 4. 632; 9. 502
plurinervia[-vis] 2. 753; 3. 503; 4. 491; 6. 252; 9. 122, 502
praelonga 9. 502
prisca 6. 505; 9. 375
punctata 2. 761; 3. 506; 9. 502
pyramidalis 3. 227
quadrans 3. 227
quercifolia 1. 634
sorbifolia 3. 227
strictissima 3. 227
suberosa 6. 244
tenuifolia 0. 505; 8. 760; 3. 503
urticaefolia 3. 227
Wimmerana 2. 894; 3. 227; 9. 502
zelkoviaefolia 2. 753; 3 227, 504; 4. 627; 6. 252, 505; 9. 502

Ulodendron 0. 629
ellipticum 5. 868
flexuosum 5. 868
Lindleyanum 5. 631, 868
majus 1. 609; 5. 868
minus 5. 868
punctatum 5. 868
spp. 9. 381
Ulophyllia
crispata 4. 868
Ulostoma
spp. 8. 507
Ulvaceae
(fam.) 5. 637
Umbellularia 2. 123
Umbildungen
der Mineralien 8. 399
Umbra gen. 3. 118*
Umbrella
Hamptonensis 3. 235
planulata 6. 229, 230
Umhüllungs
-Pseudomorphosen 6.11
Umsetzungs-Prozesse
in den Felsarten 8. 53
Umsprosser 2. 992!
Umwandlungen
von Eisenerzen 7. 64!
Umwandlungs
-Pseudomorphosen 3.476
Uncites gen. 4. 63
gryphoides 6. 373
gryphus 2. 192; 4. 60, 504; 5. 322; 6.209, 373, 508; 7. 457
laevis 3. 110; 6. 117
Uncina
Posidonomyae 1. 511
Undaria 2. 119
Undina
gen. 3. 118*
Cirinensis 4. 382
spp. 9. 764
Ungerites
tropicus 5. 576
Unghwarit 5. 832!; 8. 570!
Ungulata (fam.) 7. 869
Ungulina
gen. 6. 864
Clotho 6. 864
Unguliten
-Sandstein 7. 607; 8. 110, 594, 632
Ungulites 0. 373
Uniloculina gen. 5. 755
Unisulcus
gen. 9. 869
intermedius 9. 869
Marshi 9. 869
minutus 9. 869
Uni[oni]cardium
cardioides 8. 643
corbisoideum 4. 766
depressum 7. 743
gibbosum 7. 743
impressum 4. 766
parvulum 4. 766
uni[oni]forme 6. 218
varicosum 4. 766; 8. 482
Unio
gen. 6. 870
abbreviatus 6. 870
abductus 0. 159
acutus 6. 870
aquilinus 5. 875
atratus 5. 628
Beananus 6. 228
carbonarius 5. 628; 8. 159
cardioides 9. 750
Carteri 9. 750
concinnus 6. 495
cyreniformis 6. 870
Danai 8. 377
Deweyanus 8. 377
Eichwaldanus 1. 609; 6. 870
Eseri 2. 765
flabellatus 4. 524, 526, 529; 6. 638
Hornschuchi 4. 412! ff.
Hunteri 9. 750
hybridus 6. 870
imbricatus 9. 750
keuperinus 4. 412! ff.
Kirchbergensis 2. 765
lignitarius 8. 585, 587
litoralis 1. 760; 2. 100; 5. 595
Malcolmsoni 9. 750
mammillatus 9. 750
Martinii 6. 66
Menkei 2. 230
Meriani 7. 844
Münsteri 6. 870
nucalis 8. 496, 497
peregrinus 7. 744
phaseolus 6. 870
pictorum 2. 195, 988, 1004; 5. 595
primigenius 6. 642
Unio
priscus 7. 494; 8. 495
problematicus 6. 870; 8. 125
robustus 6. 870
Roeperti 4. 413
Ravellianus 6. 90
Solanderi 1. 712, 713
Staffinensis 2. 352
subconstrictus 6. 870²
subparallelus 6. 870
subspatulatus 8. 377
suprajurensis 6. 869, 871
tellinarius 5. 628; 6. 870
trigonus 4. 851
tumidus 2. 1004; 6. 870
umbonatus 6. 870
undulatus 2. 44
uniformis 5. 628; 6. 870
Urei 6. 644, 650
spp. 6. 228, 870
der Jura-Formation 2. 351
Unionit 4. 189
Unorganische
Verbindungen 8. 682
Unpaar-zehige
Hufethiere 7. 867
Unsymmetrische
Ammoniten 5. 487
Unterirdische
See'n 2. 353
Untergrund:
Einfluss auf die Vegetation 0. 352
Untergrünsand 3. 811
Unterirdische
Wasser 7. 447
Unterlias 7. 211
-Sandstein 9. 391!
Untermiocän
-Gebirge 3. 625.
Unteroolith 1. 484!; 2. 226 p.; 4. 710; 6. 848, 852; 7. 469; 9. 94
Unterpläner 7. 788
Unterquader 7. 480
Unterquadersandstein 4. 643

Untersilur
-Formation 9. 635p.
Untersilurische
Gebirge 4. 486
Pflanzen 5. 362
Untersuchungs-Weise, mikroskopische, der Gesteine 3. 597
Untertertiäre
Bildungen 0. 860
Upper
mooreland sandstone 0. 163, 183
lias shale 0. 152
Ludlow 6. 112
Uraeus gen. 3. 117*
Uralit 4. 71; 7. 357*
Uran
-Glimmer 9. 188*
-haltiges Mineral 1. 592!
Uraniophyllites
spatulatus 4. 627
Uranophyllites
Meneghiniana 7. 776
Uranpecherz 5. 76!, 445*; 8. 683*
krystallisirt 0. 57!
Uraster
Gaveyi 7. 746
hirundo 6. 115; 7. 746
obtusus 7. 746
primaevus 6. 115; 7. 746; 8. 126
rubens 4. 762, 763
Ruthveni 6. 115; 7. 746
Urceopora
gen. 7. 633
Urgebirge 3. 271, 363, 375, 525; 4. 165, 294*; 8. 493
vgl. Plutonische Gebilde etc.
Urgonien
(étage) 3. 166, 329; 4. 204, 250, 652; 5. 473; 7. 481, 659; 9. 124p., 372p.
Urmeere: Tiefe 6. 125
Urolepis
gen. 8. 748!
spp. 8. 748
Urolophus
gen. 5. 380
princeps 5. 380
Uronectes
gen. 0. 575
fimbriatus 8. 201; 9. 149
Uropteryx
gen. 6. 124
striatus 4. 751
undulatus 4. 751
Urospermum
sp. 3. 504
Urostenes
gen. 1. 382!
Australis 1. 382
Urpflanze 2. 507
Urspalten
der Erd-Rinde 5. 310, 641ff., 769ff.
Ursus
Americanus foss. 5. 112; 7. 376
amplidens 5. 113; 7. 375!
arctoideus 4. 198; 5. 228, 624; 9. 93, 100
arctos 2. 998; 3 759, 5. 229
Arvernensis 5. 229, 371: 9. 116
cultridens 5. 230, 372; 9. 272
Ursus
Etruscus 5. 230; 9. 116, 271
fossilis 5. 624
giganteus 1. 504
Leodinensis 5. 229
minimus 5. 229
minutus 2. 998; 4. 753; 5. 529
Neschersensis 5. 228, 371
Pitorrei 5. 228, 624; 9. 100
priscus 3. 759; 5. 624
sidero-jurassicus 1. 501
Sivalensis 4. 495, 752
spelaeus 1. 504; 2. 998; 3. 122, 377, 759; 4. 637, 733; 5. 228, 236, 371, 375, 624; 6 540, 574²; 7. 556, 849; 8. 309; 9. 93, 100, 204, 500, 861
spp. 1. 493; 5. 384
Urus priscus 5. 244
Urwelt 4. 498!
Usnea
barbata 3. 745
Utricularia
antiqua 8. 499
Utriculus
gen. 3. 237
Uvellida
(fam.) 5. 754 ff.
Uvigerina
gen. 5. 755; 7. 377
asperula 1. 378
gracilis 2. 253; 6. 756
Orbignyana 1. 378
pygmaea 4. 738
semiornata 7. 285!, 309
Uwarowit 8. 78!

V.

Vaccinium 0. 634
Acheronticum 3. 47, 505, 510; 4. 627; 5. 241; 6. 505; 9. 375
Ariadnes 9. 375
attenuatum 2. 760; 3. 505
Bruckmanni 2. 760; 3. 505
Vaccinium
Maderense 6. 244; 8. 757; 9. 253
Orci 3. 505
parvifolium 3. 505
reticulatum 3. 505
simile 3. 747
uliginosum 9. 348
vitis-Japeti 3. 505
spp. 0. 505
Vaginaten
-Kalkstein 8. 235 ff., 594
Vaginella
depressa 3. 74
spp. 6. 750
Vaginipora
spp. 4. 116. 117
Vaginula
Badenensis 7. 378

Vaginula
Bruckenthali 7. 378
costata 7. 378
Vaginulina
gen. 5. 755; 7. 377
laevigata 7. 497
subulata 4. 738; 7. 750
spp. 2. 511*
Valanginien
(terrain) 4. 310; 5. 578, 843; 8. 850; 9. 124p.
Valvata
conoidalis 5. 746
decollata 9. 750
depressa 5. 746; 9. 348
marginata 5. 746
minima 9. 750
multicarinifera 9. 750
obtusa 9. 348
parvula 7. 495; 8. 494
piscinalis 1. 760; 3. 764; 5. 746; 9. 116
piscinaloides 5. 746
striata 3. 765
tricarinata 7. 729
unicarinifera 9. 750
spp. 6. 750
Valvatina
gen. 6. 757!
umbilicata 6. 756
Vampyr 4. 55
Vanadinblei
-Erz 4. 346!; 7. 173, 716!
Vanadinocker 6. 193
Vanadinsäure 4. 176
Vanadinsaures
Bleioxyd 0. 220; 2. 214!
Kupfer 2. 468
Vanessa
spp. 0. 853
Varanus
Lemanensis 5. 374
Varians
-Schichten 7 785
Variolit 7. 742, 357*
Varvicit 2. 530
Vatikanische
Mergel 8. 584
Vaucheria
antiqua 8. 498
Vegetations
-Gürtel 6. 476
Velella 2. 122
Velletia gen. 4. 865
elegans 4. 865
Velletia
minuta 7. 494; 8. 494
laevigata 3. 765
undata 3. 765
virgata 3. 765
Venericardia
gen. 6. 869
acuticostata 1. 764
anceps 4. 505
annulata 3. 807
borealis 6. 870
chamaeformis 4. 505
corbis 4. 505
globosa 1. 715, 716
imbricata 1. 715, 764; 3. 807; 6. 870
intermedia 4. 505
Jouanneti 0. 223
multicostata 1. 764
orbicularis 4. 505
planicosta 6. 870
praecursor 7. 94; 9. 629
Quoyi 1. 229
retrostriata 6. 373
rotundata 6. 870
scalaris 4. 505
senilis 4. 505
spissa 6. 870
sulcata 6. 870
spp. 6. 869
Venerupis
antiqua 6. 648
cingulata 6. 648
coralliophaga 6. 860
Faujasi 6. 860
Irus 4. 506; 6. 860
obsoleta 6. 648
scalaris 6. 648
subglobosa 8. 507, 585
spp. 6. 860; 8. 616
Ventriculites
bisulcatus 7. 233
Venulites
concentricus 2. 933; 6. 625, 649
Venus
acutirostris 6. 866
aequalis 6. 862
Aglaurae 9. 839
Alluaudensis 6. 869
angulata 6. 866
annulata 7. 502
antiqua 6. 860
aurea 4. 506
Basteroti 6. 861
biplicata 3. 319; 9. 629
Venus
borealis 4. 505
Borsoni 3. 605
Bosqueti 0. 861
Brongniarti 0. 402; 3. 814; 4. 506; 5. 595; 6. 818
cancellaria 4. 717
capax 6. 752
caperata 0. 294
carbonaria 6. 648
carditaeformis 6. 860
carinata 6. 860
casina 4. 506; 6. 861
casinoides 3. 74; 6. 861²
casinula 4. 506
caudata 6. 860
centralis 6. 643, 648
Chinensis 6. 862
Chione 4. 506
chionoides 4. 506
cincta 4. 506; 6. 861
circinnata 6. 864
circularis 8. 495
compressa 4. 505
concentrica 6. 753, 862
cordiformis 6. 864
coturnix 6. 861
curvirostris 2. 230
cycladiformis 6. 862
Danmonia 4. 505
Darwini 7. 404, 406!
decussata 5. 595
deformis 6. 861
depressa 6. 860
discina 4. 506
donacina 6. 616, 860
Ducatelli 6. 752
dysera 5. 595; 6. 861
elegans 6. 861
elliptica 6. 648
excentrica 6. 861
exoleta 4. 506; 6. 862
exuta 6. 860
faba 0. 294; 6. 860
fallax 7. 502
fasciata 3. 756; 4. 506; 6. 861
gallina 1. 624; 4. 506; 6. 861
Galloprovincialis 6 858
gibbosa 4. 506; 6. 860
globosa 6. 864
Goldfussi 6. 860
gradata 6. 861
grandis 6. 860

Venus
gregaria 4. 514; 7. 502; 9. 854
imbricata 4. 506
immersa 6. 860
incrassata 1. 764; 2. 43, 435; 3. 189, 605; 4. 505; 6. 860, 861, 869²; 7. 229, 502; 9. 383
incrassatoides 0. 860; 3. 605, 607; 6. 860
ingrata 8. 753
Islandica 4. 506; 5. 595, 844; 6. 861, 862
islandicoides 6. 861
isocardioides 6. 866
jurensis 6. 861; 7. 743
laevis 6. 648, 860
Lamarcki 2. 43
lentiformis 4. 506; 6. 862
liasina 6. 860
limoides 3. 604
lincta 4. 506
lucinoides 6. 864
lupinus 4. 506; 6. 864
de Majence 6. 863
marginalis 6. 861
Martiniana 6. 860
maura 6. 860
Meroe 7. 229
mesodesma 1. 229
minima 8. 875
Montagui 4. 505; 6. 869
Mortoni 6. 752
multilamellosa 4. 506
nitidula 1. 764; 3. 605; 7. 229
nuculaeformis 6. 860
ochro-picta 4. 506
ovalis 0. 294, 297; 6. 860
ovata 3. 756; 4. 506; 6 861
ovum 6. 860
parallela 6. 648, 860²
parva 6. 682, 863
parvula 4. 355; 6. 860
pectunculoides 6. 862
pectunculus 4. 506
Pennsylvanica 6. 864
permagna 6 752
Phillipsi 6. 648, 860
plana 6. 861, 863
plicata 6. 716, 861; 8. 861
Venus
plumbea 6. 868
ponderosa 6. 868
prisca 6. 648; 7. 628
Proserpina 3. 369; 6. 93, 739
puerpera 2. 509, 510
radiata 4. 506
Renauxana 4. 840
rigida 6. 861
Rileyi 6. 752
Ringmerensis 6. 864
rotundata 6. 860
Royana 6. 860
rudis 4. 506; 6. 861
rugosa 6. 861⁴
rupestris 4. 506; 6. 860
rustica 4. 506; 6. 862
Saussurei 6. 860
scalaris 0. 297
Scotica 4. 505
semiplana 8. 875
senilis 4. 506; 6. 861²
similis 4. 506
Sowerbyi 6. 861
spadicea 4. 506
spinifera 6. 864
spuria 6. 864
staminea 6. 752
striatella 3. 605
striatissima 3. 605
striatula 7. 510
subglobosa 6. 864
subinflexa 6. 861
sublenticularis 5. 592
suborbicularis 6. 861
subplicata 3. 74
Suevica 1. 486; 2. 230; 6. 862
sulcata 3. 370; 4. 505, 506; 6. 93, 739
sulcataria 0. 861; 1. 764; 7. 229
tenuis 6. 860²
tenuistriata 6. 649, 860
tetrica 6. 752
texturata 4. 506
tigerina 6. 864
trapeziformis 1. 486; 2. 230; 6. 860; 7. 743
tridacnoides 6. 752
triplicata 1. 415!, 419
turgida 4. 506; 6. 861
turgidula 6. 869
umbonaria 3. 74; 6. 861; 9. 839
Venus
undata 6. 860, 863
varicosa 4. 766; 6. 860
ventricosa 5. 479
verrucosa 3. 74, 756; 5. 595; 6. 861; 7. 510
vetula 2. 43
virginea 4. 506
spp. 1. 382; 2. 977; 6. 599, 860; 8. 616
Veränderung
von Pflanzen-Arten 4. 128
im See-Spiegel 4. 474
Verbascum
nudum 3. 747
thapsiforme 3. 747
Verbenophyllum
achleatum 8. 500
Verde
antico 8. 846; 9. 742
di Corsica 7. 600
Verdrängungs-Pseudomorphosen 3. 461, 467, 476; 8. 697
Veretillum 2. 123
Vermengung von Versteinerungen verschiedener Schichten-Reihen 2. 282
Vermetus
Bognoriensis 3. 764
Genyi 3. 604
intortus 3. 764
laevis 3. 604
lima 3. 604; 6. 93
spp. 6. 750
Vermicularia
nodus 3. 235
Sowerbyi 7. 672
Vermiculites
gen. (Rou.) 4. 223!
Panderi 4. 221
spp. 9. 106
Vermikulit 2. 852!
Vermilia
ampullacea 9. 361
cristata 9. 361
macropus 9. 361
minutissima 4. 745
obscura 4. 119, 745
Verneuilina gen. 5. 755
Münsteri 4. 867
spinulosa 2. 254; 7. 292!, 309, 498

Verneuilina spp. 2. 511*
Verruca
prisca 5. 126; 7. 117; 8. 620
pusilla 8. 620
Strömia 7. 117
Verrucano 0.832; 1.528; 2. 238; 3. 167; 4. 456; 5. 176, 178; 6. 71, 216, 575; 7. 593; 8. 327, 850; 9. 738
Verrucarites 0. 626
Verrucidae
(fam.) 7. 117; 8. 620
Versteinerter
Wald 8. 90, 754
Versteinertes Holz 9.263!
Versteinerungen
(Skelette) präpariren 1. 380
gemeinsam verschiedner Formationen 9. 232
verschiedner Schichten-Reihen im Gemenge untereinander 2.282
auf sekundärer Lagerstätte 3. 190; 4. 322
im Grossherzogthum Baden 1. 377
Versteinerungs
-Mittel 4. 719
Baryt 4. 421
Blende 4. 421
-Weise 4. 657
in jetzigen Meeren 3. 767
der Kieselhölzer 5. 577!
Vertebralina
gen. 5. 751, 755
Vertebraria
Indica 5. 735
Vertebraten-Facies
des weissen Juras 0. 175
Vertheilung der Organismen auf der Erde 5.605
Vertigo
Dupuyi 5. 746
edentula 0. 869
myrmido 5. 746
palustris 0. 869
pygmaea 0. 869
spp. 9. 114
Verwerfungen 2. 142; 4. 454
Verwerfungen
der Gänge 8. 219
der Schichten 1.478; 2. 51
Verwerfungs
-Linien 2. 198
-Rücken 5. 658
Verwitterung
des Basaltes 5. 597
des Phonolithes 5. 598
Vespertilio
auritus 9. 100
murinoides 5. 224, 371
murinus 9. 100
noctuloides 5. 224
Parisiensis 5. 224
pipistrellus 5. 224
Vesperus
Parisiensis 5. 371
Vestan 9. 816!
Vesul-Mergel 4. 359
Vesuvian 2. 866; 5. 451!
Vexillum gen. 4. 222!
Desglandi [?] 4. 221
Halli 4. 221
Labechei 4. 221
Viburnum
trilobatum 3. 505
Vicaryia fusiformis 9.750
Vicia striata 8. 499
Vicksburg-Gruppe 6. 229
Vierfüsser-Fährten 2. 939; 8. 362, 363
Vieux grès rouge 1. 105
Vikariirende
Mischungstheile 1. 694
Villarsit 0. 452!; 1.204*; 2. 711
Villarsites 0. 634
Ungeri 0. 116
Vils-Schichten 4. 88; 5. 177
Vinca major 6. 244
Vincularia
gen. 4. 115!, 116!
megastoma 5. 865; 8. 594
nodosa 8. 594
nodulosa 5. 865; 9 63
rhombiphora 7. 232
spp. 2. 125
Vinoso 7. 242
Vioa
Michelini 6. 496; 8. 643
prisca 3. 758; 6. 113
Vipera Sansaniensis 5. 233
Virgularia 2. 123
Virgularia incerta 2. 123
Virgulien (terrain) 4.353!
Virgulina
gen. 5. 755; 7. 377
Schreibersana 1. 378; 7. 295!, 309, 498
subsquamosa 7. 295!
Vitis Aussoniae 9. 117
Brauni 8. 499
Noetica 7. 778
Vitrina obliqua 8. 377
pellucida 0.869; 3.534
spp. 8. 507
Vitriol-Blei 2. 519
-Letten 2. 93
Viverra antiqua 5.229, 372
d'Orbignyi 7. 370
exilis 5. 229
genetta 2. 998
genettoides 5. 229
gigantea 5. 230
incerta 5. 229
mollassica 1. 501
palaeonictis 5. 230
Parisiensis 5. 229
primaeva 5. 229
Sansaniensis 5. 229
Simorriensis 5. 229
zibethoides 5. 229
Vivianit 2. 530; 4. 174; 6. 559!; 7. 581*, 582!; 9. 187*
Vögel 6. 633!
in London-Thon 2. 995
in Neuseeland 0. 125!
-Eier 1. 374; 5. 232, 480
-Fährten 7. 878
-Federn 5.622; 9. 725
-Knochen:
der Kreide 2. 382
Stonesfielder 7. 365
Völknerit 0, 613!; 7.832!
Vogesen-Diluvial 1. 728
-Gestein 0. 422; 6.359!
-Sandstein 0. 355; 3. 528, 737; 9. 103
Flora 0. 111!
aus Geschieben mit Eindrücken 6. 63
Vogesit 0. 676
Voigtit 7. 717!
Volborthit 0. 220; 7. 439
Volcanes 4. 718
Volcanitos 4. 718; 5. 94
Volkmannia 0. 627
arborescens 5. 628; 6.97

Volkmannia
distachya 5. 629; 6. 97
elongata 6. 97; 8. 625
gracilis 4. 847; 6. 97
major 1. 476
Morrisi 4. 847!
polystachya 5. 628; 6. 97
Vollflächner 5. 543
Vollkommenheits - Stufen der Dikotyledonen 2. 420, 601
Volta'sche Säule 1. 481
Voltait 3. 321, 599*
Voltzia 0. 632
brevifolia 4. 370; 7. 778; 8. 135
elegans 8. 135
heterophylla 4. 204; 5. 316; 6. 207, 245; 7. 778; 8. 135*; 9. 359
Phillipsi 4. 743
rigida 8. 135
spp. 7. 88
Volumens-Änderung der Erde 7. 85
Voluta
acuta 3. 635; 4. 875
affinis 3. 370: 6. 93, 739
ambigua 1. 717; 7. 635³; 8. 740; 9. 866
angusta 7. 635²
Anhaltina 9. 125
athleta 1. 717; 7. 635
bicorona 7. 635
Branderi 7. 635
Bronni 3. 635; 4. 875
bulbula 7. 635
calva 7. 635
cancellata 6. 480
carinata 3. 635; 4. 875
cingulata 9. 125
cithara 7. 635
costata 1. 716, 717; 7. 635³
coxifera 3. 635
crenata 3. 635; 4. 875
crenulata 7. 635
cristata 3. 635; 4. 875
decora 7. 635
denudata 7. 635
depauperata 3. 370; 6. 93, 739; 7. 635; 8. 740; 9. 866
depressa 0. 861, 862; 2. 163, 169
devexa 7. 635
Voluta
digitalina 3. 189; 7. 635
elevata 7. 635
elongata 3. 635; 4. 840, 870, 875
fenestrata 3. 635
ficulina 8. 516
fimbriata 3. 635; 4. 875
Forbesi 7. 635
fusiformis 6. 480
Gasparini 3. 635
geminata 7. 635
gibbosa 3. 635; 4. 875
gradata 3. 635; 4. 875
harpa 7. 635
harpula 2. 164, 169; 3. 370; 6. 93, 739; 7. 635
horrida 7. 635
humerosa 7. 635
inflata 3. 635; 4. 875
jugosa 6. 480
labrella 7. 635
Lamberti 3. 763
lima 1. 716; 7. 635
luctator 7. 635
luctatrix 1. 717; 7. 635; 8. 874
maga 7. 635
magorum 1. 716; 7. 635
mixta 7. 635
muricina 7. 635; 8. 874
musicalis 3. 604; 7. 635
nodosa 7. 635
perlonga 3. 635; 4. 875
petrosa 6. 753
porulosa 3. 604
protensa 7. 635
pugil 7. 635
raricosta 3. 635; 4. 875
rarispina 3. 75
Rathieri 0. 861; 6. 534
recticosta 7. 635
rhomboidalis 3. 635; 4. 875
rigida 7. 369
Sayana 6. 753
scabricula 7. 635
scalaris 7. 635
Selseiensis 7. 635
Solanderi 7. 635
Spillimanni 6. 480
spinosa 1. 712, 716; 7. 635⁴; 8. 740; 9. 866
Voluta
squamosa 3. 635; 4. 875
subfusiformis 1. 101
subambigua 7. 635
suspensa 7. 635; 8. 740; 9. 866
suturalis 0. 862; 6. 227
torosa 3. 635; 4. 875
tricorona 7. 635
undulata 1. 716
uniplicata 7. 635
Wetherelli 7. 635
spp. 0. 512; 2. 630; 3. 627; 4. 626; 6. 479
Volutalithes
Californianus 7. 242
symmetricus 6. 230
cfr. Volutilithes
Volutilithes
gen. 0. 512
cretaceus 9. 498
spp. 6. 753
Volvaria
bulloides 3. 328
laevis 3. 634
Vomer
longispinus 5. 380
Vomeropsis
gen. 5. 381
elongatus 5. 380
Vorläufer:
des Lias 6. 741; 9. 6
Vorweltliche Fauna 6. 764
Vosgit 0. 676, 677; 4. 598!; 601
Vouron Patra 1. 374
Vulkane 4. 96!; 7. 610; 8. 80, 810, 842; 9. 197, 229, 312, 314, 323, 460, 487, 605, 827
Entstehung 3. 610
Theorie 0. 358
in Abyssinien 1. 725
von Antuco 0. 804
in Böhmen 5. 360
in Latium 0. 232
von Olot 3. 573
von Osorno 2. 551!
der Sandwichs 4. 366
von Turbaca 5. 93
von Zamba 1. 208; 5. 93
Vulkanische Asche 7. 433!
auf dem See-Grund 8. 104

Vulkanische
Ausbrüche 6. 199; 8. 101, 104; 9. 857
des Mauna Loa 2. 959, 970
Bildungen 1. 466
Italiens 0. 231
Bomben 6. 351!
Eilande:
Bridgeman 0. 465
Fuego 0. 466
Ereignisse 2. 620
Vulkanische
Erscheinungen: Java 1. 70
Eruptionen am Rhein 3. 535
Exhalationen 2. 501
Felsarten 8. 103, 104; 9. 201
Gesteine 1. 31; 2. 85; 9. 831
der Antillen 2. 486!, 970
Vulkanische
Gesteine
Bildung 1. 837
Polarität 4. 615
Vulkanischer Tuff 8. 846
Vulkanoidische Einschlüsse in Basalt 3. 667
Vulsella falcata 2. 44, 156, 168, 170; 3. 86
sp. 8. 874
Vulvulina gen. 5. 755

W.

Wachsen der Krystalle 7. 74
Wacke, porphyrartige von Berchtesgaden 0. 64!
Wackendeckel 4. 606
Wad 1. 388*!; 2. 520
Wagnerit 9. 191!
Walchia
angustifolia 9. 751
entassaeformis 7. 113
filiciformis 6. 666; 8. 503
hypnoides 2. 991; 7. 113
piniformis 6. 56, 543; 7 113, 630; 8. 503, 758
pinnata 2. 58; 6. 329
Schlotheimi 7. 113; 9. 104
Sternbergi 7. 113
Wald:
unterirdischer 0. 466
versteinerter 8. 90, 754
Wälder
unterseeische 7. 216
-Gebilde 5. 207; 7. 533 p.
im Seine-Dept. 1. 363
Wälderthon 5. 598
-Gebirge 0. 400, 417
Waldheimia
Australis 4. 59, 504
Celtica 7. 483, 653
digona 4. 504
lagenalis 4. 504
tamarindus 7. 483
vulgaris 9. 359
sp. 6. 730
Wale, fossile 3. 93!
Wallnuss-Bäume 8. 749
Wall-Riffe 2. 88!; 4. 224
Walross 8. 628; 9. 239
Wanderblöcke 4. 36*, 216; 5. 356; 6. 26, 731
der Anden 0. 460
gefurchte 2. 965
Wanderung
der Blöcke 5. 356
der europäischen Faunen aus NW. nach SO. 8. 63
der Pflanzen-Arten 3. 218!; 4. 128
Warme Quellen 5. 195; 8. 734; 9. 132
Wärme:
metamorphisch wirkend 8. 729ff., 833, 851
-Abnahme: nach den Polen, unter verschiedenen Meridianen 3. 197!
-Entwickelung: in Kohlen-Flötzen 5. 465
-Leitung in Krystallen 0. 451
-Leitung der Felsarten 2. 623!
-Vertheilung auf der Erde 5. 217
Warsaw-Kalksteine 7. 862
-limestone 8. 98
Waschen: Metall-führender Sande 2. 499!
Waschgold 9. 295
Waschwerke 5. 826
Wasser 7. 338!
des Kaspischen Meeres 6. 592!
der Themse 1. 353!, 591!; 2. 215!
Wasser
unterirdisches 2. 729; 7. 447
gebunden in Feldspath-Gesteinen 2. 322, 326
metamorphisch wirkend 8. 727ff., 832, 835
Wirkung auf Mineral-Bildungen 3. 367
auf Metalle 5. 87
auf und in der Erde 5. 721, 724
-Absorption durch Mineralien 3. 696
-Analysen 3. 902; 5. 195, 711; 6. 345, 694²; 8. 79!, 311; 9. 102
von Banju Paït 4. 446
vom Jordan 3. 187
der Themse 2. 215!
vom Todten Meer 3. 63
vom Urmia-See 7. 581
-Dampf: verändert Gesteine 2. 864
-Fumarolen 1. 869
-Gehalt
chemischer u. hygroskopischer, der Mineralien 4. 686!
-Quellen 2. 626
-Ströme 2. 717
unterirdische 0. 91
Wirkung auf Gesteine 1. 293!
-Verschluckungs-Vermögen der Gebirgsarten 0. 352
Wasserglas zum Erhalten der Petrefakte 6. 876
Wasserkies 5. 676!; 6. 48, 192*

Wassertrub-Analyse 5. 702
Waterlime-group 8. 594
Wavellit 0. 420; 6. 49; 8. 77, 685, 688; 9. 84
Wealden 6. 66; 7. 99gp., 105, 115p., 533p.
Fährten 2. 383
-clay 3. 811
-Formation 5.478,870p.; 7. 196, 850; 8. 848; 9. 509, 824
-Periode: Flora 0. 112! 2. 885
Webbina gen. 5. 755
Wehrlit 0. 705!
Weichselia gen. 7. 622!
Ludovicae 7. 622; 8. 365
Websteria sp. 1. 627
Wechsel der Meeres-Höhe 4. 474; 9. 627
Weinmannia
elaphi . . folia 7. 778
Europaea 4. 491; 9. 375
fagaraefolia 7. 778
microphylla 4. 379, 491
Paradisiaca 4. 379
Sotzkia 9. 375
Weiss-Todtliegendes 8. 608
Weissbleierz 0. 269; 1. 92*, 200; 3. 475ff., 476; 5. 72, 821; 8. 216, 319. 697
Weisse Kreide 9. 360
Weisser Jura 0. 167!; 5. 612p.; 8. 486, 488
Weisses Zinnerz 5. 841!
Weissigit 3. 385!; 4. 401!; 5. 798, 800!
Weissit 9. 567
Weissites 0. 628
gemmaeformis 5. 630
Weissspiessglanz 1. 577*; 4. 192
Weissstein 4. 40
Well-Coal 9. 848
Wellenflächen der Gesteins-Schichten 0. 251; 5. 864; 7. 239, 240; 8. 228; 9. 105, 869
Wellenkalk 0. 484, 485; 2. 17 ff., 53; 3. 11, 614; 8. 719
Welt-Gebäude 2. 240
Weltrichia 0. 630
Wengener-Schiefer 4. 456; 6. 214, 215
Wenlock-group 3. 97; 6. 112
-limestone 1. 104; 6. 112; 8. 594
-Schiefer 0. 731, 732, 738; 4. 487, 488 7. 616; 9. 480
-Slate 6. 112
-Schichten 5. 219; 7. 691; 8. 4
Werner's Geburtstags-Feier 0. 193
Wernerit 1. 389*; 2. 521, 524 ff.; 5. 196!
Wesenbergische Schicht 8. 594
Wespen 0. 25*
Wetherellia 0. 638
Wetterkalk 9. 443!
Wetzschiefer 0. 585, 621; 3. 192
-Schichten 3. 402 ff.
Wetzstein 3. 192
-Bildung 1. 143
-Formation 1. 418
-Schichten 3. 400; 5. 170
-Schiefer 4. 551!; 9. 628
Whitby Shale 0. 181
White ash Coal 9. 380
Whittleseyia
elegans 9. 826
Widdringtonia
Göpperti 4. 142
Helvetica 3. 502; 5. 638
Ungeri 2. 760; 3. 502; 8. 500
Widdringtonites 0. 632
cylindraceus 3. 746
Haidingeri 2. 887; 6. 254
Kurranus 2. 887
microphyllus 3. 746
oblongifolius 3. 746
tenuis 3. 746
Ungeri 3. 47; 4. 491
Widersinnige Gänge 6. 717
Wiederkäuer 2. 979; 7. 867!
-Schweine 8. 510
Wiener Becken 2. 254p.
-Saudstein 0. 89, 735, 737, 738; 1. 361;
Wiener
-Sandstein 2. 621; 5. 43; 6. 201; 8. 636; 9. 844
-Tertiär-Becken 2. 978p.; 3. 96p., 753
-Flora 2. 627!
Wiesenerz 2. 589
Wildkatze 2. 112
Willemit 0. 342!; 1. 89!, 448!; 6. 185
künstlich 5. 215
Williamsit 3. 699
Wilsonit 7. 67!
Wind-Gebirge 9. 218
Wind-Riefen der Schichten 9. 105
Wirbellose Thiere 7. 631 p.
Wirbelsäule der Fische 3. 115!
Wirbelthiere 7. 854, 856; 8. 375 p., 869; 9. 246
in Frankreich 5. 222!
im Loire-Becken 5. 370
in Pennsylvanischer Knochen-Höhle 1. 482
Fauna, eocäne 4. 639
Frankreichs 1. 492!
Wiser'sche Mineralien-Sammlung 4. 26
Wismuth 1. 701ff.; 5. 455
Gediegen 5. 823
-Erze 8. 330; 9. 733
Wismuthglanz 2. 875; 9. 189!
Wismuthkobaltnickelkies 2. 71!
Wismuthocker 0. 450; 2. 534; 5. 447
Wismuthoxysulphuret 9. 733
Wismuthschwefel 2. 787
Wismuthspath 0. 450!
Wismuthspiessglanz 2. 787
Wissenbacher
-Schiefer 1. 225; 3. 494, 622, 817; 5. 50; 6. 255
Withamia 0. 638
Witherit 1. 454; 2. 223!, 517; 4. 347; 9. 186
Wöhlerit 0. 56!; 1. 179; 2. 863!; 4. 451; 824!
Wölchit 5. 824

Wolfram 1. 391*, 395*; 2. 518, 527; 6. 345!; 7. 435!
-saures Kupferoxyd 7. 439
Wolfsbergit 7. 69*
Wolkenbruch 1. 465
Wolkonskoit 0. 450
Wollastonia (Coleopt. g.) ovalis 2. 984
Wollastonit 0. 846!: 3. 263; 8. 43, 44*, 54, 481*, 684, 700!
künstlich 5. 215
Woodstones 2. 161
Woodocrinus gen. 6. 604!
macrodactylus 6. 603
Woodwardia radicans 6. 244; 8. 757; 9. 253
Rösnerana 3. 502; 5. 637; 7. 614
Woodwardites 0. 627
Robertsi 9. 354
Woolhope-limestone 3. 97; 6. 112; 8. 594
Woolwich series 7. 503 p.
Wunder der Erd-Rinde 5. 256
Wundererde 9. 547!
Würfel-Borazit 4. 781
Würfelerz 5. 447; 9. 625*
Würfling 4. 769; 5. 286
Würflings-Achsen 4. 769
Wurm-förmige Eindrücke 9. 873
Konkrezionen 3. 27
Wurm-Löcher: in Schlamm-Gesteinen 9. 105, 338
-Spuren (Fährten) 9. 106
Wurmsteine 5. 505
Württemberger Soolen 0. 614!
Wurzeln von Gefäss-Kryptogamen: 8. 363

X.

Xanthitan 7. 711*
Xanthium sp. 6. 640
Xantho Edwardsi 2. 1000
Xatholinus Westwoodanus 6. 503
Xanthophyllit 2. 848; 7. 170!
Xanthosiderit 2. 53; 4. 181!, 257, 568, 814; 5. 158
Xanthoxylon Brauni 6. 505
Xenacanthus gen. 8. 743
Decheni 6. 329; 7. 629ff. 8. 743, 744
Xenia 2. 123
Xenophora gen. 4. 874
cumulans 9. 839
Lyellana 6. 534
spp. 5. 768
Xenurus gen. 4. 111
Xerophila spp. 8. 507
Xiphias antiquus 7. 116
Dixoni 8. 253
Xiphidium angustum 2. 632
maximum 2. 633; 5. 126
quadratum 2. 632
Xiphodon gen. 7. 869
Gelyensis 2. 998; 5. 228; 6. 502
gracilis 0. 499; 1. 502; 3. 754; 5. 227
paradoxus 3. 754*
sp. 2. 1001
Xiphogonium gen. 3. 487
Xiphopeza gen. 9. 868
triplex 9. 868
Xulinosprionites 0. 637
Xylith 0. 705!
Xylochlor 6. 187!
Xylolithes spp. 0. 117
Xylomites 0. 626
Aceris 5. 637
confluens 3. 225
Xylomites Daphnogenes 5. 637
deformis 9. 374
maculaeformis 3. 225
maculifer 3. 502; 5. 637
miliarius 9. 374
protogaeus 5. 637
Salicis 8. 500
stigmariaeformis 3. 434; 4. 630
umbilicatus 2. 753; 3. 47; 4. 378
varians 5. 637
varius 8. 500
Zizyphi 4. 378
Xylophaga elegantula 8. 377
Stimpsoni 8. 377
Xylophagus antiquus 1. 677; 2. 467
pallidus 6. 503

Y.

Yellow -Sandstone 9. 490
Yprésien terrain 2. 882; 3. 612; 7. 503p.; 9. 228
Yttererde Mineralien 5. 516
Ytterin-Silikat 3. 598*
Yttergranat 5. 832!
Ytteroilmenit 2. 75!, 862!
Ytterotantalit 2. 862!; 5. 514
Ytterotitanit 1. 180; 7. 709!
Ytterspath 1. 179; 5. 513!ff.
Yuccites 0. 631
Vogesiacus 2. 992; 8. 129
dubius 8. 129

Z.

Zäment
von Sand-Breccie 3.64!
Zahlen
der Thier-Arten, geologische 5. 218
Zahnlose (Thiere) 4.111!
Zamieae (fam.) 5.240, 637
Zamites
gen. 0. 630; 6. 616, 617!
acuminatus 6. 618
aequalis 2. 887
angustiformis 6. 618
brevifolius 3. 242
Brogniarti 2. 995
Bucklandi 2. 887
Cordai 6. 98
dichotomus 6. 618
difformis 2. 750
dilatatus 6. 618
distans 3. 242; 6. 253, 617
Feneonius 3. 242
gracilis 6. 253, 618
gramineus 6. 616
Haueri 3. 242
heterophyllus 6. 618
Mantelli 6. 617
megaphyllus 2. 887
microphyllus 2. 887
Moreaui 6. 617
oblongifolius 6. 617
Schmiedeli 6. 253
tenuiformis 6. 618
tertiarius 5. 637
truncatus 8. 139
undulatus 6. 617
Vogesiacus 6. 616, 617
Zamiostrobus 0. 630
crassus 2. 887
Fittoni 2. 887
Guerangeri 1. 743
Pippingford. 2. 887
Sussexensis 2. 887
Zanclodon gen. 5. 757
Zanclus eocaenus 5. 235
Zanthopsis n. g. 0. 120!
bispinosa 0. 120
nodosa 0. 120
unispinosa 0. 120
Zanthoxylon[lum] 0. 636
Europaeum 9. 375
Haeringanum 4. 380
Zanthoxylon[lum]
juglandinum 0. 506; 2. 761; 3. 506
salignum 0. 506; 2. 761
Zaphrenites[ntis?] 2. 758
bilateralis 8. 855
spp. 2. 990
Zaphrentis 2. 121*
Clappi 2. 340
Zeacrinites
magnoliiformis 0. 377
Zeacrinus gen. 9. 343
Zeagonit 3. 184*, 257
Zeanothus 0. 636
Zechstein 0. 874; 2. 197; 3. 562, 614; 4. 489p., 743, 865p.; 6. 80, 84, 140, 580!; 7. 195, 722; 8. 502p., 608, 758 p., 843; 9. 155g.
-Gebirge:
Schlesiens 3. 125 p.
Thüringens 3. 128p.
-Dolomit 3. 776!; 4. 743
-Formation 3. 35, 124p.; 5. 498p.; 6. 503p., 822; 7. 102, 223p.; 8. 168, 172
Deutschlands 4. 118p.
im Orla-Thale 3. 769!
auf Spitzbergen 0. 85
zu Stockheim 3. 1
in der Wetterau 4. 614
-Kohle 3. 770
-Oolith 3. 774
Zeitfolge
eruptiver Gesteine 9. 833
Zelkowa
Ungeri 3. 504; 9. 502
Zellania
Davidsoni 7. 483
Laboucherei 7. 483
liasina 7. 483
Zellgewebe,
vegetabilisches in devonischer Kohle 6. 605
Zentral-Europa 9. 625 g.
-Gneiss 7. 619
-Massengebirge 4. 215
Zeolith 0. 348!; 1. 559, 560; 7. 176
-Gesteine 1. 859!
Zerklüftung
der Gesteine 7. 607
Zerlegung
des Mineralwassers
von Cransac 2. 66, 71
von Niederbronn 2. 68
von Sternberg 2. 74!
Zerquetschte Kiesel
im Gestein 6. 576
Zersetzung
der Gesteine 5. 363; 8. 82
Zersetzungs-Produkte
des Leuzits 8. 69!
Zethus
gen. 0. 780, 785!; 1. 509; 6 224, 510
Atractopyge 6. 116; 9. 121
bellatulus 5. 872; 9. 121
brevicauda 9. 121
rex 9. 121
sexcostatus 4. 501; 6. 116
verrucosus 5. 872; 9. 121
Zeuglodon gen. 3. 242!
brachyspondylus 0. 202; 3. 242! ff.; 5. 112
cetoides 3. 245*; 4. 168; 5. 112
Hydrarchus 3. 245*
macrospondylus 0. 201; 3. 94, 242!; 5. 112
microspondylus 3. 94
pygmaeus 3. 246*; 5. 112
spp. 0. 726; 1. 254; 6. 237
-Kalk 5. 469, 616; 7. 749
Zeuglodontae 0. 201
Zeugophyllites 0. 631
calamoides 2. 994
elongatus 2. 994
Ziegelerz 1. 463; 5. 823
Ziegenklauen 7. 181
Zilla
cornumana 5. 121

Zilla gracilis 5. 121
porrecta 5. 121
Zink 1. 694; 9. 620
(Gediegen) 7. 312
-Erze 4. 92; 8. 329, 566
Entstehung 2. 85!
Lagerstätten 9. 318
-haltiger Tantalit 7. 332!
-Metall 6. 442
-Mineralien 1. 448!
Zinkarseniat 0. 445
Zinkblende 2. 875, 879; 5. 414; 7. 549; 9. 188*, 813!
Zinkblüthe 5. 560, 821*; 7. 325!; 9. 80!
Zinkchromit 1. 692*
Zinkeisenspath 1. 449, 705!
Zinkenit 3. 459*
Zinkferrit 1. 693*
Zinkkarbonat 1. 392*, 596
-Hydrat 4. 93
Zinkoxyd 2. 703!
-Krystalle 9. 82
Zinksilikat 1. 392*, 397*; 4. 93
Zinkspath 1. 449; 2. 66*, 518; 5. 821
Zinkvitriol 4. 94*
Zinn 0. 446; 1. 694; 2. 788; 4. 94; 5. 455
Lagerstätten } Spanien
Vorkommen } 3. 460
-Erze 0. 451; 4. 344, 346, 347; 5. 826; 8. 328, 467, 844
Vorkommen in Bretagne 2. 498
weisses 5. 841!
Zinnerz-führende Alluvionen 2. 971
Lagerstätten 0. 710; 1. 215
-Gänge 3. 725
-Gruben 9. 743
-haltiger Kies 1. 350!
Zinnkies 5. 72!; 9. 188*
Zinnober 1. 46; 4. 423*; 5. 824; 6. 185, 465, 471, 686!
-Erz 4. 183!
Zinnoxyd 9. 815!
Zinnsäure 9. 735
Zinnstein 2. 524, 528; 4. 787; 7. 394!
Ziphius gen. 3. 94!
Becani 5. 231
cavirostris 3. 93, 94; 4. 848
dentirostris 3. 94
longirostris 3. 94; 4. 848; 5. 231; 6. 491
planirostris 3. 94; 4. 848; 5. 231
Sowerbyi 3. 94
Zippea 0. 628
disticha 6. 98
Zirkon 0. 432; 2. 863, 879; 3. 259, 598; 5. 823, 826, 828*; 6. 192!, 344; 7. 718; 8. 579*
künstlich 5. 215
-Syenit 1. 592; 2. 712; 3. 184; 6. 352; 8. 577; 9. 447!
Zirkonerde 6. 345
Zirkonsäure 9. 735
Zizyphus 0. 636
Daphogenes 8. 501
Druidum 9. 375
minutulus 3. 506
nucifer 8. 499
ovatus 2. 755
paliuroides 4. 252
pseudo-smilax 4. 252
tiliaefolius 8. 501, 740; 9. 117
Ungeri 8. 586
Zoantharia (class.) 6. 113
Zölestin 0. 338; 1. 451
cfr. Cölestin
Zoisit 0. 552
Zonarites 0. 626
alcicornis 8. 640
digitatus 8. 503
reticularis 8. 640
Zone
der Avicula contorta 9. 452
Zonen
der Erz-Lagerstätten 1. 616
gegen den Äquator bewegt 4. 617
Zonites alliarius 0. 869
cellarius 0. 869
nitidulus 0. 869
pygmaeus 0. 869
Zonites
rotundatus 0. 869
spp. 8. 507
Zonopteris
comptoniaefolia 0. 116
Goepperti 0. 116
Zooligus (Ungulat.) gen. 4. 831*
Zoolitharia 5. 759
Zoologische Regionen im Meere 2. 996
Zoophytaria (class.) 6. 113
Zopf-Platten 9. 31
Zopilus 2. 118, 375
Zorilla antiqua 5. 371
fossilis 5. 230
Zosterites 0. 631
aequinervis 0. 117
affinis 2. 993; 3. 510; 4. 378
Agardhanus 2. 993
Bellovisianus 2. 993
elongatus 2. 993
enervis 2. 993
Kotschyi 6. 252
lineatus 2. 993
marinus 2. 993; 3. 47; 5. 639
multinervis 0. 117; 2. 993
Orbignyanus 2. 993
taeniaefolius 2. 993
tenuifolius 2. 993; 4. 378
vittatus 0. 117; 2. 993
Zua lubrica 0. 868
Zuckerkörniger Kalk 0. 170, 184
Zurlit 3. 261
Zusammenziehung der Erde 7. 85, 791
Zusammenvorkommen
von Aragon u. Kalkspath 5. 706*
von Augit u. Hornblende 9. 297
von dimorphen Mineralien 6. 188
von Organismen-Arten verschiedener Formationen 9. 351
von Steinkohlen-Pflanzen u. Lias-Konchylien 9. 220
Zwei-u.-ein-gliedriges Krystall-System 5. 11

Zweite Silur-Fauna 6.225
Zwerg-Löcher 7. 186
Zwiebel-Marmor 9. 742
Zwillings-Gesetz 4. 306
-Krystalle 4. 183; 6. 190, 555
Glimmer 3. 54
Zwischen-Quader 0. 134ff.
Zwischenachsen 4. 769
Zygobates dubius 7. 115
Zygobates
Studeri 6. 601
Woodwardi 6. 601
spp. 5. 234; 7. 244
Zygoceros
rhombus 0.473; 4.739; 6. 104
Zygocrinus 2. 747!
Zygomaturus
gen. 9. 243!, 244!
Zygomaturus trilobus 9.243!
Zygopteris gen. 1. 115
tubicaulis 2. 890
spp. 0. 628
Zygosaurus gen. 7. 539
Lucius 0.876; 4.497!; 8. 298!
Zypressen:
fossile von Neu-Orleans 5. 221

III. Orts-Register.

Den zitirten Seiten-Zahlen sind mehre Zeichen beigefügt, deren Bedeutung folgende ist: g. bedeutet, dass die am angeführten Orte vorkommende Stelle hauptsächlich geognostischen und geologischen, — m. dass sie mineralogischen — und p. dass sie paläontologischen Inhaltes seye. Die Zeichen * und ! bedeuten, dass die genannte Örtlichkeit in umfassenderer Weise beschrieben seye. Blosse Fundorte eines einzelnen Minerales sind nicht mit in's Register aufgenommen, wenn nichts weiter darüber mitgetheilt wird. — Die Wörter mit ä, ö, ü sind in der Regel so zwischen die andern eingeschoben, als ob jenes die einfachen Vocale a, o, u wären.

A.

Aachen 0. 92g., 704; 1. 89, 448; 2. 111p.; 4. 167g., 184, 364g.; 7. 96g., 214, 454g.; 8. 619p.
Kreide 0. 135 ff.
Kreide-Formation 0. 289!
Aargau 4. 826 g.
Abberlay 2. 727
Aberdeenshire 9. 227 g.
Abo 8. 573 m.
Abyssinien 1. 724
Achmatow 3. 62
Achmatowsk 5. 9. 575
Ackershuus s. Akerhuus
Acongagua 6. 199; 9. 467g.
Acqui 6. 92, 739; 8. 89
Adelaide 2. 322 m.; 5. 826
Adersbach 8. 90 p.
Adour 3. 76p.
-Becken 1. 751
Ägypten 5. 359; 7. 229p.
Versteinerungen 0. 222
Ätna 0. 455; 5. 70, 71 m.; 6. 46, 460
Laven 2. 316
Afganistan 5. 734 g.
Agnana 9. 230
Agram 6. 270
Ahans 5. 324
Aiglemont 7. 207
Ain-Dpt. 9. 313
Aisne 7. 371 p.
-Dpt. 7. 846; 8. 379p.
Aix (Flora) 0. 114
in Provence 3. 105; 4. 639; 5. 223 p.; 6. 502 p.; 9. 118
Akerhuus 6. 435; 7. 831
Alabama 5. 469, 616; 6. 480 p.; 7. 749
Geologie 0. 724
Alais(Gard-Dpt.) 0. 90, 878; 4. 608 p.; 5. 374
(Flora) 0 110
Alatau-Gebirge 0. 85*
Albanien 2. 241
Albis 3. 497 p; 9. 118. 501p.
Albula 8. 724 g.
Alexisbad 0. 346
Algerien 5. 87, 710 g.; 6. 450g., 566, 585; 7. 92; 8. 310 m., 723 g., 822 m.
Allgäu 5. 178 g.; 6. 601; 9. 628, 641 g.
Allgäuer Alpen 9. 641
Allendorf 3. 70
Alleghanies 5. 354
Alma 8. 873
Almaden 0. 497; 1. 45, 675; 6. 469!g., 499p.
Almeria 5. 458
Almerode 3. 751
Alp, Württembergische 5. 613 g.; 6. 26
Alpen 1. 129g., 293g.; 2. 231 g., 453 g, 620 g., 967 g.;
Alpen 3. 78g., 191, 299g., 399, 719g.; 4. 31p., 109, 205g., 355 ff., 499g., 455g., 467!g., 513 g., 829 g., 835, 846gp, 866gp; 5. 43g, 91g., 175, 179 m., 213, 219g., 469g., 472, 625 p., 806, 849g.; 6. 11m., 360, 384 p., 452, 458, 575!g., 661p., 718g., 729, 747 p., 757 p., 820; 7. 609m., 616, 619, 689 g., 726, 809g.; 8. 326, 375, 717, 724g., 834g.; 9. 59ff., 218g., 276, 349g., 452g.
Geologie 0. 302, 364, 584, 641, 719, 728, 731, 737, 738, 826
Relief 3. 70
Versteinerungen 1. 407
Altai 0. 86, 463; 1. 467, 609; 5. 837 m.; 9. 733
Altdorf 5. 495
Altenberg 1. 89, 448, 587, 705, 709
Altenmarkt 8. 586
Altsattel (Flora) 0. 114; 9. 118
Altvater -Gebirge 7. 447 g.; 9. 602g.

Alun Bay 3. 189
Alzey 3. 133ff.; 6. 21p., 534 p.; 7. 496; 9. 122
Amazonas Ebenen 8.859g.
Ammergau 5. 168
Amsterdam 3. 376!
Andalusien 5. 457 g.
Anden 0. 460, 479, 805; 5. 202, 726; 6. 571! g.
Andernach 3. 540; 7. 249 p.
Andes s. Anden
Andrarum 4. 492
Andreasberg 1. 708; 3. 694; 4. 345 m.; 6. 446
Anjou 3. 77; 5. 223 p.
Annerod 4. 581
Anticosti 8 854 g.
Antillen (Flora) 0. 115; 2. 486 g., 970
Antrim 4. 176, 182
Antuco 0. 804
Antwerpen 4. 88
Apallachen
Gebirge 6. 88; 9. 825 g., 848
Apenninen 5. 849 g.; 6. 91; 738, 749; 7. 203, 592; 9. 872p.
Apolda 3. 15
Appenzell 3. 497p.; 7. 779g.; 8. 850 g.
Apt 3. 755; 4. 608p.; 5. 223 p.
Aquae Jassae 9. 102
Aquitanien 3. 73g.; 7. 383p.
Arabischer Busen 1. 724
Aral-See 0. 737; 6. 576; 7. 739gp.; 9. 866p.
Ararat
Besteigung 2. 970; 7. 324
Araxes-Ebene 1. 90; 7. 459g.
Ardé 5. 223 p.
Ardennen 6. 358 g.; 7. 208 g., 211 g., 218g., 371p., 465, 846
-Dpt. 8. 379 p.
Arendal 1. 92; 2. 868, 878; 3. 182 m.; 5. 515 m.; 6. 191m.; 8. 566m.; 9. 816m.
Arensberg 6. 78 g., 574g.
Argenton 5. 223p., 370ff.; 8. 620
Ariège-Dpt. 8. 598; 9. 748 g.
Arjisch-See 6. 698
Arkansas 6. 381p., 480p.
Arktische Gegenden 9. 221 pg.
Armenien 1. 90, 464; 6. 698; 7. 500 g., 773; 8. 736g.
Armissan
(Flora) 0. 114
Arnfels 8. 586
Arno-Thal 5. 223 p,, 373; 9. 115p., 118g., 870gp.
Arran 1. 473
Artern 5. 477
Arva 3. 190
Arzo 6. 217; 8. 88
Aschenthal 8. 608
Asien 9. 312
Asiatisch-Russland 8.739p.
Asolo 7. 232 p.
Asow 1. 719
Asse 5. 33
Asti 3. 331
Astrupp 7. 495
Asturien 1. 471; 9. 721
Atakama 2. 864; 4. 44, 566, 791!; 5. 1g.; 6. 441, 822; 7. 166, 257, 415, 731 g; 8. 216; 9. 178
Athen 4. 637 p.
Atlantischer Ozean 4. 610; 8. 104; 9. 225 g.
Attica 7. 371 g.
Aube 6 94
Aubenge 4. 850
Aucklands-Insel
(Geologie) 0. 466
Aude 6. 355 g.
Auerbach 3. 493; 4. 787 m.
in der Bergstrasse 8. 33
Augenbad-Quelle 3. 594!
Augustusburg 9. 676 ff., 744
Aussee 5. 502p.; 6. 757p.
Australien 1 202*; 3. 72; 4. 94, 343; 5. 197, 826 m.; 6. 183, 188; 7. 312, 698; 8. 81, 196p., 229g., 510, 535, 589; 9. 239 p., 243 p., 756p.
Autun (Flora) 0. 109
Auvergne 4. 609 p.; 5. 223 p., 370p., 356
Avallon 6. 455 g.
Aveyron 3. 71; 6. 64, 732; 7. 612
Azoren 0. 1 g.

B.

Badeholz 8. 752 p.
Baden (bei Wien) 2.729
(Grossherz.) Versteinerungen 1.377; 3.742g.; 6. 333 g.; 8. 199; 9. 1 g.
Geologie 9.129, 513g.
-Baden 8.201; 9.141g.
Badenweiler 7. 129; 8. 712g.; 9. 130g., 132
Bagnor 3. 189
Bahia 3. 597, 697; 7. 64; 8. 818; 9. 192 m.
Baikal 7. 715
-Gebirge 8. 824 g.
Bains-de-Rennes,
Aude 5. 591 g.
Bakonyer-Wald 9 739
Baktschiserai 8. 873
Balaklava 8. 873
Balearen 6. 460
Balingen 6. 455 g.
Ballon
(Belchen) 1. 423; 4. 193
Balsberg 3. 608 p.
Baltische
Provinzen 8. 110 p.
Ebene 8. 257
Baltringen 3. 163 p.; 6. 330
Balve 6. 574

Bamle 6. 183
Banat 3. 591; 6. 254 p., 357 g.; 7. 744 g., 719 m.; 8. 86 g., 347 g.
Banka 0. 446; 4. 95: 9. 743
Banow 8. 841g.; 9. 841
Banz 2. 1005; 4. 369 gp.
Baradla-Höhle 7. 849
Baralon 4. 822
Barcelona 7. 343
Barenberg 0. 391
Bären-Insel 0. 86
Baring-Bai 4. 86
-Land 9. 222
Barnaul 0. 86
Barotch 8. 821
Barren-Eiland 9. 313 g.
Barrow strait 4. 85
Barton 3. 189
cliffs 1. 711 ff.
Bas-Rhin (Dpt.) 3. 736 gm.
Basskuntschaz -See 1. 601
Batavia 0. 83 g.; 1. 74
Bathurst Island 9. 221 pg
Battenberg 8. 287
Baumannshöhle 6. 537
Baveno 1. 333; 5. 561m.
Bayern 1. 129g.; 3.299g., 399, 445 g., 749p.; 4.164,513g.,348!m., 6. 359, 707, 820; 7. 266p.; 8. 366p., 403 p.; 9. 108 p., 218g., 354p,, 641 g.
Petrefakte 1. 407
Bayern'scher Wald 5.173g.
Bayern'sches Waldgebirge 3. 372; 4. 515 g.
Bayeux 5. 634p.; 6. 210
Bayonne 1. 750 p.; 5. 365
Bayreuth 8. 550
la Beauce 3. 77; 5. 223p.
Beauchamp 3. 189; 7. 490
Beaugency 5. 369
Beaujolais 7. 345
Bechelbronn 1. 734
Becler-See 4. 208
Beechey-Island 4. 85; 9. 222 p.
Belchen 1. 1 (s. Ballon)
Belfort 9. 633 g.
Belgien 1.617g.; 2. 724 g., 881 g.; 3. 229 p.; 4. 321; 6. 209, 601 p.; 7. 454 g., 470 g.; 9. 100 g., 228
Bellingham-Bay 9.754 p.
Belluno 1. 603; 7. 230p.
Benares 5. 855
Bengalen 7. 47
Beni-bou-Saïd-Berge 5. 583 g.
Bentheim 0. 385, 412; 3. 150; 5. 324
Berchtesgaden 4. 557; 8. 278
Bergamasker-Alpen 4. 835
Berggieshübel 4. 843 gn.
Bergwerkswohlfahrt6.47m.
Bergstrasse 9. 211 g.
Berleburg 4. 366 g.
Berlin 2. 252 p.
Berlingen 9. 501 p.
Bern 7. 844 g.
Bernburg 2.601; 4. 109; 8. 555 p.; 9. 90 g., 125 p.
Bernina 7.726; 8.337 g.; 9.481g.
Berncastel 6. 135 m.
Bernsdorf 9. 691, 701
Berri 2. 625; 4. 720
Bertrich 4. 38 p.
Bessarabien 6. 65
Beutigberg 9. 676 ff.
Bex 5. 678
Biaritz 1. 750 p., 752 p. 7. 844 g.
Bieber 4. 614g.
Bielefeld 0. 385
Biels-Höhle 6. 537
Bjelusow 0. 463
Biere 3. 625p.; 8. 102
Bieskiden 2. 346, 971; 9. 203 g.
Bikk-Gebirge 9. 739
Bilin 2. 748; 9. 118
Flora 0. 115
Biliton 4. 94
Binnenthal 5. 736; 8. 591 g.
Bischofsheim 6. 421
Black-Hills 8. 495 g., 509p., 709g.; 9.824
Blankenburg 0. 133 g.; 6. 640
Blaye 3. 77; 5. 223 p.
Bleiberg (bei Commern) 4. 475, 605
Bleistadt 6. 189 m.
Blutquelle 5. 363
Bochnia 5. 207
Bocup 5. 435 g.; 8. 102
Bodenmais 1.694; 3.467; 4. 177; 6. 686
Bodensee 9. 852 g.
-Becken 0. 641
Bogdo 1. 601
Bogoslowsk 1. 463
Böhmen 3. 375 g., 475 n., 482 p.! 4. 1p, 217, 459g.; 5. 858 g.; 6. 219g., 432, 483p., 708 g.; 7. 445 g., 553, 638 p., 847 g; 8.325, 341g., 473g., 554g., 718g., 754p.; 9. 485g., 841
Kreide 0. 307
Silur-Versteinerungen 4. 44
Böhmerwald 6. 72 g., 577 g.; 9. 96 g.
Böhmischbrod 3. 728 g.
Bolca 4. 572; 6. 481p.; 7. 775; 9. 118
Bolivia 3. 452, 751p.; 6. 231; 7. 731 g.
Boll 5. 104 p., 494; 6. 378 p.; 7. 106
Bolson de Mapini 6. 278; 8. 770 ff.
Bombay 8. 821
Bonn 4. 213; 9. 118
(Flora) 0. 114
Grauwacke-Gebirge 0. 282
Borgholz 8. 567 m.; 9. 297
Borkut 7. 177
Bormida 6. 92
Borneo 6. 644 m.; 8. 588; 9. 449 m.
Bornholm 4. 492
Borsa-Banya 6. 200 g.
Bory 9. 198
Bos d'Arros 1. 752p.
Bosc d'Aubigny 1. 741p.
Boulogne 3. 815
Bougival 7. 734
Bourbon (Insel) 4. 605g.
Bourboule 5. 445

Bourg d'Oisans 3. 182m.
Bourgade 1. 759; 5. 223
Bovenrivier 5. 702
Bovey-Tracey 6. 235gp.; 8. 224
Bozzone 9. 116gp.
Bracheux 3. 189; 7. 490
Bracklesham 3. 189, 190
Bradford 2. 69
Bradnor 8. 715
Brandenburg 3. 581 p.; 4. 89g.; 8. 102
Brandeisl 7. 326
Brandon 4. 196
Brasilien 6. 841 m.; 8. 818
Braunau 6. 270
Braunkohlen -Formation 8. 711
Braunschweig 2. 726* ! 5. 159, 843g.; 6. 816; 7. 473g., 659g.
(Neocomien) 0. 229
Bräunsdorf 7. 70m.
Bravais (Flora) 0. 112
Bredebeck 5. 162
Bredenbeck 8. 582
Brederberg 6. 672
Breisgau 5. 411m., 570m.; 7. 129; 8. 199g.
Breitenstein 3. 318p.
Bremervörde 7. 332
Brennberg 0. 85*
Brennthal 4. 194
Brenta 9. 200
Brentford 1. 760gp.
Brenz-Thal 7. 86
Breslau 2. 634; 6. 326
Brest 0. 234
Bretagne 2. 498, 971; 4. 221g.
Brevig 1. 198; 2. 70; 3. 60, 184; 4. 174, 445; 5. 563 m.; 6. 42 m., 53 m.; 8. 566m.
Briançon 8. 225; 9. 220g.
Brianza 6. 217
Bridgeman (Insel, Geologie) 0. 465
Britannien 4. 82g.
Brilon 4. 314g.
Brixlegg 9. 306g.
Brohl-Thal 3. 547
Brora 2. 351
Bruchsal 9. 1g., 513
Brunn 7. 181
Bruntrut 0. 173, 185
Brussa 7. 449
Buchberg 2. 866g.
Buchleiten 7. 268p.
Buchsweiler 5. 223p.
Buchwald 9. 738
Büdös 4. 836
Budweis 7. 165
Buenos Ayres 6. 108, 232
Bugey 4. 381gp.; 9. 381p.
Bukowina 4. 789; 5. 25g.; 6. 579g.; 7. 450g.
Bulgarien 8. 83
Bünde 7. 495
Bündten 7. 726; 8. 337²g., 342g.; 9. 85g., 97g., 481g., 630g.
Burlington 3. 186
Bussaco 5. 95g.
Bute (Schottland) 1. 473
Bütikon 4. 579p.; 6. 109p.
Buxviller 8. 590

C. (vgl. K.)

Cadibona 5. 223p.; 8. 89; 9. 118
Cagliari 6. 489p., 875
Caglio 9. 500p.
Cairo 5. 862
Caithness 1. 483; 8. 384p.
Calanda 0. 743; 2. 972; 7. 727
Caldeca 6. 842
Caliche 3. 835
Californien 0. 494; 1. 720; 4. 183, 816m.; 5. 68, 75, 355; 6. 187, 354, 686m.; 7. 171, 241p., 461g., 589, 853p.; 8. 103g., 340, 709
Geologie 1. 356
vgl. Kalifornien
Callao 3. 105
Calvados 0. 165; 8. 483
Camera dell' Eremita 9. 465
Campiglia 0. 356
Canada 2. 981; 6. 192m.; 8. 846g., 854g.; 9. 635p., 758p.
Canarische Inseln 8. 836g.
Candia 9. 632g.
Candona 3. 101
Canigou 2. 965; 5. 84
Caniparola 9. 871p.
Canton-Grube 9. 83m., 196m.
Canzacoli 8. 85
Cap-Land 2. 581
Cap der guten Hoffnung 7. 350; 9. 495p., 496p.
Capo di Bove 3. 184
Capo d'Istria 9. 737
Cappadocien 5. 594
Carcare 3. 369; 6. 92, 738; 8. 515
Carchare, s. Carcare
Cardiganshire 2. 242; 4. 209
Carentan 2. 882
Carien 5. 844g.
Carlsbad 4. 420
Carnetz 5 435g.
Carnia 7. 619
Carolina 4. 450; 5. 843, 847; 6. 36, 51, 350, 445, 552m.; 7. 342, 432, 435, 439, 856p.; 8. 358g., 565m.; 9. 747, 751g.
Carrara 1. 444; 3. 694; 6. 216
Carroll 8. 682, 685
Carthagena 4. 717; 8. 348
in Spanien 5. 458; 6. 203
Caspi- (Kaspi-) See 4. 466
Caspisches Meer 6. 591
Cascinelle 6. 92
Cassian vgl. St. Cassian
Castelgomberto 7. 232p.
Castelnaudary 5. 223p.
Castries 5. 223p.
Catania 5. 832m.
Catorze 6. 285; 7. 54
Caucasus 1. 491 (Kaukas.)
Cauto (el) 8. 91
Célaire 5. 472
Celle 3. 625p.
Central-Europa 9. 625g.

Cerro de Azufre 2. 683
Azul 2. 662
del Mercado 8. 769g.
Cesséras 5. 223p.
Cette 1. 674; 5. 223
Cevennen-Gebirge 6. 582
-Departement 8. 609
Chaillol 5. 474
Chalons 9. 104
Charcas 6. 286
Charente-Dpt. 7. 206g.
9. 632
Charkow 6. 111p.
Charzow 5. 367p., 755;
6. 746p.
Chatillon 6. 724
Chaumont 3. 189
la Chaux-de-Fonds 6.333;
7. 248p., 624p.
Cheltenham 1. 484g.;
2. 226gp.; 6. 455g.
Insekten 0. 118
Chemnitz 1. 358; 5. 505p.,
576; 6. 722; 8. 364p.;
9. 532g., 670g.!
Chessy 0. 444
Chiavon 4.251p.,626;5.379
4. 734gp.
Chiavona 3. 46p., 683p.
Chiem-See 3. 81; 6. 535
Chihuahua 8. 770ff.
Chile: Geologie 0. 480
Chili 2. 551 g., 662;
4. 81g., 347, 451,
466m., 566, 791;
5. 202g., 839m.;
6. 199, 571!g., 822,
842; 7. 169. 404g.,
731g., 843; 9. 234,
302m., 467g., 621
Chimay 6. 209
Chimborazo 9. 478
China 1. 724; 2. 333m.;
5. 384p.; 6. 729
Chinche-Inseln 9. 823
Chippenham 0. 165
Chomle 5. 505p.
Christiania 2.371; 4.299g.;
5. 467g.; 9. 804p.
Christiansand 2. 876g.;
5. 452
Chur 9. 630g.
Church-Stretton 7. 238
Cilicien 5. 594
Cilly (eocän) 1. 740p.;
3. 47
Ciply 3. 229; 9. 107
Cirencester 4. 620g.
Cirin 0. 196 2. 832;
4. 381!gp.
Civita-vecchia 8. 87
Claiborne 0. 724
Clausthal 3. 601; 4. 841g.;
6. 335
Cleveetz-See 8. 345
Climbach (bei Giessen)
3 685p.
Cobija 4. 791
Coblenz 2. 920p.; 4. 39p.;
6. 233p.
Coburg 4. 107, 321, 408;
7. 759p.
(s. Koburg.)
Cochinchina 6. 566m.;
8. 77m.
Cohahuila 6. 277
Coimbra 5. 95
Col de Balme 0. 667ff.
du Cardonnet 8. 225
de Chardonnet 0. 119
-des-encombres 6. 70;
8. 225; 9. 220g.
de la Madeleine 8. 226;
9. 220g.
de la Magdeleine 6. 70
Colfosco 0. 131
Columbia: Flussgebiet
0. 95
Comelico 7. 619
Comer-See 5. 83; 6. 218g.;
8. 767p.
Commentry (Allier) 2. 85
Commern 4. 475, 605
Comothau (Flora) 0. 115
Comté-Becken:
Geologie 0. 227
Concepcion 8. 770ff.
Concud 3. 617p.
Connecticut 5. 862 6. 82,
125; 7. 87, 877p.;
9. 508p.
Constantine 4. 77;
5. 363!g.
Contréxeville 7. 578
Capiapo 0. 444; 3. 566,
791; 5. 839m.
Coquimbo 0. 480; 4. 347
Corbach 3. 58
Corbiéres 0. 487;
6. 355g.
la Cordaz 5. 472
Cordilleren 0. 472; 1. 610;
2. 496; 551, 662;
4. 466, 791; 5. 203;
8. 859g.; 9. 467, 827
Coregna 7. 596
Corncockle 3. 753
Cornwall 4. 344, 346;
5. 841m.
Corsica 9. 273
Cosby's creek, Ten.
5. 562m.
Coschütz 4. 566
Cosne 9. 762p.
Côte d'Or 9. 452g.
Cotentin 4. 108
Couvin 6. 209
Couzerans 6. 47
Crailsheim 5. 366p.
Cransac (Aveyron-Dpt.)
2. 66, 71
Crefeld 7. 495
Creta 6. 82; 9. 632g.
Geologie 0. 475
Croatien 3. 874p.
Crottendorf 3. 493
Crussol-Berg 6. 57²
Cuba 8. 598
Cucuron 4.608p.; 5.223p.,
374p.
Säugethier-Fauna 1.490
Cuisse-Lamotte 7. 490
Cummingstone 9. 875
Cutch 4. 457
Cyclopen-Inseln 6. 446

D.

Dachelmoos 8. 278
Dachstein 2. 93
Dagestan 1. 205*
Dahn 1. 594
Dalmatien 2. 453; 6. 58g.
Damaskus 7. 450
Dannemora 3. 67; 9. 184
Danzig 3. 225p.
Darling Downs 9. 245
Dauba 9. 743g.
Dawalagiri 7. 98
Dax 1. 750

la Débruge 5. 223p.
Debritz 4. 565
Deccan 4. 640; 5. 862p.
Dego 3. 369; 6. 738
in Piemont 8. 516
Degerloch 5. 757
Deister 0. 401 ff.; 8. 582g.
Delemont 3. 164
vgl. Delsberg
Delsberg 3. 498p.; 4. 838g.; 9. 500p.
vgl. Delemont
Dent-du-midi 5. 472
Descabezado 2. 662 ff.
Deutschland 2. 81 gp.; 8. 97, 478g., 483g.; 9. 107
Nordwestliches 3. 31
Devonshire 3. 810g.
Diablerets 5. 472
Djebel Khaisoun 7. 450
Diemel-Thal 2. 187
Dienten 0. 517, 731
Dieu-le-Fit 7. 613g.
Dirschel 3. 225p.
Divisberg 7. 432
Dniepr 6. 111p.
Döbeln 4. 367
Doberan 4. 670
Dobrudscha 8. 83
Dobschau 9. 738
Dömitz 8. 102
Don 1. 609
Donnersberg 3. 525
Donau 8. 717
-Hochebene 9. 218g.
-Thal 3. 377p.
Dora Baltea 9. 61
Dorpat 7. 325g.
Downton 8. 715
Drachenfels 0. 790; 4. 593
Drau-Thal 0. 524
Dresden 2. 652, 895
Drôme 7. 613
Drontheim 6. 76
Dublin 5. 703m.; 6. 693
Dudley 1. 255
Dumfriesshire 4. 858
Düna 9. 845g.
Duppau 6. 705; 7. 185
Dura Den 9. 490, 491
Durango 6. 281; 7. 53; 8. 769 ff.
Durdlestone-Bay 5. 746p.
Durham 7. 636p.; 8. 745; 9. 761
Dürkheim 3. 533
Dürnberg 6. 846
Dürnten 9. 346
Duttweiler 3. 295

E.

Easton, Pen. 5. 565m.
Ebersdorf 6. 475
Ebro 5. 357
Edder 4. 15, 324, 673; 9. 154
Edle Säule 6. 36m.
Efrahvolshrain: Lava 2. 318 ff.
Eger 3. 375g.; 5. 451, 452; 6. 584, 708; 7. 723g.
Egerkingen 5. 223p.
Ehrenfriedersdorf 3. 700
Eibenstock 3. 725
Eibiswald 8. 586
Eichstädt 3. 750p.; 5. 328p.
Eifel 2. 109; 3. 543; 5. 321; 6. 110, 209g., 351g., 507p.
Eimelrode 5. 317g.
Eisenerz 6. 63
Eisernes Thor 3. 379
Eismeer 0. 740
Elba 1. 723; 5. 45
Elbe: Alluvial-Bildungen 2. 194
Elbogen 6. 584g.; 7. 723
Elm 5. 33
Elmshorn 7. 50gp.
Elsass 4. 123p.
Emberg 0. 96
Ems 4. 175
Engadin 8. 91; 9. 97g., 471g.
England 0. 858; 7. 503, 639p., 746p., 767p.; 8. 378p., 483; 9. 873
Geologie 0. 721
Entrevernes 5. 473 ff.
Eperies 9. 835
Épernay 5. 223p.
Eppelsheim 4. 608p.; 5. 223, 374p.
Erba 6. 217; 8. 88
Erfurt 3. 44gp.
Erlbach 6. 446
Erie-See 1. 463
Eritz 3. 498p.; 9. 118, 501p.
Erosa 9. 630g.
Erpfingen 1. 504
Erzberg 5. 713; 6. 63
Erzgebirge 0. 592; 4. 42; 5. 600, 712; 6. 446, 475g., 569, 708g.; 8. 72m., 844g.; 9. 96g., 469, 532g., 670g.
Erzgebirgisches Bassin 9. 714
Eschweiler 7. 97
Esino 3. 167; 4. 204; 6. 757p.; 8. 88, 767p.; 9. 59, 499p.
Esperstädt 2. 911
Essen 0. 136; 7. 96, 480, 788
Esthland 5. 852g., 865p.; 7. 607; 8. 593g.; 9. 57, 62, 120
Étampes 3. 77
Etang de Berre 3. 568
Étouaires 5. 223p.
Eùba 9. 677 ff.
Euböa 9. 216g.
Euphrat 7. 459g.
Europa 9. 625g.
Everglades 4. 229

F.

Fahlun 6. 435 m.
Fajum 4. 612
Falkenau 6. 584 g.; 7. 723 g.
Falkenhagen 7. 698 g.; 8. 583; 9. 825
Fassa 7. 172 m.
-Thal 0. 129 g.; 1. 324; 3. 711
Faudon 5. 474
Faxöe 1. 100
Fayol (Azoren) 0. 10 g.
Feejee- (Fitschi-) Inseln 4. 463* ff.
Felsberg 1. 107; 2i 972; 8. 342
Felsberger Horn 8. 342
Felsö-Banya 6. 566 m.; 7. 832 m.; 9. 835
Ferdinands-Quelle 3. 593!
la Fère 5. 223 p.
Ferques 3. 815
Ferrones 6. 368
Fichtelgebirge 4. 165; 5. 200; 9. 96g.
Figline 9. 115 p.
Finistère 8. 332
Finnland 8. 312 m.; 9. 310 g.
Fischhausen 3. 225 p.
Fitschi- (Fejee-) Inseln 4. 463* ff.
Fladungen 7. 555 p.
Flaimser Thal 2. 490
Flandern 2. 881g.; 7. 611
Flöha 6. 449
Flöhaer Becken 5. 241 p.
Flonheim 8. 530 p.
Florange 5. 213, 463
Flores (Azoren) 0. 13 g.
Florida 4. 223 g.; 8. 106! g.
Föhnern 5. 681
Fohnsdorf 4. 818; 8. 586
Fontainebleau 3. 189; 6. 344 g.
Forez 1. 238
Framont 3. 838 m.; 5. 448
Franche-Comté 2. 625; 4. 720
Francisci-Quelle 3. 594!
Franken 4. 369; 7. 1 g.; 9. 385 g.
Frankenberg 3. 125 p.; 4. 15; 5. 548; 9. 154
Frankfurt 8. 61 p., 606 g.
Franklin 3. 176; 5. 202
Frankreich 6. 718; 8. 483 g., 705
Franzensbad 3. 375
Franzensbrunn 1. 635
Freden 7. 495
Freiberg 2. 450g. 6. 38 m.; 9. 82
Freienwalde 6. 755 p.; 7. 495
Freundschafts-Inseln 8. 101
Freyburg 2. 446
Friedberg 6. 578 g.; 7. 452
Friedrichsvärn 1. 593
Fritzow 5. 848
Fronstetten 2.305p., 758p., 831 p; 3. 250 p., 378 p.
Fuego (Geologie) 0. 466
Fuerta ventura 8. 836 g.
Fulda 3. 659; 6. 26 g.
Füred 6. 730; 7. 181
Furth 9. 677 ff.

G.

Gabernegg 9. 821
Gablau 9. 210
Gablenz 9. 676, 688 ff.
Gailthal 7. 619; 9. 741
Galizien 1. 721 g.; 8. 858 g.; 9. 851
Galena 3. 609
Gamelshausen 1. 511
Gams 4. 869p.
-Thal 3. 719 g.
Garag-See 4. 612
Garbenteich, bei Giessen 4. 675 g.; 5. 436, 545
Gard
-Dpt. 7. 250 p.; 9. 220
Gargas (Vaucluse-Dpt.) 0. 878; 5. 223p.
Garnisch 2. 593; 3. 318p.
Garonne 3. 71
Gassino 2. 999 p.; 6. 91
Gastein 0. 517
Gebel-nakous 7. 725
Geisalpe 9. 641, 643
Geistergang 6. 82
Geistlicher Berg 8. 59 p.
Genf 2. 977 p.; 4. 249 p.
Genua 2. 365; 3. 564 g.
Georgia 5 843, 847; 9. 302 m.
Georgien (Asien) 8. 736
Gergovia (Flora) 0. 115
Gerolstein 6. 209
Gers 4. 608 p.
Gersdorf 5. 74
Gesellschafts-Inseln 4. 463
Giants-Causeway 6. 732
Gibraltar 2. 734 g.; 5. 460 g.
Gironde 3. 71, 73
Gishiginsk 3. 710
Gladbach 4. 827
Glärnisch 3. 329 g
Glarus 6. 362 p.; 9. 862 p.
Glatz 4. 724
Gleichenberg 1. 593; 8. 586; 9. 118
Gleiwitz 6. 692
Glockenberg 7. 725
Gloucestershire 6. 100
Gmunden 5. 42
Gokstcha-See 8. 84
Golfstrom 3. 199; 4. 223; 8. 106!
Gömörer Komitat 9. 319
Göpfersgrün 5. 200
Gorinchem 4. 195 g.
Görz 9. 737 g.
Gosau 3. 632; 5. 53
-Thal 3. 712 g.; 4. 866 gp.
Gosslar 0. 137; 3. 49 g.
Göttingen 3. 802; 4. 478 g.

Gottland 4. 492; 9. 57, 62
Gottschee 9. 856
Graciosa (Azoren) 0. 12g.
Gran 4. 573
Grasbrook
(bei Hamburg) 3. 564
Graubündten 0. 743;
7. 726²; 8. 337²;
9. 85 g., 97 g., 342g.,
481 g., 630 g., 724 g.
la Grave 5. 223 p.
Great Salt-Lake 3. 613
Grebenzer Alp 9. 757
Greenville 3. 186
Greith 3. 497 p.
Grellingen 3. 65
Grenoble 6. 554
Gresten 4. 763
Griechenland 1. 461;
5. 375 p., 718 g.;
7. 371g.; 9. 216g.
Griesern-Thal 6. 17
Griffith's
Island 4. 85; 9. 221 pg.
Grimma 3. 443
Grognardo 3. 369; 6. 92
Groningen 7. 385
Gröningen 8. 257
Grönland 2. 362g.; 3. 270g.;
4. 693 m.; 5. 350
Grossau (Steyer) 0. 89g.
Grossbritannien 9. 186 m.
Grosser Salzsee 4. 202g.
Gross-Glockner,
Höhen 0. 744
Grotte aux Fées 5. 236
Grotta di Maccagnone
9. 640 p.
Grotta di S. Stefano
9. 317 g.
Grünbach 5. 86
Grundbach 9. 697
Grünten 7. 480 g.
Guadalajara 2. 342g.; 5. 705m
Guadalaxara 9. 213
Guadarama 4. 845; 5. 358
-Gebirge 0. 84
Guadeloupe 2. 486 g.; 864
-Fluss 3. 165
Guatemala 7. 843
Gückelsberg 9. 674 ff.
Gückelsberger
Kohlen-Bassin 9. 540
Guming-Guntur 3. 463
Gumpoldskirchen 8. 825
Günzburg 1. 677p.; 2. 304
Gurnigel-Kette 8. 636
Gusternhain 0 203; 2. 305p.,
832
Gütersloh 2. 767
Guttaring 0. 715
Guttenstein 9. 740
Guyana 2. 725

H.

Habühl 7. 267, 268;
8. 403 p.
Hackelgebirge 9. 90 g.
Haddam 5. 194, 198, 701m.
Haigerloch 2. 598
Hainberg 4. 478 g.
Hainholz 8. 567 m.;
9. 297
Hainichen 4. 564; 6. 475, 543
-Ebersdorfer Becken
5. 241 p.
Halberstadt 0. 133 g.
Hall 0. 615; 6. 360
bei Kremsmünster 5. 832
Halle 1. 102 g.; 6. 362 p.
Geologie 0. 337
Hallein 6. 846
Hallstadt 5. 487 p., 500
Hals: Lava 2. 318 ff.
Hamburg 4. 36 g.
Hampshire 1. 711 g.
Hannover 3. 40; 6. 449 g.;
8. 199 g.
Hapsal 5. 855
Hardt-Gebirge 3. 528
Häring 2. 748; 3. 330 gp.;
4. 376! gp., 528! g.;
8. 586; 9. 199 g.
(Flora) 0. 114
Harrach-Thal 6. 566;
8. 310
Härtingen 2. 851
Harz 1. 223 g., 782 2g.;
2. 701, 726*, 97;
3. 175m.; 4. 642p.;
5. 540; 6. 77, 203g.;
9. 56
-Gebirge 2. 978 g.;
6. 255 gp.; 7. 463g.,
641, 755, 785 gp.;
8. 145 g., 364 p.,
717g., 751p., 808g.
Harzburg, Saline 7. 463
Harzgerode 8. 752 p.
Haslach 1. 76; 2. 205p.;
9. 172 p., 430
Hattenheim 6. 167; 7. 58
Hauenstein-Tunnel 6. 84g.
Hausbach 8. 405 ff.
Hausruck 8. 79
Haustein 7. 28, 36
Haute-Loire 4. 609 p.
Haute-Saône 8. 344, 590
Hauterive 5. 745 gp.
Hautevigne 5. 223 p.
Haut-Rhin 8. 589
Havraneck, Berg 0. 76*
Hawaii 6. 199 g.
Headon-Hill 3. 189; 4. 82
Heersum 8. 582
Heidelberg 4. 154
Heilbronn
(in Bayern) 2. 295!
Heilbrunn 1. 161, 349
Heiligenblut 0. 744
Heiligenkreutz 3. 383
Hekla 1. 848 ff.; 6. 186
Laven 2. 316
seine Geschichte 5. 578
Helgoland 7. 179
Helmstedt 6. 78; 8. 583
Hempstead 4. 83; 9. 118
Heppenheim 9. 211 g.
Herborn 8. 59 p.
Herford 8. 583
Herkules-Quelle 3. 591!
-Bäder 3. 591!; 8. 708g.
Hermersdorf 8. 846 g.
Hermsdorf 3. 625 p.;
6. 755 p.; 7. 495;
Herne Bay 3. 189
Heroldsberg 5. 757; 7. 7ff.
Hervey
-Inselgruppe 4. 464*
Herzogenbusch 4. 228
Herzogenweiler 5. 756p.
Hessen
(Grossherzogthum)
2. 82 gp., 201 g,
828 g., 976g.; 8. 696
Geologische Karte
1. 816 g; 2. 433;
4. 421
Hettange 6. 455, 491gp.;
7. 208g., 211g.

Hiendelaencia 0. 84
Hindelencina 8. 818 m.
Hildburghausen 9. 168 p.
Hildesheim 8. 582
Hils 4. 641
Hilsmulde 8. 582
Himalaya 4. 457, 475, 582; 5. 734g., 856; 7. 98
Himmelsfürst Berg 8. 566
Hindelang 9. 641
Hierapolis 8. 575
Hinterländer -Gebirge 2. 977 g.
Hirlatz 4. 545 g.
Hirschberg 8. 822 m.
-Alpe 9. 641 ff.
Hirschenloch 9. 758
Hitteröe 2. 655; 5. 513m.
Hof 9. 722
Höganaes 8. 859
Hohenhöwen 7. 28
Hohentwiel 2. 84; 3. 684
Hohenzollern 3. 324; 4. 364; 7. 724 g.; 8 719 g.
Hoher-Kramer 3. 318 p.
Hoher Peissenberg 4. 520! g.
Hoher Rohnen 3. 497 p.; 9. 118, 501 p.
Hohe-Strasse 8 606
Höhgau 2. 84; 7. 28;
Hochheim 3. 134
Hohnstein 7. 552
Holland 4. 195 g; 7. 385 g.; 8. 257; 9. 58
Holstein 2. 51 g.; 4. 208; 7. 51
Holzappel 0. 275
Holzhausen 9. 122 p.
Holzmaden 5. 494 p.
Homberg 9. 122 p.
Homburg 5. 208 g.
Hommoney creek 1. 186
Hondsrug 8. 259
Honduras 5. 363
Honfleur 0. 185
Honth 9. 193
Horazdiowitz 6. 577 g.
Hordwell 2. 1000 p.; 3. 189
-cliffs 1. 711
Horgen 3. 498
Horhausen 5. 839
Horn 9. 837 g p.
Horrsjöberg 5. 840
Huajaquillo 6. 278
Huajuquillo 8. 770 ff.
Hudh in Karamanien 0. 223
Hudsonsbai -Territorium 6. 352 g.
Huelva 9. 88 g.
Huelgoat 8. 332
Hüls 0. 393
Hünenberg 0. 390
Hungen 3. 742
Hunneberg 4. 492
Huron-See 5. 395
Hüttenberg 5. 713
Hüttenberger Erzberg 5. 447 m.
Hyerische Insel 5. 600

I. J.

Jackson 6. 229
Jamaika 6. 106
Jamoigne 4. 850; 6. 492
Jauer in Schlesien 1. 467g.
Jauling 5. 819; 6. 90 g.
Java 1. 68 g.; 3. 433 p., 602; 4. 95! g., 446, 628 p.; 5. 601! g., 616; 6. 68* g., 609; 7. 433; 8. 80g.
Jaworzno 7. 590
Jelton-See 4. 844
Jena 2. 53 g., 911; 3. 9 g.; 5. 367 p.
Joachimsthal 2. 956; 3. 595; 4. 72; 6. 82 m., 435
Johanngeorgenstadt 4. 423
Jordan: Organismen seines Wassers 0. 489
Jordan-Thal 1. 488
Jordansmühl (in Schlesien) 0. 418
Jorullo 9. 323!
Jouan-Fernandez 7. 26
Iowa 3. 480 g.; 5. 488g.; 8. 98 g.; 9. 340 g.
Jungbunzlau 9. 744
Jura 3. 323; 4. 353, 355, 370, 826; 5. 856 g.; 6. 572
-Depart. 4. 654
(-Gebirge) 5. 104; 7. 168, 844 g.; 8. 847
-Plateau 4. 216
salinois 0. 709
Idria 6. 196, 465 g.
Ilezkaja Saschtschita, Salzstock 0. 76*
Ilfeld 8. 145 g., 808 g.; 9. 56
Illinois 0. 872; 8. 99 g., 122p., 716; 9. 825g., 848 g.
Ilmenau 4. 181, 865; 7. 717 m.
Ilmen-Gebirge 0. 336; 2. 209; 4. 178
Ilseburg 0. 138
Imerethien 8. 741 p.
Imilac 5. 7
Indiana 6. 109
Inkerman 8. 873
Inn-Thal 9. 753!
Inwald 2. 346g.; 7. 154
Iphigenia -Schlucht 8. 874
Iquique (in Peru) 3. 188m.; 6. 563
Irland 6. 358
Irschel 9. 501 p.
Ischia 9. 510
Isère 6. 554
-Dept. 4. 216, 653
-Thal 5. 213
Island 0. 347, 349, 455; 1. 199, 837 g.; 5. 448, 707m., 709g.; 6. 47, 186m., 193m., 196 m., 345, 348, 350, 442 m., 562 m.; 8. 215, 9. 754 p., 832
Laven 2. 315 g.
Quellen-Erzeugnisse 0. 344!
Isny 1. 470
Isonzo-Thal 9. 737 g.

Issel 5. 223 p.
Ississu (Schwefelquelle) 7.324!
Isterberg 3. 150
Istlahuaca 6. 304
Istrien 1. 602 p.; 9. 317g.
Italien 7. 203; 8. 87 g., 584; 9. 870 p.
Ivrea 6. 172

K. (vgl. C.)

Kaba 9. 192
Kahlenberg 8. 582 g.
Kainberg 1. 634
Kaimburg (s. Kainberg) 1. 635
Kaisergebirge 8. 444 g.
Kaiserquelle 3. 593!; 4. 184*
Kaiserstuhl 2. 446; 5. 560 m., 573 m., 702, 838 m.; 8. 687
Kaiserwald 9. 96 g.
Kakowa 9. 292
Kalamaki 7. 183
Kalanda 7. 727
Kalifornien 1. 720; 2. 55, 200; 3. 696, 723 g.; 5. 716; 7. 330
vgl. Californien
Kalk-Alpen 4. 355 g.
Kalmit (Berg) 3. 531
Kaltennordheim 6. 420; 8. 712 g.
Kaluga 1. 491, 609
Kalvarienberg 3. 659
Kammerberg 5. 505 p.
Kammin 5. 848
Kamsdorf 6. 84
Kamtschatka 7. 89 g.
Kandern 8. 483
Kansas 8. 349 g., 502 p., 765 gp.; 9. 823! g., 869 p.
Kanth 2. 635
Kap-Land 2. 581
Kapfenberg 0. 96
Käpfnach 9. 427
(Flora) 0. 114
(fossile Knochen) 1. 75
Kap der guten Hoffnung 7. 350
vgl. Cap
Karagan 1. 468
Karamanien 0. 223
Kara-Tau 1. 469
Karlsbad 1. 587, 769 g; 4. 683m.; 6. 731!; 8. 325 g., 569 m.
Karlsbrunn-Quelle 3. 592!
Kärnthen 0. 513, 550; 3. 609; 5. 583 g., 586 g., 807, 821m.; 6. 465 g., 757 p., 849 g.; 7. 81 g., 214 g., 614g., 616g.; 8. 1 gp., 124, 129, 221, 344 g., 504p.; 585 g.; 9. 476 g., 740 g.
Karolina 6. 350, 351
vgl. Carolina
Karolinen-Quelle 3. 593
Karpathen 1. 721 g.; 5. 25; 8. 105, 546, 858 g.; 9. 202 g., 837 g,
Karst-Gebirge 9. 737 g.
Kaspische Länder 1. 468
Kaspisches (Casp.) Meer 4. 466; 6. 591
Kaspi-See 6. 694!
Kassiterit 8. 467*
Katharinenburg 2. 848
Katschkanar 2. 738
Katskill-Berge 5. 354
Kaukasus 1.491; 7.769 g.; 8. 84, 736 g.
KauthDruckfehler für Kanth
Kea 6. 199
Kehlheim 0. 176; 3.750 p.; 4. 577 p., 624; 5. 740
Kemmating 7. 268 p.
Kempten 1. 161
Kent's-Höhle 6. 489
Kentucky 1. 482; 7.729 g.; 9. 848 g.
Kertsch 6. 559 m., 690 m.; 7. 582, 715 m.; 8. 874
Kiew 8 828 m.
Kija-Gebirge 0. 86
Kimmito 8. 830 m.
Kimpolung 6. 579
Kindberg 1. 635
Kington 8. 715
Kinnekulle 4. 492; 6. 805
Kinzig-Thal 4. 823; 5. 832 m.
Kirchberg 2. 765 p.
Kirchen-Staat; plutonische u. vulkanische Bildungen 0. 231
Kirgisen-Steppe 8. 739; 9. 815
Kischenew 6.65; 9.862p.
Kissingen 4. 614 g.
Kitzbüchl 9. 306 g.
Klausen 5. 846 m.
Klausthal 3.601; 9.321 g.
Kleinasien 0.214; 5.594g.! 719; 7. 449
Geologie 0. 491
Klein-Spauwen 3. 189 7. 496
Kloed (Vulkan) 8. 80
Koblenz 2. 920 p.
Kobsel 8. 873
Koburg (s. Coburg) 4. 107
Köflach (in Steyermark) 8.499p., 586
Köhlerberg 8. 810; 9. 605 g.
Kolberg 9. 626
Köln 2. 192 p.
Kongsberg 3. 720 g.
Koralpen 9. 740
Korinth 7. 183
Korytnitza 3. 807
Kössen 4. 87 g. 763
Kosteinitz 0. 345
Kostenblatt 5. 599
Kotach 4. 640; 5. 862p.
Kothalme 3. 318p.
Krageröe 3. 595
Krakau 1. 732; 7. 155
Krailsheim 3. 161p.
Krain 8. 219; 9. 465g., 856g.
Kramerberg 2. 593; 3. 318p.
Krankenheil 1. 161, 349
Kremnitz 3. 383p.
Kressenberg 1. 139; 2. 129 gp.; 3. 85g.; 4. 319, 537; 6.819p.

Kreutznach 3. 133ff.; 6. 534p.
Krim 8. 873p.
Kroatien 9. 102
Kunchinjinga 7. 98
Kupferberg 2. 210
Kurland 0. 466; 5. 444; 7. 722g.; 9. 120
Kursk 5. 622p.; 6. 111p., 758; 9. 364p.

L.

Laacher See 0. 602; 1. 61; 3. 542
Laak 3. 72
Laasan 2. 985
Labuan 8. 588
Ladronen-Inseln 4. 463*ff.
Laghouat 8. 723g.
Lagieweik 6. 746p.
Lago d'Iseo 6. 637g., 738
Lago maggiore 1. 335
Lahore 6. 270
Lake superior 0. 471; 3. 466; 4. 72; 5. 73, 75, 349
(Obrer See) 4. 422
Lanckorona 2. 347
Landau 3. 524g.
Landes 3. 77
Langenberg 8. 582g.
Langenbrücken 6. 694; 8. 296; 9. 1g., 513g.
Langenbrunn 3. 377
Langrune 5. 254
Languedoc 4. 846g.
Lanzarote 8. 836g.
Laonnais (le) 5. 223p.
Lappland: Marlekor 0. 40
Lapugy 2. 630p.; 3. 810p.; 4. 574; 6. 479p.; 7. 376, 420
Larzac 1. 466
Latium: Vulkane 0. 232
Laufen-Thal 1. 745g.
Laurvig 1. 593
Lausanne 3. 498p.; 6. 450; 7. 624p.; 9. 118p., 500p.
Lauw 1. 599
Lavagna 8. 89
Laven 9. 460
Lavezzi (Stein) 8. 73!
Lebach 5. 326p.
Leckhampton 1. 484; 2. 226gp.; 8. 355gp.
Leicester 8. 228
Leiding: Braunkohle und Knochen 0. 202
Leintwardine 8. 127
Leipzig 4. 227
Leiterthal 0. 537
Leitha-Gebirge 7. 187
Leitmeritz 8. 844
Lemberg 1. 478, 479g.; 2. 510p.; 6. 95
Lempa (Flussthal) 5. 170
Lenarto 3. 186
Lenna 8. 383; 9. 499
Leoben 8. 586
Leogangthal 6. 570g.
Leognan 3. 73, 74; 5. 223p.
Lesbos 4. 862
Lessines, Belgien 1. 169
Lewisham 6. 235
Leytha, s. Leitha
Libanon
(Berg) 3. 108p., 632
Liberia 8. 69
Liebenhalle: in Braunschweig 1. 325g.
Liefland 5. 852g., 865p.
Liegnitz 0. 482; 6. 561!m.
Lienz 0. 529, 546; 7. 221, 619
Lieskau 6. 362p.
Liestal 7. 141
Ligurien 6. 91, 738
Limagne 4. 608p.; 5. 223p., 374p.
Limburg 4. 228; 9. 107, 466g.
Limoges 7. 332m.
Linz 5. 632; 9. 115
Lion-river 3. 473
Lippe-Detmold 7. 696g.; 9. 825
Lisenz 6. 37
Lithauen 7. 722g.
Livland 8. 593g.; 9. 57, 62g., 120
Llanquihue 2. 551!
Loa (Mauna Loa) 6. 199
Löbau 1. 591; 2. 485; 7. 44
Löbejün 1. 475; 7. 835
Lobsann 1. 734; 4. 123p.; 5. 370p.; 9. 822
Loch Staffin 2. 350
Locle 6. 332; 9. 501q.
Lodève (Flora) 0. 110; 5. 353gp.; 7. 113p.
Loire-Becken 4. 831
Lombardei 6 215g., 736g., 749; 8. 83g., 747, 766gp.; 9. 59, 356p., 465g., 499²p.
London 9. 228g.
Quellen 2. 626
Longmynd 5. 217; 7. 238, 239²; 9. 105
Longwy 4. 850
Lörrach 9. 137g.
Lössnitz 3. 609
Lothringen 2. 972; 6. 207g.
Löwenberg 7. 629
Löwenfluss 5. 562
Lozère 6. 582g.
Departement 8. 609
Lübbeke 4. 476
Lubenz 8. 718g.
Luc 5. 635p.
Luckau 6. 583
Ludlow 8. 624
Ludwigs-Quelle 3. 592!
Lugano 1. 333; 5. 479²; 8. 383p.; 9. 59
Lugau 9. 706
Luithorst 7. 495
Lüneburg 4. 776m., 839g.; 7. 73
Lüneburger Haide 4. 560; 6. 668
Lunel 4. 198; 5. 223, 370ff.
Luxemburg 4. 849gp.; 6. 455g., 491gp.; 7. 213; 8. 352g.; 9. 345g.
Luzern 9. 501p.
Lyme regis 0. 181; 6. 455g; 9. 637p.
Lyon 2. 965
Eruptiv-Gesteine 0. 72

M.

Maar von Uelmen:
im Reliefbild 4. 228
Maccagnone 9. 640 p.
Madagaskar 1. 374; 4. 110; 5. 480; 6. 849; 8. 610
Madera 5. 507 p.; 6. 241 gp.; 8. 757; 9. 253 p.
Madeira s. Madera
Madras 2. 855; 6. 185 m.
Madrid 3. 616; 4. 845 g.
Magdeburg 2. 359, 362 g.; 3. 45; 7. 496
Mägdesprung 8. 752 p.
Magra-Thal 9. 872 p.
Magyarad 9. 198
Mähren 2. 624 g.; 4. 477 g.; 6. 56 g., 553, 854; 7. 350 g., 448 g.; 8. 574 m., 809; 9. 487, 606, 841
Maidan-Pek 6. 710
Mainz 3. 189, 481 g.; 5. 187, 223, 374; 6. 533 !p.; 8. 506; 9. 114, 121, 194
Becken 1. 177; 2. 433, 586 g.; 3. 129 g; 8. 451
Tertiär-Becken 3. 670 p.
-Gebirge 3. 38
Majorca 6. 460 g.
Mairhof 7. 267, 268; 8. 405 ff.
Malaga 5. 458 g.
Malbattu 5. 223 p., 370 p.
Malpays 9. 323
Malta 6. 101 gp.
Malvern-Berge 2. 727 g.
Man 5. 709
Manche-Dept. 8. 841 g.
Manderscheid:
im Reliefbild 4. 227
Mandschurei 9. 312
Manebach 5. 505 p.
Mangut 2. 242
Mangyschlack 1. 468
Mauna-Loa: 2. 959, 970; 6. 199
Männersattel 8. 342
Mannsfeld 0. 110; 3. 125
Mans 1. 65 g., 738 g.
(Flora) 0. 113, 115
Maracaybo 4. 716
Marboré 0. 469
Marburg 7. 345 g.
Mardorf 9. 296
Markersdorf 8. 202
Marienbad 1. 769 g.; 4. 217 g.; 8. 341 g.
Marienbrunnen 9. 821 !
Marmarosch 6 200 g.
Marokko 5. 583
Marostica 5. 379
Marquesas-Inseln 4. 462
Martigues 3. 568
Martinique 2. 487, 620
Martinsart 4. 850
Massafuera-Insel 7. 22
Massa maritima 8. 704 g.; 9. 872 p.
Massachusetts 2. 852
Mastricht 3. 229; 8. 231, 619 p., 744 p., 850 g.; 9. 120, 384 p. 466 g.
Matra-Gebirge 9. 739
Mattsee 3. 88
Mauremont 4. 375, 639; 5. 223 p.
Maurienne 5. 91; 6. 70 g.; 9. 220 g.
Mauritius-Insel 5. 489
Mauvaises Terres 5. 111 !gp.; 7. 246; 8. 376 p.
May-hill 2. 727
Mecklenburg 4. 670; 5. 435 g., 727 gp.; 7. 116; 8. 102
Meeresalpen 6. 575 ! g.
Mehadia 8. 708 g.
Mejillones 4. 791
Meisdorf 0. 91
Meissner 5. 199
Melchingen 3. 378 p.
Mella 6. 737 g.
Melville-Island 4. 86; 9. 221 gpg.
Memmendorf 3. 493
Memphis (Tenn.) 4. 860 p.
Menat 5. 370
Mendrisio 1. 337; 6. 207
Mennser Steinberg 8. 569
Meran 1. 667
Mérignac 3. 73, 74
Merseburg 3. 631
Mersey 7. 835
Meseritz 2. 460 p.; 3. 607
Metz 6. 455
Meudon 1. 100; 3. 189; 5. 223 p.; 7. 733; 9. 360 p.
Meurthe-Departement 2. 736 g.; 4. 212 g.; 6. 202 g.
Mexico 6. 185, 257, 557; 7. 53, 393 m., 610 g., 838; 8. 226, 726, 757 p., 769; 9. 213, 218, 323, 827 g.
Mezières 7. 211
Mezö-Madaras 6. 694
Miask 2. 850; 4. 178, 181; 7. 330 m.
Michaelsberg 3. 601 m.
Michigan 4. 422; 5. 349; 7. 79, 589
Miesbach 6. 359, 535, 707
Milhau 6. 732
Militär-Grenze 8. 842
Milo 0. 449 m.; 1. 461 g.
Miltitz 3. 493
Minas geraes 2. 698 m.
Minchinhampton 1. 485, 2. 226; 3. 232 p.; 4. 764 p.; 7. 742 p.
Minden 5. 598
Minnesota 3. 480 g.; 5. 488 g.
Mississippi 4. 829 g.; 6. 229², 480 p.; 8. 97 g., 480 g.; 9. 497
Missouri 6. 734 g.; 7. 858 p; 8. 98 g., 122 p., 360 g., 375 p.; 9. 849 g.
Misteca 6. 304
Mistelgau 5. 494 p.
Mittelasien 8. 212
Mittelmeer-Küste Nördliche 3. 564
Mittweida 3. 443
Möen 1. 791 g.
Modum 3. 720 g.; 5. 561; 8. 825 m.
Moissac 5. 223 p.
Mokattam
bei Kairo 0. 222
-Berg 5. 862

Moldava 5. 577
Moliére-Berg 7. 624 p.
Moncayo 4. 176
Mondorf 6. 846; 7. 471
Mondsee 5. 43
Monod 9. 500 p.
Monroe 3. 602
Montabuzard 5. 223 p., 374 p.
Montajone 9. 116 p., 118, 872 p.
Montalceto 9. 871, 872 gp.
Montagne-noire 0. 488; 5. 223 p.
Montagnes rocheuses 8. 708 g.
Montereau 3. 189
Mont-albano 1. 466
Mont-blanc 4. 205; 5. 91
-Dore 5. 356, 445
Everest 7. 98
Genêvre 0. 675
-perdu 0. 469
Monte Bamboli 4. 626; 9. 118, 871, 872
Bolca 3. 46 p.; 4 251 p., 572; 5. 379; 7. 775, 8. 586 (Flora) 0. 114
vgl. Bolca
Caporciana 6. 844
Cerboli 0. 493
Mario 8. 584
nuovo 0. 720
Pastello 7. 776 p.
Postale 5. 379; 7. 154
Monte Promina 3. 509 p.; 4. 47, 877 p.; 5. 369; 6. 231; 8. 586; 9. 118
Rosa 5. 91; 6. 86! g.
-rotondo 8. 704 g.
Salvatore 1. 337
San-Salvadore 5. 479²; 8. 383 p.
di Somma 2. 591; 3. 257 m.; 4. 76, 448 m; 6. 43 m.; 8. 826 m.
Vegroni 7. 776 p.
Montecchio maggiore 7. 230 p.
Montgomeryshire 2. 242; 4. 209
Monti Berici 6. 823
Massi 4. 626
Pisani 6. 575
Montioni 0. 356
Montmartre 3. 189
Montpellier 1. 492, 759; 2. 997 p.; 4. 609 p.; 5. 223 p.; 620 p.
Montrejeau 9. 622
Montrouge 9. 239
Mönzlen 9. 501 p.
Monzoni 5. 451 m.; 8. 86
-Berg 7. 69; 8. 692
Moosseedorf 8. 742
Moreton-Bay 8. 230, 589
Mormont 4. 83
Mornhausen 4. 192
Mörschwyl 8. 659 g.; 9. 273
Mortain 8. 841 g.
Mosel 6. 491; 7. 371 p.
-Departement 2. 706; 9. 371 p.
Moskau 1. 491, 495 g.
Mösseberg 4. 492
Mösskirch 3. 251; 8. 296 p.
Möttling 9. 856
Mourne-Gebirge 3. 464; 5. 739
-Mountains 6. 184 m., 358 g., 688 m.; 7. 174
Mouzaïa 6. 185
Muffendorf 0. 788; 4. 213
Muggendorf 0. 171
Mühlhausen 1. 122; 8. 589
Mülhausen 9. 640 p.
Muldener Hütte 0. 432
Mull 1. 487; 2. 853
Insel 6. 732
Müllheim 9. 130 g.
Münsterappel 3. 217
Münster'sches Becken 5. 733
-Thal 1. 1; 5. 411 m.
Münzenberg 6. 418 g.
Murg-Thal 0. 575

N.

Nadworna 1. 721 g.
Nagorzáni 1. 480
Nagpur 9. 750 g.
Nagyag 6. 689 m.; 7. 187 g.
Namaqua-Land 3. 473
Nanterre 5. 223 p.
Nara-Fluss 7. 472 g.
Narsan-Quelle 8. 311!
Narva 5. 852
Nassau 1. 150; 2. 197 g., 267 g., 292 g., 370; 3. 174 m., 727; 6. 367 p.; 7. 163; 9. 46 g., 84 m., 627 g.
Nattheim 8. 489
Nauheim 8. 859
Naumburg 3. 9
Naxos 0. 681
Neapel 7. 840; 9. 230 g.
Nebel-Gebirge 5. 760
Nebrasca 3. 480 g.; 4. 127 p.; 5. 111 gp., 488 g; 7. 113 p., 115 p., 491, 492, 493 gp., 854 p., 864 p.; 8. 360 g., 376 gp., 493 g., 495 g., 591 p.; 9. 246 p., 602, 823! g.
Neffinz 4. 846 g.
Nertschinsk 1. 467
Neschers 4. 609 p.
Neu-Almaden 4. 183; 6. 686; 7. 330
Neubayern 3 83, 86
Neuchâtel 4. 375; 7. 248 p.
Neuengland 9. 508 p., 866 p.
Neugranada 1. 600; 2. 496 g.; 4. 362 g., 716; 5. 93 g., 381 p., 466; 8. 308
Neuhausen 1. 502; 3. 378 p.
Neuholland 2. 332 m.; 8. 196 g., 294
Neujersey 0. 255; 2. 76; 7. 856 p.; 8. 253 p., 360 g.; 9. 469
Neumexico 3. 32; 8. 360 g., 726
Neunkirchen 0. 364
Neupaka 5. 505 p., 576
Neuschottland 3. 511 g.; 4. 633; 8. 333 g.
Neuseeland 1. 226, 249, 255, 256, 373;

Neuseeland 5. 125; 7. 108; 8. 618p.; 9. 495p.
foss. Vögel 0. 125
Neusüdwales 6. 69g.
Fossil-Reste 1. 381
Neutra 9. 203g.
Neuwied 3. 548
Neu-York 1. 498p.; 3. 339p.; 4. 346; 5. 247p.
Newcastle am Hunter, in Australien 1. 726
Newhaven 3. 189
Neyrac 6. 345
Niakornak 5. 350
Nicobaren 1. 237g.
Nidda (Flora) 0. 114
Niederbronn 2. 68*
Nieder-Einsiedel 3. 173
Niederlande 3. 371g.; 5. 99
Niederösterreich 9. 837gp.
Niederrhein 2. 752p.; 6. 504
-Departm. 3. 736gm.
Niederschlesien 9. 830
Niederstotzingen 2. 303p.
Niemes 9. 743g.
Nijne Tagil 7. 443
Nikolajew: Goldsaifen 0. 86
Niobrara 9. 246p.
Nizza 3. 603p.; 4. 205; 5. 223p.
Nord-Amerika 5. 354; 6. 1g., 91g., 239p., 353g., 381p., 385gm., 480³p., 735g., 752p.; 7. 115p., 862, 864; 8. 254p., 327m., 333g., 359g., 476g., 553, 601g., 854g.; 9. 234p., 235p., 379²p., 505p., 506p. 508p., 509p.
Geologie 1. 462
Geologische Zusammenstellung 4. 79
-Carolina 8. 358g.
Nord-Deutschland 6. 27, 477p.; 7. 495p.; 8. 608g., 635p.
-Persien 8. 736g.
-Polar-Meer 6. 464
-Wales 4. 486g.
Nordwest-Deutschland 3. 31g.; 4. 641p.
Northamptonshire 8. 483
Northumberland 7. 636p.
Norwegen 1. 178, 256g.; 2. 859; 3. 720; 5. 708; 6. 75; 8. 703gp.; 9. 339gp.
Nossi-Bé 6. 849; 7. 348g.; 8. 610
Novale 3. 46p.; 4. 251p.
Nova-Scotia 5. 500g.
Nummuliten-Formation 8. 739
Nürtingen 7. 93
Nusplingen 0. 171; 4. 51; 5. 613p., 614; 6. 105p., 486

O.

Oajaca 6. 304
Obdach 1. 634
Oberhessen 2. 201g.
Oberhalbstein 8. 337g.
Oberkirchberg 8. 296p.
Oberlapugy 2. 630p.
Oberneisen 3. 727
Oberpfalz 3. 363g.; 4. 722; 5. 704m.
Oberschlesien 2. 93, 337
Muschelkalk 0. 99
Oberer See (Lake super.) 0. 471; 6. 1g; 7. 79, 589
Oberstein 6. 22
Oberyssel 4. 363g, 364g.
Ocker 8. 583
Ödenburg 0. 84
Öderan 9. 744g.
Oder-Ebene 5. 77g.
Odessa 9. 861p.
Ohaba 9. 79
Ohio 6. 109p.; 7. 340, 341p., 626p.; 8. 400p.; 9. 825g.
Ohmden 5. 494
Ohm-Gebirge 2. 1g.
Öhrenstock 9. 298
Oktibbeha-County 8. 823
Olah-Lapos-Banya 9. 835
Oláhpian 4. 69, 710g.
Olette 4. 72
(Ostpyrenäen) 3. 474
Oliera 9. 200
Olot 3. 573
Ölsnitz 9. 704
Öningen 2. 759p., 959g.; 3. 499p., 874; 5. 546, 621!p., 636p.; 6. 129g.; 9. 118, 501p., 723, 853
(Flora) 0. 115, 499
Oos 9. 143, 152
Opatowitz 6. 459, 747p.
Oporto 0. 98g.
(Silur-Flora) 0. 108
Oran 3. 741g.; 6. 450g.; 9. 820m.
Orange-county 6. 445
Orawitza 9. 292
Oregon 0. 95; 4. 107; 6. 354; 8. 103g.
Orel Gouvt. 0. 243p.; 6. 111p.; 9. 845
Orenburg 2. 353
Orglande 1. 100
Orinoko-Ebenen 8. 859g.
Orkney's 4. 820
Orla-Thal 3. 769g.
Orléans 5. 223p., 370ff.
Örlinghausen 0. 385ff.; 2. 185
Örlinger Thal 7. 556p.
Orontes-Thal in Syrien 0. 223
Orsowa 3. 591
Ortenburg 7. 266p.; 8. 349, 403p.
Orthez 3. 74
Ösel 5. 865; 6. 690; 7. 843; 8. 320, 593g., 600g.; 9. 57, 759
Osnabrück 0. 393; 2. 358g.; 3. 445; 7. 495
Osorno 2. 551!
Osterkappeln 8. 583
Osterode 4 210
Österreich 1. 634p.; 2. 254p., 362, 980p.; 6. 481, 484p; 7. 344g.; 8. 586; 9. 837gp., 843

Österreich
ob der Enns 0. 728
tertiäre Florula 2. 748
Tertiär-Mollusken 2.630
Österreichisch-Schlesien 2. 624 g.
Osterwald 5. 162; 8. 582
Osterweddingen 3. 625 p.
Ostindien 4. 457; 5. 855 g.; 6. 42; 7. 47; 9. 749
(Vorder-) 5. 733 g.
Ostindischer Ozean 8.587g.
Ostsee
-Provinzen 2.54 9.120, 864
Othmarsingen 3. 163 p.
Ötzthal 3. 786; 9. 752!
Oviedo 5. 358

P.

Padua 7. 811 g.
Paffrath 6. 209
Palagonia 6. 46
Palästina 8. 608
Palembang 8. 588
Palermo 9. 640 p., 861
Palma (Insel)
Relief-Bild 4. 228
Panama 2. 496 g.
Pappenheim 3. 750 p.; 9. 763 p.
Paradiesberg 2. 873
Paraguay 2. 361 g.!
Pardines 5. 370 p.
Pargas 6. 351
Paris 5. 360!g.; 7. 465, 490 gp., 631, 733; 8.616, 834; 9.125p., 228, 239
Pariser-Becken 6. 210; 7. 631 p.; 9. 756 p.
Paris-Londoner Becken 3. 188
Parschlug 3. 47; 8. 586; 9. 118
(Flora) 0. 115
Partenkirchen 6. 568
Passau 3. 460, 466
Passy 5. 223 p.
Patagonien 7. 379
Pau 1. 752 p.
Paumotu
-Archipel 4. 461* ff.
Pavia 4. 626
Payta-Bay 9. 233
Pechgraben 0. 89 g.
Pédémar-Berg 9. 220
Peine 5. 7
Peipus 2. 68
Peissenberg 4. 520! g.
Pendjab 4. 457
Pendock 7. 344 p.
Pernant 5. 474
Pennsylvanien 1. 481; 8. 400 p.; 9. 379 p.
Pentelikon 7. 371
Peréal 4. 608 p.
Perledo 3. 167; 6. 216; 8. 88
Pernau 9. 64 g.
Pernigotti 4. 35 g.
Perréal 5. 223 p., 374 p.
Perrier-Berg 5. 223 p., 370 p.
Persien 8. 736 g.
Perte-du-Rhône 3. 330; 4. 375
Peru 4.346 m.; 5. 835 m.; 6. 714; 7. 731 g.
Geologie 1. 356
Petersberg 9. 466 g.
Petersburg 8. 630 p.
(Petersburgh) 8. 686
Petit-Coeur 0. 663, 834; 4.109; 6.70; 8. 225 9. 220 g.
Petschora 0. 728
-Gegenden;
Geologie 0. 728
Peyrolles 5. 370 p.
Pferdskopf 9. 833
Pfitsch 8. 825 m.
-Thal 7. 331 m.; 9. 625 m.
Pfunders 7. 325
Phlegräische Felder 1.589; 2. 497 g.
Phrygien 8. 575
Pialpinson
(Flora) 0. 113
Pichachen 0. 840 ff.
Pick-Gebirge 9. 854
(vgl. Bikk-Gebirge)
Pico (Azoren) 0. 11 g.
Piemont 2. 999 p.; 3. 335 g.; 5. 732; 9. 60 ff.
Piesting 4. 866 p.
Pietzpuhl 9. 865 p.
Pikermi 4. 637!, 638 p.; 5. 375 p.; 6. 594; 7. 124, 234p., 370p., 759 p.; 9. 270 p.
Pilgramsreuth 4. 722
Pilsen 6. 577; 8. 92
Pirano 7. 829
Pisa 9. 115 p.
Pi-sé 2. 551!
Pitkäranta 8. 467
Piz Minschun 8. 91
Plateau
de la Cavalerie 1. 466
Plattenberg 9. 862 p.
Plattensee 7. 181
Plauerscher
Grund 2. 652; 4. 834; 6. 475
Plombières 7. 578; 8. 734
Podhorn 1. 775 g.
Pola 1. 603
Polar-Gegenden 8. 109 p.
Poldern 4. 89
Polen 5. 463 g.
Polk 7. 176 m.
-County 9. 819m.
Pommern 5. 847
Pontil 7. 842
Poonah 4. 78
Popilani 0. 225
Popokatepetl 7. 55
Poratsch 3. 478 m.
Porrentruy 4. 353 g.
Porta Westphalica 3. 324, 327
Portland 7. 848
Port Leopold 9. 221 pg.
Port-Natal 0. 482; 7.369p.
Porto-santo 5. 507 p.
Porto-venere 7. 597
Portugal 5. 95 g.
Geologie 0. 478
Pössneck 3. 128
Potsdam 8. 94 g.
Pottsville 5.875; 9.379p.
Pozzuoli 0. 357; 1. 589; 8. 223
Prasberg 8 586, 587 gp.
Predazzo 0. 132; 1. 323; 2.490; 4. 305!; 8.85

Preston 6. 88
Prevali 6. 633p.; 8. 586; 9. 740
Prince-Leopold's Island 4. 85
-Patrick-Insel 9. 221pg.
-Regent's-Inlet 4. 85
Promina 6. 485; 8. 586
Provence 6. 502 p.
Przibram 5. 76 m.; 7. 847 g.; 9. 77 m., 306, 841
le Puy 4. 831 p.
-en-Velay 5. 223p., 370p.
Pyrenäen 0. 486; 2. 965 g.; 3. 569; 4. 466 m.; 5. 83, 358, 679, 721; 7. 858 p.; 9. 470, 748

Q.

Quadalaxara 0. 84
Quang-ngai 8. 77 m.
Quedlinbburg 0. 133 g.; 5. 368 p., 493;
Quedlinburg 7. 622
Queen's-Channel 4. 85

R.

Radnitz 5. 505 p.; 6. 96 gp.; 8. 92
Radoboj 0. 852, 854; 2. 748; 3. 47, 627p. 874p.; 4. 178, 701 m.; 8. 586; 9. 118
(Flora) 0. 114
Radowenz 8. 90p., 754
Rauhthal 3. 15
Raibl, in Oberkärnthen 0. 733; 2. 769 g.; 7. 618 p.; 8. 1 gp., 124 p., 129p., 504p.; 9. 39 p.
Ralligen 9. 500 p.
Ralligstöcke 4. 613 g.
Rammelsberg 2. 71; 3. 599m.; 8. 829m.; 9. 83 m.
Randen 0. 856
Ranville 0. 162; 5. 633p.ff.; 8. 483
Rautenberg 8. 583, 686; 9. 488
Rasgatà 3. 54
Rathshausen 4. 205 g.
Real del monte 9. 213
Recoaro 5. 315; 6. 213g., 823; 7. 778p., 812 g.
Red-River 7. 458 g.
Redoule, la 1. 737
Regensburg:
Geognosie 0. 624
Reichenau 5. 858
Reichenbach 6. 186
Reichenhall 1. 203
Reichenstein
(in Schlesien) 3. 187m.
Rein
(in Steiermark) 5. 767
Reisensburg 1. 677 p.; 2. 304
Remagen 8. 835 g.
Remiremont 2. 85
Rennes 3. 102p.; 8. 869 p.
la Réole 5. 233 p.
Reposoir
-Thal 0. 474
Réthel 6. 358
Reuth 7. 5 g.
Reval 5. 852
Rezbanya 1. 705; 2. 852; 9. 734
Rhätikon 4. 835
Rhein 0. 385; 3. 535
-Becken 0. 862, 863; 1. 728
-Ebene 1. 728
Rhein-Lande 8. 744
Braunkohlen-Flor 2. 985
Rhein-Preussen 4. 605; 7. 454; 9. 855 g.
Rhein-Thal 3. 524 g.
Rheinfelden 7. 136
Rhode-Island 2. 849
Rhön 4. 161g.; 5. 166; 6. 24g., 421; 8. 711g; 9. 770, 831
-Gebirge 2. 942; 3. 437g.
Rhone 5. 719, 6. 82
-Becken 2. 362 g.
-Dpt 9. 315
-Thal 5. 464
Rhonen, hoher 3. 497 p.
Richmond
(Wirbelthiere) 1. 254!
Riddarhyttan 5. 705 m.
Ridgeway 5. 746 p.
Riechelsdorf 5. 71 m.; 6. 43 m., 444 m.
Riesgau 0. 314
Riesengebirge 9. 457 g.
Rilly-la-montagne 7. 490
Rimogne 7. 207, 211
Rio Colorado 3. 40
Florido 8. 770 ff.
grande 3. 32; 7. 458g.
-tinto 9. 88 g.
Rivaz 9. 500 p.
Riviera 3. 564 g.
Robin-Hoods bay 6 455 g.
Rocca Monfina 0. 233; 8. 292
Rocky
mountains 3. 613gp.!; 5. 195, 355, 726g., 8. 709g.; 9. 602
Rochlitz 8. 831 m.; 9. 81 m.
Roczyny 2. 348
Rodriguez, Insel 5. 489
Rohitsch 9. 633 g., 821
Rokitzan 7. 638 p.
Rom 5. 352 g.; 8. 584; 9. 234 p.
plutonische und vulkanische Bildungen 0. 231
Romerikenberg 2. 465p.; 4. 49; 5. 336 p.; 7. 491 p.
Romery 7. 211, 213 g.
Roncà 7. 230 p., 776 p.
Ronzon 4. 831p.; 5. 223p., 373
Röraas 6. 76
Rosstrappe 8. 843

Rothes Meer 1. 724; 5. 472
Rothplatten-Graben 9. 642
Rothweil 5. 366 p.; 8. 291
Rott 1. 677 p.; 2. 54; 3. 163 p.; 4. 580; 8. 556; 9. 237 p., 723 p.
Rotzo 4. 35 p., 456
Royan 0. 488; 1. 100
Royat 5. 445
Rüberkamp 6. 574
Rüdersdorf 5. 367 p.
Rudolphstadt 7. 165
Ruff-mountains 3. 474; 4. 72; 6. 51
Rügen 3. 608 p.
Ruhpolding 3. 191
Ruhr 2. 72, 98 g.; 4. 73 g.; 6. 584 g.; 7. 96
Rurutu (Inselgruppe) 4. 464*
Russland 0. 740; 1. 607 g.; 2. 757 p.; 4. 110 p.; 6. 74; 7. 373 p., 472 g., 633 p.; 8. 110 p., 238 p., 248 p. 739 p.; 9. 120, 357 p., 364 p., 845 g., 861 p., 864
  Geologie 0. 728
  Jura Formation 0. 226
Ruszkberg 8. 86 g.
Rybna 5. 756; 6. 746 p.

S.

Saal-Berge 2. 350
  -Thal 3. 9
Saale (Salzburg) 5. 219
Saalfeld 3. 123, 614 g.
  Flora 2. 56
Saalhausen 6. 543
Saarbrück 2. 768 p., 996 p.; 5. 865 p.; 6. 108 p.; 8. 612 p.
Saatzer Kreis 8. 718 g.
Sabero 6. 368
Sachsen 2. 373 p.; 3. 621 p.; 5. 477, 625 p.; 6. 474 g.; 8. 502 p.
  Kreide 0. 306
Sacramento-Thal 8. 103 g.
Sacrau 1. 600
Sagor 2. 748; 8. 586
Sahara 9. 474 g.
Sahla 9. 815 m.
Saint-Affrique 7. 612
  -Claude 8. 725 g.
  -Etienne (Flora) 0. 109, 110
  -Gely 5. 223 p.
  -Geniès 5. 223 p.
  -Gerand-le-Puy 5. 223 p.
  -Marcel 1. 89; 2. 702
  -Michael (Azoren) 0. 3 g.
  -Nectaire 5. 445
  -Ouen 7. 490
Sainte-Croix 8. 629; 9. 124 p., 373 p.
Sala 2. 879
Salairsk-Gebirge 0. 86
Salcedo 3. 46 p.; 4. 251 p., 626
Salcedo (Flora) 0. 114
Salève-Berg 7. 84
Salins 6. 455 g.; 9. 350
Salles 3. 73, 74
Salmendingen 1. 503
Salonichi 8. 383; 9. 216 g.
Saltrio 6. 217; 8. 88
Salt valley 6. 88
Salzberg, der 6. 360, 486
  bei Quedlinburg 0. 135
Salzburg 0. 513, 550; 4. 194; 5. 219 g.
  Geologie 0. 728
Salzgitter 1. 325; 7. 495
Salzhausen 2. 467 p.; 4. 211; 6. 757 p.
Salzsee, der grosse 3. 613; 4. 202 g.; 5. 195; 8. 103
Samoa-Inselgruppe 4. 463* ff.
San Andrès 9. 827!
  Francisco:
    Geologie 0. 494
  Gregorio 8. 770 ff.
  Jorge (Azoren) 0. 8 g.; 8. 757; 9. 254
  Isidro 3. 617 p.
  Mihiel 0. 3 g.; 7. 84
  Pedro da Cora 0. 99
  Salvador 5. 170, 479²
  Vincente 6. 242 gp.
Sancerre 9. 762 p.
Sanct-Cassian 0. 129 ff.; 5. 757; 8. 767
  -Schichten 4. 559
  vgl. Cassian
  -Domingo 2. 508 p.; 5. 89
  -Florian 6. 716; 8. 860 p.
Sanct
  -Gallen 2. 35 g.; 3. 497 p.; 5. 578 g.; 6. 129 g.; 7. 780; 8. 659; 9. 273, 501 p.
  -Gotthard 7. 609 m.
  -Helena (Insel) 4. 834 g.
  -Stephan 1. 635
  -Wolfgang 3. 717 g.
Sandling 5. 500, 502 p.
Sandwichs-Inseln 2. 959, 976; 4. 366, 465*; 6. 199; 8. 101
Sangerhausen 5. 465
Sansan 1. 763 p.; 3. 105 p.; 5. 223 p.; 374
Santander 9. 449 m.
  Geologie 0. 486
Santiago 4. 791
Saône- u. -Loire-Dept. 9. 103 g.
Sardinien 6. 555
la Sarraz 4. 83
Sarthe-Dpt. 6. 848 g.; 7. 851 p.
Sarzanello 9. 871 gp.
Saucats 3. 73, 74
Savona 3. 564 g.; 6. 92
Savoyen 4. 109; 6. 66 g., 213; 8. 225, 380 p., 481 g.; 9. 349 g.
Sayner-Hütte 3. 59
Scarborough 3. 232 p.; 7. 743 p.; 8. 483
  (Flora) 0. 112
Schandau 7. 552
Schanzenberg 2. 460 p.; 3. 607
Scharlei 6. 356
Schaumburg 1. 60
Scheerensteig 8. 752 p.

Scheidsburg 8. 835g.
Schemnitz 4. 78; 6. 36m
(Flora) 1. 115
Schie 7. 831
Schienener Berg 0. 499
Schildstein 4. 779m.
SchindlerGang-Zug 1. 21
Schlackenwalde 6. 29
Schlanders 1. 445
Schlangenberg 0. 86
Schlern 0. 130ff.
Schlesien 2. 624g., 892g.;
3. 125g., 701;
4. 477g., 724,
5. 717g.; 6 458g;
745g.; 7. 839g.;
8. 332; 9. 830
Schleusingen 9. 799
Schlotheim 8. 615p.
Schmeien 3. 378p.
Schmiedefeld 4. 185
Schmiedehausen 3. 15
Schmölnitz 3. 703
Schneckenberg 8. 752p.
Schneckenstein 4. 787m.
Schneeberg 2. 866g;
2. 725, 843m.;
4. 423, 826
Schönebeck 5. 477
Schonen s. Schoonen
Schöningen, Saline 7. 463
Schönstein 8. 587
Schoonen 7. 625; 8. 859
Schossnitz 2. 635; 3. 225;
5. 368p.; 6. 227;
8. 256; 9. 118
Schottland 1. 636; 5. 462;
6. 67, 354g., 442²m.;
7. 732g.; 9. 337g.,
507p., 875p.
Schraplau 3. 45; 5. 871
Schrotzburg 9. 118, 501p.
Schulau 7. 53
Schwaben 5. 612; 6. 850ff.;
7. 92; 8. 352g.,
353g., 641g.; 9. 452g.
Schwäbische Alp 1. 501p.;
3. 377p.
Schwarze Quelle 3. 594!
Schwarzenberg,
der 3. 85g., 492
Schwarzenstein 1. 595
Schwarzwald 1. 1ff.;
3. 805; 6. 667g.;
7. 28, 779g.; 8. 720
Hebung 5. 55
Schweden 2. 242p.!;
Schweden
3. 608p.; 4. 179m.,
492p.; 6. 794gp.;
8. 703g.; 9. 257g.
Marlekor 0. 34
Schweitz 1. 599g., 717g.,
2. 35g., 198, 231g.,
847, 863; 3. 497;
4. 355g., 639, 826;
5. 179m., 468, 615p.,
636p.; 6. 11m.,
51, 129g., 729;
7. 623p., 779g.,
844g.; 8. 629. 636p.,
747p.; 9. 372p.,
427p., 500p.
Paläontologie 4. 374
Schwiebus 1. 696
Sebastopol 8. 873
See-Alpen 6. 575g.
Seefeld 0. 734; 7. 617;
8. 4; 9. 753
Seeläsgen 1. 696; 2. 211
Segeberg 4. 779
Segovia 6 205g.
Selke-Thal 0. 91
Selters 4. 614g.
Selvretta 9. 752!
Seisser-Alp 0. 131; 9. 77m.
Sémur 6. 455g.; 9. 452g.
Sentheim 8. 590
Serbien 6. 710; 8. 87g.
Serravezza 7. 594
Serre-Gebirge 9. 104
Seveckenberg 7. 871
Sevres-Dpt. 9. 371p.
Seychellen 8. 339g.
Shanghai 5. 384
Sheppey 5. 220
(Flora) 0. 114
Siebenbürgen 3. 460;
4. 68, 423m., 674,
711, 836; 6. 251p.,
479p., 689, 690m.;
7. 187g., 610g.
Siebengebirge 1. 816;
2. 465p.; 3. 193g.;
4. 49p., 593, 623p.;
5. 87; 6. 231, 552,
564m.; 7. 491p.,
582, 721; 8. 321,
556, 857g.; 9. 237²p.,
723p.
Sibirien 1. 467; 3. 72;
4. 477, 822
Hölzer 0. 126
Sieblos 6. 421; 7. 554p.;
Sieblos
8. 712g.; 9. 114,
115p.
Sieg-Gegend 7. 77
Siegen 2. 67, 490, 844;
3. 182m.; 4. 710;
6. 80
Siena 9. 1g6gp.
Sierra blanca 6. 278
de Chartagena 8. 348
madre 5. 726
morena 1. 68; 3. 616;
6. 469g., 499p.
nevada 1. 28; 5. 355,
458; 7. 461g.; 8. 709
Geologie 8. 229
Sigri 4. 862
Simbirsk 6. 101; 9. 845
Simorre 5. 223p.
Simplon 1. 333
Sinai-Berg 4. 724g.
Singapore 8. 589
Sinigaglia 9. 118, 872p.
Sinnatengrün 8. 574
Sioux-Land 8. 254p.
Siränowosk 4. 832g.
Sitter 2. 36g.
Sizilien 3. 278; 9. 464
Skandinavien 0. 477;
6. 219; 9. 471
Hebung 1. 175
Skopau 3. 631
Sky 2. 210
Skye 2. 350
Smjejew 0. 86
Smolensk 4. 465g.
Snarum 1. 604; 4. 595;
5. 569m.; 7. 836m.
Soden 9. 46!
Soissonnais 2. 882;
5. 223p.; 7. 490g.
Soissons 3. 189
Solenhofen 3. 750; 4. 52ff.,
210; 6. 418p.; 7. 366;
8. 489, 622p.;
9. 763p.
(Flora) 0. 112
Solothurn 4. 84;
9. 366p.
Somma vgl.
Monte di Somma
Sommières 5. 223
Sondrio 8. 83g
Sonnenstein 3, 600
Sonora, la in Mexico
2. 75; 7. 166
Sonthofen 7. 481

Sooden (bei Allendorf an der Werra) 2. 494 3. 70
Sotzka 2. 748; 3. 47; 8. 513g., 584g.; 9. 118
Soubrigues 3. 74
Souvignargues 7. 250p.
Spanien 1. 24g.; 2. 339p., 342g.; 3. 569g, 616 g.; 4. 460; 5. 357!g.; 6. 205g.; 9. 308, 318, 319, 321, 721
Geologie 0. 467
Spessart 4. 614g.; 8. 607g.
la Spezzia 4. 456g.; 6. 216, 749; 8. 89
Spitzbergen 0. 85
Spitzhut 8. 582
Staffordshire 1. 477
Stannern 3. 699
Starhemberg 4. 87, 763
Starkenburg 2. 201g.
Stassfurth 4. 779m.; 5. 477; 7. 73. 837
Staufen 1. 1; 2. 536g.
Steben (im Voigtland) 3.702
Steier vgl. Steyer
Steierdorf 6. 253p., 357; 7. 444g.
Steinberg 8. 569
Steinheim 1. 503p.; 5. 166
Sternberg 8. 102
Heilquelle bei Prag 2. 74
Sterzing 2. 849; 3. 53
Stettfurt 9. 501p.
Stettin 7. 495, 835; 8. 102
Stevens Klint 1. 791g.
Steyer 0. 89*; 1. 231g.
Steyermark 1 593; 6. 44, 63, 197g., 716; 7. 337g.; 8. 499p., 513, 585, 860p.; 9 312g., 373p
Geologie 0. 712
Steyersche Florula 7. 636
Stincher Fluss 1. 636
Stilles Meer 4 460g.
Stockach 7 781; 9. 141g
Stockheim 3 1g.
Stonesfield 5 746p.; 7. 109, 365p
(Flora) 0. 112
Stradella, la 4 626
(Flora) 0 115
Stradonitz 3. 120p.
Strakonitz 4 348; 6 577g.
Stramberg 9 607g.
Strassgang 8 586
Strouth 2 226gp
Strehlen (Geologie) 0. 466
Streitberg 0. 171
Striegau 9 831
Striese 3 225p
Stromboli-Laven 2 316
Stura 6. 71
Subapenninen 5 223p
Sudemer-Berg 3 495
Süd-Afrika 6. 105; 7. 90; 9. 495, 496
Süd-Amerika 6. 231p.; 8 859g.
Süd-Australien 1. 202*
Süd-Russland 9. 861
Südermannland 1. 359g.
Sudeten 8 546
Südsee 4. 460; 8. 101
Geologie 1. 356
Suffolk 6 491p.
fossile Knochen 0 90
Sulzbach 4 184
-Thal 7. 337g.
Sulzbad 4 123p; 5 756p.
Sulzbrunnen 1 161
Sumatra 8. 588
Süntel 8. 583
Superga 3. 331
(Flora) 0. 114
Surinam 3 683
Sussex 7. 99
Swanage 5 237p, 6 110; 8. 114p.
-Bay 5. 746p.
Swinitza 3. 379
Swoszowice 1. 732; 9 118
in Galizien: Flora 1 127
Sydney 8. 229g.
Sylt 7. 50, 235
Sympheropol 3 759
Syrien 7 450
Versteinerungen 0 222
Szakadat 6 251p.
Szanto 9. 198

T.

Täbingen 9. 628
Tabor 5. 81
Tahiti 8. 101
-Inseln 4. 463* ff.
Tajo 0 478
Talca
Talmatsch 3 110p.
Taman 1. 718; 5 460; 6 715
Tammela 8. 830m.
Taninge 7 766
Tarapaca 3 835g.; 4. 446; 6 553
Tarasp 9. 85g.
Tarawan-Insel-Gruppe 4. 465*
Tarentaise 0. 120, 656, 831; 5 91; 6. 70g.; 8 225; 9. 220g.
(Flora) 0. 110
Tarija 3. 751p.; 6. 231
Tarn 3. 71
Tarnowitz 2 93; 5. 756; 6. 746p; 8. 691
Tarsus 5. 595
Tasmania 8 294
Tatra 8. 343
-Gebirge 2 971; 8. 105
Tauern 0. 524
Taunus 8 607
Taurus 5. 241p; 9. 289
Teisenberg 2. 129gp; 4. 537
Tejupilco 6. 304
Tennessee 5. 843; 8 350g; 9. 505p.
Terceira 0. 5g.
Ternitz 8. 832m.
Teschen 7. 351g; 9 606
Teufelsgrund 5. 411m.
Teutoburger Wald 1. 62, 310; 2. 185g., 589; 3. 31g.; 5. 733; 6. 721; 7. 192g. 9. 855
Geologie 0. 385
Texas 1. 577; 2. 850, 960g; 3. 31g, 165p;

Texas 6. 347, 480p ; 8. 553
Thalheim 6. 251 p.
Tharand 3. 490
Tharander Wald 2 451 g.
Theben 0. 313
Thessalon-Island 5. 395p.
Theta 8 550
Thjorsá: Laven 2. 317
Thor-Oglu am Taurus 0. 223
Thun 1 599; 4 613
Thurgau 6. 129 g.
Thüringen 1. 640p ; 3 769; 4. 46, 124 p., 496, 633p ; 6. 59g.,503p , 615 g.; 7. 471; 8. 622 g.
Lettenkohle 3. 220 g.
Thüringer Wald 1. 782; 4. 185; 6. 60 g.!, 624 g.
Thurn (Pass) 4. 94
Tiber-Delta 3. 615 g.
Tiberias-See 1. 488
Tihany 7 181
Tilgate-Forest 0. 745
Timor 9 197 g
Tinos 0. 313
Tippah-County 9. 497
Tirol s. Tyrol
Tischenreuth 3. 363 g. ; 4. 819 m.
Titikaka-See 0 472; 3 751
Tokay 4. 490g.; 9. 835
Toconado 5. 7
Todtes Meer (Wasser-Analyse) 0 454
Organismen im Boden 0. 489
Toledo 6. 469 g , 499 g.
Tolfa, la 0 356
Toluca 3. 174; 5 446, 572; 7. 830
Tölz 1. 161, 349; 4. 536
Tongan-Insel-Gruppe 4. 464 *
Tongatabu 8. 101
Torcy 8. 102
Torres-Strasse 8. 593
Tortona 2. 1002 g.
Tortworth 2. 727
Toskana 1. 722g ; 4 155g , 694g ; 5 450, 699m , 834; 6 349², 460g , 689²m , 693m., 749; 7. 592g ; 8 704; 9. 115g , 118, 234
Lagoni 0. 492
Toulon 3 566
Tour, la 4. 198
Touraine 3. 77; 4 608g.; 5. 223 g.
Tour-de-Boulade 5 223 g
Tours 4. 840 g.
Transkaukasien 1. 205 *; 8. 596 g.
Traun 2. 593; 3. 91
Traun-Gebiet 2. 92
Traunstein 2. 129 ; 3. 191 ; 4. 57 p.; 5. 42 ; 6. 535
Travers-Thal 5. 200
Traversella 9. 62m., 80m.
Trient 7. 814 g.
Trier 6. 711; 9. 741
Triest 7. 810g.; 9. 737 g.
Trofeiach 1. 634
Trojagaer -Gebirge 5. 735
Troppau 8 809 g ; 9. 201 g. , 307 g , 605 g.
Tschatyr-Dagh 8. 873
Tuczon 6. 273*; 7. 166
Tuffer 2 748; 7. 163
Tula 1. 609; 5 581 g.
Tunaberg 1. 359 g. ; 2 879; 3. 704 g. ; 5. 452
Tundra 0 126
Tunkinskisches Gebirge 5 447
Tunstall Hill 9 761
Turbaco (Vulkan) 4 717; 5 93, 466
Turin 2 988 g , 999 p.; 3. 332 g.; 6. 172; 9 60
Turnau 7. 110p.; 8. 586
Turnay 3. 229 g.
Turner's Falls 7 877 p.
Tweed 3. 380
Tyrol 2. 109 g , 354 g ; 3. 320 , 839 m ; 5 93, 846 ; 6 360; 7. 221 , 616, 619, 689 ; 8. 444 g ; 9. 199g , 275, 306g 312 g.
Tyroler Alpen 6 661 g,

U.

Überlingen 9 141 g.
Überlinger-See 7. 781
Ubsttt 9. 516
Uffhofen 2. 831 p.
Ulatutan 8. 470 m
Ullernaas 4. 302 ff
Ulm 1. 503 p.; 6. 604 ; 9. 172 p.
fossile Knochen 1. 76ff.
Ulster-Thal 4. 161 g.
Ungarn 9 193, 295 g., 479 g , 835, 851, 854 g.
Unkel 4. 91
Untersberg 4. 319
Unterkirchberg tertiäre Knochen 1. 79
Unterrhein-Dpt. 3 320 g
Upnor 3 189
Ural 0. 237, 449; 1. 463, 467 , 610 ; 2. 850; 3. 62, 72; 5. 460 g., 575m., 702 6. 560m., 572, 576g. ; 7. 186g., 330 m. , 443 m. , 710 m.; 8. 298 p., 685 m. , 695 m. , 818 m.; 9. 231 gp., 300 m.
-Gebirge 0. 86
Urk (Insel) 5. 99 g.; 6. 572 g.
Urmia-See 6. 694; 7. 501p., (Urumiah-) See 7. 581
Ursprung 6. 446
Usingen; Grauwacke-Gebirge 0. 287
Ustürt 1. 470
Utah 5. 202 g.
Utö 8. 327
Utznach 5. 563 m. ; 9. 118 g., 346
Utzwyl 9. 429 p.

V.

Vaels 2. 111
Vaihingen 6. 455 g.
Val Brembrana 4. 456; 6. 218; 8. 88, 383
Val d'Arno 4. 609 p.
Val di Magra 9. 872 p.
Val Seriana 3. 167; 4. 835
Trompia 3. 167
Tuoi 9. 97 g.
Valdivia 3. 563
Vallières-les grandes 4. 473
Vallongo 0. 99
Valmondois 3. 189
Valogne 1. 100
Van-See 6. 694
Vancouvers-Insel 9. 754 p.
Var-Departement 2. 367 g.
Vaucluse 1. 490; 5. 223 p.; 7. 84
-Dept. 5. 223 p., 374 p.
Vaud: vgl. Waadt
Vaugirard 5. 223 p.
Velay 4. 608 p.; 5. 370 p.
Velez Malaga 5. 458
Venagas 8. 770 ff.
Vendargues 5. 223 p.
Vendée 2. 83 g., 730 g.
Venedig 2. 352; 4. 31 p., 251 p., 7. 230 p., 809 g.
Venetische Alpen 0. 536; 7. 619
Venezuela 0. 479; 4. 106; 5. 564
Venzone 2. 687
Vera-cruz 7. 717 m.
Veraguas 2. 496 g.
Verdun 7. 84
Vereinte Staaten 5. 194, 527 m., 533 m.; 6. 91 g.; 7. 862; 8. 601 g., 628² p
Vermont 4. 196; 5. 846 m.
Vernet-Thal 5. 83
Verona 7. 230 p., 775 p., 813
Vestone 9. 500 p.
Vesuv 1. 465, 603; 3. 257 m.; 5. 698 m.; 7. 590, 840; 8. 70 m., 218, 842; 9. 229, 9. 299, 633, 731 m., 857
Ausbruch von 1850 1. 209
Laven 2. 316
Vettakollen 4. 302 ff.
Vic 5. 702 m.; 7. 213 g.
Vicentinisches 6. 213 g.
Vicenza 4. 251 p.; 6. 823; 7. 230 p., 811; 9. 359 p.
Victoria 5. 197; 9. 624, 625 m., 822
-Fluss 8. 81
Virginien 6. 88, 101; 9. 751 g.
Virton 6. 455
Visp-Thal 5. 807; 6. 51 g.*; 7. 95
Vogelsberg 2. 591, 897; 3. 141 g., 707; 4. 614 g.; 8. 606 g.
Vogesen 2. 863, 881; 3. 736 g.; 4. 193 g.; 5. 850; 6. 359; 8. 734²
Vöhringendorf 3. 378 p.; 7. 870
Voigtland 4. 787 m.; 5. 574
Voirons 8. 381; 9. 123 p., 372 p.
Volhynien 3. 807
Voltaggio 6. 92
Voralpen 4. 513 g.
Vorarlberg 4. 203 g., 829 g.; 5. 178 g.
Vöringendorf
vgl. Vöhringendorf
Vörösvagas 8. 213
la Voulte 5. 731
Vulkan San Andrès 9. 827

W.

Waadt 4. 639; 5. 472 g.; 8. 747 p.
vgl. Vaud
Waadtland 4. 36, 83, 639; 7. 625 p.; 8. 118
Waag 9. 201 g.
Waingongora 0. 125
Waldeck 4. 15, 672 g.; 5. 314 g.; 6. 140 g.
Wales 4. 486 g., 487; 7. 238
Kohlen-Reviere 0. 498
Walle 3. 625 p.; 7. 495
Wallis 5. 472 g.; 8. 591 g.
Waltsch 3. 578; 6. 362
Wand 4. 866 p.
Wangen 6. 214; 9. 501 p.
Warasdin-Teplitz 9. 102
Warmbrunn 5. 213
Warwickshire 8. 227
Wassy 2. 510; 6. 66
Weilburg 4. 454 g.
Weinheim 3 552; 6 395, 6 533 p.; 8. 532 p.
(bei Alzey) 7. 496
Weissenbach-Thal 3. 719 g.
Weissenburg (Bern)
Mineral-Quelle 0. 62!
Weisseritz-Thal 3. 561 g.
Weisshorn 9. 630 g.
Weissig 6 543; 7. 552
Wellingtons-Canal 4. 85; 6. 465
-Strait 4 85
-Sund 7. 100
-Thal 8. 510
Wendelstein 4. 542
Werchojaner-Gebirge 5. 212
Werfen 0 731
Wesenberg 5 852
Weser-Kette 8. 561 g.
Westeregeln 3. 625 p.; 7. 496
Western Islands 1. 473
Westerwald 2. 292 g, 305 p, 851
Westgothland 4 492
Westphalen 4. 314, 366 g.; 5 49 g., 81; 6. 583 g., 711, 721; 7. 641 gp., 785 gp.; 9. 346 gp., 491, 855 g.
Wettin 1. 350, 353, 475

Wetterau 2. 58g.; 3 136, 141; 4 211, 459p.; 615g; 6 578, 757²p; 8. 498 g, 703 g.; 9. 121 p.
Wetterloch 4. 542
Wetterstein 5. 92
Wetzlar 2 203g, 828g, 976 g.
Wexiö 7. 69; 9. 819 m.
Weymouth 7 848
Whitby (Flora) 0 112
Wicklow 5 703 m.
Geologie 0. 494
Wieliczka 1. 635 p; 3. 382² p.
Wien 2 112 p.; 3 331; 4. 760 p.; 5, 768p; 6. 750gp; 8. 765p.
fossile Knochen 0 202
Wiener Becken 9. 837gp.
Wiener-Neustadt 5 86
Wiesbaden 4. 183
Wiesloch 2. 907; 4. 709; 7. 549; 8. 289; 9 1 g.
Wight 2 882, 1001 p.; 3. 189; 4. 82 g.; 5. 223 p., 370 ff
(Flora) 0. 114
Wildbachgraben 9. 641, 644
Wildsfluth 5 206
Wildshut
(an der Salzach) 3 120p.
Wildungen 6 140! g.
Winterberg 3 217 p.
Wipp-Thal 9. 753
Wippach-Thal 9 737 g.
Wisconsin 3 335p., 480g, 609g.; 5 488g.
Geologie 0 227
Wittekind, Soole 0. 63!
Wittichen 5 836 m.
Wogau 3. 15 ff.
Wolfach 4. 823; 5 832 m.
Wolfgang-See 4. 866! gp. 5 500; 6. 724 g.
Wolfsberg 1. 348
Wolga 6. 111p.; 9. 845g.
Wolkenstein 5 450
Wollin 6 577 g
Woolhope 2 727
Woolwich 3. 189
Worbis 2. 1 g.
Woronesch 4. 465 g; 9. 845
Wunsiedel 3. 491; 5. 200; 7. 70m; 8. 828m.
Württemberg 1. 501 p; 2. 637p; 4. 248p; 6. 741!; 8 352, 353 g.
Württemberegr Alp 5. 613 g.
Wüste von Atacama 4 791!
Wutach 3. 805; 6. 667 g.
Wysen 3. 65

X. Y.

Xiquipilco 6. 297; 7. 578
Yonne-Dept. 5. 207
Yorkshire 4. 483

Z.

Zacatecas 0. 446; 1. 348, 591; 3. 174; 6 288; 9. 736, 737
Geologie, Bergbau 0. 317
Zakopane 8. 343
Zamba
(Vulkan) 1. 208; 5. 93
Zapote 6. 278
Zaunhaus 3. 491
Zeisigwald 9 535 ff., 675 ff.
Zellerfeld 6 47 m., 443
Zentral-Indien 9. 750 g.
Zermatt-Thal 5 839
Ziller-Thal 4. 183; 8 826m.
Zinnwald 6 49, 195 m, 688; 8. 72 m.
Zips 9. 479
Zipser Komitat 9. 319 g.
Zirknitz 0 529
Zoldo 8. 383
Zovencedo 9. 113
Zschopau 9 673 ff, 744
Zuckmantel 3. 708
Zugspitze 3. 299, 442; 5 92
Zürich 2. 726; 9. 427p.
Zweibrücken 3. 529
Zwerglöcher 6. 707
Zwickau 3. 442 g, 535; 5 505 p.; 6. 448, 475, 543; 8. 651g; 9. 215, 674 ff.
Zwiefalten 4. 249 p.
Zwiesel 5. 674 m.

3 2044 106 271 042